508
L04b
9162

LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF VERMONT.

L. O. S. Kol

Oct. '95

BIBLIOTHECA
CARCINOLOGICA
L.B. Holthuis

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA

NATURÆ.

TOM. I. PARS VI.

CLASSIS VI.

VERMES.

Mihi contuenti ſeſe perſuaſit verum Natura nihil incredibile exiſtimare de ea.

Plin. XI. 3.

TARDIGRADA, mollia, pendentia, vivaciſſima, redintegranda, humidi Animantia, multa *acephala & apoda plurima*, *androgyna vel neutra*, multa, *tentaculis* plurima dignoſcenda.

IMPERFECTA veteribus, nec adeo inepte, dicta animantia, deſtituuntur auribus, naſo, multa capite, oculis *a*) pedibuſque diſtinctis, ab inſectis itaque diverſiſſima, a quibus dudum removi naturæ cryptogama: ſunt *Inteſtina*, *Molluſca*, *Teſtacea*, *Zoophyta*, *Infuſoria*.

INTESTINA terrena quondam dicta, ſumma corporis ſimplicitate conſpicua, alia intra alia animantia vivunt, alia in aquis potiſſimum *dulcibus*, pauciora in terra habitant; perforat *Gordius* argillam, ut aqua tranet, *Lumbricus* humum, ne ſitu corrumpatur, *Teredo* ligna, ut deſtruantur, quemadmodum *Pholades & Mytili lithophagi* petras, ut ſolvantur.

MOLLUSCA nuda, brachiata, vagantur pleraque per maria, cœlo reſplendentia, tanquam totidem lucernis tenebricoſum illuminant abyſſum phoſphorea.

TESTACEA, molluſca domiporta, calcareaque domuncula nobilitata, calcifica, & ipſa ſæpe calcivora, inſectis oppoſita ſpecierum numero, magna ludentis Naturæ varietate *b*) multi-

a) Vermium genus omne oculis carere, tradidit quidem *Plinius*, *at præter maritimos multos*, *limacibus*, *nereidibus*, *hirudinibus*, *oculi ſunt*, *ut que ab humanis diverſi*.

b) *Plin.* IX. 33. Tot *colorum* differentiæ, tot *Figuræ* planis, concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe cæſis, in dorsum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice muricatim intorto, margine in mucronem emisso, foris effuso, intus replicato; jam distinctione virgulata, crinita, crispa; canaliculatim, pectinatim, imbricatim undata; cancellatim reticulata, in obliquum, in rectum expansa, densata, porrecta, sinuata, brevi nodo ligatis, toto latere connexis, ad plausum apertis, ad buccinum recurvis. *V. Bonanni*, *Rumpfii*, *Kleinii explicationem*.

plicata. TESTAS polydædalas Conchyliorum parium æque attente legit ſumma ſapientia, ac care emit erudita luxuria, a quiſquiliis *c*) ad Ammirales Scalareſve, margaritis *d*) ſuis pretioſiores, quas artificum politura vitiando nobilitat, ut pulchrius pateat in tritonis COCHLEIS vividis ad *Umbilicum* aut *Cardinem* poſteriorem *Apertura* rarius *Operculo* clauſulis, cum *Labro* exteriore interioreve, ſæpe dentato ad *Columellam*, circa quam *Spiræ Anfractus* ſiniſtri, rarius contrarii dextri, *ſutura* connexi rarius *varice* cincti; læves, ſulcati, ſtriati, angulati, nodoſi, aculeati, ſpinoſi, frondoſi uſque in *Mucronem* apicis rarius decollatum, & ut intueatur in Veneris CONCHIS vividis lectis teſtarum nativa paria, determinatam figuram, valvulas ſiniſtras & dextras, æquales vel inæquales, æquilateres vel inæquilateres; interius dentatos *Cardines* inter *Nates* infimas *Umbonum* tumentium; inferius *Ani* impreſſuram, anterius *Vulvæ* rimam, *Labiis nymphiſque* conniventem, *Hymene* obtectam, *Pube* interdum cinctam; harum *Limbus* exterior circumſcribitur *Margine* integerrimo, crenulato ſ. dentato: *ſuperiore* ante vulvam; *poſteriore* pone anum; *exteriore* natibus oppoſito. Decet inprimis inquirere in foſſilium incognita protypa, inprimis *anomiarum*, abyſſi cimelia, cum alia ſint *terreſtria*, *fluviatilia*, *lacuſtria*, *littorea*, *maritima*, *pelagica* alia.

ZOOPHYTA compoſita animantia, in bivio animalium vegetabiliumque conſtituta, *radicata* (plurima) *cauleſcunt* multiplicata vita *ramis*, *gemmis* cæduis, metamorphoſique *florum* animantium ſponte ſeſe moventium, eo ſi plantæ eſſent Zoophyta, ſenſu motuque deſtituta, & Zoophyta veræ plantæ, ſed ſenſus motuſque organo inſtructæ (*equidem his ineſſe ſenſum, quæ nec animalium, nec fruticum, ſed tertiam ex utroque naturam habent*. Plin. *e*) adeoque vegetabilia naturali metamorphoſi mutanda in animalia. Horum alia mollia, nuda, Zoophyta ſtricto ſenſu audiunt; alia teſta quaſi dura obtecta *Lithophyta*. Hæc priſci plantas aeris contactu lapideſcentes putabant, ſed recentioribus etiam ex ſuo ſemine lapides germinare, inprimis ob calcaream horum indolem viſi, uſque dum *Marſiglii* diligentia extraxerat e mari corallia vegetantia floribus octandris octopetalis, a contactu aeris ſe contrahentibus, inque aqua denuo expandendis; at eodem tempore

---

c) *Speculatie-god* vulgo.
d) *Margaritarum* duos in candore, magnitudine, orbe, lævore, pondere. PLIN. IX. 35. Pretioſiſſima Cleopatræ Antonio expoſita. *Ibid.*
e) *Amœn. acad.* 5. p. 350.

(1727) *Peyſſonnellus* corallia ab animalculis fabricari, ultra ſeculum poſt eandem apud ſapientiores indos ratam ſententia *f*) primum vidit vix auditus, niſi *Tremblæus* (1741) hydras omnium admiratione detexiſſet, & ad littora curioſos allicuiſſet, quo via per *Elliſii* ſertularias ad corrallia aperta fuit. *g*)

INFUSORIA animalcula omnium minima, plurima oculis nudis vix uſurpanda, tentaculis deſtituta, plurima in infuſis habitant, ſemel exſiccata denuoque humectata non reviviſcunt.

AUCTORES, hæc animalia illuſtrantes pauci inter hos pretioſi; meritiſſimus *O. F. Müller*, tum *Bellonius* (1553), *Rondelet* (1554), *C. Geſner* (1558), Columna (1605), *Aldrovandi* (1606), *Jonſton* (1650), *Reimarus* (1773); de inteſtinalium hiſtoria meruere *Pallas* (1760), *Verſtoi de Czer* (1772), *Hepp* (1780), *Goeze* (1782), *Bloch* (1782), *Werner* (1782), *Retzius* (1786), *Schrank*; de reliquis inteſtinis vix ulli. De MOLLUSCIS *Bohadſch* (1761), *Klein* (1734), *Leske* (1776); de TESTACEIS primario ſobrius *Bonanni* (1681), ditiſſimus *Liſter* (1685), ſolidiſſimus *Rumpf* (1705), curioſiſſimus *Petiver* (1702), abſolutiſſimus *Gualtieri* (1742), nitidiſſimus *Argenville* (1742), pulcherrimus *Regenfus h*) (1758), locupletiſſimi *Martini* (1768), *Chemnitz* (1784), & *Schroeter* (1784), nec non *Columna*, *Barrelier*, *Bianchi*, *Klein*, *Ginanni*, *Lange*, *Leſſer*, *Knorr*, *Geve*, *Geoffroy*, *Ad. Murray*, *Favart*, *d'Herbigny*, *Ducheſne*, *Kaemmerer*, *Spengler*, *Adanſon* infelicique partu *Seba*, alii. De ZOOPHYTORUM hiſtoria meruere Comes *Marſigli*, oculatus *Donati*, lynceus *Ellis*, indefeſſus *Baſter*, acutiſſimus *Pallas*, *Solander*, *Cavolini*, alii; de infuſoriorum princeps, *O. F. Müller*, tum *Goeze*, *Wrisberg*, *Terecho-wsky*, *Schranck*, *Baker*, *Hill*, *Joblot*, *Ledermüller*, *Hermann*, *Eichhorn*.

---

f) *Rumpf muſ.* 152. *ad tab.* 16. F.

g) *Amœn. acad.* 5. *p.* 350.

h) *Regenfuſii* operis commentatore *Cl. Krazenſtein* & *Spengler* prodiere tantum tabulæ XII.

GENERUM Characteres.

I. INTESTINA. Animalia ſimplicia, nuda, artubus deſtituta.

* *intra alia animalia degentia, oculis nullis.*

276. ASCARIS. *Corpus* teres, poſterius attenuatum, capite trinodi.

TRICHOCEPHALUS. *Corpus* teres, capite filiformi longo.

UNCINARIA. *Corpus* filiforme elaſticum: capite labiato; labiis membranaceis angulatis, cauda (*feminæ*) aciformi (*maris*) uncis 2 veſicæ pellucidæ incluſis armata.

TILARIA. *Corpus* filiforme totum.

SCOLEX. *Corpus* minimum gelatinoſum opacum, capite exſertili & retractili: auriculis 4 pellucidis.

LIGULA. *Corpus* lineare æquale elongatum.

LINGUATULA. *Corpus* depreſſum oblongum: ore anteriori oſtiis 4 cincto.

STRONGYLUS. *Corpus* teres elongatum; anterius globoſo-truncatum: apertura circulari margine ciliata, poſterius (*feminæ*) acuminatum (*mari*) cucullatum.

ECHINORHYNCHUS. *Corpus* teres: proboſcide cylindrica retractili aculeis uncinatis coronata.

HÆRUCA. *Corpus* teres: capite aculeis coronata.

CUCULLANUS. *Corpus* poſterius acuminatum, anterius obtuſum: ore orbiculari.

CARYOPHYLLÆUS. *Corpus* teres læve, ore amplo.

FASCIOLA. *Corpus* depreſſum ovatum gelatinoſum.

351. TÆNIA. *Corpus* articulatum depreſſum, anterius tubulo inſtructum: poro ventrali duplici.

353. FURIA. *Corpus* lineare aculeis reflexis utrinque ciliatum.

281. MYXINE. *Corpus* teres ſubtus carinatum pinna adipoſa.

** *extra alia animalia habitantia.*

† *poro laterali nullo.*

275. GORDIUS. *Corpus* æquale filiforme totum, teres, læve.

280. HIRUDO. *Corpus* anterius & poſterius truncatum, ore caudaque progrediendo dilatata.

Vagientem etiamnum in cunis ſcientiam a matre lactante longius remotam mirentur adultiores. Cui ordini adſcribendum *Caſcinium* Solandri?

†† *poro laterali pertuſa.*

277.	LUMBRICUS.	*Corpus* teres annulatum : aculeis conditis.
279.	SIPUNCULUS.	*Corpus* teres : roſtro cylindrico anguſtato.
278.	PLANARIA.	*Corpus* depreſſum : poro ventrali.

II. MOLLUSCA. Animalia ſimplicia artubus inſtructa.

* *ore ſupero.*

288.	ACTINIA.	*Apertura* unica communi, dilatabili, nuda, baſi affixa.
	CLAVA.	*Apertura* unica communi, dilatabili verticali : tentaculis clavatis cincta.
	MAMMARIA.	*Apertura* unica, cirris nullis, lævis.
	PEDICELLARIA.	*Corpus* pedunculatum fixum : pedunculo rigido.
287.	ASCIDIA.	*Aperturis* duabus : altera humiliori affixa.
	SALPA.	*Aperturis* duabus : utraque terminali.
	DAGYSA.	*Aperturis* duabus. *Corpus angulatum.*

** *ore antico :*

† *pinna mobili ad abdomen vel caudam.*

	PTEROTRACHEA.	*Corpus* pervium, gelatinoſum tracheatum.

†† *corpore pertuſo foraminulo laterali.*

282.	LIMAX.	*Tentacula* 4. *Anus* communis cum poro laterali.
283.	APLYSIA.	*Tentacula* 4. *Anus* ſupra poſteriora.
284.	DORIS.	*Tentacula* 2. *Anus* ſupra poſteriora.
289.	TETHYS.	*Foramina* lateralia ſiniſtra gemina.

††† *corpore tentaculis anterius cincto.*

290.	HOLOTHURIA.	*Tentacula* carnoſa.
291.	TEREBELLA.	*Tentacula* capillaria.

†††† *corpore brachiato.*

292.	TRITON.	*Brachia* bipartita : quibuſdam cheliferis.
296.	SEPIA.	*Brachia* 8-10, inſtructa cotylis.
295.	CLIO.	*Brachia* 2, dilatata.
	LOBARIA.	*Corpus* ſupra convexum, ſubtus planum lobatum.
293.	LERNÆA.	*Brachia* 2. ſ. 3. teretia.
294.	SCYLLÆA.	*Brachia* 6 : remotis paribus.
	GLAUCUS?	*Brachia* 4 ramoſa.

††††† *corpore pedato.*

285. APHRODITA.	*Os* inerme. *Corpus* ovale, oculatum.
AMPHITRITE.	*Os* inerme. *Corpus* ſubrotundum. *Oculi* nulli.
SPIO.	
286. NEREIS.	*Os* unguiculatum. *Corpus* elongatum. *Tentacula* ſimplicia.
NAIS.	*Os* inerme. *Corpus* elongatum. *Tentacula* o.

*** *ore infero ut plurimum centrali.*

PHYSSOPHORA?	*Corpus* gelatinoſum e veſicula aerea pendens.
297. MEDUSA.	*Corpus* gelatinoſum læve.
LUCERNARIA.	*Corpus* gelatinoſum rugoſum brachiatum.
298. ASTERIAS.	*Corpus* coriaceum, muricatum.
299. ECHINUS.	*Corpus* cruſtaceum, aculeatum.

III. TESTACEA. Molluſca ſimplicia, obtecta teſta calcarea.

* *Multivalvia.*

300. CHITON.	*Teſta* multivalvis, longitudinaliter dorſalis.
301. LEPAS.	*Teſta* multivalvis inæquivalvis, ſeſſilis.
302. PHOLAS.	*Teſta* bivalvis: acceſſoriis poſterioribus.

** *Bivalvia* CONCHÆ.

303. MYA.	*Teſtæ cardines* (*ſæpius*) dente craſſo vacuo.
304. SOLEN.	*Teſta* utrinque hians: cardinis dente ſubulato reflexo, ſæpe duplici.
305. TELLINA.	*Cardinis* dentibus lateralibus alterius valvæ utplurimum vacuis.
306. CARDIUM.	*Cardinis* dentibus lateralibus remotis penetrantibus.
307. MACTRA.	*Cardinis* dente intermedio complicato trigono cum adjecta foveola.
308. DONAX.	*Cardinis* dente laterali (*utplurimum*) remoto vacuo.
309. VENUS.	*Cardinis* dentibus approximatis divaricatis.
310. SPONDYLUS.	*Cardinis* dentibus duobus diſtinctis foraminulo.
311. CHAMA.	*Cardinis* dentibus (*in altera teſta*) duobus obliquis obtuſis.
312. ARCA.	*Cardinis* dentibus numeroſis penetrantibus.
313. OSTREA.	*Cardinis* dente o, ſcrobiculo ovato.
314. ANOMIA.	*Cardinis* dente o, ſcrobiculo (*in multis* lineari marginali.

315. MYTILUS. *Cardinis* dente o: ſcrobiculo ſubulato diſtincto.
316. PINNA. *Cardinis* dente o; margine altero coalito.

*** *Univalvia.*

† *ſpira regulari* COCHLEÆ.

317. ARGONAUTA. *Teſta* unilocularis, ſpiralis, involuta.
318. NAUTILUS. *Teſta* multilocularis: loculis per foramen communicantibus.
319. CONUS. *Teſtæ apertura* effuſa lineari edentula.
320. CYPRÆA. *Teſtæ apertura* effuſa, lineari utrinque dentata.
321. BULLA. *Teſtæ apertura* ſubcoarctata obliquata.
322. VOLUTA. *Teſtæ apertura* effuſa: columella plicata.
323. BUCCINUM. *Teſtæ apertura* canaliculo dextro.
324. STROMBUS. *Teſtæ apertura* canaliculo ſiniſtro.
325. MUREX. *Teſtæ apertura* canaliculo recto.
326. TROCHUS. *Teſtæ apertura* coarctata ſubtetragona.
327. TURBO. *Teſtæ apertura* coarctata orbiculari.
328. HELIX. *Teſtæ apertura* coarctata lunari.
329. NERITA. *Teſtæ apertura* coarctata ſemiorbiculari.
330. HALIOTIS. *Teſtæ apertura* dilatata: *Spira* occultata.

†† *ſine ſpira regulari.*

331. PATELLA. *Teſta* patenti-conica, quieſcens.
332. DENTALIUM. *Teſta* libera ſubulata utroque fine aperta.
333. SERPULA. *Teſta* adnata (*utplurimum*) tubuloſa.
334. TEREDO. *Teſta* intruſa ligno.
335. SABELLA. *Teſta* granis arenaceis conflata.

IV. ZOOPHYTA. Animalia compoſita vegetabilium more efflorescentia.

* *ſtirpe calcarea* LITHOPHYTA.

336. TUBIPORA. *Corallium* tubis cylindricis.
337. MADREPORA. *Corallium* ſtellis concavis.
338. MILLEPORA. *Corallium* poris ſubulatis.
339. CELLEPORA. *Corallium* cellulis cavis.
340. ISIS. *Stirps* lapidea.

** *ſtirpe molliori.*

ANTIPHATES. *Stirps* cornea, ſpinulis obſita, carne gelatinoſa tecta.
341. GORGONIA. *Stirps* cornea, carne celluloſa vel vaſculoſa tecta.
342. ALCYONIUM. *Stirps* ſuberoſa.

343. SPONGIA. *Stirps* ſtupoſa.
344. FLUSTRA. *Stirps* poroſiſſima.
345. TUBULARIA. *Stirps* fiſtuloſa.
346. CORALLINA. *Stirps* articulis filiformibus calcareis.
347. SERTULARIA. *Stirps* articulis filiformibus fibroſis.
350. PENNATULA. *Stirps* coriacea penniformis.
349. HYDRA. *Stirps* medulloſa nuda.

V. INFUSORIA. Animalia minima ſimpliciora.

* *organis externis inſtructa.*

BRACHIONUS. *Corpus* teſta tectum apice ciliatum.
348. VORTICELLA. *Corpus* nudum apice ciliatum.
TRICHODA. *Corpus* altera parte crinitum.
CERCARIA. *Corpus* rotundato-caudatum.
LEUCOPERA. *Corpus* undique ciliatum.

** *organis externis nullis.*

† *complanata.*

GONIUM. *Corpus* angulatum.
COLPODA. *Corpus* ſinuatum.
PARAMECIUM. *Corpus* oblongum.
CYCLIDIUM. *Corpus* orbiculare vel ovatum.

†† *teretia.*

BURSARIA. *Corpus* cavum.
VIBRIO. *Corpus* elongatum.
ENCHELIS. *Corpus* cylindraceum.
BACILLARIA. *Corpus* ex trabeculis in varias formas accommodatis compoſitum.
352. VOLVOX. *Corpus* ſphæricum.
MONAS. *Corpus* punctiforme.

Admiranda tibi levium ſpectacula rerum.

VIRG.

I. INTESTINA.

Animalia *ſimplicia*, *abſque artubus*, *nuda*.

276. ASCARIS. *Corpus* teres elaſticum utrinque attenuatum, capite trinodi; cauda obtuſa aut ſubulata. *Vaſa* ſpiralia lactea pellucentia.

a. *hominis*.

vermicularis. 1. Aſc. cauda ſubulata, cute ad latera corporis ſubtiliſſime crenata. *Goeze Eingew. p.* 102. *t.* 5. *f.* 1-3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 1269. Aſcaris pollicaris.
Aldrov. inſ. 6. *p.* 651. 656.
Mouff. theatr. inſ. p. 297.
Valiſn. op. 1. *t.* 20. *f.* 5-10.
Cleric. lambr. t. 3. *f.* 5-10.
Bianch. hiſt. morb. t. 3. *f.* 20.
Phelſ. hiſt. aſcar. t. 1. *f.* 3-11. *t.* 2. *f.* 1-3.
Pall. inf. viv. p. 12.
Müll. hiſt. verm. 1. 2. *p.* 6. *t.* 34.
Hill hiſt. anim. p. 14.
v. Doever. verm. p. 59. 60.
O. Fabr. Fn. groenl. 248.
Bloch Eingew. p. 31.
Happ verm. hom. int. p. 8.
Werner verm. inteſt. p. 72. *t.* 5. *f.* 133-137.
Habitat in puerorum, *etiam recens natorum*, inteſtinis, *potiſſimum recto*, *vivipara*.

lumbricoides. 2. Aſc. cauda obtuſa vel ſubincurva, ani rima tranſverſa, inteſtino aurantio. *Goeze Eingew p.* 65.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 2. Aſcaris ſpithamea.
Aldrov. inſ. l. 6. *p.* 652. *f.* 4. 5.
Jonſt. inſ. p. 158. *t.* 24. *n.* 1.
Mouff. theatr. inſ. p. 282. 296.
Red. anim. viv. negl. an. viv. p. 19. 20. *t.* 10. *f.* 2. 3. *opuſc.* 3. *t.* 10. *f.* 1-4.
Valiſn. op. 1. *p.* 271. *t.* 34. 35.
Cleric. lumbr. p. 218. *t.* 4. *f.* 1-4. *t.* 10. 11.

Klein herpetol. p. 63. t. 1. f. 3. t. 2. f. 1-7.
Act. angl. 1678. *n.* 147.
Barthol. cent. 2. *h.* 23.
Pallas diſſ. de inf. viv. p. 13.
Odhel. act. Stockh. 1776. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 1. 3. & *p.* 313.
Doeveren. verm. p. 68. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Müller hiſt. verm. 1. 2. *p.* 35.
Naturf. 12. *p.* 180.
Bloch Eingew. p. 29. *t.* 8. *f.* 1-6.
Wern. verm. inteſt. p. 75. *t.* 6. *f.* 144-148. *t.* 7. *f.* 153-159.
Rauh de aſc. lumbric. Linn. Goett. 1779.
Pereboom deſcr. nov. gen. verm. Stomachida, &c. Amſtel. 1780.
Habitat in hominis inteſtinis, *præſertim tenuibus, aliquando in ductum pancreaticum penetrans ſetarum defectu facile a lumbrico terreſtri dignoſcendus, cingulo nullo,* σιρογγυλος *Hippocratis, Lumbricus teres aliorum.*

vespertilionis. 3. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in veſpertilionis auriti inteſtinis.

b. *mammalium.*

phocæ. 4. Aſc. pallida, inteſtino lacteo ſpirali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 272. *n.* 250.
Goez. Eingew. p. 73. *t.* 2. *f.* 9. 10.
Habitat in phocarum, vitulinæ, groenlandicæ, hiſpidæ inteſtinis, ½-8 *pollices longa, utroque fine attenuata, poſteriore acuminata, adunca, tota pellucida.*

bifida. 5. Aſc. poſterius furcata, anterius curva ſetiformis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 74. *f.* 3. *rar.* 2. *p.* 102. *prodr.* 2592. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 273. *n.* 253.
Habitat in phocæ groenlandicæ inteſtinis, *aſc. phocæ magnitudine, pallida, inteſtinis contortuplicatis, roſtro anterius acutiſſimo, ad cujus baſin porus pro proboſcide brevi.*

canis. 6. Aſc. cauda acuminata, capite applanato, membrana utrinque alato, vaſis ſpermaticis cincinnatis. *Wern. verm. inteſtin. cont.* 1. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 38-40. *Goeze Eingew. p.* 81. 84.
Barth. anat. cent. 2. *p.* 318.
Red. opuſc. 3. *t.* 8. *f.* 1-4.
β) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
γ) *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 73. *t.* 13. *f.* 8?
opuſc. 3. *t.* 17. *f.* 3.

Habitat in canis familiaris inteſtinis.

viſceralis. 7. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 308. *t.* 8. *f.* 1.
Habitat in canis familiaris renibus.

lupi. 8. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75.
Habitat in lupi inteſtinis.

vulpis. 9. Aſc. membranis capitis lateralibus retrorſum attenuatis. *Goeze Eingew. p.* 84.
Froelich Naturſ. 24. *p.* 140. *t.* 4. *f.* 30. 31.
Klein herpet. p. 63.
Habitat in vulpis inteſtinis, *potiſſimum duodeno.*

leonis. 10. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 75. & *p.* 309. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat ſub leonis pelle.

tigridis. 11. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 19.
Act. acad. pariſ. 1763. *p.* 47.
Habitat in tigridis inteſtinis.

felis. 12. Aſc. capite veſicula utrinque oblonga poſterius obtuſa pellucida ex albo cineraſcente. *Goeze Eingew. p.* 79. *t.* 1. *f.* 5. 9-13.
Froelich Naturſ. 24. *p.* 141.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 12. *t.* 13. *f.* 8.
Habitat, utplurimum gregaria & tæniam ſerratam comitem habens, in felis cati ventriculo & inteſtinis, *præſertim tenuibus.*

cati. 13. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 80.
Habitat in felis cati inteſtinis, *veſicularum capitis defectu ab aſc. felis diſtincta.*

martis. 14. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 84.
Habitat in martis inteſtinis.

bronchialis. 15. Aſc. albida contorta granulis quaſi infarcta. *Wern. verm. int. cont.* 1. *p.* 9. *t.* 8. *f.* 20. 21.
Habitat in martis pulmonibus, *bronchiorum dichotomiæ glomeratim adhærens.*

Aſcarides, *plurimæ in inteſtinis obviæ, utplurimum gregariæ, valvula triplici ad caput inſtructæ, qua ſe, dum nutrimentum hauriunt, affigunt, femina a mare diſtincta, frequentius ovipara utero bicorni gaudet. Plures ſpecies adhuc ignotas, vel imperfectius juſto definitas & diſtinctas deteget dies; An quos* Red. *oper.* 3. *p.* 8. *in anguis bicipitis inteſtinis conſpexit albidi & rubelli vermes huc ſpectant? quo ſpectat aſcaris acuta, a* Müllero *zool. dan.* 3. *p.* 53. *dicta, & t.* 111. *f.* 1-5. *delineata?*

renalis. 16. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 309. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in martis renibus.

mephitidis. 17. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14.
Habitat in mephitidis inteſtinis.

gulonis. 18. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14.
Habitat in gulonis inteſtinis.

talpæ. 19. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 75. 87.
Habitat in talpæ inteſtinis & ventriculo.

muris. 20. Aſc. cauda pennata, inteſtino obſcuriori. *Wern. verm. inteſt. cent.* 1. *p.* 10. *t.* 8. *f.* 1-7. *Goeze Eingew. p.* 86. 87.
Habitat in muſculi ventriculo, *annulata, feminæ genitalibus triplici foramine hiantibus.*

hirci. 21. Aſc. *Soemmer. ap. Goeze Eingew. p.* 175.
Habitat in hirci inteſtinis.

vituli. 22. Aſc. filiformis cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 91. *t.* 2. *f.* 7. B.
Camper. Schrift. berl. Naturf. 1. *p.* 115.
Pall. de inf. viv. p. 14.
Valiſn. op. t. 34. 35. *f.* 2. 3.
Cleric. lumbr. t. 10. 11. *f.* 2. 3.
Habitat gregaria in vitulorum per artem infectorum pulmonibus & tracheis, *vivipara.*

equi. 23. Aſc. cylindrica magna. *Goeze Eingew. p.* 62. *t.* 1. *f.* 1-3.
Bloch Eingew. p. 30. *t.* 8. *f.* 4-6.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 72.
Barthol. act. Havn. 1. *p.* 37.
Vandell. diſſ. p. 71. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in equi inteſtinis, *inter congeneres gigas, ut ſeſquipedalis digiti minimi craſſitie occurrat.*

ſuis. 24. Aſc. pallida, linea utrinque longitudinali ſubochracea. *Goeze Eingew. p.* 71. *Pall. inf. viv. p.* 14.
Doever. verm. int. p. 67.
Habitat in ſuis ſeroſæ inteſtinis, *aſc. equi longitudine æqualis, at multo tenuior.*

apri. 25. Aſc. *Ebel Beſch. der berl. Naturf.* 3. *p.* 420. *Goeze Eingew. p.* 92. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in apri pulmone, *vivipara, friabilis, utrinque attenuata, fili tenuiſſimi craſſitie, pollicem circiter longa.*

c. avium.

aquilæ. 26. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 81.
Habitat in falconis chryſaëti inteſtinis.

albicillæ. 27. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in falconis albicillæ inteſtinis.

buteonis. 28. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis, *ventriculo vicinis.*

milvi. 29. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85. 126.
Habitat ſatis magna ſpiraliter convoluta in milvi inteſtinis, *ventriculo & recto propinquis; an forſan duæ ſpecies diſtinctæ?*

ſubbuteonis. 30. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in ſubbuteonis inteſtinis, *acui affinis.*

hermaphrodita. 31. Aſc. poſterius oblique truncata obtuſa breviter mucronata, aculeis duobus incurvis pone aperturam poſteriorem prominentibus. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 151. *t.* 4. *f.* 11-13.
Habitat in pſittaci æſtivi inteſtinis tenuibus.

cornicis. 32. Aſc. *Soemmer. apud Goeze Eingew. p.* 75.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 83.
Habitat in cornicis ventriculo.

coraciæ. 33. Aſc. alba lævis. *Friſch miſc. berol.* 3. *p.* 47. *Pallas inf. viv. p.* 61. *Goeze Eingew. p.* 90. *t.* 2. *f.* 5. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat ſub cute jugulari coraciæ garrulæ.

cygni. 34. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80?
Habitat in cygni inteſtinis.

anatis. 35. Aſc. alba poſterius planiuſcula. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
Goeze Eingew. p. 85.
Habitat in anatis boſchadis inteſtinis, 4-6 *pollices longa vivipara.*

fuligulæ. 36. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in anatis fuligulæ interaneis, *ovipara.*

lari. 37. Aſc. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 552.
Habitat in lari cinerei inteſtinis.

ciconiæ. 38. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86.
Habitat in ciconiæ inteſtinis.

tardæ. 39. Aſc. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in otidis tardæ interaneis.

papilloſa. 40. Aſc. ſubtus papilloſus, cauda in ſetam abeunte aculeata. *Bloch. Eingew. p.* 32. *t.* 9. *f.* 1-6.
Habitat in otidis tardæ inteſtino, cæco & recto, 6-8 *lineas longa, crinis equini craſſitie, ovipara, cauda nunc una, nunc tribus ſetis terminata, mucronibus 2 inæqualibus prope caudam, papillis in abdomine utplurimum 4, cui interdum quinta, & 3 minores ad utrumque caudæ latus accedunt.*

gallopavonis. 41. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in gallopavonis inteſtinis.

galli. 42. Aſc. capite uncinato, cauda acuta. *Goeze Eingew. p.* 75. 76. 85. 86. *t.* 1. *f.* 4. 7. 8.
Habitat in galli *junioris &* gallinæ inteſtinis.

gallinæ. 43. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in gallinæ inteſtino cæco.

phaſiani. 44. Aſc. inteſtino clavato, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in phaſiani picti inteſtino cæco, *an eadem cum aſc. gallinæ?*

tetraonis. 45. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 82.
Habitat in tetricis interaneis.

columbæ. 46. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 84. 85. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in columbæ domeſticæ inteſtinis.

alaudæ. 47. Aſc. *Vandell. diſſ. p.* 76.
Goeze Eingew. p. 125.
Habitat in alaudæ interaneis.

ſturni. 48. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 86.
Habitat in ſturni vulgaris inteſtinis.

turdi. 49. Aſc. *Goeze Eingew. p.* 75. 77. 78. 85. *t.* 2. *f.* 1-3.
Habitat in turdi iliaci, viſcivori, pilaris inteſtinis, hepate.

d. *reptilium.*

d. *reptilium.*

teſtudinis. 50. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 80.
Habitat in teſtudinis orbicularis interaneis.

lacertæ. 51. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 108.
Doever. verm. p. 57.
Habitat in lacertæ paluſtris inteſtinis.

bufonis. 52. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93. 94. 434. *t.* 4. *f.* 1–3. & *t.* 35. *f.* 7–10.
Habitat in bufonis inteſtinis, *vivipara.*

pulmonalis. 53. Aſc. filiformis, inteſtino nigro, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 95–97. *t.* 5. *f.* 6–17.
Habitat in bufonis & rubetræ pulmonibus, *vivipara.*

rubetræ. 54. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 95. 97. 101.
Habitat in bufonis & rubetræ inteſtino recto, *vivipara.*

trachealis. 55. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 98. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat in bufonis pulmonibus, *vivipara.*

ranæ. 56. Aſc. cauda ſubulata, inteſtino clavato. *Goeze Eingew. p.* 101. *t.* 4. *f.* 4–9.
Doever. verm. p. 97.
Habitat in ranæ temporariæ inteſtino recto, *vivipara.*

inteſtinalis. 57. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 100.
Habitat in ranæ temporariæ inteſtinis.

dyſpnoos. 58. Aſc. cauda ſubulata. *Goeze Eingew. p.* 98.
Habitat in ranæ temporariæ plumonibus, *reſpirationem & natationem impediens, vivipara, fertiliſſima, ſpiraliter convoluta.*

inſons. 59. Aſc. cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 98.
Swammerd. bibl. nat. p. 317.
Habitat in ranæ temporariæ pulmonibus, *innoxia.*

e. *piſcium.*

anguillæ. 60. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 86. *opuſc.* 3. *p.* 231?
Habitat in murænæ anguillæ interaneis.

marina. 61. Aſc. filiformis albidus lævis, plano ſpirali convolutus, inteſtino tubuloſo.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1075. *n.* 4. *Müll. zool. dan. prodr.* 2578.
O. Fabr. fn. groenl. p. 166. *n.* 241. Gordius (marinus) filiformis plano ſpirali convolutus.

Leeuwenh. arc. nat. p. 370.
Pall. inſ. viv. intr. viv. p. 16.
Aſcan. ic. rer. nat. t. 7. *f.* a. b. c.
Müll. Naturf. 12. *p.* 183. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 208. 212.
Brit. zool. t. 20. *f.* 3.
Habitat in piſcibus marinis, *potiſſimum* gadis, *viſceribus utplurimum extus adhærens, ad ſeſquipollicem longa, ſub tecto ſuo immobilis, at in aquam conjecta mirifice ſe torquens, lepræ norwegicæ nequaquam cauſa.*

blennii. 62. Aſc. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 216.
Habitat ad & in blennii vivipari inteſtinis, *partim in nodos convoluta.*

rhombi. 63. Aſc. *Müll. Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 213.
Habitat in Pleuronecte Rhombo.

Percæ. 64. Aſc. recta acicularis utroque fine incurva. *Goeze Eingew. p.* 90.
Habitat in perca fluviatili.

globicola. 65. Aſc. anterius obtuſior ſubbifida, globulum membranaceum inhabitans. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 243.
Jonſt. inſ. 183? Vermis Bellonii in cernuis obvius.
Habitat nuda, & globulo incluſa in gaſteroſteo aculeato, *ventriculi cuti exteriori adhærens, gelatinoſa, lævis, planiuſcula, aquea, utroque fine lineaque longitudinali dorſi lacteis, 4 lineas longa.*

lacuſtris. 66. Aſc. plano ſpirali convoluta utrinque attenuata. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 268. *n.* 242.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 5. Gordius lacuſtris.
Habitat in gaſteroſtei aculeati inteſtinis, lucii hepate, *alba, lævis, an forte eadem cum globicola.*

ſiluri. 67. Aſc. recta acicularis utroque fine incurva. *Bloch Eingew. p.* 31.
Habitat in glanide.

farionis. 68. Aſc. teres cineraſcens. *Goeze Eingew. p.* 77.
Habitat in farionis inteſtinis.

truttæ. 69. Aſc. filiformis, cauda rotundata. *Goeze Eingew. p.* 93.
Habitat in farionis inteſtinis.

marænæ. 70. Aſc. *Koelr. comm. petrop.* 18. *p.* 509.
Habitat in maræna.

Acus. 71. Aſc. recta rigida acicularis, utroque ſine ſubincurvo. *Bloch Eingew. p.* 30. 31.
Beſch. der berl. Naturf. 4. *p.* 544. *Goeze Eingew. p.* 90. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 140. Aſcaris Seta.
Habitat in lucii inteſtinis, *alba, ad* 2 *pollices longa.*

halecis. 72. Aſc. filiformis plano ſpirali convoluta.
Bloch Eingew. p. 33. *t.* 8. *f.* 7-10. Gordius harengum. *Müll. berl. Naturf. Schr.* 1. *p.* 212.
Habitat in halecis veſiculis ſeminalibus, & *extus ad* inteſtina, *ad pollicem longa, crinis equini craſſitie.*

argentinæ. 73. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 88.
Habitat in argentina.

gobionis. 74. Aſc. cauda truncata. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 1-3. *Habitat* circa cyprini gobionis hepar, *tenerrima.*

rajæ. 75. Aſc. poſterius attenuata integra, anterius ſetiformis ſubcurva. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 273. *n.* 253. *Müll. zool. dan. prodr.* 2593. *ic.* 2. *t.* 74. *f.* 1-3.
Habitat in rajæ fulloniæ ventriculo, *bifidæ ſimilis & æqualis, cauda tamen non fiſſa, & quaſi abrupta, roſtro longiore, compreſſo, linea longitudinali, quaſi fiſſo diſcernenda.*

ſquali. 76. Aſc. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89.
Habitat in ſqualo glaberrima.

lophii. 77. Aſc. rigida cornea glaberrima dilutius fuſca; inteſtino filoque multipliciter contorto lacteis, globulo minimo ad caudam. *Müller Schr. der. berl. Naturf.* 1. *p.* 211. *zool. dan.* 3. *p.* 53. *t.* 111. *f.* 1-4.
Habitat in lophii piſcatorii *canali cibario, magna.*

f. *vermium.*

lumbrici. 78. Aſc. minutiſſima, cauda ſubulata, punctorum obſcurorum ordinibus duobus. *Goeze Eingew. p.* 110. *t.* 4. *f.* 10. *v. Gleich. auſerl. microſc. Entd. p.* 58. *t.* 27. 28.
Habitat in lumbricis, *infra cutem & in humoribus, nudo oculo non uſurpanda.*

TRICHOCEPHALUS. *Corpus* elaſticum, contortum: parte poſteriori craſſo clavato; anteriori capillari duplo longiori, ad finem interdum nodoſa.

* *capite ſimplici.*

hominis. 1. Tr. ſupra ſubcrenatus, ſubtus lævis, anterius ſubtiliſſime ſtriatus.
Mant. 2. *p.* 543. Trichuris.
Roeder. & *Wagler de morb. mucoſ. ed. Wrisb. p.* 62. *t.* 3. *f.* 4. Trichuris.
Roeder. Goett. gel. Anz. 1761. *St.* 25.
Wrisb. de animalc. infuſ. p. 6. & *Roeder.* & *Wagl. de morb. muc. præfat.*
Happ verm. inteſt. hom. hiſt. p. 21.
Wern. verm. inteſt. p. 84-86. *t.* 6. *f.* 138-143.
Müller Naturf. 12. *p.* 182.
Bloch Eingew. p. 32. *f.* 7-9.
Goeze Eingew. p. 113. &c. *t.* 6. *f.* 1-5.
Blumenb. Naturg. p. 410.
Habitat in hominis, *potiſſimum morbo mucoſo laborantis, inteſtinis, rarior in tenuibus, frequentiſſimus in cæco, ad* 2 *pollices longus.*

equi. 2. Tr. *Goeze Eingew. p.* 118. *t.* 6. *f.* 8.
Habitat in equo, $2\frac{1}{2}$ *pollices longus, parte poſteriore pollicari, anteriori ſeſquipollicari.*

apri. 3. Tr. cauda utrinque ſquamis crenatis ornata. *Goeze Eingew. p.* 122. *t.* 6. *f.* 6. 7.
Habitat in apro, *humano æqualis.*

muris. 4. Tr. capite trinodi. *Goeze Eingew. p.* 119. *t.* 7. A. *f.* 1-5.
Habitat in muris inteſtinis, *medio fere inter duodenum* & *rectum loco, parte tenuiore veſiculis albis obſeſſa.*

Trichocephali *gregarii ovipari, quotquot hactenus novimus, in inteſtinis præſertim mammalium habitant; mares cauda ſpiraliter convoluta diſtincti.*

vulpis. 5. Tr. capite acutiuſculo anguis, collo tranſverſim ſtriato: veſiculis unilateralibus. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 142. *t.* 4. *f.* 25 - 29.
Habitat in vulpis inteſtino cæco.

* * *capite uncinato.*

lacertæ. 6. Tr. cauda utrinque ſquamata. *Goeze Eingew. p.* 123. *t.* 7. A. *f.* 6. 7.
Pallas nov. comm. petrop. 19. *t.* 10. *f.* 6. *n. nord. Beytr. p.* 111. Tænia Spirillum.
Müll. Naturf. 12. *p.* 182.
Habitat in lacertæ apodis inteſtinis.

FILARIA. *Corpus* teres filiforme, æquale, læviſſimum, ore dilatato: labio ſubrotundo concavo.

* *hominis.*

medinenſis. 1. F. tota pallida.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1075. *n.* 3. Gordius medinenſis.
Welſch monogr. Vena medinenſis.
Sloan. jam. 2. *p.* 190. *t.* 233. *f.* 1. Vena medinenſis.
Kaempf. amœn. exot. p. 524. Dracunculus perſarum.
Gallandat n. act. ac. caeſ. 5. *app. n.* 3.
Grun. act. ac. el. Erf. ad 1777. *med. n.* 3.
Habitat in Guinea, America & Aſia meridionali, *nudipedum obambulantium ſervorum pedes intrans, dolorem febremque excitans, caute extrahendus, ad* 12 *pedes longus; mercurio ſublimato corroſivo in ſpiritu frumenti ſoluto intra* 20 *dies, qui alius demum poſt* 40 *dies, educitur: An inter inteſtinales locum meretur?*

* * *mammalium.*

equi. 18. F. poſterius attenuata, cauda acutiſſima incurvata.
Abildgeard apud Müll. zool. dan. 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 12.
Habitat in equini corporis cavis variis telaque celluloſa.

Filariæ, *a gordiis habitaculo & plurimæ cauda non uncinata diſtinctæ, ſæpius telam celluloſam, rarius inteſtina inhabitant, ex piſcibus, amphibiis, vermibus exules, an ſingulæ pro animali, in quo degunt, diverſo, diverſæ ſpecies?*

leonis. 2. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in leone.

martis. 3. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 15. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in marte.

leporis. 4. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Habitat in leporum coxæ tela celluloſa.

* * * *avium.*

falconis. 5. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Vandell. diſſ. p. 75.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 80.
Habitat in falconum tela celluloſa abdominali & crurali.

ſtrigis. 6. F. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 83.
Habitat in ſtrigibus, *in tela celluloſa capitis & aures cingente.*

cornicis. 7. F. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 83.
Habitat in cornicis thorace & pulmonibus.

ciconiæ. 8. F. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 223?
Habitat in ciconia.

gallinæ. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 126. *t.* 7. B. *f.* 8-10.
Müll. Naturf. 12. *p.* 187.
Habitat in gallinæ inteſtinis tenuibus, 2 *pollices longa, capillaris.*

* * * * *inſectorum.*
† *perſectorum.*

ſcarabæi. 10. F. *Act. angl.* 1. *p.* 49.
Habitat in ſcarabæo fimetario.

ſilphæ. 11. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Habitat in ſilpha obſcura.

carabi. 12. F. *Pall. de. inſ. viv. p.* 12.
Ciſt. act. angl. n. 81.
Habitat in carabo.

grylli. 13. F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Friſch inſ. 12. *p.* 3. *t.* 2. *f.* 1.
Roeſ. inſ. 2. *p.* 58.
Sulz. hiſt. inſ. p. 81.
Pall. it. 1. *p.* 26.
N. Mannigf. 4. 1. *p.* 55. 117.
Habitat in gryllis.

monoculi. 14. F. *Walch Naturf.* 12. *p.* 64.
Habitat in monoculo apode.

+ + larvarum.

lepidopterorum. 15. F. cauda uncinata. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 98. *Goeze Eingew. p.* 127.

papilionum. *a)* F. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

polychlori. *a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

urticæ. *b.* F. ex flaveſcente cinerea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

betulæ. *c.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

quercus. *d.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

ſphingum. *β)* F. ſphingis euphorbiæ. *Roeſ. inſ.* 1. *phal.* 1. *p.* 20.

phalænarum. *γ)* F. *N. Mannigf.* 4. *app. p.* 455.

quercus. *a.* F. alba. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

cajæ. *b.* F. ſpadicea. *Wern. verm. inteſt. cont.* 1. *p.* 6.

Ziczac. *c.* F. *Degeer inſ.* 1. *p.* 309. *t.* 34. *f.* 6-8.

nuptæ. *d.* F. *Goeze Eingew. p.* 127. *t.* 8. *f.* 4-6.

Pſi. *e.* F. *Roeſ. inſ.* 1. *phal.* 2. *p.* 65.

ponionellæ. *f.* F. *Goeze Eingew. p.* 128.
Habitat ſub larvarum *cute, his pernicioſiſſima, non raro ſolitaria, 4, 5, 6, 7, pollices longa, glaberrima, dura, utroque fine attenuata, anteriori obtuſiore, labiis quaſi 3 oblongis munito.*

tenthredinis. 16. F. *Act. Stockh.* 35. *p.* 181.
Habitat in tenthredinum larva.

phryganeæ. 17. F. *Degeer inſ.* II. 1. *p.* 555. A. 14. *f.* 12-14.
Habitat in phryganearum larvis.

UNCINARIA. *Corpus* filiforme elaſticum, antrorſum obſolete noduloſum: labiis membranaceis angulatis.
Cauda feminæ aciculata, maris uncis 2 cuſpidatis veſicæ pellucidæ incluſis armata.

melis. 1. U. femina ſubrecta, maris uncis approximatis: veſica rotundata. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 136.

Goeze Eingew. p. 106. A. B. *f.* 1 – 4. Aſcaris criniformis.
Müll. Naturf. 22. *p.* 55. Strongylus melis.
Habitat in melis inteſtinis craſſis.

vulpis. 2. U. femina ad angulum inflexa, maris uncis remotis quadricuſpidatis: veſica cordato-biloba. *Froelich, Naturf.* 24. *p.* 137. *t.* 4. *f.* 18. 19.
Habitat in vulpis inteſtinis craſſis, *præcipue recto.*

SCOLEX. *Corpus* gelatinoſum, polymorphum, anterius latiuſculum, poſterius acuminatum, nunc lineare & elongatum, nunc regoſum & breve, teres, flexuoſum vel depreſſum, capite exſertili & retractili.

pleuronectis. 1. Sc. capite auriculis quaternis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 58. *par.* 2. *p.* 53. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 206. 207. 210. 213.
Habitat in Pleuronectis Rhombi, Linguatulæ, Plateſſæ, Salmonis Lavareti & Cyclopteri Lumpi *muco inteſtinali, nudo oculo non diſtinguenda, capite colloque pellucidis, illo pone punctis 2 ſanguineis, utplurimum oblongis ſplendidis picto: auriculis in varias formas plicatilibus; hoc brevi: margine lunato, in vivis ſanguineo, capite ad tænias accedens.*

lophii. 2. Sc. *Müll. berl. Naturf. Schr.* 1. *p.* 211.
Habitat in Lophii piſcatorii muco inteſtinali, *nudo oculo vix diſcernenda; an diverſa a ſc. pleuronectis ſpecies?*

LIGULA. *Corpus* lineare æquale elongatum; anterius obtuſum, poſterius acutum ſutura dorſali impreſſa.

inteſtinalis. 1. L. albiſſima anguſtiſſima.
Bloch Eingew. p. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Goeze Eingew. p. 183. *t.* 14. *f.* 1 - 3.
Habitat in mergi minuti, *albelli &* mergenſeris *colymbi auriti* inteſtinis, *abdomine adeo pectore ad pedem uſque longa, faſciam exacte referens.*

abdominalis. 2. L. cineraſcens latiuſcula. *Goeze Eingew. p.* 187. *Syſt. nat.* VI. *p.* 70. *t.* 6. *f.* 1. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2076. *Amœn. acad.* 2. *p.* 71. *act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 6. Faſciola (inteſtinalis) linearis longa.
Bloch Eingew. p. 2. Ligula piſcium.
Bloch Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 549. Fiek.

cobitidis. α) L. *Bloch Eingew. p.* 2.
cyprinorum. β) L. *Goeze Eingew. p.* 187.
Gronov. act. helv. 2. *p.* 374.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 94. Tænia cingulum.
gobionis. *a.* L. *Bloch Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 549.
trincæ. *b.* L. *Bonnet. inſectol. Abb. p.* 62.
caraſſii. *c. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 100.
leuciſci. *d. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 95.
Bloch Beſch. d. berl. Naturf. 4. *p.* 549.
alburni. *e. Bloch Eingew. p.* 2.
vimbæ. *f. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 94.
Bloch. Eingew. p. 2.
Goeze Eingew. p. 189. *t.* 16. *f.* 7. 9.
bramæ. *g. Pallas n. nord. Beytr.* 1. *p.* 96. *elench. zooph. p.* 414.
Bloch Eingew. p. 2.
Beſchr. der berl. Naturf. 4. *p.* 549.
Goeze Eingew. p. 187. *t.* 16. *f.* 4-6.
Ruyſch obſerv. anat. n. 64. *opp.* 1. *p.* 61. *t. f.* C.
Habitat in piſcium abdomine, *præſertim* meſenterio, *piſces emacians, deformans, abitura cutem perterebrans, nunc ſolitaria, nunc gregaria,* ½ *lineam craſſa,* ½ - 5 *pedes longa.*

STRONGYLUS. *Corpus* teres elongatum, pellucidum glabrum, anterius globoſa truncatum: apertura circulari margine ciliata, poſterius in femina integrum acuminatum, in mare in membranas pellucidiſſimas, laxas diſtantes dilatatum.

equinus. 1. Str. capite opaco, inteſtino nigro. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 42. *f.* 1 - 12. *rar.* 2. *p.* 6.

Strongyli *ovipari, hactenus non niſi in mammalium canali cibario reperti.*

Barthol. act. havn. 1. *p.* 37.
Goeze Eingew. p. 137. *t.* 9. B. *f.* 10. 11.
Habitat gregarius in equi ventriculo; *mas pallide luteus, membrana flavicante ſubtiliſſima interanea involvente, cauda triphylla: inter membranulas nunc e papillula exeunte ſpiculo ſimplici appoſitis 3 laciniis munito, nunc præter uncum ſpiculo duplici utroque tricuſpide, feminæ inteſtinum involventibus vaſculis, filiformibus albis.*

ovinus. 2. Str. *O. Fabr. apud Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 8.
Habitat in ovium inteſtinis.

ECHINORHYNCHUS. *Corpus* teres: proboſcide cylindrica retractili echinata.

a. *mammalium.*

phocæ. 1. E. pallidus, inteſtino lacteo ſpirali.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 1. *prodr.* 2590. *rar.* 2. *p.* 101.
O. Fabr. fn. groenl. p. 272. *n.* 250. Aſcaris phocæ.
Habitat gregarius in phocæ groenlandicæ & hiſpidæ inteſtinis, *quam non raro fere conſumit*, 3 ½ 8 *pollices longus, pellucidus, membranaceus, utroque fine attenuatus, poſteriori acuminatus, aduncus.*

tubifer. 2. E. albidus glaber, poſterius in ſetam attenuatus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 2. *prodr.* 2591, *rar.* 2. *p.* 101.
O. Fabr. fn. groenl. p. 273. *n.* 251. Aſcaris (tubifera) albida, antice roſtro cylindrico quaſi prolongata.
Habitat in phocæ barbatæ ventriculo, *vix pollicem longus.*

Gigas. 3. E. candidiſſimus, collo nullo proboſcide vaginata: aculeorum uncinatorum ordinibus pluribus, papillis ſuctoriis ſenis. *Goeze Eingew. p.* 143. *t.* 10. *f.* 1-6.
Bloch Eingew. p. 26. *t.* 7. *f.* 1-8.
Pall. comment. Petrop. 19. *p.* 202. *t.* 11. *f.* 3. & *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. Tænia hirudinacea.
Müll. Geſch. der. daen. u. norw. Th. 1. *p.* 136. b.
Habitat in porcorum, *præſertim in ſtabulo ſaginatorum*, inteſtinis, *gregarius, in apro magis cæruleſcens,* 12 *pollices ad* 1 ½ *pedes longus, proboſcidis filamentis quaſi ligamentis duobus lateralibus, aculeis fauciantibus, ovulis primo hyalinis, maturis margine fuſceſcentibus.*

balænæ. 4. E. *Phips it. p.* 103. *t.* 7. *f.* 1. A. B. C.
Habitat in balænæ inteſtinis.

b. *avium.*

buteonis. 5. E. candidiſſimus, veſiculis caudæ cæruleſcentibus lentiformibus. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 12. *f.* 1. 2. A.
Habitat in buteonis inteſtinis, 2 ¼ *pollices longus.*

ſcopis. 6. E. proboſcidis aculeis numeroſiſſimis. *Goeze Eingew. p.* 154. *t.* 11. *f.* 13.
Habitat in ſtrigis ſcopis inteſtinis craſſis.

aluconis. 7. E. corpore ſubrugoſo opaco, proboſcide incraſſata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 69. *f.* 1-4. *inf. rar.* 2. *p.* 86.
Habitat in Strigis Aluconis inteſtinis, *flexuoſus, proboſcide aculeis innumeris armata, in centro apicis pertuſa.*

ſtrigis. 8. E. proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p.* 153. *t.* 11. *f.* 8-12.
Habitat in ſtrigis ſtridulæ inteſtinis craſſis.

pici. 9. E. candidus, collo nullo, proboſcidis aculeis ſerratis. *Goeze Eingew. p.* 150. *t.* 11. *f.* 1-5. & A.
Habitat in pici erythrocephali & viridis inteſtinis, *gregarius*, 1 ½ *pollices longus, proboſcidis aculeis minimis.*

borealis. 10. E. anatis molliſſimæ.
Phips it. p. 103. *t.* 7. *f.* 1. Sipunculus Lendix.
Habitat in anatis molliſſimæ inteſtinis.

boſchadis. 11. E. collo filiformi, proboſcide ſubechinata. *Goeze Eingew. p.* 163. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Habitat in anatis domeſticæ inteſtinis.

anatis. 12. E. coccineus ovatus, thorace proboſcideque undique uncinatis: collo longo lævi intermedio. *Goeze Eingew. p.* 164. *t.* 13. *f.* 1. 2.
Habitat in anatis fuſcæ inteſtinis.

mergi. 13. E. capite colloque armato. *Bloch Eingew. p.* 28. *t.* 7. *f.* 9-11.
Habitat gregarius in mergi minuti inteſtinis, 1-1 ½ *pollicem longus.*

alcæ. 14. E. anterius ſubtus rugis lateralibus medietatem elevatam includentibus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 74. *f.* 8. *prodr.* 2597. *rar.* 2. *p.* 106. *O. Fabr. fn. grœnl. p.* 276. *n.* 257. Aſcaris alcæ.

Habitat in alcæ picæ inteſtinis, *ad 4 pollices longus, albus, dorſi linea longitudinali nigra, teretiuſculus, antrorſum acutiuſculus, ſubtus planus, poſterius ſubpriſmaticus fine exquiſite ocuto, an hujus generis?*

ardeæ. 15. E. ſtriatus, proboſcide clavata. *Goeze Eingew. p. 152. t. 11. f. 6. 7.*
Habitat in ardea cinerea, *poſterius conicus, medio utrinque ſinuato.*

gazæ. 16. E. *Red. anim. viv. n. an. viv. p. 85. t. 15. f. 13. opuſc. 3. p. 229. t. 21. f. 9.*
Habitat in ardea alba.

vanelli. 17. E. caudæ veſica alba: centro albo. *Goeze Eingew. p. 155.*
Habitat in vanelli inteſtinis *mediis.*

merulæ. 18. E. ovatus, thorace aculeato. *Goeze Eingew. p. 165.*
Habitat in merula & fringilla montana.

c. *reptilium.*

ranae. 19. E. candidus, proboſcide intus filamentis duobus tenellis albis directa. *Goeze Eingew. p. 159. t. 12. f. 10. 11.*
Pall. Comment. petrop. 19. p. 452. t. 9. f. 2. a. A. n. nord. Beytr. 1. p. 109. t. 3. f. 37. Tænia hæruca.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 82. opuſc. 3. p. 221.
Habitat gregarius in ranarum, *præſertim* temporariæ, inteſtinis, *fixus interdum vireſcens aut cineraſcens.*

falcatus. 20. E. proboſcide longa longitudinaliter uncis multifariam armata, anteriori litura, poſteriori fine puncto pellucido.
Froelich Naturf. 24. p. 117. t. 4. f. 22-24.
Habitat in ſolamandræ inteſtino duodeno prope pylorum.

d. *piſcium.*

anguillæ. 21. E. corpore candido lævi, proboſcide globoſa. *Müll. zool. dan. 2. t. 61. f. 1-3. med. rar. 2. p. 84. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 204.*

Echinorhynchi *firmiſſime animalium, quæ inhabitant viſceribus, utplurimum inteſtinis ſæpe per totam vitam uni eidemque loco infixi, utplurimum gregarii, in homine hactenus non inventi, corpore tereti non articulato ſatis a tænia diſtincti, proboſcidis uncinis nudis immobilibus; mares feminis utplurimum oviparis minores, ſæpiſſime plane ſegregati in alio individuo habitant: An, quam* O. Fabricius *in blennio viviparo* Acharius *in lota* O. Fr. Muller *in belone, invenerunt, diſtinctæ ſpecies?*

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87. *opuſc.* 3. *p.* 234.
Leeuwenh. arc. nat. p. 313. 314. *f.* 1. 2.
Habitat in murænæ anguillæ inteſtinis, *opacus, proboſcide collo ſuffulta, uncinorum quinorum vel ſenorum ſeriebus* 6–8 *armata; mas poſterius globulis* 7 *opacis, canaliculo ſerie duplici concatenatis conſpicuus, femina duplo longior, & ova continens ovalia, ob fetus lineares.*

xiphiæ. 22. E. xiphiæ gladii. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 89. *t.* 24. *f.* 7. *op.* 3. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in xiphiæ inteſtinis, *quæ ſæpe perforat.*

candidus. 23. E. corpore opaco ſubrugoſo albo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 139. *t.* 37. *f.* 7–10. & 2. *t.* 34. *f.* 7. *rar.* 1. *p.* 92. & 2. *p.* 105. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 205. 209. 214.
O. Fabr. fa. groenl. p. 275. *n.* 256. Aſcaris verſipellis.
Acharius n. act. Stockh. 1780. I. 1. *n.* 5. Achantrus ſipunculoides.
Goeze Eingew. p. 157.
Habitat in gadorum, callariæ, barbati, merlangi, blennii ranini, pleuronectis plateſſoidis, percæ cernuæ & fluviatilis, cyprini idbari inteſtinis, *ad* 3 *pollicum longitudinem ſe expandens, æqualis craſſitiei, interdum cineraſcens aut flaveſcens, fuſcus, fulvus, croceus, rubicundus, violaceus pro indole fluidi, in quo degit, proboſcide uncinorum* 9–15 *ordinibus* 9–16 *armata, mas minor, ſæpiſſime plane ſeparatus a femina habitans.*

lineolatus. 24. E. corpore lineolis tranſverſis fuſcis medio interruptis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 142. *t.* 37. *f.* 11–14. *rar.* 1. *p.* 96.
Müll. zool. dan. prodr. 2599. Echinorhynchus (gadi) proboſcide cylindrica inflexa, corpore filiformi rugoſo.
Pallas zooph. 415. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 107. *t.* 3. *f.* 36. *nov. comm. Petrop.* 19. *p.* 452. *t.* 9. *f.* 2. Tænia Hæruca.
Habitat in gadorum inteſtinis, *ad* 2 *pollices longus, proboſcide minuta.*

longicollis. 25. E. albo-rufeſcens, capite rotundato longitudinaliter ſtriato, collo filiformi, proboſcide ſubechinata. *Goeze Eingew. p.* 162. *t.* 12. *f.* 12–14.

Habitat in Callariæ inteſtinis, *proboſcidis uncis minimis.*

pleuronectis. 26. E. corporis lateribus undulatim impreſſis. *Müll. Naturf.* 10. *p.* 150.

Habitat in pleuronectis maximi inteſtinis; *an vere diſtincta ſpecies?*

attenuatus. 27. E. globiferus, corpore æquali flavo lævi, collo filiformi. *Müll. zool. dan. 1. p. 137. t. 37. f. 1-3. rar. 1. p. 89.*
Pallas n. nord. Beytr. 1. p. 110. t. 3. f. 38. Tænia longicollis.
Habitat rarior & minus numeroſus in fleſi inteſtinis, *pellucidus, æqualis ubique craſſitiei, poſterius rotundatus obtuſus, proboſcide ligamento utrinque adnexo.*

annulatus. 28. E. globiferus, corpore acuminato, collo rugoſo. *Müll. zool. dan. 1. p. 138.*
Müll. zool. dan. prodr. 2601. Echinorynchus (lævis) proboſcide echinata prope apicem in ſphæram lævem dilatata.
Habitat in Cotti Scorpii, Callariæ & Bramæ inteſtinis, *attenuato proxime affinis.*

plateſſoidæ. 29. E. roſtro attenuato, poſterius cingulo elevato terminali. *Müll. zool. dan. 2. t. 74. f. 5. prodr. 2594. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 207. O. Fabr. fn. groenl. p. 274. n. 254.* Aſcaris pleuronectis.
Habitat in pleuronectis plateſſoidæ ventriculo, $2\frac{1}{2}$ *pollices longus, pallidus lævis.*

percæ. 30. E. mollis rugoſus utrinque obtuſus. *Pallas n. nord. Beytr. 1. p. 109.*
Müll. zool. dan. 1. p. 140. par. 1. p. 92. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 205.
Habitat in percæ fluviatilis inteſtinis, *an vere diſtincta ſpecies?*

cernuæ. 31. E. percæ cernuæ. *Müll. zool. dan. 1. p. 140. rar. 1. p. 92. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 204.*
Habitat in percæ cernuæ inteſtinis *uncinorum proboſcidi ſeriebus* 10-12; *an propria ſpecies?*

cobitidis. 32. E. ſtriatus, proboſcide clavata. *Goeze Einzew. p. 158. t. 12. f. 7-9.*
Habitat in cobitidis barbatulæ inteſtinis.

Salmonis. 33. E. corpore clavato lævi, proboſcide cylindrica. *Müll. zool. dan. 2. t. 69. f. 1-3. ſuner. rar. 2. p. 83.*
Habitat in Salaris inteſtinis, *albus, glaber,* opacus, *anterius ventricoſus, poſterius acuminatus, proboſcide minus echinata, quam in congeneribus.*

ſubloba-tus. 34. E. albus globifer poſterius ad latera ſublobatus, collo cylindrico annulato, proboſcidis coronis uncinorum denorum ſedecim. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 172. *t.* 4. *f.* 8-10.

Habitat in Salaris junioris inteſtinis, *candido quadruplo minor, annulato proxime affinis.*

quadriroſ-tris. 35. E. candidus, cauda rotunda corpori intruſa, proboſcide quadruplici. *Goeze Eingew. p.* 166. *t.* 12. *f.* 3-5.

Habitat in Salaris hepate, *proboſcidis uncinis innumeris, an hujus generis?*

truttæ. 36. E. *Goeze Eingew. p.* 137. *t.* 12. *f.* 5. 6.

Habitat in farionis inteſtinis, *rubellus, prælongus.*

maræ-næ. 37. E. fuſiformis lævis ſubrugoſus, pone attenuatus obtuſiuſculus.

Martin & Acharius n. act. Stockh. 1780. *p.* 44, &c. *t.* 2. *f.* 1. 2. Acanthrus ſipunculoides.

Habitat in marænæ inteſtinis.

lucii. 38. E. corpore pellucido lævi. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 138. *t.* 37. *f.* 4-6. *rar.* 1. *p.* 90. *Naturf.* 12. *p.* 188. *t.* 5. *f.* 1-5. *Beſch. der. berl. Naturf.* 4. *p.* 543. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 203.

Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 109.

Goeze Eingew. p. 156. *t.* 12. *f.* 3. 4.

Habitat in lucii inteſtinis, *flavicans, poſterius anguſtior & obtuſus.*

argenti-næ. 39. E. *Barthol. act. havn.* 2. *p.* 225.

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 87.

Habitat in argentina.

aloſæ. 40. E. filiformis, anterius clavatus rubicundus, aculeorum ſeriebus ſex latioribus armatus, proboſcide pallida, aculeorum ſeriebus octo denſioribus. *Herrmann Naturf.* 17. *p.* 177. *t.* 4. *f.* 11. 12.

Habitat in aloſæ inteſtinis, 2 *pollices longus, proboſcide cylindrica, medio paulo craſſiori, collo brevi, ſaturatius rubro, aculeorum circulis* 2 *armato.*

barbi. 41. E. ovatus flavus, faſciatus, collo longo albo cylindrico ad finem cyathiformi. *Schranck Naturf.* 18. *p.* 83. *t.* 3. *f.* D-H.

Habitat in cyprini barbi inteſtinis, *e. lucii affinis.*

carpionis. 42. E. cyprini carpionis.
Koelreuter nov. comm. Petrop. 15. *p.* 500. *t.* 26. *f.* 5. Acanthocephalus.
Habitat in carpionis inteſtinis.

idbari. 43. E. cyprini idbari. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 140.
Habitat in idbari inteſtinis, *candido proxime affinis.*

affinis. 44. E. cyprini rutili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 136.
Habitat in cyprini rutili inteſtinis.

rutili. 45. E. proboſcide tuberoſa apice aculeata, altero corporis latere unico, altero quatuor oſculis notato. *Müll zool. dan.* 2. *t.* 61. *f.* 1-8. *rar.* 2. *p.* 61.
Habitat rariſſimus & ſolitarius in cyprini rutili inteſtinis, *elongatus, contractus utroque ſine obtuſus, expanſus anteriore acuminatus, proboſcide poſterius anguſtata apice aculeis 6 rectis ſingulis globulo affixis armata.*

bramæ. 46. E. collo filiformi, proboſcide aculeis minimis armata. *Goeze Eingew. p.* 163.
Habitat in bramæ inteſtinis.

lophii. 47. E. lophii piſcatorii. *Müller Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 211.
Habitat in lophii piſcatorii inteſtinis, *albus, glomeratus.*

ſturionis. 48. E. rotundatus albus. *Goeze Eingew. p.* 157.
Habitat in ſturionis inteſtinis, *candido affinis.*

HÆRUCA. *Corpus* rotundatum: fine anteriori bicolli ſimplici aculeorum corona cincto, proboſcide nulla.

muris. 1. H. ex albo cineraſcens rugoſa.
Goeze Eingew. p. 138. *t.* 9. B. *f.* 12. Pſeudoechinorhyncus.
Habitat in muſculi ventriculo, *proboſcidis retractilis defectu ab echinorhyncho diverſa.*

CUCUL-

CUCULLANUS. *Corpus* poſterius acuminatum, anterius obtuſum, ore orbiculari, cucullo ſtriato.

a. *mammalium.*

talpæ. 1. C. talpæ europaeæ. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 8. *f.* 7. 8.
Habitat gregarius membranæ incluſus in adipe peritonæi talpæ europææ, *in ſpiram contortus.*

ocreatus. 2. C. corpore faſciolato, cauda ocreata.
Goeze Eingew. p. 182. *t.* 15. *f.* 6. 7.
Habitat in talpæ europææ inteſtinis, *gregarius, oviparus,* 2 *pollices longus, culmum ſtramineum mentiens.*

muris. 3. C. *Goeze Eingew. p.* 242.
Habitat in muris inteſtinis tenuibus.

b. *avium.*

buteonis. 4. C. falconis buteonis. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis.

c. *reptilium.*

ranæ. 5. C. cauda foliacea. *Goeze Eingew. p.* 98.
Habitat in ranæ temporariæ inteſtinis.

d. *piſcium.*

lacuſtris. 6. C. rufus, anterius truncatus. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 146. *prodr.* 2596.
α. C. murænæ anguillæ. *Goeze Eingew. p.* 130. *t.* 9. A. *f.* 1. 2. *Beſch. der berl. Naturſ.* 3. *p.* 493.
Leeuwenh. arc. nat. 2. *p.* 313.

percæ. β. C. percæ fluviatilis. *Goeze Eingew. p.* 132. *t.* 9. B. *f.* A. B. 4-9.
Müll. Schr. der berl. Naturf. 1. *p.* 205. 2. *p.* 133. *t.* 1. *f.* 8-14.
Bloch Eingew. p. 34. *t.* 10. *f.* 1-4.

luciopercæ. γ. C. percæ luciopercæ. *Goeze Eingew.* 131. *t.* IX. a. *f.* 3.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 217.

cernuæ. δ. C. percæ cernuæ. *Müll. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 214. 2. *p.* 133.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 103. 104.

---

cucullani *plurimi vivipari frequentiſſime in inteſtinis, præſertim piſcium, rarius in alio viſcere habitant.*

farionis. ε. C. ſalmonis farionis. *Goeze Eingew p.* 133.

ſalaris. ζ. C. ſalmonis ſalaris. *Goeze Eingew. p.* 133. *t.* 8. *f.* 9. 10.
Habitat in piſcium *aquas dulces inhabitantium* inteſtinis, (ζ) *etiam in* hepate, *fertiliſſimus.*

aſcaroides, 7. C. capite orbiculari utrinque uncinato, cauda rotundata brevi acuminata: ſpiculis binis exſertis. *Goeze Eingew. p.* 134. *t.* 8. *f.* 11-16.
Habitat in Siluri Glanidis ventriculo, *larvis muſcæ ſimilis ad aſcarides accedens, pollicem longus, ex albo cineraſcens, gregarius.*

marinus. 8. C. cinereo-luteus, anterius obtuſus. *Müller zool. dan.* 1. *p.* 144. *f.* 1-11. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 209.

cirratus. α. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 1-7. *rar.* 1. *p.* 99.

muticus, β. C. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 144. *t.* 38. *f.* 8-11. *rar.* 1. *p.* 99.
Habitat in gadorum *plurimorum* inteſtinis, *oviparus, elongatus, flexuoſus, teres, pellucidus ſubtiliſſime tranſverſe ſtriatus, inteſtino fuſco, capite latiore, ſuborbiculato, anterius quaſi aduſto, mare ad caudam prope anum aculeo nigricante ſetaceo bicuſpide armato, feminæ in corporis medio tuberculo rima notato.*

CARYOPHYLLÆUS. *Corpus* teres: ore fimbriato.

piſcium. 1. C. *Goeze Eingew. p.* 180. *t.* 15. *f.* 4. 5. *Bloch. Eingew. p.* 34. *t.* 6. *f.* 9-13.
Habitat in piſcium, *aquas dulces inhabitantium, potiſſimum* cyprinorum, carpionis, tincæ, jeſis, bramæ inteſtinis, *rarior, margaritaceus, ad pollicem longus, reliquis inteſtinalibus vitæ tenacior, fine poſteriori rotundato, anteriore latiori.*

LINGUATULA. *Corpus* depreſſum oblongum. *Os* anterius oſtiis 4 cinctum.

ſerrata. 1. L. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 148. *t.* 4. *f.* 14. 15.
Habitat in leporis timidi pulmonibus.

278. FASCIOLA. *Corpus* planiuſculum, poro duplici, rarius ſolitario.

a. *hominis.*

humana. 2. F. hominis. *Doever. verm. p.* 54. *Cleric. lumbr. p.* 119.

b. *mammalium.*

vulpis. 4. F. orbicularis, capite craſſo rotundato arcu circulari a trunco ſeparato, parte poſteriori ad latera repanda, caudæ appendicibus utrinque duabus cylindricis membranaceis. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 11-13.
Habitat in vulpis inteſtinis, *an hujus generis?*

putorii. 5. F. minutus ſubrotunda, poris duobus approximatis. *Goeze Eingew. p.* 175. *t.* 14.
Habitat in Muſtelæ Putorii inteſtinis, $1\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

melis. 6. F. craſſa, capite triangulari. *Goeze Eingew. p.* 176. *t.* 14. *f.* 9. 10.
Habitat in melis inteſtinis, *brevis.*

veſpertilionis. 3. F. elongata teres, inteſtinis rubris. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 12-16.
Goeze Eingew. p. 171. *t.* 14. *f.* 1-3.
Habitat in veſpertilionis auriti inteſtinis, *quæ ſæpe perforat, ex rubro fuſca, carnoſa, punctis minimis tranſverſim ſtriata, hermaphrodita.*

hepatica. 1. F. ovata ſubpetiolata. *Fn. ſuec.* 2075. *it. goth.* 200. *Pall. inf. viv. p.* 27.
Müll. verm. terr. & fluviat. hiſt. 1. 2. *p.* 7. 52. *zool. dan.* 1. *p.* 103. *prodr.* 2707. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 327. *n.* 312. Faſciola depreſſa ovata fuſco-albida, antice tubulo inſtructa.
Schaeffer monogr. von Egelſchn. f. 1-17.
Amœn. acad 2. *p.* 86. 185. 186. Limax ovatus lividus margine acuto.
Bloch. Eingew. p. 5. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Goeze Eingew. p. 55. 179. Planaria latiuſcula.
Aldrov. inſ. l. 7. *p.* 722.
Leeuwenh. arc. nat. p. 147.
Barthol. act. Havn. 3. *p.* 133. f.
Cleric. lumbr. p. 141. *t.* 9. *f.* 2. & *t.* 12. *f.* H-M.
Brauners tank wid.
Smoetſ. och mytt. afloſk. och. fiäderfä. p. 12. *t.* 3. *f.* 5.

Bianchi hep. p. 342.
Lesk. Naturg. p. 507.
Act. angl. 49. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1.
Breſl. Samml. p. 694. *f.* 1-4.
Act. helvet. 5. *p.* 374.

boum. β. F. *Goeze Eingevv. p.* 170. 171. 205.
Müll. Naturf. 18. *p.* 35. *t.* 4. *f.* 11.
Aldrov. inſ. l. 7. *p.* 133. f.
Falck. Viehſeuch. t. 2. *f.* 6. 7.

porcorum. γ. F. *Goeze Eingevv. p.* 171.

apri. δ. F. *Cleric. lumbr. p.* 119.

cervi. ε. F. *Borlac. cornub. t.* 24. *f.* 10. Porus cervinus.
Cleric. lumbr. p. 119.

equi. ζ. F. *Buffon. hiſt. nat.* IV. *p.* 174. &c.
Habitat in ovium, boum, ſuum, equorum, elaphorum, capreolorum hepate & ductu choledocho, *androgyna, ovipara, poro duplici hepati infixa, hydropem aſciten excitans, ad pollicem longa, anterius latior, tubuloque terminata, fuſca vel ex fuſco albida.*

elaphi. 7. F. conico ovata, ſphinctere ampliſſimo: ore aſſurgente remoto.
Zeder Schr. berl. Naturf. 10. *p.* 65. *t.* 3. *f.* 8-11. Feſtucaria cervi.
Habitat in cervi elaphi *ventriculo gregaria, poro unico, villis adhaerens.*

c. *avium.*

bilis. 8. F. toroſa. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 61. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Habitat in falconis melanuati *cyſtide felleo, gregaria.*

buteonis. 9. F. *Goeze Eingew. p.* 85.
Habitat in buteonis inteſtinis tenuibus, *poro duplici.*

milvi. 20. F. plana, poro duplici, inteſtinis frondoſis. *Goeze Eingew. p.* 173.
Habitat in milvi inteſtinorum tenuium muco, *minuta.*

---

faſciolæ *androgynæ, oviparæ præter inteſtina alia quoque frequenter, nonnullæ ſpecies non niſi alia viſcera inhabitant, inteſtinis flexuoſis, ovariis lateralibus conſpicuæ; an quas* Redi *in lepore,* Cl Mertem *in mure,* O. Fabricius *in perca fluviatili & trinca, alii in ſcombro invenerunt, diſtinctæ a reliquis hujus generis ſpecies?*

ſtrigis. 11. F. teretiuſcula, poro ſimplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 14. *f.* 4-6.
Habitat in ſtrigis inteſtinis, *an hujus generis?*

pusilla. 12. F. minutiſſima polymorpha vitæ tenax cyſtidi incluſa. *Braun Schr. berl. Naturſ.* 10. *p.* 63. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat in ſtrigis Aluconis *thorace in* erinaceo europhio *ſub cute, an hujus generis?*

anatis. 13. F. rufeſcens teretiuſcula pori ſimplici. *Goeze Eingew. p.* 174. *t.* 13. *f.* 8-11. *Naturf.* 14. *p.* 137.
Bloch Eingew. p. 35. *t.* 10. *f.* 5-7. Cucullanus conoideus.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 54. *f.* 1-3. *rar.* 2. *p.* 39. Hirudo faſciolaris.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 206.
Habitat in & ad anatis domeſticæ inteſtina, *parva, pellucidiſſima, interdum alba, antrorſum in triangulum apice truncatum terminata, poſterius rotundata, ſtatura media filiformi nigra tranſverſim curvata, margines verſus bifurca, inteſtino flexuoſo nigricante, ovariis lateralibus; an hujus generis?*

anſeris. 14. F. oblongo-ovata, ſubtus papillis oppoſitis bifariam digeſtis, poris approximatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 112. *t.* 4. *f.* 5-7.
Habitat in anſeris domeſtici *paſcentis* inteſtino recto.

gruis. 15. F. *Bloch Eingew. p.* 35. *t.* 10 *f.* 5-7.
Habitat in gruis inteſtinis, *an diſtincta ab faſciola anatis?*

ardeæ. 16. F. ſuborbicularis. *Goeze Eingew. p.* 177. *t.* 15. *f.* 1.
Habitat copioſiſſima in ardeæ ſtellaris inteſtinis, *quæ perforat.*

d. *reptilium.*

ſalamandræ. 17. F. oblonga ſublinearis, mota lagenam æmulans, poris remotis. *Froelich. Naturf.* 24. *p.* 119. *t.* 4. *f.* 8-10.
Habitat in ſalamandræ nigræ inteſtino. recto.

ranæ. 18. F. ſubclavata ore ſeſſili. *Pallas inf. viv. p.* 29. *n.* 1. 2.
Goeze Eingew. p. 93. 178. *t.* 15. *f.* 2. 3.
Swammerd. bibl. nat p. 317.
Habitat in ranæ pulmonibus, hepate, inteſtinis, *tardiſſime ſe movens, nunc in globum contrahens, nunc in faſciam expandens.*

uncinulata. 19. F. uncinulis duobus elaſticis in parte poſteriori armata. *Braun Schr. berl. Naturf.* 10. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 1-3.
Habitat in rana eſculenta *ſub integumentis abdominis communibus, nunc ſolitaria, nunc gemina, nunc gregaria, gradiendo hirudinem æmulans.*

e. *piſcium.*

binodis. 20. F. elongata teres, poro laterali papillari caudata. *Müll. zool dan.* 1. *p.* 108. *t.* 30. *f.* 8. *prodr.* 2717. *rar.* 1. *p.* 69.
Habitat in piſcium inteſtinis, *æqualis, poris papillaribus, anteriori majore, finem anteriorem complectente, cauda filiformi, dimidia corporis longitudine.* Zoega.

diſticha. 21. F. elongata teres poro laterali porrecto excavato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 108. *t.* 30. *f.* 9. *prodr.* 2716. *rar.* 1. *p.* 69.
Habitat in piſcium inteſtinis, *magnitudine ad f. lucii accedens, rugoſa, retrorſum attenuata, fine anteriori ſubbifido: laciniis inæqualibus apice excavatis.* Zoega.

anguillæ. 22. F. *Leeuwenh. arc. nat. p.* 316. *f.* 6.
Habitat in anguilla.

ſcabra. 23. F. elongata teres, ſeriatim denticulata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 51. *f.* 1-8. *rar.* 1. *p.* 31.
Habitat in gadi barbati ventriculo, *oculo nudo vix conſpicua, vivida, pellucida, ſphærulam duriorem & foveatam ex ore protrudens, tranſverſim ſtriata, margine ſerrulata, vaſe duplici albo filiformi, alioque flexuoſo nigricante ovis farto per totam corporis longitudinem excurrente.*

æglefini. 24. F. linearis depreſſiuſcula, collo nulla. *Müll. zool. dan. p.* 106. *t.* 30. *f.* 4. *prodr.* 2712. *rar.* 1. *p.* 65.
Habitat haud rara in æglefini inteſtinis, *ſemipollicaris, cinerea, utroque fine rotundata.*

blennii. 25. F. linearis plana, collo elato baſi divergente truncato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 106. *t.* 30. *f.* 5. 2. *t.* 78. 9. 14. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 66. & 2. *p.* 116. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 217.
Bloch. Eingew. t. 2. *f.* 10. 11.
Habitat in blennii vivipari muco inteſtinali, *oculo nudo non conſpicua, alba, pellucida, in angulum obtuſum utplurimum curvata, poro laterali majore in angulo corporis, ſaliente prominente, veſiculas albas 2, terminali unicam comprehendente.*

ſcorpii. 26. F. elliptica, altero fine papilla minima perforata, collo nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 1. *prodr.* 2709. *rar.* 1. *p.* 64.

Habitat in cotti Scorpii inteſtinis, *nudo oculo non uſurpanda, pellucida, utroque fine obtuſa, ex albo cinerea, ovulis farta.*

plateſſæ. 27. F. elliptica viridis. *Müller zool. dan.* 2. *t.* 78. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 114.

Habitat in plateſſæ muco inteſtinali, *minutiſſima, ut nudum oculum ſubterfugiat, opaca, in 3 areas virides totidemque albas alternantes diviſa, poro terminali amplo, laterali in medio, ovis ſaturate viridibus.*

luciopercæ. 28. F. ovato oblonga ſubventricoſa, collo brevi, pori terminalis margine dilatato lævi. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 2. *prodr.* 2710. *rar.* 1. *p.* 64.

Habitat in luciopercæ inteſtinis, *granuli arenæ magnitudine, fuſceſcens, collo cylindrico, poro laterali prominulo, retrorſum anguſtior.*

percæ. 29. F. ovata ventricoſa, collo brevi, poro terminali margine noduloſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 105. *t.* 30. *f.* 3. *prodr.* 2711. *rar.* 1. *p.* 65.

Habitat in percæ cernuæ inteſtinis, *f. luciopercæ paulo major, fuſca, collo albo cylindrico, noduloſo, poro terminato, poro laterali ad baſin colli ſito, poſterius obtuſa.* Zoega.

Lagena. 30. F. corpore rotundato, collo longo. *Braun Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 236. *t.* 10.

Habitat in percæ fluviatilis inteſtinis.

Varica. 31. F. linearis teres, collo divergente obtuſo infra apicem perforato. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 8. 11. *rar.* 2. *p.* 93.

Habitat in ſalaris ventriculo, *elongata, ſæpe in angulum acutum divergens, extenſa lævis, contracta ruguloſa, poro laterali in medio fere corporis poſito, vaſculo duplici filiformi albo utrinque decurrente, cum corpuſculis 2 ovatis albis opacis retrorſum cohærente, ovulis innumeris ſparſis ex luteo viridibus canaliculo hyalino flexuoſo, ſingulisque membranæ pellucidæ incluſis.*

eriocis. 32. F. elliptica hyalina medio rufa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 4-7. *rar.* 2. *p.* 92.

Habitat in eriocis inteſtinis, *nudo oculo vix conſpicua, anteriore parte retractili & extenſili inteſtinum filiforme conglomeratum, media ovula conferta vireſcentia, duaſque veſiculas includente.*

farionis. 33. F. oblonga depreſſiuſcula, anterius lobis ſex æqualibus marginata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 72. *f.* 1-3. *rar.* 2. *p.* 91.
Habitat in farionis muco inteſtinali, *flaveſcens, vix linea longior, margine obtuſe crenulata, lobis anterioribus ſubquadrangulis membranaceis.*

truttæ. 34. F. oblonga, maculis duabus albis lucidis orbiculatis pone porum inferiorem. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 126. *t.* 4. *f.* 16. 17.
Habitat in truttæ inteſtino recto.

umblæ. 35. F. oblonga plana, collo anguſtiore retractili. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 329. *n.* 314.
Habitat gregaria in umblæ ſanguine dorſali, *albida,* $1\frac{1}{2}$ *lineam longa, lagenam figura referens, poſterius latior obtuſe truncata, margine acuto.*

lucii. 36. F. lanceolata, margine depreſſo crenato, collo elongato tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 7. 2. *t.* 78. *f.* 6-8. *prodr.* 2713. *rar.* 1. *p.* 67. 2. *p.* 115. *Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 203. *Naturf.* 14. *p.* 136.
Bloch Eingew. p. 6. *Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 537. *t.* 14. *f.* 1-4.
Goeze Eingew. p. 172. *t.* 14. *f.* 3.
Habitat in lucii œſophago & ventriculo, *in hujus plicis latens, vivida, rubra,* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, vitæ tenacioris.*

halecis. 37. F. *Leeuwenh. epiſt.* 97. *p.* 47.
Habitat in halece.

bramæ. 38. F. oblonga teres, baſi attenuata obtuſa, collo tereti ſubincurvo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 107. *t.* 30. *f.* 6. *prodr.* 2714. *rar.* 1. *p.* 66.
Habitat in bramæ inteſtinis, *alba, poro laterali ab baſin colli ſito, ovulis oblongis fuſcis.*

jeſis. 39. F. ovata anterius anguſtata. *Bloch Eingew. p.* 11. *t.* 2. *f.* 10. 11.
Habitat in jeſis inteſtinis, *lagenam forma ſua mentiens,*

f. *vermium.*

loliginis. 40. F. ore papillis faſciculato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2708. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 328. *n.* 313.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *Fn. ſuec.* 2077. Faſciola barbata.
Habitat in loliginis inteſtinis, *an hujus generis?*

351. TÆNIA. *Corpus* depreſſum, articulatum.
Caput veſicis ſuctoriis quatuor.
† capite corona uncinorum vaginatorum exſertilium & retractilium duplici armato.

† *in aliis præter inteſtina viſceribus habitantes, veſica ad partem poſteriorem auctæ* Hydatulæ ſ. Veſicariæ, ſ. Viſcerales, ſ. Hydatigenæ.

a. *hominis.*

viſceralis. 5. T. piſiformi, veſicæ incluſa, anterius lata, poſterius acuminata. *Tyſon act. angl.* 43. *n.* 475. *p.* 305.
Haen rat. med. II. 3. *c.* 16. §. 2. *p.* 282.
Pall. miſc. zool. p. 174. *n. nord. Beytr.* I. *p.* 83. *Stralſund. Magaz.* I. *p.* 81.
Hoelpin Schrift. berl. Naturf. I. *p.* 348.
Bloch Eingew. p. 24.
Goeze Eingew. p. 196. & 249. *t.* 20. B. *f.* 12. a. b.
Wern. verm. inteſt. p. 68. *t.* 9. *f.* 29-33.
Habitat in hepate, placenta uterina, ſacco hydropico, *aliiſque* tumoribus morboſis hominis, *nunc ſolitaria, nunc gregatim incluſa veſicæ, an una eademque ſpecies?*

celluloſæ. 6. T. veſicæ cartilagineæ tunicæque poſterius bicaudatæ ſolitaria incluſa. *Werner verm. int. cont.* 2. *p.* 2. *ſeq. t.* 1. *f.* 1-8.
Goeze Entd. daſſ die Finnen Bloſenw. ſind. Halle 1784.
Habitat in tela celluloſa muſculorum, *pollicem integrum longa, dimidium lata, & ¼ craſſa, capitis uncinulis obtuſis (an forſan intra vaginam retractis) vitæ tenaciſſima.*

b. *mammalium.*

ſimiæ. 7. T. *Bloch Eingew. p.* 24.
Habitat in ſimiæ diaphragmate, *avellanæ magnitudine; an eadem cum hydatula?*

veſpertilionis. 8. T. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 334.
Habitat in veſpertilionis hepate, *an eadem cum hydatigena ?*

vulpis. 9. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 13.
Habitat in vulpe.

putorii. 10. T. *Goeze Eingew. p.* 206.
Habitat in putorii hepate, *an eadem cum t. ferarum?*

urſi. 11. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 74.
Habitat in urſo.

gulonis. 12. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 14. 15.
Habitat in gulone.

hydatigena. 13. T. ſimplex, corpore elongato ſenſim antrorſum lateſcente, veſicula parte anteriore duplo longiore & latiore terminato, capite ſeſſili diſtincto. *Batſck Bandw. p.* 100. *n.* 8. *f.* 46.
Pall. miſcell. zool. p. 168. *t.* 12. *f.* 12. 13. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.
Bloch Eingew. p. 23. *n.* 1. *Schrift. der berl. Naturf.* 1. *p.* 338. *t.* 10. *f.* 9.
Goeze Eingew. p. 223. *t.* 19. *f.* 1. 2.
Habitat in muris decumani, ratti, amphibii hepate, *fine poſteriore anteriore duplo & veſicula adhærente quadruplo anguſtiori*, 1¼-8½ *pollices longa, capite fini anteriori æquali, collo nullo, corpore medio lineari.*

murina. 14. T. ſimplex corpore elongato ſenſim antrorſum lateſcente: articulis pone ad latera denticulatis, veſica caudali fini anteriori æquali capite ſeſſili diſtincto. *Batſch Bandw. p.* 100. *n.* VIII. *β.* f. 12-16. 18. 20. 29. 30. 47-49.
Maratt. zooph. p. 38.
Friſch miſc. Berol. 6. 1. *p.* 121.
Pallas inſ. viv. p. 51. *elench. zooph. p.* 413. *n.* 5. *miſc. zool. p.* 160. 168. 171. *t.* 10. *f.* 12. 13.
Doever. verm. inteſt. p. 105.
Bloch Eingew. p. 23.
Goeze Eingew. p. 227-247. *t.* 18. B. *f.* 10-14. *t.* 19. *f.* 3-14.
Werner verm. inteſt. cont. 1. *p.* 13. *t.* 9. *f.* 22-33.
Habitat in muris terreſtris & muſculi hepatis *ſuperficie, piſi, aliquando avellanæ magnitudine, articulis longioribus & magis diſtinctis, veſica caudali longe anguſtiori ab hydatigena dignoſcenda, an vere ſpecie diverſa ?*

cordata. 15. T. ſimplex teres corpuſculo diſtincte inſerto in angulum infracto, veſica terminali ventricoſo cordata pone acuminata. *Batſch Bandw. p. 94. n. 4. f. 42. 43.*
Goeze Eingew. p. 218 t. 18. B. *f. 6. 7, & p. 236. t. 18.* B. *f. 15–17.*
Habitat in leporum muriumque hepate, *veſica minuta, an vere diſtincta a piſiformi ſpecies?*

piſiformis. 16. T. ſimplex teres turbinata, corpuſculo contiguo, inferius cum veſica ovato-ventricoſa confluente. *Batſch Bandw. p. 96. n. 5. 44. 45.*
Pall. miſc. zool. p. 158. n. nord. Beytr. 1. p. 82.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 73. t. 5. f. 6. Opuſc. 3. t. 1. f. 3.
Bloch. Eingew. p. 25. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 338.
Goeze Eingew. p. 210–219. t. 18. A. & *t. 19.* B. *f. 4. 5.*
Habitat copioſiſſima in leporis, *potiſſimum ſeneſcentis,* hepate, *racematim ſæpius cohærens, piſi circiter magnitudine, ex albo cæruleſcens.*

utricularis. 17. T. ſimplex teres corpuſculo diſtincte inſerto recto, veſica oblonga, retrorſum utriformi obtuſa. *Batſch Bandw. p. 99. n. 7.*
Goeze Eingew. p. 219. n. 3. t. 18. B. *f. 8. 9.*
Habitat in leporis uteri gravidi *tela celluloſa.*

ferarum. 18. T. ſimplex teres clavata, corpuſculo contiguo inferius cum veſica ovali oblonga confluente. *Batſch Bandw. p. 98. n. 6.*
α. Hydatula cervorum. *Goeze Eingew. p. 205. 206.*
Steno apud Barth. act. havn. 1. n. 36. p. 68.
β. Hydatula Saigæ. *Pall. ſpicil. zool. 12. p. 43. t. 3. f. 5. n. nord. Beytr. 1. p. 82.*
Habitat in elaphi, capreoli, rangiferi, Saigæ *etiam ſaniſſimorum* omento, peritonæo, hepate, *avellanæ, juglandis, ovi gallinacei magnitudine, veſica magis coriacea: ſtriis traſverſis magis evidentibus, collique rugis diſtincta.*

caprina. 19. T. capri hirci.
Barthol. hiſt. anat. 2. p. 49.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 75.
Hartmann miſcel. Nat. Curioſ. 1705. p. 152. f. 21–24.
Habitat in capræ viſceribus.

ovilla. 20. T. ovis arietis.
Goeze Eingew. p. 257. t. 17. f. 10. 11.

Pall. miſc. zool. p. 161. *t.* 12. *f.* 1-11. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 82.

Habitat in ovium *potiſſimum vertiginoſarum* peritonæo, hepate, omento, *an ſatis diſtincta a reliquis ſpecies?*

cerebralis. 21. T. multiplex, corpuſculis pluribus baſi ſua veſicæ communi magnæ adnatis acervatim in ſuperficie diſtributis & in eandem retractilibus, veſica exteriore nulla. *Batſch Bandw. p.* 84. *n.* 1. *f.* 34-36. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 339.

Bloch Eingew. p. 25. Vermis veſicularis ſocialis.

Leske Dreher der Schaafe Leipz. 1780. *t.* 1. *f.* 1-3.

Goeze Eingew. p. 248. *t.* 20. A. *f.* 1-5. *t.* 20. B. *f.* 6-8. *neuſt. Manigf.* 4. *p.* 619.

C. a Borke Naturf. 14. *p.* 142.

Fontana opuſc. ſcientif. Florenz. 1783. 8.

Boerner n. œcon. ſchleſ. Nachr. 1. *p.* 241.

Geutebrück Unterr. v. Schaef. 1. *p.* 277.

Haſtfer Unterr. v. Zucht u. Wart. der Schaafe p. 98.

Ranſtler Anz. der leipz. œcon. Societ. 1776. *p.* 20.

Habitat in ovium vertiginoſarum, *potiſſimum annuarum* cerebro *inſigni ſua copia morbi hujus pecorini cauſa veſica evacuata, inſanabilis, ſingulis latice limpido repletis (veſiculis* 300-400-500*) vermiculis ſemen milii magnitudine æquantibus* 2 *ligamentorum ope adhærentibus, qui omnes capite* 32-36 *uncinulis armato, cerebro potiſſimum ejus ſuperficiei, aut parti medullæ ſpinali vicinæ firmiſſime infiguntur, in illo caſu eam vertiginis ſpeciem, quæ* Drehen *opilionibus audit, in hoc* Springen *cauſantes.*

vervecina. 22. T. veſica magna, corpore brevi rugoſo-imbricato. *Goeze Eingew. p.* 208. *t.* 17. A. *f.* 3-5.

Pallas Stralſ. Magaz. 1. *p.* 81.

Habitat in vervecum, *præſertim impinguatorum*, peritonæo, *an eadem cum globoſa?*

granuloſa. 23. T. multiplex, corpuſculis pluribus veſicæ communis parietibus laxe adhærentibus minutiſſimis granum referentibus, veſica externa internaque calloſis. *Batſch Bandw. p.* 87. *n.* 2. *f.* 37.

Goeze Eingew. p. 258. *t.* 20. B. *f.* 9-14.

Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 85.

Habitat in vervecum hepate, *veſicis nunc avellanam, nunc ovum columbinum, nunc gallinaceum magnitudine æquantibus, plura millia vermiculorum continentibus, interiori*

cæruleſcente; vermiculis ipſis libere natantibus in fluido veſica contento, oculo nudo vix conſpicuis, brevibus, craſſis, punctatis, utroque fine obtuſis.

bovina. 24. T. ſimplex, veſica magna, corpore brevi rugoſo imbricato.
Barthol. hiſt. anat. cent. 4. *p.* 381.
Hartmann miſcell. Nat. Curioſ. dec. 2. *ann.* 4. *obſ.* 73.
Pall. miſc. zool. p. 172.
Goeze Eingew. p. 205.
Habitat in vitulorum boumque viſceribus thoracicis & hepate, *an a globoſa vere diſtincta?*

apri. 25. T. ſuis apri. *Goeze Eingew. p.* 205. 206. *t.* 17. B. *f.* I. II.
Habitat in apri hepate, *juglandis magnitudine, t. ferarum proxime affinis.*

globoſa. 26. T. ſimplex teres, corpuſculo diſtincte inſecto in angulum infracto, veſica terminali globoſa integra. *Batſch Bandw. p.* 89. *n.* 3. *f.* 38-41.
Bloch Eingew. p. 24. *n.* 2. *Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337. *t.* 10. *f.* 1-8.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 83.
α. Hydatula pulmonis. *Bloch Schr. der berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
β. Hydatula lienis. *Bloch Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 337.
γ. Hydatula hepatis. *Goeze Eingew. p.* 197. *t.* 17. A. *f.* 1. 2. 4. 5.
δ. Hydatula peritonæi. *Goeze Eingew. p.* 208. *t.* 17. B. *f.* 6-9.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1320. *n.* 5. Hydra (Hydatula) tentaculis quaternis obſoletis, corpore veſiculoſo.
Pallas miſcell. zool. p. 162. *t.* 12. *f.* 1-11. *Stralſ. Mag.* 1. *p.* 64. *t.* 1. 2.
Tyſon act. angl. vol. 17. *n.* 193. *p.* 506. Lumbricus hydropicus.
Payer miſc. nat. cur. dec. 1. *ann.* 7. *obſ.* 206. Hydatis animata.
Hartm. miſc. nat. cur. dec. 3. *ann.* 2. *obſ.* 193.
Barth. obſ. cent. 2. *n.* 87. *p.* 293. Ova in porcis.
Habitat in porci viſceribus, *præſertim* abdominalibus, *ovi columbini malive citrei non raro magnitudine, diſtincte, at ſubtiliter rugoſa, veſica terminali corpus multoties ſuperante, cæruleſcente, poſt abitum animalculi flavicante.*

Finna. 27. T. conica, duplici veſicæ incluſa, interiori baſi ſua adhærens, capite collum veſicæ verſus directo. *Fiſcher in Werner verm. inteſt. cont.* 3. *p.* 65. *t.* 5.
O. Fabr. nov. act. Soc. Hafn. 2. *p.* 287.
Goeze Entd. daſſ die Finnen Blaſenw. ſind. Halle 1784.

Habitat fixa in tela celluloſa, ſuis carnibus intertexta, *morbum illum, quem* Finnen *nuncupant* . *laniones, excitans, veſica ovali, ſemen milii æquante, exteriori ex tela celluloſa ipſa conſlata, denſa, elaſtica, intus lævi, & ſeroſo latice nalida, interiori pellucida, ſubtiliſſima rubello ſero repleta, qua nonniſi collabente vermiculus incluſus lobos oculis offert, vitæ tenaciſſimus: an eadem ſpecies cum t. celluloſæ?*

c. *amphibiorum.*

ſalamandræ. 28. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12.
Habitat in Salamandra.

ſerpentum. 29. T. *Red. anim. viv. n. an. viv. p.* 12.
Habitat in ſerpentibus.

d. *piſcium.*

truttæ. 30. T. *Froelich. Naturf.* 24. *p.* 127.
Habitat gregaria in truttæ hepate.

† † *in inteſtinis ſolis habitantes, veſica terminali nulla.*
a. *hominis.*

ſolium. 1. T. articulis ſubvaginatis, ovario faſciculatim ramoſo: ramis ſublinearibus crebris, faſciculis tranſverſis compreſſis: margine articuli laterali anguſto compreſſo. *Batſch Bandw. p.* 117. *n.* 3. *f.* 1-6. 9-11. 21-23. 53.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1323. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2264. *Amæn. ac.* 2. *p.* 74. *t.* 1. *f.* 1. Tænia oſculis marginalibus ſolitariis.
Pall. inf. viv. p. 38. *elench. zooph. p.* 405. *n.* 1. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 46. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 1-9. Tænia cucurbitina.
Andry gener. des vers 1. *p.* 195. *f. pag.* 33. 198. 200. 202. 205. 268. Ver ſolitaire ſans épine.
Tyſon act. angl. 1683. *n.* 146. *t.* 1. & 2. *f.* 2. 6. 10. lumbricus latus.
F. Plater prax. 993. Vermis cucurbitinus.
Ernſt diſſ. de tænia braſil. 1743. Tænia ſecunda Plateri.
Hayd exper. 47. *t.* 47. Lumbricus latus.
Bonnet mem. préſ. à. l'acad. de Par. 1. *p.* 511. & *Journ. de phyſ.* 1777. *apr. p.* 277. Tænia à anneaux longs.
Coulet monogr. Lugd. b. 172. *lumbricus latus.*
Hill hiſt. an. p. 16. Sicyonia.
Dionis monogr. Tænia articulos demittens.
Beverw. theſ. p. 202. *t.* 202. *f.* 3.
Raul. morb. aer. 1752. *app. t. f.* 1-4.

Roederer progr. de tænia. 1760.
Limburg act. angl. 56. *a.* 1766. *p.* 128. *t.* 6.
Goeze Eingew. p. 269. *ſqq.*
Bloch Eingew. p. 20. *n.* 20.
Müll. Naturf. 14. *p.* 134. 198-201.
v. Gleichen Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 203. *t.* 6. *f.* 10-13.
Werner verm. inteſt. p. 18.
Ariſtot. anim. l. 5. *c.* 19.
Aldrov. inſ. 6. *p.* 562. *t.* 1.
Valiſn. op. p. 177.
Cleric. lumbr. t. 7. A. B.
Berthol. act. havn. 2. *p.* 148. 3. *p.* 116.
α) Tænia grandis. *Goeze Eingew. p.* 278. *t.* 21. *f.* 1-7.
β) Tænia plana pellucida. *Goeze Eingew. t.* 21. *f.* 9-12.
Wern. verm. inteſt. p. 18. *t.* 1. 2. *f.* 1-46.
Habitat in hominis inteſtinis, *frequentior feminis, frequentior Saxonibus & Batavis, quam quidem aliis certe Europæ gentibus, nimia copia duriſſima aliquando mala creans, non raro mortem, difficilius longe pellenda, quam alii hominem infeſtantes vermes, rariſſime ſolitaria, ut dentur exempla* 200 *ejuſmodi vermium unius hominis inteſtina affligentium, a* 3-8, *imo, ut referunt, ad* 60 *uſque pedes longa, uncinis* 6-7 *priorem,* 8-9 *poſteriorem capitis coronam formantibus, cute alba pellucidiſſima, ut ovaria eleganter ramoſa tranſluceant, articulis primis ex oblongo quadratis, ſequentibus cucurbitæ ſemen referentibus, poſtremis, quos crebrius quam aliæ ſpecies dimittit, longioribus.*

vulgaris. 2. T. orificio ovorum duplici: altero in tergo ovarii punctiformi, altero ante illud poſito papilliformi expreſſili.
Batſch Bandw. p. 107. *n.* 1. *f.* 33. 50.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1323. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2262. *Amœn. acad.* 2. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 2. *Müll. zool. dan. prodr.* 2654. Tænia oſculis lateralibus geminis.
Pallas inſ. viv. p. 30. *n.* 1. *el. zooph. p.* 408. *n.* 3. Tænia griſea.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 59. *n.* 3. *t.* 3. *f.* 13-16. Tænia membranacea.
Plater prax. 992. Lumbricus latus ſ. Tænia inteſtinorum.
Spigel monogr. Lumbricus latus.
Schenck obſerv. 111. *p.* 408. Tænia.
Cleric. lumbr. p. 132. *t.* 6. *f.* 2. Lumbricus latus. *p.* 136. *c.* 7. *t.* 7. Tænia prima.

Plateri p. 129. *t.* 5. *f.* 1. *p.* 159. *t.* 8. *f.* 1. B.
Fabric. obſerv. 2. *c.* 70. Lumbricus latus.
Barthol. act. Havn. 2. *p.* 148. *t.* 39. Lumbricus latus.
Andry gener. des vers. c. 3. *t.* 2. *f.* 9. & *t.* 3. *f.* 16.
Tulp obſerv. p. 170. *t.* 7. *f.* 1.
Bonnet journ. de phyſ. 1777. *p.* 243. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Gadol ſatag. 88.
Goeze Eingew. p. 297.
Werner verm. inteſt. p. 49. *t.* 3. *f.* 47-57.
Habitat in hominum inteſtinis *in* Suecia *vulgatior, pertinaciſſime inſixa ut violentioribus etiam remediis reſiſtat tenuis, laxa, quaſi-membranacea, ſolio tenacior viva lacteſcens, ſubpellucida,* 10-16 *pedes longa & fine latiori ultra* 4½ *lineas lata, articulis nunc quadratis, nunc paulo magis oblongis, medio ſecundum longitudinem ſubtiliter ſtriatis, ad latera tranſverſe rugoſis, ovariis florum corollam referentibus.*

b. *mammalium.*

catenifor-mis. 4. T. articulis oblongis ellipticis: oſculis marginalibus ſolitariis. *Goeze Eingew. p.* 306.

canina. α. Tænia oſculis marginalibus oppoſitis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1324. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2265. *Amœn. acad.* 2. *p.* 81. *t.* 1. *f.* 4. *Act. Stockh.* 1747. *t.* 5. *f.* 0.
Pall. inf. viv. p. 48. *n.* 5. *elench. zooph. p.* 408. *n.* 2. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 57. *n.* 2. *t.* 3. *f.* 10-12. Tæniæ canina.
Blumenb. Naturg. p. 412.
Goeze Eingew. p. 311. *t.* 23. *f.* A-C. *Naturf.* 14. *p.* 134.
Bloch Eingew. p. 17. *t.* 5. *f.* 6. 7. Tænia cucumerina.
Werner verm. inteſt. p. 58. *t.* 3. *f.* 64-69. 77-79. *cont.* 1. *t.* 9. *f.* 34-37.
Batſch Bandw. p. 129. *n.* 7. *f.* 7. 8. 24-26. 57. 65. 161. Tænia elliptica.
Wagler apud Goeze Eingew. p. 324. *t.* 23. *f.* D. E.
Ruyſch obſ. 84.

lupi. β. Tænia (marginata) articulis ſubvaginatis: laterali margine latiuſculo, ovario faſciculatim ramoſo: ramis ſublineari-

---

Tæniæ oſculis in capite poſitis nutrimentum haurientes rariſſime ſolitariæ, fertiliſſimæ oviparæ, ovis per canales proprios ductis, per oſcula marginalia exeuntibus, in articulis poſterioribus ſenioribus copioſioribus, ſpecies pauciores adhuc ſatis accurate deſcriptæ, plures incognitæ, multæ forſan pro diſtinctis habitæ eædem, diſcrimine ſolum a nutrimenti & habitaculi indole varia proficiſcentibus

bus divaricatis, faſciculis obliquis magis disjunctis. *Batſch Bandw. p.* 125. *n.* 4. *f.* 54.
Goeze Eingew. 307. *t.* 22. A. *f.* 1-5.
Bloch Eingew. p. 20. *t.* 6. *f.* 6-8.
Werner verm. inteſt. p. 59.
Red. anim. viv. n. an. viv. p. 72.

vulpis. γ. Tænia (cratægaria) articulis ſubvaginatis non marginatis, ovario faciſculatim ramoſo: ramis inverſe ovatis ſubpetiolatis. *Batſch Bandw. p.* 126. *n.* 5. *f.* 55.
Bloch Eingew. 20. *n.* 19. *t.* 6. *f.* 6-8. Tænia canina.
Goeze Eingew p. 310. *t.* 22. A. *f.* 6-9. & *Naturf.* 14. *p.* 144.

litterata. δ. Tænia articulis ſubvaginatis non marginatis, ovario anguſtato longitudinali ſerie linearum ſerpentiformium conflato. *Batſch. Bandw. p.* 128. *n.* 6. *f.* 56.
Goeze Eingew. p. 310. *t.* 22. A. *f.* 10-12.

felis. ε. Tænia. *Goeze Eingew.* 315. *t.* 22. B. *f.* 13-22.

ſciuri. ζ. Tænia (floribunda) articulis leviter cohærentibus elongatis, utroque fine rotundatis linearibus, ovario pinnato lobulato; lobis criſpatis, papillis ſolitariis. *Batſch Bandw. p.* 137. *n.* 10. *f.* 60.
Goeze Eingew. p. 332. *t.* 23. *f.* 5. 6.

glirium. η. Tænia (puſilla) articulis conglutinatis oblongo-ellipticis, ovario vage pinnato: ramis gracillimis, papillis ſolitariis. *Batſch Bandw. p.* 134. *n.* 8. *f.* 58.
Goeze Eingew. p. 335. *t.* 23. *f.* 5. 6.
Habitat in canum (δ. *in* vulpis), cati, ſciuri, veſpertilionis, & murium ratti muſculique inteſtinis, 18-24 *pollices*, η) 1½ *pollicem longa, proboſcide tereti collo, non articulato; ovis piſi more rotundis, rufis vel fuſcis, albida.*

cucurbitina. 30. T. opaca ex albo flaveſcens proboſcide æquali, articulis omnibus quadratis: oſculis alternis. *Werner verm. inteſt. p.* 56. *t.* 3. *f.* 70-76.
Red. opuſc. 3. *t.* 17. *f.* 4.
Habitat in canum inteſtinis, *craſſior capite latiori, articulis magis æqualibus, retrorſum paulo latioribus & tumido margine cinctis, ovulis minoribus a ſolio diſtincta.*

ſerrata. 31. T. articulis ſerratis ſtriatis capite magno. *Goeze Eingew. p.* 337.
Batſch Bandw. p. 138. *n.* 11. *f.* 19. 32. 61. 63. 67.
Red. anim. viv. an. viv. p. 71. *t.* 13. *f.* 6. 7. *opuſc.* 3. *t.* 17. *f.* 1. 2.

canis. α. Tænia. *Goeze Eingew. p. 349. t. 25. B.*
Vandell. diſſ. tres p. 151. t. 5.

felis. β. Tænia collo breviſſimo. *Bloch Eingew. p. 19. n. 18. t. 6. f. 1-5.*
Goeze Eingew. p. 337. t. 24. f. 1-6. t. 25. A. f. 1-5.
Pall. n. nord. Beytr. p. 47. t. 2. f. 1. 2. A. B. 3.
Valiſn. op. 1. p. 147.
Cleric. lumbr. p. 41. 47. 51. t. 3. f. 1. 2. t. 9. f. 3. 4.
Morgagn. opuſ. 1. p. 174.
Vandell. diſſ. p. 148.
Habitat in canis feliſque inteſtinis, *ad 19 pollices uſque longa, $3\frac{1}{4}$ lineas lata, articulis rectangulis, anterioribus ſenſim latioribus & brevioribus, ovario minus diſtincto per paria pinnato.*

moniliformis. 32. T. articulis orbiculatis, ovario pinnato: pinnis vage ramoſis; ramis apice craſſiuſculis, capite rotundato, collo non articulato. *Batſch Bandw. p. 135. n. 9. f. 59.*
Goeze Eingew. p. 350. t. 26. f. 1-4.
Habitat cum cateniformi in felis inteſtinis, $22\frac{1}{2}$ *pollices longa, ad $3\frac{1}{4}$ lineas lata, colore margaritarum, linea longitudinali media, articulis ſubgloboſis.*

lineata. 33. T. articulis ſubquadratis truncatis, faſcia alba longitudinali, ovariis ſeriatis ſacciformibus conſtante, collo contorto. *Batſch Bandw. p. 143. n. 12. f. 68. 69.*
Goeze Eingew. p. 352. t. 25. A. f. 6-10.
Habitat in cati ſylveſtris inteſtinis, *ex albo cæruleſcens, ſex pollices longa, culmi ſtraminei latitudine; an hujus familiæ?*

muſtelæ. 34. T. *Goeze Eingew. p. 336.*
Batſch. Bandw. p. 143.
Habitat in muſtelæ vulgaris, martis, putorii inteſtinis, *pollicem longa, $\frac{1}{6}$ lineæ lata; an propria, eadem ſpecies hujus familiæ?*

filamentoſa. 35. T. articulis quadrangulis: ovariis lateralibus contortis ultra marginem lateralem elongatis oſculo terminatis, capite rotundato, proboſcide pyriformi. *Goeze Eingew. p. 360. t. 27. f. 6.*
Batſch Bandw. p. 160. n. 18. f. 84. 85.
Habitat in talpæ inteſtinis tenuibus, *ſatis longa, articulis brevibus conico truncatis: diſco ovali diſtincto.*

erinacei. 36. T. articulis ſerratis brevibus, collo nullo, capitis uncinulorum corona ſimplici. *Bloch Eingew. p.* 20. *t.* 6. *f.* 1. 2. 3. 7. 8.
Habitat in erinacei inteſtinis, *an diſtincta a ſerrata ſpecies?*

ſtraminea. 37. T. collo ſimplici tenuiſſimo, proboſcide pyriformi, articulorum latitudine longitudinem quater ſuperante. *Goeze Eingew. p.* 357. *t.* 27. *f.* 1-3.
Sulzer Naturg. Hamſt. p. 88. *not.* 1.
Batſch Bandw. p. 188. *n.* 31. *f.* 116. 163.
Habitat in criceti inteſtinis, *anteriori ſine capillari, poſteriori conico, ad 8 pollices longa.*

magna. 87. T. articulis brevibus latiſſimis altero margine nodulosa, capite magno truncato-tetragono, plica gulari. *Abildg. ap. Müll. zool. dan.* 3. *p.* 50. *t.* 110. *f.* 1.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 75. *t.* 3. *f.* 20.
Chabert malad. vermin. p. 22. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in equi ventriculo *&* inteſtino tenui, 26-30 *pollices longa.*

quadriloba. 88. T. lanceolata, articulis breviſſimis, capite truncato-tetragono: lobulis binis in utroque colli latere. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 51. *t.* 110. *f.* 2. 3.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 71. *t.* 3. *f.* 21-24.
Habitat in equi inteſtinis tenui *&* ventriculo.

caprina. 89. T. terete-conica, articulis breviſſimis, oſculis quatuor lateralibus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 52. *t.* 110. *f.* 4. 5.
Habitat in capræ hepatis ſuperficie.

c. *avium.*

pſittaci. 38. T. corpore filiformi, articulis breviſſimis, capite minutiſſimo. *Goeze Eingew. p.* 406.
Habitat copioſiſſima in pſittaci brachyuri inteſtinis, *ultra* 14. *pedes longa, capite rotundato, collo non articulato.*

cornicis. 39. T. articulis prioribus: infundibuliformibus, poſterioribus ellipticis. *Goeze Eingew. p.* 337. *t.* 23. *f.* 7.
Habitat in cornicis inteſtinis, *an propria ſpecies?*

ſerpentiformis. 40. T. proboſcide apice incraſſata, baſi dilatata, articulis cuneiformibus dilatatis abbreviatis. *Batſch Bandw. p.* 176.

Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Tænia avium.
Bloch Eingew. 4. *p.* 556.
α. Tænia capite ſeſſili, proboſcide piſtillari apice convexa. *Goeze Eingew. p.* 391. a *t.* 31. *f.* 7-9.
Batſch Bandw. f. 96-98.
β. Tænia collo non articulato, proboſcide piſtillari apice ſubumbonata. *Goeze Eingew. p.* 391. b. *t.* 31. *f.* 10. 11.
Batſch. Bandw. f. 99. 100.
γ. Tænia capite ſeſſili, proboſcide ventricoſo pyriformi. *Goeze Eingew. t.* 31. *f.* 12. 13.
Batſch Bandw. f. 101. 102.
δ. Tænia galbulæ. *Goeze Eingew. p.* 393.
ε. Tænia ſcolopacum. *Goeze Eingew. p.* 394.
ζ. Tænia fulicarum. *Goeze Eingew. p.* 394.
η. Tænia charadrii. *Goeze Eingew. p.* 394.
ϑ. Tænia vanelli. *Goeze Eingew. p.* 394.
ι. Tænia turturis. *Goeze Eingew. p.* 394.
Doever. verm. p. 130.
κ. Tænia turdorum. *Goeze Eingew. p.* 393.
λ. Tænia loxiæ. *Blumenb. Naturg. p.* 412.
Habitat in Corvorum Corona, frugilegi, Cornicis, Monedulæ, glandarii, Picæ, Orioli Gabulæ, ſcolopacum, fulicarum *quarundam*, charadrii hæmantopodis, vanelli, turturis, turdorum pilaris, viſcivori, iliaci, muſici, migratorii, ſaxatilis, Merulæ, & loxiæ curviroſtræ inteſtinis, *alba, ad pedis longitudinem ſe expandens, capite tenuiſſimo; an una ſpecies?*

caryocatactis. 41. T. articulis utroque margine acutis prominentibus, ovariis inconſpicuis. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 157.
Habitat in caryocatactis inteſtinis, *an diſtincta a ſerpentiformi ſpecies?*

crateriformis. 42. T. articulis crateriformibus, collo longiore ſimpliciſſimo proboſcide ſagittata. *Goeze Eingew. p.* 396. *t.* 31. B. *f.* 16-18.
Batſch Bandw. p. 180. *n.* 16. *f.* 103. 104.
Habitat in pici majoris inteſtinis, *fili tenuiſſimi forma, uncinorum capitis corona ſimplici.*

torquata. 43. T. capitis annulo nigro, collo capillari, articulis brevibus latis: ultimo acuto. *Bloch Eingew. p.* 16. *t.* 4. *f.* 11-13.
Habitat in anatis domeſticæ pinguis inteſtinis, *copioſiſſima, 8-9 pollices longa, lineam lata.*

ſcolopacis. 44. T. alba. *Müller Schr. der. berl. Naturf.* 1. *p.* 218.
Habitat in ruſticolæ inteſtinis; *an hujus familiæ?*

Filum. 45. T. capite rotundato, proboſcide obtuſa collo ſimplici, articulis inconſpicuis. *Goeze Eingew.* 393. *n.* 8. *t.* 32. A. *f.* 1-7.
Werner verm. inteſt. p. 54. *t.* 3. *f.* 58-63.
Batſch Bandw. p. 163. *n.* 19. *t.* 86. 87.
Habitat copioſiſſima in ruſticolæ inteſtinis, *fili craſſitie, vix ultra 7 pollices longa,* 560 *articulis tenuiſſimis, collo ſimplici punctato.*

infundibuliformis. 46. T. articulis infundibuliformibus ſerratis, proboſcide cylindrica elongata. *Goeze Eingew. p.* 386. *t.* 31. A. *f.* 1-6.
Bloch Eingew. p. 14. *n.* 8. *t.* 3. *f.* 3. 4. Tænia collo longiſſimo.
Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 555. *t.* 12. *f.* 3-5. Tænia Infundibulum.
Müller Naturf. 14. *p.* 179. Tænia anatis.
Pall. n. nord. Beytr. 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 29. 30. Tænia avium.
Batſch Bandw. p. 172. *n.* 23. *f.* 31. 91-93. 164.
β) Tænia otidis. *Goeze Eingew. p.* 390.
Habitat copioſiſſima in galli anatiſ*que* domeſticæ, *rarius in* feræ, anſeriſ*que*, *β) in* tardæ inteſtinis, *expanſa ad* 13 *pollices longa, oſculis alternis, proboſcidis uncinis retroverſis acutiſſimis.*

ſturni. 47. T. articulis longioribus, poſtremis utrinque tumidis, collo breviore ſimplici, capite ſubquadrangulo. *Goeze Eingew. p.* 397. *n.* 31. B. *f.* 19-21.
Habitat in ſturni vulgaris inteſtinis, *tenuiſſima, ad* 5 *pollices longa, articulis prioribus rugas ſubtiles referentibus, mediis ex plano ovali globoſis.*

paſſeris. 48. T. craſſiuſcula, articulis breviſſimis poſterius ſulco fimbriatis. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 29. 30.
Habitat in fringillæ domeſticæ & cannabinæ inteſtinis; *an vere diſtincta ab infundibuliformi?*

Quorſum ſpectant tæniæ *in* urogallo, tetrice, calidri *Squalo* acanthia *teſte* Müllero *Naturf.* 22. *p.* 41. *in* farione, umbla *p.* 47. belone *p.* 48. *repertæ? a* Doeveren *verm. inteſt.* 151. *in* gobio nigro, *ab* aliis *in* cyprinis tinca & alburno *notatæ?*

hirundinis. 49. T. capillaris, collo ſimplici, articulis truncato-infundibuliformibus. *Goeze Eingew. p.* 390.
Habitat in hirundinis urbicæ inteſtinis, *vix viſibilis*, $\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

d. *piſcium.*

nodulosa. 50. T. articulis nodulosis medio punctatis, capite bilabiato: labio utroque aculeis tricuſpidatis geminis. *Goeze Eingew. p.* 418. *t.* 34. *f.* 3-6.
Pallas inf. viv. p. 37. *n.* 3. Tænia rugoſa.
elench. zooph. p. 413, *n.* 6. Tænia piſcium.
n. nord. Beytr. 1. *p.* 90. *n.* 12. *t.* 3. *f.* 32. & 32. C. & *p.* 105. *t.* 3. *f.* 34. Tænia noduloſa, & 2. *p.* 62. Tænia lucii.
Bloch Eingew. p. 19. & *Beſchr. berl. Naturf.* 4. *p.* 541. *t.* 15. *n.* 4. & *p.* 547. Tænia tricuſpidata.
Müll. zool. dan. prodr. 2655. & *Naturf.* 14. *p.* 138. 141-143. Tænia lucii.
Batſch Bandw. p. 148. *n.* 15. *f.* 76-79. Tænia nodoſa.
β. Tænia cyſtica. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 101. *t.* 3. *f.* 33. Tænia hydatidis. *Bloch Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 547. *n.* 3.
Habitat in lucii, percæ fluviatilis, & cernuæ anguillæ ſalaris, leuciſci inteſtinis, *β) in* percæ fluviatilis hepate, *cyſtidi incluſa, articulis numeroſis, medio paululum elevatis, ad latera depreſſis & ſubcrenatis, poſterioribus paulo latioribus.*

†† *capite inermi.*

a. *hominis.*

lata. 3. T. candida, articulis breviſſimis medio nodoſis: oſculo ſolitario. *Pall. elench. zooph. p.* 110. *n.* 4. *inſect. viv. p.* 35. *n.* 2. *nord. Beytr.* 1. *p.* 64. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1324. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2263. *Amœn. acad.* 2. *p.* 80. *t.* 1. *f.* 3. Tænia (lata) oſculis lateralibus ſolitariis.
Plater prax. c. 14. Tænia prima.
Bonnet, mem. préſent. de Paris 1. *p.* 478. *t.* 15. 16. *journ. de phyſ.* 1777. *p.* 262.
Bloch. Eingew. p. 17. *n.* 16.
Goeze Eingew. p. 298. *t.* 21. *f.* 8.
Müll. Naturf. 14. *p.* 160.
Gleicken Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 204. *t.* 6. *f.* 1-9.
Batſch Bandw. p. 111. *n.* 2. *f.* 51. 66.

β) Tænia tenella. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 69. *t.* 2. *f.* 19. A. B.
Habitat in hominis inteſtinis, *in* Helvetia & Ruſſia *aliis frequentior, facilius, ricini potiſſimum oleo, pellenda, ab* 18-120 *pedes longa, vulgari magis opaca, craſſior, latior, ut dimidium pollicem interdum ſuperet, articulis tranſverſim ſubtiliſſime ſtriatis, ſeſquilineam longitudine rariſſime ſuperantibus, ovariis petalorum roſæ in modum diſpoſitis.*

dentata. 51. T. capite acuminato ſeſſili, articulis majoribus tranſverſe ſtriatis, omnibus dilatatis brevioribus: oſculo in marginis lateralis utriuſque medio elatiore. *Batſch Bandw. p.* 184. *n.* 29. *f.* 110-113.
Werner verm. inteſt. p. 49. *t.* 3. *f.* 47-57. Tænia vulgaris.
Habitat in hominis inteſtinis, *elongata, anguſta,* 10-12 *pedes longa, antrorſum latior, folio craſſior, & tenacior, ovariis nudo oculo non conſpicuis, capite ſubtus cordis truncati formam referente.*

b. *mammalium.*

phocæ. 52. T. capite longo tetragono: auriculis quatuor. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 316. *n.* 296. *O Müll. Naturf.* 14. *p.* 179.
Habitat in phocæ barbatæ inteſtino recto, *fœtida, flava, gregaria,* $3\frac{1}{2}$ *pedes longa,* 2 *lineas lata, articulis* 400 *& ultra, anterioribus conſertiſſimis minutiſſimis, capite colli anguſtioris interventu cum trunco connexo; an hujus familiæ?*

bacillaris. 53. T. capite rotundato: proboſcide pyriformi, articulis anguſtiſſimis bacillos ſibi appoſitos æmulantibus. *Goeze Eingew. p.* 359. *t.* 27. *f.* 4. 5.
Batſch Bandw. p. 191. *n.* 34. *f.* 122. 123.
Habitat in talpæ inteſtinis, *fili tenuiſſimi craſſitie, collo non articulato.*

pectinata. 54. T. oblongo-lanceolata, anterius in roſtrum breve coarctata, collo vix conſpicuo. *Batſch Bandw. p.* 168. *n.* 21. *f.* 89. 168.
Goeze Eingew. p. 363. *t.* 27. *f.* 7-13. Tænia articulis latis pectiniformibus, apice acutiſſimo, capite inermi quadriveſiculato.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 75. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 25-27. Tænia acutiſſima.
Limburg. act. angl. 56. *t.* 6. *f.* 1.

Red. anim. viv. n. an. viv. p. 74.

β) Tænia cuniculi. *Goeze Eingew. p.* 363.

Marigues journ. de phyſ. Sept. 1778. *p.* 229. *t.* 2. *f.* 3.

Buff. hiſt. nat. 12. *t.* 13. *p.* 103.

γ) Tænia marmotæ. *Blumenb. Naturg. p.* 412.

Habitat in leporis, β) cuniculi, γ) marmotæ inteſtinis & ventriculo, *gregaria, lanceolatæ proxime affinis, vix ultra 6 pollices longa, plus quam* 200 *articulis conſtans.*

ovina. 55. T. longiſſima, articulis anguſtiſſimis brevibus utrinque rotundatis: vaſis lateralibus pellucidi diſtinctis oſculiſque geminis marginalibus oppoſitis.

Bloch Eingew. p. 16. *n.* 14. *t.* 5. *f.* 1-5. Tænia vaſis nutriciis diſtinctis.

Goeze Eingew. p. 369. *n.* 10. *t.* 28. *f.* 1-12.

Batſch Bandw. p. 182. *n.* 28. *f.* 109. 162.

Rautin des malad. occaſ. par les var. de l'air. p. 444.

β) Tænia bovina? *Cleric. lumbr. p.* 74.

Habitat in ovium, *præcipue lactentium*, inteſtinis, *a lata, articulis ſibi propioribus, oſculis marginalibus oppoſitis, ovis obtuſe conicis, canalibus lateralibus luculentis, fine anteriori capillari, inſigni fertilitate & longitudine, quæ ſæpius* 80, *aliquando* 200 *pedes aſſequitur, diſtincta.*

equina. 56. T. capite quadrangulo: foraminibus quatuor, articulis dilatatis breviſſimis: oſculis inconſpicuis. *Müller Naturf.* 14. *p.* 158-179.

Buff. hiſt. nat. 12. *tom.* 7. *p.* 444.

Pall. elench. zooph. p. 411. *n. nord. Beytr.* 1. *p.* 71. *n.* 6. *t.* 3. *f.* 20.

Goeze Eingew. p. 353. *t.* 25. B. *f.* 11-13.

Batſch Bandw. p. 201. *n.* 42. *f.* 137. 138.

Habitat in equi ventriculo, *ad* 10 *pollices longa, articulis lamellarum aut articulorum melolonthæ inſtar ſuperficie ſua ſibi incumbentibus, capite magno, lobis membranaceis parti poſteriori utrinque* 2 *appoſitis acuto manifeſte diſtincta.*

ſuis. 57. T. *Pall. ſpic. zool. p.* 22. *t.* 3. *f.* 13.

Habitat in ſue æthiopico, *an propria ſpecies hujus familiæ?*

c. *avium.*

globifera. 58. T. articulis prioribus rhombeis, mediis ovalibus & pyriformibus, poſterioribus globoſis petiolatis.

Goeze Eingew. p. 402. *t.* 32. A. *f.* 13-16. Tænia brachium globuloſum.

Bloch Eingew. p. 14. *t.* 3. *f.* 5-7. Tænia cylindracea.
Batſch Bandw. p. 191. *f.* 119-121. & *p.* 199. *f.* 134-136.
Habitat in falconum, Buteonis & Lanarii *juniorum etiam turdi viſcivori* inteſtinis, *ad* 12 *pollices longa, fine anteriori capillari: proboſcide brevi, obtuſa.*

perlata. 59. T. capite quadrangulari, articulis quadratis acute marginatis: nodo medio albo margaritæ ſimili.
Goeze Eingew. p. 403. *t.* 32. B. *f.* 17-23.
Batſch Bandw. p. 146. *n.* 14. *f.* 73-75.
Habitat in buteonis inteſtinis, *tenuibus pedem longa, margaritæ colore, per totam longitudinem nodoſa, articulis brevibus, collo aut ſimplici aut nullo.*

Flagellum. 60. T. parte poſteriori dilatata ſubito in capillarem anteriorem terminata. *Goeze Eingew. p.* 406. *t.* 32. B. *f.* 28-31.
Batſch Bandw. p. 170. *n.* 22. *f.* 90. 169.
Habitat in milvi inteſtinis, 2 *circiter pollices longa, proboſcide brevi, lata, truncato-conica.*

candelabraria. 61. T. articulis oblongis: mediis ſubcampanulatis; pictura pellucente margini parallela, fine anteriori capillari.
Goeze Eingew. p. 405. *t.* 32. B. *f.* 24-27.
Batſch Bandw. p. 144. *n.* 13. *f.* 70-72.
Habitat in aluconis inteſtinis, *collo longiſſimo ſubtiliſſime punctato, articulis collo proximis obtuſangulis, ſequentibus pictura candelabrum referentibus.*

crenata 62. T. capite obtuſo, collo longiſſimo, articulis crenatis: latitudine longitudinem ſexies ſuperante.
Goeze Eingew. p. 395. *t.* 31. B. *f.* 14. 15.
Batſch Bandw. p. 187. *n.* 30. *f.* 114. 115.
Habitat in pici majoris inteſtinis, *collo punctato.*

lanceolata. 63. T. lanceolato-oblonga antrorſum æquabiliter decreſcens, capite papillæ ſimili, articulis breviſſimis.
Bloch berl. Naturſ. Beſch. 4. *p.* 553. *n.* 10. Tænia anſeris. *Eingew. p.* 9. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Müll. Naturf. 18. *p.* 27.
Goeze Eingew. p. 377. *t.* 29. *f.* 3-12.
Pallas n. nord. Beytr. 1. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 26.
Friſch miſc. Berol. 1727. *p.* 42.
Batſch Bandw. p. 165. *n.* 20. *f.* 88. 167.
β) Tænia lanceolata nodoſa. *Bloch Eingew. p.* 10. *t.* 1. *f.* 9.

Habitat in anſeris domeſtici, *β) in* merganſeris & abbelli inteſtinis, *ad* 10 *pollices longa, modo pura ſit, albiſſima, tenera.*

ſetigera. 90. T. corpore ad unum latus ſetoſo: ſetis tenuiſſimis breviſſimis cylindricis truncatis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 106. *t.* 4. *f.* 1-7.
Habitat in anſeris domeſtici paſcentis inteſtinis, *tenuibus ad confinia craſſorum.*

anſeris. 64. T. minuta anguſtiſſima, fine anteriori capillari. *Goeze Eingew. p.* 380. *t.* 29. *f.* 1.
Habitat in anſeris domeſtici inteſtinis, *an diſtincta a trilineata?*

anatis. 65. T. capite obtuſo, articulis ſubtriangulis: oſculis lateralibus ſub margine. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 156. 179.

faſciolaris. α) T. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 85. *t.* 2. *f.* 23.
lineata. β) T. *Bloch Eingew. p.* 12. *n.* 5. *Beſch. berl. Naturf.* 4. *p.* 555. *t.* 14. *f.* 5-7.
Batſch Bandw. p. 196. *n.* 38. *f.* 130. Tænia trilineata.
Malleus. γ) T. *Goeze Eingew. p.* 383. *t.* 30. *f.* 1-3.
avium. δ) T. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 87. *t.* 3. *f.* 29.
Habitat in anatum inteſtinis, *α)* 6, *β)* 4, *γ) ad* 17, *pollices longa, ſatis lævis, γ) anterius malleolata.*

lævis. 66. T. capite cylindrico, collo tenuiſſimo longo, articulorum latitudine longitudinem ſexies ſuperante. *Bloch Eingew. p.* 15. *t.* 4. *f.* 4-6.
Batſch Bandw. p. 194. *n.* 36. *f.* 126. 127.
Habitat in anatum, clangulæ & clypeatæ inteſtinis, *articulis nudo oculo non conſpicuis.*

cuneata. 67. T. capite acuminato ſeſſili, articulis cuneatis. *Batſch Bandw. p.* 190. *n.* 32. *f.* 117. 118.
Bloch Eingew. p. 13. *t.* 3. *f.* 1. 2. Tænia articulis conoideis.
Habitat in tardæ, anatumque fulicæ & clangulæ inteſtinis, 1-2 *pedes longa, proboſcide brevi.*

alcæ. 68. T. articulis viminalibus, fine anteriore tenuiore cylindrico. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 318. *n.* 297. b.
Habitat gregaria in alcæ picæ inteſtinis, *albida, ad* 9 *pollices longa, poſterius latior, articulis circiter* 184, *ſingulis utrinque ad marginem papilla notatis.*

cordæ. 69. T. teretiuſcula, articulis cordatis, fine anteriori filiformi acuminato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 298.
Habitat in alcæ picæ inteſtinis, *albicans, vix ultra* 3 *pollices longa, articulis circiter* 87, *margine utrinque papilla notatis.*

tardæ. 70. T. articulis rhombeis: lineis in medio aliquot tranſverſis, ovariiſque in margine poſteriori tumido.
Bloch Eingew. p. 12. *t.* 2. *f.* 5-9. Tænia villoſa.
Werner verm. inteſt. p. 54. *t.* 3. *f.* 58-63.
Batſch Bandw. p. 163. *n.* 19. *f.* 86. 87. Tænia fimbriata.
Habitat copioſiſſima in tardæ inteſtinis, *crinis equini craſſitie, ad* 4 *pedes longa, capite oblongo, collo capillari, articulis circiter* 32000 *brevibus, latis, tenellis, altero latere denticulato, altero ovario, tanquam membrana articulo ipſo duplo latiore, acuto.*

Linea. 71. T. tenuiſſima, collo ſimplici, proboſcide ſubpetiolata capiteque globoſis, articulis brevibus dilatatis: angulo poſteriore prominente acuto. *Goeze Eingew. p.* 399. *t.* 32. A. *f.* 8-12.
Batſch. Bandw. p. 194. *n.* 37. *f.* 28. 128. 129.
Red. opuſc. 3. *p.* 219?
Habitat numeroſiſſima in perdicum inteſtinis, *ad* 5 *lineas longa, in hac familia minima.*

maculata. 72. T. tenuis pellucida margine ſerrata, articulis breviſſimis dilatatis: eminentia media nigra & angulo poſteriore prominente acuto.
Bloch Eingew. p. 14. *t.* 4. *f.* 1-3. Tænia tenuis nodis inſtructa.
Batſch Bandw. p. 193. *n.* 35. *f.* 124. 125.
Habitat in turdi iliaci inteſtinis, *anguſtiſſima, alba.*

d. *reptilium*

bufonis. 73. T. anterius ſubteres, poſterius filiformis, capite continuo obtuſo, articulis membrana tenella obvolutis cylindricis oblongis: margine argenteo.
Goeze Eingew. p. 425. *t.* 35. *f.* 1-6. Tænia diſpar.
Batſch Bandw. 216. *n.* 50. *f.* 155-163. 165.
Habitat in bufonis & ſalamandræ inteſtinis, *alba,* 6 *pollices circiter longa, opaca.*

e. *piſcium.*

anguillæ. 74. T. capite ſeſſili diſtincto craſſiore, articulis oblongis vage torulosis: oſculis duobus in uno latere. *Batſch. Bandw.* p. 211. *n.* 46. *f.* 148-150.
Beſch. berl. Naturſ. 3. *p.* 490. *Goeze Eingew. p.* 414. *t.* 33. *f.* 6-8. Tænia claviceps.
Müll. Schr. berl. Naturf. 1. *p.* 208. *Naturf.* 14. *p.* 156.
Doever. verm. p. 130.
Red. an. viv. n. an. viv. p. 86. *t.* 14. *f.* 4. *opuſ.* 3. *p.* 252. *t.* 18. *f.* 4.
Habitat in anguillæ inteſtinis, *ad* 4 *pedes longa, capite anterius truncato, articulis* 8 *proximis longiore, articulis circiter* 600, *prioribus ſubquadratis, latitudine longitudinem duplo, poſterioribus orbicularibus: latitudine longitudinem octuplo ſuperante.*

rugoſa. 75. T. ſerrata capite obtuſe conico: papillis binis utrinque ad apicem uſque adnatis, articulis breviſſimis dilatatis. *Batſch Bandw. p.* 208. *n.* 44. *f.* 142-145.
Goeze Eingew. 410. *t.* 33. *f.* 1-5.
Red. an. viv. n. an. viv. p. 91. *t.* 15. *f.* 10. *op.* 3. *p.* 245. *t.* 21. *f.* 5.
Struſſenſ. act. Stockh. 35. *n.* 2. *p.* 23.
Habitat in Gadorum, Muſtelæ & Lotæ inteſtinalis cæcis, *copioſiſſima, tripedalis, collo ſub cylindrico articulato, in ſpiritu vini fuſceſcens, articulis poſterioribus ovorum plenis, capitis forma externa, totoque corporis habitu tetragonocephalæ affinis, an vere diſtincta?*

ſcorpii. 76. T. capite carinato, oſculis lateralibus divergentibus, articulis inæqualibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 44. *f.* 1-7. *rar.* 2. *p.* 13. *nov. act. ſoc. dan.* 1. *p.* 61-151. *Naturſ.* 14. *p.* 144. 179.
Müll. zool. dan. prodr. 2656. *O Fabr. fn. groenl. p.* 319. *n.* 299. Tænia oſculis lateralibus, ultimo tenuioris extremitatis articulo tetragono.
Leeuwenh. arc. nat. p. 376. Vermes ex rhombi inteſtinis.
β) Tænia pleuronectis maximi. *Müll. Naturſ. p.* 145-151. 18. *p.* 25.
Habitat in Cotti Scorpii & pleuronectis maximi ventriculo & inteſtinis, *capitis forma mutabili, corporis margine quaſi crenato, linea utrinque longitudinali, cauda obtuſa integra, articulorum anteriorum oſculo nullo.*

percæ. 77. T. capite bulboſo, ocellis quatuor, articulis quadrangulis: oſculis marginalibus. *Müll. zool. dan. 2. t. 44. f. 1-4. rar. 2. p. 11. nov. act. ſoc. dan. 1. p. 59. 64. 65. Müll. Naturf. 14. p. 152. 153. 179. Schr. der berl. Naturf. 1. p. 206–209.*
Pall. n. nord. Beytr. 1. p. 102.

β) Tænia lineolis lateralibus nullis. *Müll. zool. dan. rar. 2. p. 12.*
Goeze Eingew. p. 416. t. 33. f. 11-14. Tænia alternatim tranſverſe lineata, articulis quadrangularibus, quadriverrucoſo.
Batſch Bandw. p. 157. n. 16. f. 80-82. Tænia ſiluri.
Habitat rarior in percæ marinæ, β) *in* glanidis inteſtinis, *linea utrinque longitudinali candida, articulis craſſioribus & planioribus, quam in congeneribus, capite obtuſo inſequentibus articulis anguſtiore.*

erythrini. 78. T. latiſſima, capite brevi tetragono octolobato, ore antico punctato. *O. Fabr. fn. groenl. p. 317. n. 297.*
Habitat in percæ norwegicæ inteſtinis, *vivax & in aqua quidem marina vitæ tenax, 6 circiter pedes longa, 4 lineas lata, lactea, inteſtino ex griſeo violaceo, articulis margine papillari retrorſum tendente utrinque terminatis, anali margine decemſerrato.*

cernuæ. 79. T. *Pallas elench. zooph. p. 414.*
Habitat in percæ cernuæ inteſtinis, *vix propria ſpecies.*

ſolida. 80. T. oſculis ſub margine articulorum: alterius extremitatis articulo acuto. *Müll. zool. dan. prodr. 2657. Naturf. 18. p. 24-26. t. 3. f. 1-5.*
Linn. it. goth. p. 268. Faſciola. hepatica.
Pall. inſ. viv. p. 135. elench. zooph. p. 410. β. n. nord. Beytr. 1. p. 76. 78. t. 3. f. 27.
O. Fabr. fn. groenl. p. 320. n. 300. Batſch. Bandw. p. 224. n. 52. f. 170. Tænia. gaſteroſtei.
Habitat in gaſteroſtei aculeati ventre, *quem tumidum reddit, ſæpius ſolitaria albiſſima, congeneribus durior & ſolidior, utrinque obtuſe marginata, articulis breviſſimis, linea utrinque longitudinali excavata.* Zoega.

gaſteroſtei. 81. T. tenuiſſima, cauda obtuſa. *Müll. Naturf. 18. p. 28. t. 3. f. 6. 7.*
Habitat in gaſteroſtei aculeati inteſtinis, *minima articulis nudo oculo vix diſcernendis.*

ſiluri. 82. T. crenata, capite continuo, articulis brevibus parallelepipedis: oſculis binis bimarginatis.

Goeze Eingew. p. 415. *t.* 33. *f.* 9. 10. Tænia oſculata.

Batſch Bandw. p. 209. *n.* 45. *f.* 146. 147.

Habitat in glanidis inteſtinis craſſis, *minus copioſa, noduloſa minor, diſtincto in proboſcide retractili ore, articulis minus evidentibus.*

Salmonis. 83. T. capite globoſo mutabili, oſculis articuliſque annularibus inconſpicuis. *Müll. Naturf.* 14. *p.* 179. 202. 18. *p.* 22. *nov. act. dan.* 1. *p.* 68.

Goeze Eingew. p. 417. *t.* 34. *f.* 1. 2. Tænia Proboſcis ſuilla.

Bloſch Eingew. p. 15. *t.* 4. *f.* 7-10. Tænia capite truncato.

Beſch. berl. Naturf. 4. *p.* 545. *t.* 10. *f.* 8. 9. Tænia craſſa.

Batſch Bandw. p. 212. *n.* 47. *f.* 151. 152. Tænia proboſcidea.

β) Tænia tetragonoceps. *Pall. n. nord. Beytr.* 1. *p.* 87. *t.* 3. *f.* 31. A-D.

Batſch Bandw. p. 204. *n.* 43. *f.* 139-141. 175.

Habitat in ſalmonis ſalaris & ariocis ventriculo *ac* inteſtinis, *a* 2 *lineis ad* ¾ *pedem longa, capite ovali articulum quinquies ſuperante, corpore teretiuſculo, articulis poſterioribus ſenſim anguſtioribus ultimo reliquis quinquies longiore.*

Froelichii. 91. T. capite cum collo longiſſimo tenuiſſimo inarticulato continuo, ovariis dendaticis lineâ laterali cinctis. *Froelich Naturf.* 24. *p.* 124. *t.* 4. *f.* 20. 21.

Habitat in Salmonis Wertmanni inteſtino duodeno.

Cuinam hujus ſectionis generi adſcribendi ſunt vermes a Redi *in aquilæ pedibus an. viv. n. an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 225. *in lari œſophago an. viv. p.* 83. *op.* 3. *p.* 226. *t.* 21. *f.* 10. *in teſtudinibus variiſque rajæ ſqualique ſpeciebus an viv. p.* 110. 111. 107. *op.* 3. *p.* 296. 285. *in gadorum inteſtinis an. viv. p.* 90. *t.* 15. *f.* 6. *opuſc.* 2. *p.* 243. *t.* 21. *f.* 2. 3. 4. *in piſce tam baro an. viv. p.* 92. *t.* 15. *f.* 1-4. *op.* 3. *p.* 250. *t.* 20. *f.* 1-4. *in cancri ovariis an. viv. p.* 101. *t.* 17. *f.* 1. *op.* 3. *p.* 270. *t.* 24. f. e. *in aſcidiæ ſpecie, (ſi quidem huc ſpectet) an viv. p.* 105. *t.* 15. *f.* 7. *op.* 3. *p.* 276. *t.* 21. *f.* 7. *in aphrodite aculeata anim. viv. p.* 105. *t.* 17. *f.* 5. *op.* 3. *p.* 287. *t.* 25. *f.* 4. *in ſepia an. viv. p.* 95. *t.* 16. *f.* 6. *op.* 3. *p.* 255. *t.* 23. *f.* 1. *notati? cuinam, ſi quidem ſtructa ſit violentia vomitus & habitaculo inconſueto nequaquam deformata ſpecies vermis* a b. Scopoli *notatus & delic. inſubr. p.* 1. *t.* 20. *deſcriptus & delineatus: erat ille per vomitum in femina rejectus, in os amplum ſupra verrucoſum exeuntibus dentibus* 2, *quorum alter in veſicam ovi gallinacei magnitudine, alter in proceſſum capitis vermiformem corporis reliqui longitudine terminatur? An proprium genus echinorhyncha proximum pleurorynchus corpore filiformi, capite rotundo, proboſcide longa inermi, laterali diſtinctus, a* Cl. Nan. *in ſturionis inteſtinis repertus, & Schr. berl. Naturf.* 7. *p.* 471. *deſcriptus & t.* 7. *delineatus?*

Rectangulum. 84. T. articulis tranſverſis margine rotundatis, ductu pellucidiore in medio ad angulum ſubrectum flexo. *Batſch Bandw. p.* 159. n. 17. *f.* 83. 174.
Bloch Eingew. p. 11. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Habitat in Cyprini Barbi inteſtinis, *pollice vix longior, alba, tenuis, ſemipellucida, fine anteriori acutiore.*

torulosa. 85. T. elongata toruloſa, capite obtuſo, collo crenato, articulis orbiculatis: oſculis geminis difformibus. *Batſch Bandw. p.* 181. *n.* 27. *f.* 105-108.
Bloch Eingew p. 11. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 1-4. 10. 11. Tænia articulis rotundis.
Habitat in Cyprino Jeſe, *ad* 2 *pedes longa, capite plano, anterius truncato, collo brevi, articulis brevibus craſſis.*

laticeps. 86. T. ſubtiliter tranſverſe rugoſa, parte poſteriori craſſiore: fine obtuſo anterius lobo contractili crenato terminata. *Pall. n. nord. Beytr. p.* 106. *n.* 16. *t.* 3. *f.* 35.
Habitat copioſa in bramæ inteſtinis, *minuta, pollicem circiter longa, molliuſcula.*

353. FURIA. *Corpus* lineare, æquale, filiforme, utrinque ciliatum aculeorum reflexorum corpori appreſſorum ſerie ſimplici.

infernalis. 1. F. *Fn. ſuec.* 2070. * *Amœn. acad.* 3. *p.* 322.
Solander nov. act. Upſal. 1. *n.* 6.
Pallas nord. Beytr. 1. *p.* 113.
Habitat in Bathniæ paludibus vaſtis ceſpiloſis, *unguis longitudine, carnea vel ochroleuca, apice ſæpius nigra, carices crebro fruticeſque adſcendens, ventoque per aërem ducta hominum equorumque partes nudas non perpendiculariter ſitas per cutem intrans, ſenſationem primo acupuncturam mentientem, excitans, locoque, per quem introgreſſa eſt, punctum nigrum & vehementem pruritum, mox dolorem atrocem, maculam rubram, & gangrænam a puncto illo nigro undequaque progredientem, febrem inflammatoriam, frequentibus animi deliquiis & deliriis ſtipatum, altero, aliquando primo die, imo paucas poſt horas morte terminatam, niſi cito citius,*

Furiæ & Myxines genus *inter utramque ſectionem hujus ordinis ambigunt.*

quæ ſumma difficultas eſt, vermis extrahatur, aut ſi jam profundius penetraverit, caro, quam feriit exſcindatur, oleumque, ut fertur, betulæ empyreumaticum infundatur, vel lac coagulatum caſeuſve imponatur.

281. MYXINE. *Corpus* teres ſubtus carinatum pinna adipoſa.
Os terminale cirroſum.
Maxillæ binæ pinnatæ: dentibus plurimis acutis in fauce.
Dens ſuperior ſolitarius acutus.

glutinoſa. 1. M. *Fn. ſuec.* 2086. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 91. *t.* 8. *f.* 4. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 287. *act. nidroſ.* 2. *p.* 250. *t.* 3. *Müll. zool. dan. prodr.* 2755. *O. Fabr. f. groenl. p.* 344. *n.* 334.
Helm. it. 1. *p.* 100.
Will. ichth. 107. *Raj. piſc.* 36. Lampetra cæca, oculis carens.
Habitat in Oceano europæo, *piſces intrans, devorans; aquam in gluten vertens.*

275. GORDIUS. *Corpus* teres æquale læve.

aquaticus. 1. G. filiformis fuſcus.
Syſt. nat. XII. *p.* 2. 1052. *Fn. ſuec.* 2068*. Gordius pallidus, extremitatibus nigris.
It. goth. 282. Gordius.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 30. *n.* 161. Gordius Seta.
Geſn. ag. 463. Vitulus aquaticus, Seta, amphisbæna aquatica.
Aldr. inſ. 720. *t.* 765. Seta ſ. vitulus aquaticus.
Jonſt. inſ. t. 25. Meerwijn.
Klein tent. herp. p. 68. Lumbricus aquaticus. 4.
Planc. conch. app. c. 22. *t.* 5. *f.* F. Seta paluſtris.
Hill. hiſt. anim. p. 14. Chætia.
Habitat in vivis, *aliiſque* aquis *fundi potiſſimum* argillacei, *quem, uti piſcis aquam tranat, ſcaturiginum plurium auctor, opacus, ſæpe in ſpiram varie ſe contorquens, interdum pallidus, rarius altero fine parumper acuminatus, morſura paronychiam excitare, opio feliciſſime ſanandam fertur in* Waldai *piſces occidere, hominibus non perinde infeſtus.*

2. G.

argillaceus. 2. G. flaveſcens totus. *Fn. ſuec.* 2069.*
Habitat in argilla, *proprio quaſi elemento, quam ubique tranat, adeoque ubi illa foditur, frequens; vix diſtinctus ab aquatico.*

Filum. 3. G. filiformis candidus. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 31. n. 162.*
Habitat in cuniculis, *in cortice tubi abiegni, olim aquæ ductui inſervientis, excavatis, ſubtiliſſimus, altero fine ſubattenuatus, hyalinus.*

lacteus. 4. G. totus albus opacus. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 32. n. 163.*
Habitat per myriades à Junio ad Septembrem in aquis, *in quibus* fagifolia *pubeſcunt, tactus momento citius ſe contrahens, rurſumque expandens.*

arenarius. 5. G. fulvus obtuſus. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 33.*
Habitat in fundo ſabuloſo ſinus Chriſtianenſis Norwegiæ.

277. LUMBRICUS. *Corpus* teres annulatum ſæpius cingulo elevato genitalium receptaculo cinctum, aculeis utplurimum conditis longitudinaliter exaſperarum, poro laterali inſtructum.

terreſtris. 1. L. ruber octofariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 24. n.* 157.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1076. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 2073. Lumbricus trifariam retrorſum aculeatus.
Hill. hiſt. anim. p. 15. Lumbricus lævis.
Aldrov. inſ. 693. Lumbricus terreſtris.
Raj. inſ. 2. Lumbricus terreſtris minor.
Sloan. jam. 2. *p.* 189. Lumbricus terreſtris minor rubicundus.
Petiv. gazoph. t. 130. *f.* 6.
Red. exper. 4. *t.* 15. *f.* 1.
Paulini de lumbr. terr. Francof. 1703.
Leſſer theolog. des inſ. par Lyonnet. f. 1. 2. 3.
Vandelli diſſert. 3. *Patav.* 1748. *p.* 98. 147. *t.* 4.
Klein tent. herpetol. p. 58.
Murrey de lumbric. ſet. obſerv. t. 2. *f.* 1-5.

Phelſam hiſt. aſcarid. t. 2. f. 4. 5.
Bonnet inſectol. 2. t. 4.
Wichmann. Beſch. berl. naturf. Fr. 3. p. 231.
β) Lumbricus major. *Raj. inſ.* 1.
Habitat in ligno putrido & humo, *quam bibulam reddit, cotyledones plantarum conſumens, nocte pro copula exiens, a naſua, talpa, erinaceo, gallina, creoce, effoſſus fuligine, vino pellendus, 6-8. pollices longus 117-133. ſegmentis conſlatus, ſingulis quatuor paribus aculeorum oculo nudo non conſpicuorum armatis, expanſus utrinque convexus, contractus ſubtus planiuſculus, canali rubro totum corpus percurrente, cingulo rugoſo, poroſo utrinque tumido ſubtus planiuſculo, ore infra proboſcidem poſito.*

marinus. 2. L. papillis dorſalibus geminatis ſetigeris. *It. wgoth.* 189. *t.* 3. *f.* 6. *It. ſcan.* 315. *Fn. ſuec.* 2074.*
Bell. aquat. 444. Lumbricus marinus.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 233. *t.* 1. *f.* 19. 29. Nereis lumbricoides.
Habitat in maris Europæi *fundo ſub arena, nonne potius ad nereides relegandus?*

vermicularis. 2. L. albus bifariam aculeatus. *Müll hiſt. verm.* 1. *p.* 26. *n.* 158.
Habitat haud infrequens in truncis humentibus *ac inter* folia madida, *in humidiuſculis commode repens, in ſiccis valde ſe torquens, glaber, nitidus.*

variegatus. 4. L. rufus maculatus ſexfariam aculeatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 26. *n.* 159.
Bonnet, vers d'eau douce. t. 1. *f.* 1-5.

Habitat in alnetorum & nemorum limo aquoſo, *pulcherrimus, rubro colore teſſulis fuſcis minimis interſtincto, linea ſanguinea media totum corpus percurrente, facillime redintegrandus, & ſponte in fruſta diſſiliens, integrum animal referentia.*

tubifex. 5. L. rufeſcens bifariam aculeatus. *Müller. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 27. *n.* 160. *zool. dan.* 3. *p.* 4. *t.* 84. *f.* 1-3.
Bonnet, vers d'eau douce. t. 3. *f.* 9. 10.
Trembley, hiſt. des polyp. t. 7. *f.* 2.
β) L. ſeta anterius utrinque porrecta. *Müll. hiſt. verm.* 1. *p.* 27.
γ) *Schæffer Armpolypen.* 1755. *t. f.* 1-3?
Habitat in rivulorum fundo, *pellucidus, ſimpliciſſimus, tenuiſſimus, apice truncatus inteſtino obſcuro, ex terra tu-*

bulum perpendicularem erectum ſibi fingens, quem inhabitat.

lineatus. 6. L. albus, linea longitudinali rubra. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 29.*
Müller v. Würm. p. 110. 118. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Habitat frequentiſſimus ad littora maris Baltici, *copioſiſſimus inter fucos, pellucidus ſetis breviſſimis, arteria dorſi lutea, vena caput verſus biſida, ovario albo Maio pleno.*

ciliatus. 7. L. rufus ciliis annulatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 30.
Habitat in Norwegiæ maritimis, *glaber, ſegmentis ultra* 40, *interſectionibus faſciculis* 4 *ſetarum breviſſimarum armatis.*

tubicola. 8. L. albus, macula ſegmentorum dorſali rubra. *Müll. zool. dan. prodr.* 2613. *zool. dan. rar.* 2. *t.* 75.
Habitat rarus in fundo argillaceo ſinum Norwegiæ, *tubulum, teretem, membranaceum, limo obductum, ſe uncia longiorem inhabitans, ſegmentis corporis* 27, *interſectionibus utrinque* 2 *ſetis armatis, inteſtino nigro totum corpus percurrente.*

echiurus. 9. L. ſeriatim granuloſus, poſterius obtuſe truncatus, duplicique ſetarum corona cinctus. *Pall. miſcell. zool. p.* 146. *t.* 11. *f.* 1-6. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 1-5.
Habitat in maris fundo arenoſo, *frequens, hieme potiſſimum, in littore belgico, gadi morrhuæ eſca, digiti medii magnitudine, lingua carnoſa, craſſiuſcula, ſcaphoidea, ex griſeo albidus: viſceribus fulvis.*

Thalaſſema. 10. L. ſtriatus ſordide ruber rutilo-maculatus, ſubtus griſeus, ore infundibulo intus rugoſo ad marginem plicato cincto.
Pall. miſc. zool. p. 147. *t.* 11. *f.* 9. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Cornubiæ littore *profunde inter rimas rupium ſubmarinarum, glaber, mucoſus, altero fine craſſior, altero ſubacuminatus, ore ſupero: infundibulo croceo.*

edulis. 11. L. ex albido carneus poſterius ſubclavatus anterius dilatatus papilloſus, ore terminali papillari ruga villoſiſſima cincto. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 10. *t.* 1. *f.* 7.
Camell. act. angl. 26. *n.* 318. *p.* 248. Tambiloc?
Habitat in littore ſabuloſo inſularum Oceani indici, *fere pedalis, pennæ anſerinæ craſſitie, ad pedem vel ſeſquipe-*

dem intra arenam latens, pervio ad ſuperficiem canal iſe prodens, Sinenſibus eſculentus propriaque arte captus nonnullis inter partem villoſam finemque poſteriorem 278 ſtria annulari diremtis, ſine poſteriori bulboſo papilla gemina, anteriori carneis confertis per ſeries tranſverſas digeſtis obſeſſo.

oxyurus. 12. L. ex liveſcente albidus fine poſteriore acutiſſimus, anteriore obtuſus, roſtro tereti lateſcente retractili & exſertili. *Pall. miſcell. zool. p.* 146. 147. *t.* 11. *f.* 7. 8. *ſpicil. zool.* 10. *p.* 16.
Habitat in Suſſexiæ *littore, ſubſeſquipollicaris, ſtriis teneris annuloſus, roſtro truncato ſubtiliter granuloſo, poro vix conſpicuo ad baſin roſtri ſito.*

fragilis. 13. L. ruber, verrucis lateralibus fiſſis ſetis, faſciculatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2611. *zool. dan. rar. deſcr.* 1. *p.* 45. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *t.* 22. *f.* 1-3.
Habitat in fundo limoſo *ſinus* Norwegiæ Droebacenſis, *terreſtris facie, nereidibus affinis at aculeis manifeſtis, annulis ultra* 500. *lævibus fragillimis, capite, conico ore huic proximo rugoſo.*

armiger. 14. L. ruber, lamellis ventris lanceolatis, geminatis, anterius nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2610. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 46. *zool. dan.* 1. *p.* 73. *n.* 29. *t.* 22. *f.* 4. 5.
Habitat in fundo impaio ſinus marini inſularum Teiſt oceani Norwegici, *nereidibus proximus,* 20 *lineas longus, annulis ultra* 100 *conſtans.*

cirratus. 15. C. cirris longiſſimis. *Stroem. act. Nidr.* 4. *t.* 14. *f.* 7.
Habitat in mari Norwegico, *cirris annulatis* 3-24. *per totum corpus diſperſis.*

ſabellaris. 16. L. articulatus, altero fine truncatus, interſectionibus articulorum incraſſatis biaculeatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 37. *t.* 104. *f.* 5.
Habitat in ſinu Norwegiæ Droebacenſi, *an forte cum tubicola diſtincti generis?*

278. PLANARIA. *Corpus* gelatinoſum planiuſculum : poro ventrali duplici ; ore terminali.

* *oculis nullis.*

ſtagnalis. 1. Pl. ovata fuſca anterius pallida. *Müll. verm.* I. 2. *p.* 53. *n.* 178.
Pallas inf. viv. intra viv. p. 272. Faſciola ovata plana ſubpetiolata aquatica.
Habitat in ſtagnis, *opacus, ſupra & ſubtus æqualis antrorſum ſubacuminatus pellucens : maculis binis lacteis : ovis numeroſis albidis ad latera congeſtis.*

nigra. 2. Pl. oblonga nigra, anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 179. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 3. 4.
Habitat in rivo, ſubtus tota plana, poſteriora verſus poris duobus albidis ſecundum longitudinem diſpoſitis.

brunnea. 3. Pl. oblonga brunnea : linea longitudinali nigra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 54. *n.* 180.
Habitat - - - *nigræ proxime affinis.*

ciliata. 4. Pl. elongata depreſſa ciliis cincta. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 55. *n.* 181.
Joblot. microſc. I. 2. *p.* 66. *t.* 8. *f.* 52-11. & *t.* 10. *f.* 13. ? Solea aurea & parva.
Habitat in aqua *ſub* lemna, *griſea, e granulis quaſi conſtata, ciliis mobilibus, organo antico rotatorio vorticellam mentiens, an proprii generis?*

Gulo. 5. Pl. elongata pellucida, anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 56. *n.* 182.
Habitat rara in aquis *ſub* lemna *primo intuitu ciliatam referens, pellucida granuloſa, at ciliis orba, margine omni ſtriis tenerrimis teſſulato, pro lubitu lente celeriterve incedens, cyclidia cohabitantia uno hauſtu ingurgitans, & poſt aliquot horas ſimul iterum evomens.*

punctata. 6. Pl. elongata teres viridis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *n.* 183.
Habitat primo vere in pratis inundatis, *antrorſum obtuſa, poſterius ſubacuminata puncticulis nigris conſperſa, & ova 5 rubra, ſphærica undique pellucida continens.*

flaccida. 7. Pl. elongata brunea: linea laterali tranſverſiſque albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 57. *zool. dan. prodr.* 2678. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 69. *zool. dan. t.* 64. *f.* 3. 4.
Habitat inter rudera teſtarum in ſinubus Norwegiæ, *quietus ſpiraliter ſe convolvens, & partem corporis quamcunque pro lubitu attenuans, dilatans, corrugans, utroque fine ſubattenuata, ſupra convexiuſcula ſubtus plana, rubicunda, immaculata.*

roſea. 8. Pl. elongata rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 58. *zool. dan. prodr.* 2679. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 68. *zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 1. 2.
Habitat in ſinubus Norwegiæ *paſſim nigro-ſtriata, utroque fine obtuſa, ſupra convexa nigro-punctata, ſubtus pallidior: anterius pone caput lunula utrinque ex punctis nigris conflata.*

angulata. 9. Pl. elongata rufo fuſca: anterius angulis binis albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 58.
Habitat in fundo arenoſo Oceani, *ingens, anterius ſubacuminata, poſterius obtuſa, ſupra convexa ſubtus pallida, tubulo albo pellucido, inteſtino ſubrubente ſpirali inſtructo, ano terminali.* O. Fabricius.

rubra. 10. Pl. oblonga depreſſa pallide rubra. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2683. *zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 9. 10. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 304.
Habitat in profundo littoris Groenlandici *ſuper ulvas & fucos frequens, ſupra lineis tranſverſis tenerrimis exarata.* O. Fabricius.

viridis. 11. Pl. oblonga. ſupra convexa viridis: ſtriis tranſverſis albis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 59. *zool. dan. prodr.* 2684. *zool. dan.* 2. *p.* 77. *t.* 68. *f.* 1-4. *O. Fabr. Fn. groenl.* 305.
Habitat in radicibus fucorum marinorum, *craſſiuſcula, ſubtus pallidior, unicolor, antrorſum obtuſa: rima utrinque rubra; poſterius oblique truncata, ſubtus verſus medium foramine ovato, ano in dorſi medio.* O. Fabricius.

operculata. 12. Pl. ſubovata griſea ſubtus operculo tubulum exſertilem condente inſtructa. *Müll. zool. dan. rar.* 2. *p.* 78. *t.* 68. *f.* 5-8. *O. Fabr. Fn. groenl.* 307.
Habitat rara in littoribus arenoſis & *inter* fucos ſinuum minorum Norwegiæ, *fabæ coffeæ non diſſimilis, marginem flectendo cito ſatis progrediens, plicarum marginalium*

ope ſuperis quoque corporibus ſe affigens & adſcendens, ex viridi griſea, ſubtus, dorſique linea longitudinali pallidiori, operculo candido, margine ſubtus plicato.

ſubulata. 13. Pl. elongata, anterius acuminata poſterius truncata. *Müll. zool. dan.* 2. *p.* 79. *t.* 68. *f.* 11. 12. *O. Fabr. Fn. groenl.* 308.

Habitat copioſa in confervis Groenlandiæ marinis *& fundo limoſo* cavernarum rupium aquam ſub æſtu retinentium, *alba, ſupra griſea, motu roſtri ſerpentino celerrime ingrediens, roſtro autem tacto in cubum minutum ſe contrahens.*

ventricoſa. 14. Pl. ovata ventricoſa, anterius collo cylindrico-conico elongata, poſterius obtuſa.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 17. *t.* 1. *f.* 9. 10. Faſciola ventricoſa.

Habitat in Amboina, *prægrandis, ex livido exalbida, ſtriis, rugiſque tenuiſſimis exarata, poro utrinque ad foſſam colli baſilarem ampliſſimam circularem; nonne eadem cum tetragona?*

quadrangularis. 15. Pl. pallida ovata anterius acutiſſima membranulis quatuor longitudinalibus criſpulis alata.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 20. *t.* 1. *f.* 12. a-e. Faſciola quadrangularis.

Habitat haud infrequens prope Hagam Comitum *in foſſis inter lemnam, molliſſima, pellucida, forma mutabili, limacis more ingrediens, ſuper alia corpora gliſcens, & alteri animalculo obvia quaſi ſterrita contracta quieſcens: An hujus tribus?*

bicornis. 16. Pl. ovato-lanceolata utrinque obtuſa ex griſeo cinerea nigro-punctata: anterius tubulis binis breviſſimis divergentibus.

Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 23. *t.* 1. *f.* 14. a. b. Faſciola punctata.

Habitat in Belgii aquis lemna coopertis, *forma mutabili, læſa aut irritata tubulorum ope hirudinis more corpus figens, ſubtus albidior: venis fuſceſcentibus; an hujus tribus & generis? an diverſa a tentaculata ſpecies?*

griſea. 43. Pl. corpore griſeo dilatato antrorſum elongato-acuminata, fine poſteriori abbreviata acuta. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 38. *t.* 105. *f.* 1.

Habitat in aquis lacuſtribus *inter confervas.*

fulva. 44. Pl. depreſſa latiuſcula utroque fine acuta, macula longitudinali nigra elongata media. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 2.
Habitat - - -

viridata. 45. Pl. oblonga teres viridis utroque fine acutiuſcula. *Müll. zool. dan. prodr.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 4.
Habitat auctumno in pratis inundatis.

** *oculo unico.*

glauca. 17. Pl. ſubelongata cinerea, *i*ride alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60 *n.* 184.
Habitat in aquis, *torvæ affinis, lineam longa, anterius acuminata, poſterius latiuſcula, linea interdum duplici nigra in medio dorſi anterius & poſterius coeunte.*

ineata. 18. Pl. elongata ſupra convexa cinerea: linea longitudinali pallida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 60.
Habitat vaga in littore maris Balthici, *ſeſquilineam longa, ſubtus alba: area media fuſca, antrorſum attenuata, retrorſum dilatata.*

rutilans. 46. Pl. linearis, antrorſum acute attenuata, oculo nigro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 49. *t.* 109. *f.* 10. 11.
Habitat in maris baltici *fucis.*

*** *oculis duobus.*

fuſca. 19. Pl. fuſca nigro-venoſa oblongo-lanceolata anterius truncato ſubretuſa, poſterius acuta.
Pall. ſpicil. zool. 10. *p.* 21. *t.* 1. *f.* 13. a. b. Faſciola fuſca.
Habitat vulgatiſſima in Europæ aquis ſtagnantibus herboſis, *ad* Menyanthis, Sii aquatici, Nymphææ folia, *tenerrima, limacis more in ſuperfice aliorum corporum gliſcens, per aquas ſat celeriter currens, dum quieſcit aut irritatur, ſe contrahens forma mutabili; nonne eadem cum torva?*

lactea. 20. Pl. depreſſa oblonga alba anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 61. *n.* 185. *zool. dan.* 3. *p.* 47. *t.* 109. *f.* 1. 2.
It goth. p. 250. Hirudo depreſſa alba, lateribus acutis.
Habitat frequens in paluſtribus *ſub* nymphææ foliis, *poſterius acuminata, margine laterali acuto, macula media lactea retrorſum in lineam pallidam extenſa, vaſis linearibus apice bifidis plurimis utrinque excurrentibus interaneis ſæpe læte purpureis.*

torva. 21. Pl. depreſſa oblonga cinerea vel nigra ſubtus albida, iride alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 62. *n.* 186. *zool. dan.* 3. *p.* 48. *t.* 109. *f.* 5. 6.

Habitat in aquis, 4-5 *lineas longa, anterius obtuſa, poſterius ſubacuminata, oculis ſubtus pellucentibus, poris ventralibus albis interaneis pinnatis fuſcis, interdum nigricans, poris ſubtus tribus, & macula pone oculos angulari alba.*

tentaculata. 22. Pl. depreſſa oblonga cinerea anterius tubuloſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 63. *n.* 187.

Habitat in aquis paluſtribus, 7 *lineas longa, ſupra ſolida ventre repens, in aquis ventre dorſoque æque mota, utrinque fere perinde obtuſa, marginibus lateralibus ſinuatis, macula dorſi media albida, ventre interdum albo dorſoque fuſco, rarius dorſo fuſco punctis nigris marginato & ventre cinereo, interaneis ſubtus nunc conſpicuis nunc inconſpicuis: pinnis nunc ſimplicibus nunc furcatis.*

crenata. 23. Pl. depreſſa ovato-oblonga pallida margine crenulato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 64. *n.* 188.

Habitat rara in lacu vici Lyngbye Daniæ, *lacteæ facie, dorſo obſcure brunneo: macula media alba, interaneis ramoſiſſimis.*

Helluo. 24. Pl. ovata teres viridis. *Müll. hiſt. verm.* I. *p.* 64. *n.* 189. *zool. dan.* 3. *p.* 39. *t.* 105. *f.* 3. *prodr. n.* 2692.

Habitat in pratis inundatis *ad ſeſquilineam longa, punctatæ facie, anterius obtuſa, poſterius acuminata, dorſo obſcuro, ora candida.*

obſcura. 25. Pl. ovato-oblonga utrinque obtuſa alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 190.

Habitat in piſcinis, *lineam longa, ſubpellucida.*

roſtrata. 26. Pl. oblonga hyalina, extremitate elongata, oculis rubris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 65. *n.* 191. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 9.

Habitat in paludoſis, *lineam longa, candida, media maſſa helvola.*

atomata. 27. Pl. plana membranacea alba, superne atomis ſparſis rufis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2706. *zool. dan. rar.* 1. *p.* 73. *zool. dan.* 1. *p.* 115. *t.* 32. *f.* 3. 4.

Habitat in ſinu Norwegiæ Droebacenſi, *doridis obvelatæ facie, ſubtus immaculata, punctorum nigrorum agminibus 2 oculos referentibus.*

cornuta. 28. Pl. plana oblongiuſcula, tentaculo ab utroque capitis latere. *Müll. zool. dan. prodr.* 2681. *zool. dan. rar.* I. *p.* 74. *zool. dan.* I. *p.* 116. *t.* 22. *f.* 5-7.

Habitat in ſinu Norwegiæ Droebacenſi, *albida, ſubtus albo-punctata, ſine anteriori proboſcidis inſtar exſertili & retractili, pone tentacula agmen punctorum nigrorum angulatum aliudque ad baſin utriuſque.*

radiata. 29. Pl. oblonga rufa, dorſo roſula candida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 66. *n.* 192. *zool. dan.* 3. *p.* 41. *t.* 106. *f.* 1. & *t.* 109. *f.* 7. 9.

Habitat rara in aquis ſilvaticis, *prima facie vorticellam rotatoriam referens, ſeſquilineam, longa, opaca: margine pellucido, antrorſum radiis pallidis: medio macula candida varia.*

ſtrigata. 30. Pl. oblonga pallida: lineis tribus longitudinalibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 66. *n.* 193. *zool. dan.* 3. *p.* 41. *t.* 105. *f.* 8.

Habitat in aquis paludoſis, *ſtrigis ruſis.*

groſſa. 31. Pl. cylindracea alba, anterius & poſterius acuminata: oculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 67. *n.* 194. *zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 5.

Habitat in plantis aquaticis, *2 lineas longa, interdum decuplo minor, pellucida, ovis 5-33 magnis, ſphæricis, rubris, conſertis.*

linearis. 32. Pl. elongata teretiuſcula pallide lutea. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 67. *n.* 195. *zool. dan.* 3. *p.* 42. *t.* 106. *f.* 2.

Habitat in ſilvarum foveis paluſtribus, *ſeſquilineam longa, decuplo latitudine ſua longior: margine pellucido candido, obvia evitans.*

…is 33. Pl. linearis ſupra convexa cinerea ſubtus alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 68. *n.* 196.

Habitat in aſſeribus muſciſque humidis, *quam terram ſpectant, extra humiditatem paucorum minutorum intervallo pariens, hirudinis inſtar ſe contrahens & expandens, limacis more progrediens, & viſcoſa, ut igitur utrumque genus jungat, opaca.*

tetragona. 34. Pl. lutea, lamellis quadrangulis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 69. *n.* 197. *zool. dan.* 3. *p.* 42. *t.* 106. *f.* 1–5.
Habitat rarior in ſtagnis foveiſque aquæ purioris, *lamellis ſubmembranaceis pellucidis, ſæpius octilatera, rarius bilatera.*

capitata. 35. Pl. oblonga cinerea, capite diſcreto. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70.
Habitat in mari Balthico, *torvæ affinis, at capite diſcreto faſciolas limacibus aquaticis nectens, reſupinata quieſcens & ut plurimum aquæ innatans, viſcida, anterius obtuſa, poſterius acuminata, ſupra gibba nigricans: punctatis albis ſparſis, ſubtus plana alba; verſus oram utriuſque lateris ſuperne macula alba, in cujus angulo externo oculus.*

caudata. 36. Pl. anterius rotundata, poſterius in caudam attenuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 70. *zool. dan. prodr.* 2702. *zool. dan. rar.* 2. *p.* 80. *zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 13-15. *O. Fabr. Fn. groenl.* 310.
Habitat gregaria in Groenlandiæ fucis ulviſ*que* littoralibus, *vivaciſſima, 2 lineas longa, a flavo rufa ſubconvexa.*

auriculata. 37. Pl. oblonga anterius truncato-emarginata poſterius acuta. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 16. 17. *rar.* 2. *p.* 81.
Habitat in ſinuum Norwegiæ aqua marina, *nudo oculo inconſpicua, gelatinoſa, pellucida, macula media opaca oblonga, in formam ſphæricam & ovatam paſſim ſe contrahens.*

filaris. 38. Pl. linearis, cauda filiformi contractili. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 68. *f.* 18–20. *rar.* 2. *p.* 82.
Habitat in madrepora prolifera, *limacis more vitri parietes adſcendens, pollicem longa, lineam lata, carnoſa, ex rufo fulva, anterius obtuſa, poſterius macula rufa notata, antrorſum ciliis breviſſimis micantibus obſita.*

Lingua. 47. Pl. pellucida fuſco cinerea utroque fine obtuſiſſima. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 40. *t.* 105. *f.* 7.
Habitat auctumno *in* piſcinis.

**** *oculis tribus.*

Gefferenſis. 39. Pl. elongata viridis pone caput rufa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 64. *f.* 5–8. *rar.* 2. *p.* 70.
Habitat in littoris Gefferenſis Falſtriæ fuco furcellato, *teres, anterius obtuſa, poſterius acuminata, corporis ſegmentis*

inæqualibus, ſerie punctorum albidorum minimorum inſcriptis: interſectionibus pallidis.

***** *oculis quatuor.*

marmorata. 40. Pl. oblonga pallida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71. *n.* 198. *zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 2.
Habitat rara in foſſis aquaticis, *dimidiam lineam longa, ex cæruleo griſea, interaneis glomeratis albis: macula media magna rotunda flava.*

candida. 41. Pl. elongata albida. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 71.
Habitat in Groenlandiæ *littore ſub* lapidibus, 2-3. *pollices longa, admodum glutinoſa, linea media longitudinali lactea, ore tubulum exſerente.* O. Fabricius.

truncata. 48. Pl. pallidè rubens, antrorſum late truncata, poſterius acutiuſcula. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 43. *t.* 106. *f.* 1.

****** *oculis pluribus.*

tremellaris. 42. Pl. plana membranacea lutea, margine ſinuato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 72. *zool. dan.* 1. *t.* 32. *f.* 1. 2. *prodr.* 2705. *rar.* 1. *p.* 72.
Habitat in mari Balthico Hafniam *alluente in* ſinu Chriſtianenſi & Droebacenſi Norwegiæ, *tremellam referens, 9 lineas longa, tarda ſupra cineraſcens, diſco ſubluteo: media linea pinnata infraque hanc lunulæ duæ albæ, ſubtus albicans, maculis tribus lacteis.*

279. SIPUNCULUS. *Corpus* teres elongatum.
Os anterius attenuatum cylindricum.
Apertura lateralis corporis verruciformis.

nudus. 1. S. epidermide ſtricta. *Martin on marin. verm. &c.* 1. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 1. Sipunculus corpore nudo.
Geſn. ap. 1026. Vermis mærorhynchopterus Rondeletii 2.
Bohadſch mar. 93. *t.* 7. *f.* 6. 7. Syrinx.
Habitat in Oceano europæo *ſub lapidibus.*

Faſciola cornuta Com. Raſumovvsky *vix hujus generis,*

ſaccatus. 2. S. epidermide laxa.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1078. *n.* 2. Sipunculus corpore tunica laxa induto.

Martin. on mar. vermſ. 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 3? Sipunculus reticulatus.

Amœn. acad. 4. *p.* 454. *t.* 3. *f.* 5. Nereis ſacculo induta.

Geſn. aq. 1026. Vermis macrorhynchopterus 1.

β) Lumbricus phalloides. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 12. *t.* 1. *f.* 8.

Habitat in Oceano indico, *etiam* Vitamnico β) americano, inſulam Granadam *alluente.*

280. HIRUDO. *Corpus* oblongum, anterius & poſterius truncatum, muticum, cartilagineum, os caudamque dilatando progrediens.

indica. 1. H. depreſſa fuſca, ſtriis tranſverſis muricatis centum.

Habitat in Indiæ marinis, *ore admodum dilatato, ſtriis annularibus expanſis elevatis.*

medicinalis. 2. H. elongata nigricans: ſupra lineis verſicoloribus, ſubtus maculis flavis. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 37. *n.* 167.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 2079. *Amœn. ac.* 7. *p.* 42. Hirudo depreſſa nigricans ſupra lineis flavis ſex intermediis nigro arcuatis, ſubtus cinerea nigro maculata.

Hill. hiſt. anim. p. 16. Hirudo nigreſcens flavo variegata.

Raj. inſ. 3. *Schmuck chir. Schrift.* 1. Hirudo medicinalis.

Geſn. piſc. 425. *t.* 425. Hirudo major & varia.

Bergman. act. Stockh. 1757. *p.* 308. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 1. 2.

Giſler act. Stockh. 1758. *p.* 95. *n.* 1.

Salomon act. Stockh. 1760. *p.* 35.

Habitat in ſtagnis & paludoſis, *præſtantiſſimus phlebotomus, inprimis hæmorrhoidum, ſupra rugis plurimis annularibus pro lubitu dilatandis vel contrahendis conſtans, lineis in dorſo utrinque* 4, *prima ruſa, altera ruſa nigro maculata, tertia nigra, quarta flava, ventre flavo maculis nigris vario, oculis oriſque uncis, ut videtur, nullis.*

ſanguiſuga. 3. H. elongata nigra, ſubtus cinereo-virens: maculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 2 *p.* 38. *n.* 168.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2078. *Amœn. acad.* 7. *p.* 44. Hirudo depreſſa fuſca: margine laterali flavo.

Hill. hiſt. anim. p. 16. Hirudo nigra abdomine plumbeo.

Raj. inſ. 3. Hirudo maxime vulgaris.

Petiv. gazoph. t. 130. f. 7.
Bergm. act. Stockh. 1757. n. 4. t. 6. f. 3. 4.
Giſl. act. Stockh. 1758. p. 95. n. 2.
Habitat in foſſis, ſtagnis, paluſtribus, *ultra 4 pollices interdum longa, ventris medio interdum immaculato, à Norlandis medicinalis inſtar adhibita, cruoris adeo avida, ut novem ſanguine & vita privare equum dicantur, à dyticorum larvis nonnunquam ad mortem uſque exſucta.*

lineata. 10. H. elongata griſea, dorſo lineis quatuor longitudinalibus nigris. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 39. n. 169.*
Habitat rara, primo vere in paludoſis, 16 lineas longa rugis confertis annulata, oculis 6 aterrimis ſerie duplici tranſverſim diſpoſitis.

vulgaris. 4. H. elongata flavo fuſca, oculis octo: ſerie lunata. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 40. n. 170.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 4? *Fn. ſuec.* 2080. Hirudo (octoculata) depreſſa fuſca, punctis octo nigris ſupra os.
Bergm. act. Stockh. 1756. p. 199. & 1757. t. 6. f. 5. 8.
Habitat vulgatiſſima in plantis aquaticis, 15. *lineas longa monoculis & animalculis infuſoriis minimis, helicum quoque incolis victitans, ab his poſtremis jure talionis iterum exſucta, ovulis in gravida ſphæricis diaphani ad 70, oculis interdum 9, nunc fuſca immaculata, nunc cinerea punctis nigris ſuperius conſperſa, nunc fuſca, punctis flaveſcentibus ſupra conſperſa, nunc luteo-fuſca: linea medio nodoſa, laterali nigricante anterius intus pinnata, nunc flaveſcens, lineis longitudinalibus, media nodoſa, lateralibus punctis remotis ſanguineis.*

bioculata. 5. H. elongata cinerea, oculis duobus. *Müll. hiſt. verm. I. 2. p. 41. n. 171.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2081. Hirudo (ſtagnalis) depreſſa nigra, abdomine ſubcinereo.
Bergm. act. Stockh. 1757. n. 4. t. 6. f. 9-11.
Habitat frequens in paludoſis foveis numeroſis, rivis, 9 *lineas longa, cum incola helicis planorbis ſæpe confluctans, tota albida, pellucida, punctis cinereis conſperſa, ad latus plicata, crenulata, ovis ad 40 ingravida, circulo pellucido cinctis, junioribus cinereis, maturioribus fuſcis, pullis jam excluſis cauda matris ventri adhærentibus.*

Non miſſura cutim, niſi plena cruoris hirudo pellitur inſperſa muria.

complanata. 6. H. dilatata cinerea, linea dorſi duplici tuberculata, margine ſerrato. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 47. *n.* 175.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1079. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 2082. Hirudo depreſſa ovato-oblonga interaneis fuſcis pinnatis pellucentibus.
Hill. anim. p. 16. Hirudo lateribus attenuatis.
Bergm. act. Stockh. 1757. *t.* 6. *f.* 12-14. Hirudo ſexoculata.
Habitat haud frequens in rivis 4 *lineas longa, deſes, helicum incolas aggrediens, faſciis tranſverſis e lineis* 3 *pallidis compoſitis varia, margine albido, ſubtus griſea, capite acuminato albo, oculis ſex, cauda orbiculata cinerea.*

hyalina. 7. H. dilatata pellucida flava: margine integro. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 49. *n.* 176.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1080. *n.* 7. Hirudo (heteroclyta) hyalina poſtice lutea.
Trembl. hiſt. polyp. t. 7. *f.* 7.
Ledermüll. microſcop. p. 165. *t.* 84. *f.* k-q. (Junior.)
Habitat in rivorum plantis aquaticis, *quieta*, 7 *lineas longa, ſaniem ex incolis helicis planorbis emanantem frequenter ingurgitans, planiuſcula, anterius acuminata, poſterius latiuſcula, ſupra ſtriis atomorum longitudinalibus cineraſcentibus, ſubtiliſſimis, confertis, & tranſverſis remotis fuſceſcentibus, remotioribus nigris punctiſque fulvis ſparſis varia, capite albo, oculis* 4-6, *matre ova ſphærica, viridia, annulo pellucido cincta ad* 100, *ex quibus pulli primi partus flavi, ſecundi virides prodeunt geſtante.*

piſcium. 8. H. elongata flavicans: linea dorſali pinnata alba. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 43. *n.* 172.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1080. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 2083. Hirudo (geometra) teres, extremitatibus dilatatis.
Hill. hiſt. anim. p. 17. Hirudo dorſo elevato, cauda latiore.
Friſch. inſ. 6. *p.* 25. *t.* 11. Hirudo ore caudaque ampla.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 199. *t.* 32. Hirudo piſcium.
Bergm. act. Stockh. 1757. *p.* 310. *n.* 3.
Ledermüll. microſcop. t. 84. *f.* a-i.
Geſellſchaftl. Erzaehl. 4. *p.* 303.
Habitat in aquis dulcibus, 8 *lineas longa, piſces infeſtans, antrorſum attenuata, interdum cinerea: ſubtus flava fuſ-*

eo-punctata ſine anteriori albo: margine diſcoque fuſceſcente, poſteriori albido, radiis fuſcis punctoque intermedio nigro, oculis 4.

teſſulata. 11. H. cinerea, margine teſſulato, oculis octo: ſerie duplici longitudinali. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 45. *n.* 173.
Habitat rara in rivis, *pro ætate admodum varia, raro quieta, junior elongata, provectior, dilatata; ad* 18 *lineas longa, atomis undique nigris, ſupra maculis aurantiis vel albis, margine maculis albis, vel partim griſeis partim aurantiis varia ſubtus griſea: maculis* 2 *mediis rotundis albis, femina interdum pullis* 300 *fœta.*

margina- ta. 12. H. dilatata fuſca, margine teſſulato, oculis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 46. *n.* 174.
Habitat rara in rivo, *teſſulatæ affinis,* 10 *lineas longa, capite candido pellucido: faſciis* 2 *tranſverſis fuſcis, anterius obtuſo poſterius coarctato, abdomine ex fuſco brunneo: ſtriis ſubtiliſſimis ſubtus in lineolas duplicatas fuſcas coeuntibus, punctorum alborum in dorſo ſeriebus* 5, *margine laterali albo, lineola duplici fuſca in quadratas areas diviſo, cauda orbiculata pallida: marginis maculis fuſcis.*

groſſa. 13. H. dilatata flavicans anterius fiſſa. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 69. *n.* 27. *t.* 21. *f.* 1. 5. *prodr.* 2668. *rar.* 1. *p.* 43.
Habitat in mari, *venerem exoletam intrans,* 12 *lineas longa, &* 7 *lata, ſtriis ſubtiliſſimis albis exarata, anterius anguſtata, obtuſa, matre ovulis pellucidis ſphæricis in latice gelatinoſo natantibus ad* 1000 *referta.*

hippo- gloſſi. 14. H. dilatata albida medio corporis ocello didymo candido. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 54. *f.* 1-4. *prodr. p.* 2669. *rar.* 2. *p.* 41. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 302. *t.* 1. *f.* 8.
Baſt. opuſc. ſubſec. 2. *p.* 138. *t.* 8. *f.* 11.
Habitat in cute Pleuronectis Hippogloſſi, *cui tuberculis, hamulis, cuſpidibus tenaciſſime adhæret, ovalis, depreſſa, pellucida anterius ſubacuminata, poſterius in orbiculum deſinens, capite ſubtriangulari macula cinerea utrinque notato, oculis non conſpicuis, cauda ſubtus tuberculis ſeriatim a centro excurrentibus hamulis* 2, *ac verſus medium cuſpidibus* 2 *armata.*

muricata. 9. H. teres, corpore verrucoſo. *Fn. ſuec.* 2084. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *t.* 8. *f.* 3.
Rondel. aquat. 2. *p.* 111. Hirudo marina.
Baſt. opuſc. ſubſec. 1. *p.* 82. *t.* 10. *f.* 2. Hirudo piſcium.
Habitat in Oceano atlantico.

II. MOL-

II. MOLLUSCA.

Animalia ſimplicia, nuda (abſque teſta inhabitata) artubus inſtructa.

282. LIMAX. *Corpus* oblongum repens: ſupra clypeo carnoſo: ſubtus diſco longitudinali plano.
Foramen laterale dextrum pro genitalibus & excrementis.
Tentacula 4 linearia ſupra os, oculis in apice majorum.

lævis. 8. L. niger glabriuſculus. *Müller hiſt. verm.* II. *p.* I. *n.* 199.
Habitat haud frequens Octobri *in* muſcis, 5 *lineas longus, nitidus, clypei ſtriis tranſverſis undulatis, atro anguſtior.*

ater. I. L. niger rugoſus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 2. *n.* 200.
α) Limax aterrimus ſubtus pallidus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* I. *Fn. ſuec.* 2088. *Liſt. anim. angl. p.* 131. *t.* 2. *f.* 17. *ſynopſ. f.* 102. *tab. anat.* 5. *f.* I. 23. *exerc. anat. t.* 3. *f.* I–5. Limax ater.
Aldrov. inſ. 702. Limax tota nigra.
Geſn. aquat. p. 254. Cochlea *nuda.*
Argenv. conch. t. 28. *f.* 28.
Sibbald. prodr. hiſt. nat. Scot. 2. *l.* 3. *p.* 34.
Hill. hiſt. anim. p. 87. *t.* 3.
Berl. Magaz. 3. *p.* 341. *t.* 5. *f.* 72.
β) Limax ater, dorſi carina pallide virente.
γ) Limax niger, ore luteſcente ſubtus albus.
Swammerd. bibl. nat. t. 9. *f.* I.
δ) Limax ex fuſco caſtaneus, ore luteſcente ſubtus albus.
Liſter ſynopſ. t. 101. a. *f.* 103. *& app. t.* 2. *f.* I. Limax ſubrufus.
Berl. Magaz. 3. *p.* 339. *t.* 6. *f.* 71.
ε) Limax obſcure fuſcus, ore ſtrigaque utrinque luteſcente.
Habitat α) vulgaris in ſilvaticis, *β) in nemoroſis, γ, δ, ε rariores in* hortis, *a* 16 *lineis ad* 5 *pollices longus, tentaculis ſemper nigris, clypeo punctis confertis ſca-*

briuſculo abdominis dorſo ſulcis rugoſo, corporiſque ora lineolis nigris tranſverſis teſſulata.

albus. 2. L. albus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 4. *n.* 201.

α) Limax totus albus.

β) Limax albus, margine flavo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1081. *n.* 2. *Müll. Obſerv. an Swamp. Hafn.* 1763. *p.* 61.

γ) Limax albus, margine & ſyncipite aurantio.

δ) Limax albus, tentaculis nigris.

Habitat in nemoribus ſi viſque, 3 *lineas ultra* 5 *pollices longus, colore conſtante.*

ſuccineus. 3. L. ſupra ſubrufus, ſubtus albus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 7. *n.* 203.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 3. Limax (rufus) ſubrufus.

Aldrov. inſ. 702. Limax magna colore rufo.

Hill. hiſt. an. p. 87. *t.* 3.

Habitat in umbroſis, ad montium radices, *ſeſquipollicaris, ſine maculis aut cingulo, tentaculis majoribus ſupra nigris.*

cinereus. 4. L. cinereus maculatus & immaculatus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 5. *n.* 202.

Liſter exerc. anat. t. 3. *f.* 6. 7. 9. 10. Limax maximus cinereus ſtriatus.

α) Limax immaculatus, clypeo nigro-cæruleo.

β) Limax clypeo maculis, abdomine faſciis longitudinalibus nigris.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1081. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2090. *It. oel.* 61. Limax (maximus) cinereus maculatus.

Liſter anim. angl. p. 127. *t.* 2. *f.* 15. Limax cinereus maximus ſtriatus & maculatus.

Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 7. Cochlea nuda domeſtica.

Sibb. prodr. hiſt. nat. Scot. 2. 1. 3. *p.* 33.

Schirach. von Erdſchneck. t. 2. *f.* 10.

Berl. Magaz. 3. *p.* 336. *t.* 9. *f.* 69.

γ) Limax clypeo abdomineque maculis nigris.

Liſt. ſynopſ. f. 104. *tab. anat.* 5. *f.* 6-10. Limax variegatus ſive faſciatus cellarius.

Limaces *voraces, hortis, agris, pratis infeſti, a cornicibus, anatibus, aliisque volucribus & mammalibus ſæpius devorati, cineribus, fuligine arcendi pellendi, crebris experimentorum redintegrationem vermium teſtantium vidimus gelatina ſua viſcida glutinant, nutriunt, inclinant, hinc nuperius a medicis commendati, diſcutiente etiam vi celebrati; an diſtincti a reliquis faſciatus & luteus a* Com. Raſumowsky *hiſtor. natur. Jorat.* 1. *p.* 267, & 269. *memorati?*

Argenv. conchyl. t. 28. *f.* 31. Limax cellaria.

δ) Limax abdomine ſtriis quinque albidis : infima abrupta.

ε) Limax abdomine rugis albis cinereiſque ac maculis nigris ordine duplici.

ζ) Limax margine albo.

Habitat α) vulgaris β) rarior in nemoroſis, *reliquæ rariores γ) in* hortis, *ε) in* ſilvis, *δ) & ζ) in* umbroſis, *ultra 5 pollices longus, ζ) minor.*

hyalinus. 5. L. hyalinus, tentaculis obſoletis : lineola fuſca a tentaculis ad clypeum.

Habitat in muſcis, *phaſeoli cotyledonibus infeſtus, cineribus clavellatis pellendus, rugis ventris creberrimis interruptis.* Scopoli.

agreſtis. 6. L. albidus, tentaculis nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 8. *n.* 204.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1082. *n.* 6. Limax cinereus immaculatus.

Liſt. anim. angl. p. 130. *t.* 2. *f.* 16. Limax cinereus parvus immaculatus pratenſis.

Liſt. ſynopſ. f. 101. *tab. anat.* 5. *f.* 11. *exerc. anat. t.* 3. *f.* 11. Limax parvus cinereus.

Argenv. conchyl. t. 28. *f.* 27.

Berl. Magaz. 36. *p.* 345. *t.* 8. *f.* 74.

Schirach von Erdſchn. t. 1.

Blanka inſ. 151. *t.* 13. *f.* X.

α) Limax totus albidus immaculatus.

β) Limax albidus clipeo flaveſcente.

γ) Limax albidus, capite nigro.

δ) Limax albidus, dorſo cinereo.

ε) Limax albidus, atomis nigris ſparſis.

Habitat in hortis, pratis, agris nemoribuſ*que a* Maïo *ad* Decembrem *uſque*, 2-9 *lineas longus, auctumno ſecale recens ſatum depaſcens, in hortis ſæpius nocte helianthum annuum adſcendens, ejuſque folia conſumens, tactus digito quaſi mortuus viſcoſitate ſua adhærens, occidente ſole reviviſcens, victumque quærendo vagans, ſi digito rurſus tangatur, tentacula quidem condens, mox vero exſertis pergens, clypei & abdominis linea longitudinali nulla, tentaculis minoribus minimis, medicato uſu celebris.*

cinctus. 9. L. flaveſcens, clypeo abdomineque cingulo cinereo. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 9. *n.* 205.

Habitat haud frequens in nemoroſis, *immaculatus, ſubtus albus, 2 pollices longus.*

margi-natus. 10. L. cinereus, clypeo utrinque ſtriga obſcura, abdomine pallide cæruleſcente. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 206.

Habitat in fago, *primo vere & Novembri vulgaris, colore cum ætate non mutato, dorſi carina alba, utrinque ex cinereo ſubcæruleſcente, abdomine interdum nigro-maculato.*

reticu-lata. 11. L. fuſcus, clypeo punctis, abdomine lineolis nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 207.

Schaeff. Verſ. mit Schneck. 1. *t.* 1. & *t.* 2. *f.* 1-3.

Habitat vulgaris in Daniæ & Germaniæ hortis, *ſeſquipollicaris.*

flavus. 7. L. flavus maculatus. *Fn. ſuec.* 2092.

Liſt. exerc. anat. 1. *t.* 1. Limax ſuccini colore, albidis maculis inſignitus.

Habitat inter herbas; *an propria ſpecies?*

aureus. 12. L. flavus immaculatus. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 10. *n.* 208.

Habitat in Daniæ & Norwegiæ umbroſis, *ſeſquipollicaris, ſubtus albus, linea inter tentacula intermedia tentaculiſque ipſis nigris.*

fuſcus. 13. L. rufeſcens, linea laterali dorſoque nigricante. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 11. *n.* 209.

Habitat in nemoroſis, *ſubtus albus, abdominis macula longitudinali fuſca, 8 lineas longus.*

tenellus. 14. L. vireſcens, capite tentaculiſque nigris. *Müll. hiſt. verm.* II. *p.* 11. *n.* 210.

Habitat primo vere in nemorum foſſulis *foliis aridis repletis, 10 lineas longus, clypeo albido in luteum vergente.*

lanceo-laris. 15. L. lineari lanceolatus utrinque acutiſſimus, margine undique limbo membranaceo aucto, tentaculis nullis. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 19. *t.* 1. *f.* 11.

Habitat in mari Cornubiam *alluente, margine ſubtus bilabiato & ſulcato, laterum ſtriis obſoletis antrorſum obliquatis, prope dorſum angulo recurvatis: vix hujus generis, ſed cujus?*

283. APLYSIA. *Corpus* repens, obvelatum membranis reflexis: *Clypeo* dorſali membranaceo pulmones obtegente.

Foramen laterale dextrum pro genitalibus.

Anus ſupra extremitatem dorſi.

Tentacula quatuor anterius ſita.

depilans. 1. Apl. tentaculorum membranarumque margine cum diſco concolore.
Syſt. nat. X. *p.* 653. Tethys limacina.
Rondel. piſc. 1. *p.* 520. Lepus marinus.
Geſn. aquat. 475. Lepus marinus Rondeletii.
Bohadſch. marin. 3. *t.* 1. 2. 3. Lernea (graphice.)
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 8. 9.
Habitat in mari mediterraneo, *ſanie depilans tactu* (*B.* 51.) *fœtidiſſima ad nauſeam uſque.*

faſciata. 2. Apl. nigra unicolor, membranis tentaculiſque margine coccineis. *Poiret, voy. en* Barbarie. 2. *p.* 2.
Habitat ad Barbariæ *littora, ſub rupibus degens contacta laticem nigrum rubrumque, nequaquam tamen fœtidum aut depilantem eructans.*

284. DORIS. *Corpus* repens, oblongum, ſubtus planum.

Os anterius ſubtus.

Anus poſterius in dorſo, ſupra cinctus ciliis.

Tentacula duo ad quatuor, ſupra corpus antrorſum intra foramina retractilia.

* *corpore retrorſum acuminato, ſupra convexo nudo,* Limaciæ Mülleri.

verrucoſa. 1. D. corpore ſupra undique tuberculato.
Rumpf. muſ. 38. Limax marina verrucoſa.

Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 5. Mitella verrucoſa.
Habitat in oceano indico, *ſemicylindrica, fine anteriori rotundato, tentaculis breviſſimis, margine laterali deflexo, pede ovali, oblongo, margine plano.*

clavigera. 5. D. ovalis candida, pedicellis dorſi clavatis croceis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2770. *zool. dan.* 1. *p.* 58. *n.* 22. *t.* 17. *f.* 1-3. *Act. Nat. Curioſ.* 6. *p.* 118.
Bommé, act. Vliſſ. 3. *p.* 296. *n.* 4. *f.* 3? geknootide Zee-Slakje met *vic.* Hoornen.
Habitat in fucis maris Norwegici, *gelatinoſa, ſubpellucida, cauda acuta: macula flava; capitis verruca laterali flava, truncata, tentaculis* 2 *croceis.*

quadrilineata. 6. D. alba, lineis quatuor nigris, auriculis ſulphureis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 59. *n.* 23. *t.* 17. *f.* 4-6. *prodr.* 2771. *Act. nat. Cur.* 6. *p.* 50.
Habitat in ſinuum maris Norwegici *fucis, congeneribus agilior, ſulphureis maculis varia, tentaculis* 2 *albis, brevibus diſtantibus.*

faſciculata. 7. D. linearis ex cinereo ferruginea, papillis dorſi acutiuſculis ſubferrugineis.
Forsk. Fn. arab. p. 99. *n.* 3. *anim. t.* 26. *f.* 5. Limax marinus.
Habitat in mari mediterraneo, *fruſtulis ligneis natantibus adhærens, pollicem longus, ſubtus pallidus, tentaculis* 4 *pallidis, pellucidis.*

papilloſa. 8. D. ſupra papillis tecta: linea dorſali lævi.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1082. *n.* 8. *Fn. ſuec.* 2093.* Limax papilloſus.
Baſter op. ſupſ. 1. *p.* 81. *t.* 10. *f.* 1. Doris ſpinis mollibus hirſuta.
Forsk. anim. mar. t. 26. *f.* H? Limax marinus.
Act. havnienſ. 10. *f.* 11-16. Doris bodoenſis.
Act. Vliſſing. 3. *p.* 318. *f.* 2.
Habitat in Oceano europæo.

auriculata. 9. D. alba, faſciculis dorſalibus rubris apice albis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2778.
Act. havn. 10. *p.* 16. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in mari Norwegico.

Dorides, *in mari habitantes ſtructuræ quoque majori elegantia a limacibus in terra degentibus diſtant, plures jam, ſed imperfectius juſto ab* Aldrovando *deſcriptæ, prima ab* Æliano.

lacinulata. 10. D. albida, papillis dorſi obovatis utrinque ſex. *Forsk. Fn. arab. p. 99. n. 4. anim. t. 26. f. 4.* Limax tergipes.
Habitat in fundo maris ad fretum Oereſund *inter* fucos, *magnitudine pediculi majoris, forma variabili, plurium vermium more ſupinus reptans.*

minima. 11. D. pallide cinerea, papillarum dorſalium ſeriebus quatuor. *Forsk. Fn. arab. p. 100. n. 5.*
Habitat in mari mediterraneo, *fucis natantibus incumbens, ſeminis oryzæ magnitudine, ſubtus pallidior, oblongo-arctata, tentaculis 4, juxta caput albis, papillis plurimis ex ovato oblongis, obtuſis, cineraſcentibus.*

cervina. 12. D. ex rubeſcente cinerea, papillis dorſi octonis ramoſis. *Bommé, act. Vliſſ. 3. p. 290. n. 2. f. 1.* Haairs hoorn gelyk getakte Zee-ſlakje.
Habitat in ſertularia abietina, ⅓ *pollicis longa, capite etiam caudaque papillis ramoſis ornata, clavigeræ affinis.*

radiata. 13. D. ex argenteo cærulea, ſubtus alba, papillis lateralibus quaternis radiato-dentatis. *du Pont act. angl. 53. p. 57. 58. t. 3.*
Habitat in Oceano, *ultra pollicem longa, faſciculatæ affinis, tentaculis 4, linea dorſi media argentea, lateribus 2 apice profunde cæruleis.*

coronata. 14. D. lactea, ſubtus hyalina, papillis dorſi rubro punctatis pyramidalibus utrinque ſex apice rubris.
Bommé, act. Vliſſ. 1. p. 394. t. 3. f. 1-3. & 3. p. 288. Geknifde of gekroonde Zee-ſlakje.
Habitat ad littus inſulæ Walcheren Seelandiæ, $\frac{3}{8}$-$\frac{5}{8}$ *pollicis longa.*

pennata. 15. D. dorſo papillis retrorſum incumbentibus ſubcylindricis tecto.
Bommé, act. Vliſſ. 3. p. 292. t. 3. f. 2. Gevederde of zacht gedoornte Zeeſlakje.
Habitat ad Seelandiæ *littus in zoophytis, quorum quoque colorem nunc ex cinereo album, nunc rubeſcentem refert,* $\frac{3}{8}$-$\frac{3}{4}$ *pollicis longa, fertiliſſima, tentaculis 4.*

peregrina. 16. D. tentaculis quatuor non retractilibus, corpore lacteo, cirrorum ex fuſco cæruleorum in dorſo ſeriebus decem. *Cavolin. polip. mar. 3. p. 190. t. 7. f. 3.*
Habitat in mari mediterraneo, *ad* promontorium Miſcenenſe.

affinis. 17. D. purpurea, dorſo cirrorum ſeriebus ſeptem, tentaculis quatuor non retractilibus annulatis apice albis. *Cavol. polip. mar. 3. p. 193. t. 7. f. 4.*
Habitat in mari mediterraneo, *circa promontorium* Miſenenſe.

tetraquetra. 18. D. quadrangularis coriacea, poſterius acuminata ſupra plana: angulis carunculato-hiulcis. *Pallas nov. act. Petrop. 2. p. 237. t. 5. f. 22.*
Habitat in mari Kurilas *inſulas alluente, à quarum incolis conda coctaque comeditur, media inter utrumque tribum.*

** *corpore utrinque obtuſo, plano, tecto.*

fuſca. 2. D. ovalis, lamella ſcabra punctata. *Müll. zool. dan. 2. p. 22. t. 47. f. 6-8. prodr. 2768. rar. 2. p. 22.*
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1083. *n.* 2. Doris (bilamellata) corpore ſupra lamella plana ſcabra.
Fn. ſuec. 2094. Limax bilamellatus.
Habitat in mari norwegico, *limacis more incedens, glaber, ſupra pallide fuſcus cinereo punctatus, ſubtus albus, lamella tegente ſupra ſulphureo punctata, ſubtus alba, glabra, tentaculis 2 fuſcis, ano tranſverſo plumis 6 ſulphureis cincto.*

obvelata. 19. D. alba corpore elongato: lamella repanda ſupra punctata. *Müll. zool. dan. 2. t. 47. f. 1. 2. prodr. 2758. rar. 2. p. 19.*
Planc. conch. min. not. p. 105. t. 5. f. G. H. Concha ſine teſta.
Habitat in fundo ſinus Droebacenſis Norwegiæ, *limacis inſtar incedens, ſubpellucida, ſubtus glabra, lamina ſupra punctis convexis aſpera, tentaculis 2 ſimplicibus.*

muricata. 20. D. ovalis ſupra undique verrucis luteis. *Müll. zool. dan. 3. p. 7. t. 85. f. 2-4. prodr. 2773.*
Habitat in mari norwegico.

piloſa. 21. D. corpore ovato luteo pilis mollibus albis tecto, tentaculis occultis. *Müll. zool. dan. 3. p. 7. t. 85. f. 5-8.*

lævis. 22. D. ovalis alba, corpore ſupra planiuſculo lævi. *Müll. zool. dan. 2. t. 47. f. 3-5. prodr. 2774. rar. 2. p. 21.*
Habitat in mari norwegico atlantico, *carnoſa, glabra, ano plumis 8 cincto.* Koenig.

arboreſ-ceus. 23. D. tentaculis ramoſis, dorſo gibbo fruticante. *Müll. zool. dan. prodr.* 2776. *Act. havn.* 10. *p.* 14. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in mari norwegico.

frondoſa. 24. D. corpore utrinque cirrhis plurimis ramoſis.
Aſcan. act. Dronth. 5. *p.* 155. *t.* 5. *f.* 2. Amphitrite frondoſa.
Habitat in mari norwegico, *tentaculis* 2.

Argo. 4. D. ovalis, corpore lævi, tentaculis duobus ad os, ano ciliato phrygio.
Bohadſch. mar. 65. *t.* 5. *f.* 4. 5. Argo.
Columu. ecphr. t. 32. Lepus marinus alter major.
Dicquemere, journ. de phyſ. 1779. *jul. p.* 56. *t.* 2. *f.* 10. Limace à plante.
Habitat in mari mediterraneo, *coccinea, ano cincto ramis, quaſi opere phrygio laceris.*

ſtellata. 25. D. ovalis, ſtella ad anum octoradiata: radiis ramoſis.
Bommé, act. Vliſſing. 3. *p.* 298. *n.* 5. *f.* 4. Eegeltje met eene ſter op de ſtuit.
Habitat ad littora Seelandiæ *in alcyoniis, ex albo cinerea, ſubtus plana, ſupra tuberculis obtuſis aſpera, tentaculis* 2.

285. APHRODITA.

Corpus repens oblongum, ſquamis tectum: pedibus utrinque ſetoſis.
Os terminale, cylindricum.
Tentacula duo ſetacea annulata.
Oculi quatuor.

aculeata. 1. Aphr. ovalis hirſuta aculeata. *Fn. ſuec.* 2099. *Gunner. act. Nidroſ.* 3. *p.* 59. *Pall. miſc. zool. p.* 77. *t.* 7. *f.* 1-13. *Baſter opuſc. ſubſ.* 2. *p.* 62. *t.* 6. *f.* 12.
Muſ. Ad. Frid. 1. *p.* 93. Aphrodita nitens.
Jacob apud Barthol. act. Hafn. 3. *p.* 88. *t.* 88. Vermis aureus.
Barrel. ic. plant. rar. p. 131. *t.* 1284. Eruca marina.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 8. Phyſalus.
Red. opuſc. 3. *p.* 276. *t.* 25. Hyſtrix marina.
Molyn. act. angl. vol. 19. *n.* 225. *p.* 405.

Ruyſch theatr. an. 1. *p.* 23. *n.* 49.
Dale h ſt. of Harwich and Doverc. p. 394.
Seb. muſ. 1. *t.* 53. *f.* 3. & *t.* 90. *f.* 1. 2. & 3. *t.* 3. *f.* 7. 8.
Column. ecphr. 25. *t.* 26.
Habitat in Oceano europæo, 4–7 *pollices longa, teſtaceis victitans, craſſa utrinque* 40-41 *pedunculis ornata, & ſupra pedunculos faſciculo villorum aureo, cupreo & viridi-cæruleo colore ſplendentium.*

ſcabra. 2. Aphr. oblonga, dorſo ſquamato ſcabro.
Habitat in mari belgico. *oniſco paulo longior ſquamis* 20 *alternis, ſcabris obtecta, pedibus utrinque circiter* 20; *an vere diſtincta ſpecies?*

ſquamata. 3. Aphr. oblonga ſquamis aſperis unicoloribus nigro punctatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1084. *n.* 3. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXIV.
Müll. von Würmern, &c. p. 170. *t.* 13. *zool. dan.* 3. *p.* 25. *t.* 96. *f.* 1–4. *prodr. n.* 2642. Gedüpfelte Aphrodite.
Pallas miſc. zool. p. 91. *t.* 7. *f.* 14. a-d.
Baſt. op. ſubſ. 2. *l.* 3. *t.* 6. *f.* 5.
Habitat in Oceano europæo, mari glaciali *& ad* promontorium Bonæ Spei, *inter fucos & ſentularias libera vagans, & per maris fundum circumrepens,* 11 *lineas ad pollicem uſque longa, ventre medioque dorſo lævi & nudo, reliquo dorſo ſquamis piſcinarum æmulis rigidis ſemipellucidis ochroleucis tecto.*

imbricata. 4. Aphr. oblonga, ſquamis glabris variegatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1084. *n.* 4. Aphrodita oblonga, dorſo ſquamato: ſquamis XXXVI.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an propria ſpecies diverſa à ſequenti?* Koenig.

plana. 5. Aphr. oblonga, ſquamis lævibus bicoloribus. *Müll. von Würmern. p.* 180. *t.* 14. *f.* 1–5.
Müll. prodr. zool. dan. 2644. Aphrodita (cirrata) poſtice acuminata, pedibus cirratis.
Habitat in mari boreali, *præſertim* Iſlandiam *alluente,* 8–20 *lineas longa, utrinque plana, caudam verſus anguſtata, ſegmentis* 36, *totidem utrinque pedibus, toti-*

Aphroditæ per mare vagantur, ſexu diſtincto; ſiccæ facile cum crepitu in fruſta diſſiliunt.

demque caudam verſus decreſcentibus in 2 ſeries digeſtis ſquamis dorſum contegentibus inſtructa, proboſcide magna craſſa.

lepidota. 6. Aphr. oblonga, faſcia dorſi longitudinali ſanguinea. *Pall. miſc. zool. p.* 94. *t.* 7. *f.* 15. a. b. *t.* 8. *f.* 1. 2. *Baſt. opuſc. ſubſ.* 1. *l.* 1. *t.* 4. *f.* 3. A-C.
Habitat ſatis copioſa in mari *inter* Angliam & Belgium *intermedio, pedunculis* 16, *ſquamis ſubtiliſſime punctatis imbricatis* 14 *parium, an ſatis diſtincta a plana?*

cirrhoſa. 7. Aphr. lienari-attenuata, pedunculis compreſſis apice bipartitis, ſquamis veſicuioſis. *Pall. miſc. zool. p.* 95. *t.* 8. *f.* 3-6.
Habitat in mari ſeptentrionali, *tenerrima, ſquamis ſubrotundis* 11 *parium, pedunculis utrinque* 35 *productioribus; an ſatis diſtincta ſpecies?*

violacea. 8. Aphr. oblonga violacea, ſquamis dorſalibus utrinque quindecim. *Müll. prodr. zool. dan.* 2645. *Act. Nidroſ.* 4. 93.
Habitat . . .

longa. 9. Aphr. ſquamis concoloribus, medio dorſi nudo, pedibus papilla ſimplici ſetigera, cirris lateralibus nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2646.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente, inter ſquamatam & lepidotam media.*

SPIO.

Corpus protenſum in tubulo, articulatum: filis dorſalibus.
Pedunculi ſetis hiſpidi dorſum verſus poſiti.
Tentacula 2 longa ſimplicia.
Oculi 2 oblongi.

ſeticornis. 1. Sp. tentaculis tenuibus ſtriatis. *O. Fabric. Schr. der berl. naturf. Geſ.* 6. *p.* 259. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1-7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1085. *n.* 4. Nereis (ſeticornis) tentaculis capitis binis longitudine fere corporis.
O. Fabric. Fn. groenl. ſp. 283. Nereis ſeticornis.
Baſter op. ſubſ. 2. *p.* 134. *t.* 12. *f.* 2.
Habitat gregaria in Oceano, *potiſſimum ſinus* Groenlandiæ *fundo argillaceo, rarius arenoſo, ad* 3 *pollices longa, tubulo e particulis terreis formato tenui erecto triplo longiore, e quibus animalcula piſcatura exſerit tentacula ca-*

pillaria, alba, ceterum ex albido viridis: linea dorſi media ſanguinea, poſterius thalaſſina, anterius ex nigro cinerea: ſtriis tranſverſis albis, capite pallido.

filicornis. 2. Sp. tentaculis craſſis annulatis. *O. Fabr. Schr. der berl. naturf. Geſ. 6. p. 264. n. 2. t. 5. f. 8-12.*
Habitat gregaria in ſinu Groenlandiæ, *oblonga, pollicem longa, flavicans aut rubicunda, linea media & utroque fine cinereis, tubulo fragili, erecto, vireſcente, quem non niſi invita relinquit, tentaculis exſertis & circumvolutis planarias piſcans.*

AMPHITRITE. *Corpus* protenſum in tubulo, annulatum.
Pedunculi verrucoſi.
Tentacula acuminata approximata, plumoſa.
Oculi nulli.

reniformis. 1. A. corpore rotundato, palpis ſimplicibus. *Müll. von Würm. p.* 194. *t.* 16. *f.* 1-3.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 13. *t.* 89. *f.* 1. 2. *prodr.* 3063. Tubularius unicillus.
Habitat gregaria in fundo maris Islandiam *alluentis, pulcherrima, rubra,* 3 *pollices longa, capite arcubus duobus ſemicircularibus munito, plumis* 14 *colore rubro alboque alternante amæniſſimis ornatis, corporis annulis* 80-90, *utrinque tuberculis minimis appoſitis, cauda acuta non articulata, tubulo, quem vix relinquit rubro, tenaci, coriaceo, ſimplici,* 4 *pollices longo; an ad tubulariam referenda?*

Penicillus. 2. A. ſcuto aculeato, proboſcide clavata. *Müll. von. Würm. p.* 8. *n.* 3.
Columm. aquat. & terr. c. 11. *p.* 22. Προβοσκιπλεκτανος.
Habitat in ſyrtibus maris Neapolin *alluentis ultra* 2 *pollices longa linea media nigra, per totam corporis longitudinem excurrente, faſciculo plumarum numeroſiſſimarum tentacula exornante rubro flavo maculato, proboſcide huic æquali; pedunculo albo tubuloſo, clava rubra ſtriata, tubulo albo, lævi firmo, interdum inflexo:*

Ventilabrum. 3. A corpore verrucoſo, proboſcide nulla. *Müll. von Würmern. p. 8. n. 4.*

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1269. *n.* 814. Sabella (Penicillus) teſta membranacea erecta radicata.

Ellis corall. 92. *t.* 34. Corallina tubularia melitenſis.

O. Fabr. Fn. groenl. p. 438. *n.* 449. Tubularia Penicillus.

β) *Baſter opuſc. ſubſec.* 2. *p.* 178. *t.* 9. *f.* 1.

Habitat in mari mediterraneo, *faſciculo plumarum tentacula exornante in 2 brachia diviſo.*

auricoma. 4. A. cirris binis utrinque, anterius flabellis duobus aureis rigidis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 87. *t.* 26. *f.* 1-6. *prodr.* 2622. *rar.* 1. *p.* 54. *O. Fabr. Fn. groenl.* 272.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1268. *n.* 809. Sabella (granulata) teſta ſolitaria libera ſimplici curvata granis arenaceis fuſcis.

Pall. miſcell. zool. p. 117. *t.* 9. *f.* 1-13. Nereis cylindraria.

Martin. Conchyl. p. 18. & *p.* 69-72. *t.* 4. *f.* 26. 27. Tubulus vermicularis.

Klein tubul. mar. p. 21. *t.* 1. *f.* 5. & *echinod. p.* 62. *t.* 33. *f.* A. B. Solen fragilis.

Brit. zool. 4. *p.* 130. *t.* 92. *f.* 163. Sabella tubiformis.

Dicquemar. journ. de phyſiq. 1779. *Jul. p.* 54. *t.* 2. *f.* 1-12. Ver à fourreau conique.

Martin. Conchyl. 1. *t.* 4. *f.* 26.

Habitat in mari ſeptentrionali, glaciali atlantico, indico, *tubulo fuſco, diaphano, fragili: altero fine cuneato anguſto, intus lævigato, capite ramoſo albo: anterius uncis 16 albis armato, trunco inverſe conico, chalybeo, læviſſimo, ad marginem utrinque faſciculis ſetarum ternarum quaternarumve aurearum 14, cauda ex lamellis tribus ovalibus minutis duris conſlata.*

criſtata. 5. A. corniculis ramoſis binis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 70, *f.* 1-4. *prodr.* 2620. *rar.* 2. *p.* 87.

Habitat in oſtreis vetuſtis ſinuum maris norwegici, *elongata, teres, flexuoſa, ex rubro flava, poſterius acuminata, ſegmentis 17, anterioribus utrinque verruca ſetaque inſtructis, capitis cirris pluribus, corpore ſextuplo brevioribus, tubulo fragili flexuoſo, e limo teſtarumque rejectamentis compoſito.*

chryſocephala. 6. A capitis diſcreti vertica paleolis aureis conſertis bifariam coronato.

Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 235. *t.* 5. *f.* 20.* Neris chryſocephala.

Habitat in indici maris *fundo*, *ſabellæ alveolatæ affinis*, *mollis attenuata*, *ſupra planiuſcula*, 4 *circiter pollices longa*, *pedunculis criſtam æmulantibus*, *penicilligeris*, *cirrigeris*, *mucrone carneo* & 2-4 *tum retrorſum brachiolo terminatis*, *tentaculis numeroſis*.

plumoſa. 7. A tentaculis binis articulatis ſub faſciculis ſetarum porrectarum, corpore tereti caput verſus incraſſato clavato hiſpidulo. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 16. *t.* 90. *f.* 1. 2. *prodr. n.* 2621.
Habitat in maris Norwegici *argilla inter mytilos edules*.

291. TERELLA. *Corpus* oblongum repens nudum, branchiis ad latera inſtructum, ſæpius in tubulo.

Os anterius labiatum edentulum, proboſcidem clavatam exſerens.

Tentacula circum os capillaria plura, ciliata.

cirrata. 1. T. corpore tereti, penicillis corporis lateralibus triplicibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1085. *n.* 3. Nereis (cirroſa) tentaculis oris longiſſimis, capite utrinque cirris X.
Müller von Würmern p. 188. *t.* 15. *f.* 1. 2. *prodr. zool. dan.* 2617. Amphitrite cirrata.
Dicquemare Journ. de phyſ. 1777. *Mars. p.* 215. *t.* 1. *f.* 10. 11. Ver-meduſa.
Habitat in maris Iſlandiam alluentis *fundo arenoſo*, *a* Koenigio *detecta*, & Spio *cirrata nuncupata*, *rubra*, 3-4 *pollices longa*, *ſenſim retrorſum attenuata*, *annulis conflata* 60-70 *retrorſum decreſcentibus*, *labio ſuperiori cirris protenſis*, *dorſi ſuperioris lateribus breviorum ſerie ornatis*, *tubulo craſſo*, *fragili*, *incolæ longitudine*, *læſa rubrum ſuccum fundens*, *quo aquam tingit* & *opacat*.

lapidaria. 2. T. cirris ad anteriora corporis octo, circa os quatuor. *Syſt. nat.* XII. *p.* 1092. *n.* 1. Terebella.
Kaehl. act. Stockh. p. 1754. *p.* 144. *t.* 3. *f.* A-E.

Habitat in mari mediterraneo, *intra rupium foramina, quæ jam excavata deprehendit.*

conchilega. 3. T. albida, cirris oris numeroſis filiformibus: ſuperioribus longiſſimis, branchiis ruberrimis.

Pall. miſc. zool. p. 131 *t.* 8. *f.* 17-22. Nereis conchilega.

Habitat in mari Belgium *alluente copioſa, ad quinque pollices longa, lumbrici æmula, tænia ſubtus rubra, capite ſubtus ſquamis 4 munito, tubulos e teſtaceorum fragmentis calami anſerini craſſitie & ad ½ pedem longos ſtruens.*

complanata. 4. T. depreſſa, cirris oris quatuor, corporis verrucis lateralibus penicilligeris duplici utrinque ſerie digeſtis.

Pall. miſc. zool. p. 109. *t.* 8. *f.* 19-26. Aphrodita complanata.

Brown jam. p. 395. *t.* 39. *f.* 1. Nereis tentaculis capitis binis tripartitis, corporis pluribus peniciliiformibus duplici ſerie ad latera poſitis.

Habitat in mari inſulis cambæis *circumfuſo, corporis ſegmentis* 130 *minutis, dorſi criſtula carnoſa, obtuſa, longitudinaliter adnata.*

carunculata. 5. T. depreſſo-quadrangula, penicillorum corporis ſerie quadruplici ventralium cirris nullis.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 10. Nereis (gigantea) tentaculorum faſciculis triplici ordine.

Pall. miſc. zool. p. 102. *t.* 8. *f.* 12. 13. Aphrodita carunculata.

Seba muſ. 2. *p.* 31. *t.* 81. *f.* 7. Millepeda marina amboinenſis.

Habitat in mari americano & indico, *tenera*, 1-14 *pollices longa, penicillis lateralibus flaveſcentibus papillæ transverſæ inſidentibus, ventralium cirris nullis, pone cirros dorſi caruncula ovali depreſſa, branchiis ramoſiſſimis, ſegmentis corporis ultra* 90.

roſtrata. 6. T. tetraëdra, penicillorum corporis ſerie quadruplici, palato quaſi elongato.

Pall. miſc. zool. p. 106. *t.* 8. *f.* 14-18. Aphrodita roſtrata.

Habitat in mari indico, *carunculatæ affinis, at cute rudiori, penicillis magis prominentibus, omnibus cirro inſtructis, branchiis inſignibus diſtincta,* 8 *pollices ad pedem longa, penicillorum ſetis rigidis, ventralium ex fuſco aureolis, dorſalium ex ferrugineo fuſceſcentibus.*

ſlava. 7. T. depreſſa, branchiis utrinque 37, cauda bifurca.
Pall. miſc. zool. p. 97. *t.* 8. *f.* 7-11. Aphrodita flava.
Habitat in mari indico, 2 ½-4½ *pollices longa, ſegmentis corporis* 33-40, *penicillorum cirratorum pilis tenuiſſimis ſlavicantibus, dorſi criſtula ex triquetro compreſſa, cirris duobus anterius ornata.*

rubra. 8. T. rubra, depreſſa, cauda cirris duobus terminata, capite maxillis duabus corneis mobilibus.
Bommé, act. Vliſſing. 6. *p.* 379. *f.* 4. A. B. Rood-glinſterende Nereide of Zee-duczend-been.
Habitat in mari, Seelaudiæ *inſulis circumfuſo, branchiis oculorumque defectu ad hoc genus accedens,* 3 *circiter pollices longa, ſtria dorſali nigra, capite albo cylindrico, quaſſata ſaniem mucoſam albidam fundens, nitens, corporis ſegmentis* 144.

aphrodi-tois. 9. T. teres retrorſum lente attenuata, ſubtus depreſſiuſcula ſulco obſoleto exarata: branchiis in ſegmentis octo prioribus nullis, in ſequentibus tribus ſimplicibus, in poſtremis ſenſim majoribus uno verſu pinnatis.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 229. *t.* 5. *f.* 1-7. Nereis aphroditois.
Habitat in Oceano indico, *ſeſquipedalis ſegmentis* 148 & *ultra, pedunculis carnoſis cirro inſtructis, papilla penicilligera, capite bicirrato.*

bicornis. 10. T. proboſcidis diſco ſimplici terminali bicorni. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 17.
Habitat in Oceano americano.

ſtellata. 11. T. proboſcidis diſco triplici perfoliato, anteriore armato cornu truncato aculeis radiato. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 138. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Oceano americano.

An hujus generis vermis a M. Slabbero, *act. Vliſſingenſ.* 1. *p.* 387. *ſqq. deſcriptus, & t.* 2. *delineatus indicus?*

286. NEREIS. *Corpus* repens longum.
Pedunculi laterales penicillati.
Tentacula ſimplicia, rarius o.
Oculi quatuor aut duo, rarius o.

* *ore unguiculato* ſ. forcipato.

versicolor. 2. N. ſubdepreſſa, pedunculis acuminatis ſetiferis. *Müll. von Würm. p.* 104. *t.* 6. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2624.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1064. *n.* 11. *It. wgoth.* 191. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 160. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 534. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 31. Scolopendra (marina) pedibus utrinque, corpore pallido, linea dorſali rubra.
Habitat in mari ſeptentrionali, *male pro cauſſa mali haleces infeſtantis habita, corporis articulis* 85, *poſterioribus ſenſim minoribus, ochroleuca, ſtria media obſcure rubra, cauda ſegmentiſque corporis anterioribus ſordide viridibus, medium verſus iridis coloribus ludentibus, tentaculis ſuperioribus brevibus ſubulatis* 3, *inferioribus pellucidis conicis* 2, *lateralibus corneis* 4, *ſanguine rubro.*

noctiluca. 1. N. corpore vix conſpicuo. *Fn. ſuec.* 2098. *Müll. zool. dan. prodr.* 2623. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 291. *n.* 273.
Amœn. acad. 3. *p.* 203. *t.* 3. Noctiluca marina.
Griſl. venet. quart. Scolopendra marina lucida.
Vianell. monogr. Luciolella aquæ marinæ.
Habitat in omni facile mari, *minutiſſima, agiliſſima, fulgore e cæruleo viridi micans, & aquas perfundens.*

fimbriata. 3. N. ſubdepreſſa, pedunculis cirratis lentigeris. *Müller von Würm. p.* 144. *t.* 8. *f.* 1-3. *prodr. zool. dan.* 2627.
Habitat in mari Balthico, *linearis*, 3 *pollices longa, fulva, dorſo medio ventriſque linea longitudinali media cæruleis, tentaculis capitis* 8, *cauda* 2 *filis terminata.*

armillaris. 4. N. ſubdepreſſa, pedunculis conicis: cirris lenticularibus. *Müll. von Würm. p.* 150. *t.* 9. *f.* 1-5. *zool. dan. prodr.* 2626. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 294. *n.* 276.
Habitat in mari ſeptentrionali, *in ſabulo littorum profunde ſe condens, agiliſſima, filiformis,* 15 *lineas longa, tentaculis ad utrumque capitis latus* 3 *moniliformibus, corporis articulis* 120, *ſingulis utrinque pedunculo munitis, cauda filis* 2 *longis terminata.*

mollis. 5. N. faſciculis pilorum lateralibus ſupra pedunculos. *Fn. ſuec.* 2097.
Habitat in mari norwegico ; *an hujus generis et tribus?*

Pelagica. 6. N. ſupra convexa, pedunculis cirratis verrucoſis. *Müller von Würm. p.* 140. *t.* 7. *f.* 1-3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 2096. Nereis ſegmentis XL, ſubtus ſulcata.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 292. *n.* 275.
Müll. prodr. zool. dan. 2628. Nereis verrucoſa.
Act. Havn. 10. *p.* 169. *t. e. f.* 10. Nereis ferruginea.
Baſter ob. ſubſ. 2. *p.* 133. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Oceani europæi *fundo, inter radices ulvarum, ſub lapidibus et intra teſtas vacuas, motu flexuoſo ingrediens, et urceolis frontis fundum perfodiens, ſpadicea, tentaculis, cirris frontalibus, caudalibus lateralibuſque et pedunculis albidis, maxillis ex fuſco nigricantibus, linea dorſi coccinea ; ad 7 pollices longa, macula capitis inter oculos trigona alba, 2 aliis ad latera, ſetis ferrugineis, cauda binis cirris terminata.*

tubicola. 10. N. ſubdepreſſa, pedunculis ſubcirratis globoſis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 60. *t.* 18. *f.* 1-6. *rar.* 1. *p.* 38. *prodr.* 2625.
Habitat in mari ſeptentrionali, *linearis, tentaculis capitis 5 rectis, tubulum tenacem ex proprio ſucco indurato ſtruens.*

norwegica. 11. N. convexa, pedunculis cirratis pennigeris.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 1086. *n.* 11. Nereis glabra, ſegmentis CXX. annularibus, ore dentato dupliciter forcipato.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 99. *t.* 29. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 60. *prodr.* 2630. Nereis pennata.
Gunner act. Nidroſ. 4. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 7-12. Nereis madreporæ pertuſæ glabris ſegmentis CXX. annularibus, ore dentato et dupliciter forcipato.
Muſ. Kirch. cl. 13. *p.* 412. *f.* 8-10.
Habitat in maris norwegici *ſinubus, calami anſerini craſſitie, flavicans, linea dorſi obſcure rubra, capitis tentaculis 5, æqualibus, collo ſuperne utrinque cornuto, corporis articulis* 126, *cauda filis 2 ſubtilibus terminata, tentaculis triplo longioribus.*

pinnata. 12. N. convexa, pedibus cirratis pinnigeris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 102. *t.* 29. *f.* 4-7. *rar.* 1. *p.* 62. *prodr.* 2629.

Habitat in ſinuum maris norwegici *limo cœruleſcente, ſpadicea, nitoris chalybei, tentaculis capitis, 5 articulatis, ſegmentis corporis* 106-122, *cauda filis* 2 *craſſis breviſſimis terminata, norwegicæ proxime affinis.*

corniculata. 13. N. ſubdepreſſa pinnata; pedunculis cirro ſetaque longa ſimplici. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 52. *f.* 1-4. *rar.* 2. *p.* 33.
Habitat in mari Norwegico, *minima, ſplendida, agilis, albida, utrinque inciſa, capitis tentaculis* 6, *oculis glomeratis ruberrimis, corporis ſegmentis* 28, *cauda cirris* 2 *longioribus terminata.*

puſilla. 14. N. depreſſa, pedunculis cirratis: filamentis articulatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2631.
Habitat in mari norwegico.

inciſa. 15. N. convexa, ſegmentis diſtantibus, pedunculis ſimplicibus cirratis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 295. *n.* 277.
Habitat rara in mari Groenlandiam *alluente procul a littore inter radices ulvarum maximarum*, $2\frac{1}{3}$ *pollices longa, elongata, ſubtus ex albido rubicunda, ſulco medio longitudinali exarata, ſupra pallida, ferruginea, medio ſubgriſea, capitis tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *maxillis flavis, corporis ſegmentis* 80.

aphroditoides. 16. N. depreſſa, non ſulcata, pedunculis cirratis papilligeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 296. *n.* 278.
Habitat haud frequens in maris Groenlandiam *alluentis fundo limoſo, admodum vivida, vix pollice longior, capite albo: maxillis oculiſque nigris, tentaculis* 4, *frontis cirris* 2, *pellucida anterius ochroleuca, ceterum rubicunda, lineis abdominis* 2 *ferrugineis, rarius viridans, lineis abdominalibus, dorſi et tranſverſalibus rubris.*

** *ore proboſcideo.*

cærulea. 7. N. glabra cœruleſcens. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 198. *n.* 280. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1086. *n.* 7. *Amœn. acad.* 4. *p.* 254. *n.* 38. *Fn. ſuec.* 1095. Nereis glabra cæruleſcens ſegmentis CLXXXIV.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 93. Nereis tentaculorum 184. paribus.
Habitat in Oceano *ſplendida.*

viridis. 8. N. depreſſa, lamellis pedunculorum lanceolatis. *Müll. von. Würm. p.* 162. *t.* 11. *f.* 1-6. *zoo. dan. prodr.* 2636. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 297. *n.* 279.

Habitat in mari Iſlandiam & Groenlandiam *alluente, in foraminibus lavæ a monte* Hecla *ejectæ*, 3 *pollices longa, graminea* (*junior rubicunda, linea dorſi longitudinali viridi, capite, tentaculis cirris lamelliſque niveis*) *filiformis, capitis tentaculis utrinque* 3, *oculis* 2 *nigris, proboſcide clavata, quam læſa protrudit, corporis ſegmentis* 130 *æqualibus, caudæ cirris* 2 *brevibus.*

maculata. 9. N. convexa, lamellis pedunculorum ſubcordatis. *Müll. von Würm. p.* 156. *t.* 10. *f.* 1-6. *zool. dan. prodr.* 2635. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 298. *n.* 281.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1086. *n.* 9. Nereis viridis, dorſo nigro-punctato, articulis CC.

Habitat ad Iſlandiæ & Groenlandiæ *littora*, $2\frac{1}{2}$-4 *pollices longa, ſupra vireſcens: linea utrinque longitudinali obſcuriore, ſubtus caudæque cirris brevibus pallidior unicolor, collo & parvo capite cum frontis cirris brevibus utrinque* 2, & *tentaculis* 4 *albis, pedunculorum ſetis & lamellis ex flavo viridibus, oculis tantum* 2, *proboſcide clavata longa, alba, rubro ſtriata.*

craſſa. 17. N. depreſſa, proboſcide cylindrica, pedunculis ſanguineis: ſetis ramoſis. *Müller von Würm. p.* 166. *t.* 12. *f.* 1-3.

Habitat in Oceani fuco natante, 4 *pollices longa, æqualis, capitis parvi tentaculis* 4 *cirris* 2 *frontalibus rubris brevioribus, oculis* 2 *nigris, proboſcide truncuta emiſſili, caudæ ſetis* 2 *rigidis inæqualibus.*

ſtellifera. 18. N. depreſſa, pedunculorum lamellis ellipticis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 1-3. *prodr.* 2632. *rar.* 2. *p.* 62.

Habitat in maris Norwegici *ſinubus, proboſcide ſquamiſque dorſi oblongis, nereides aphroditis jungens, at flexilis, filiformis, alba, ſubtus linea media longitudinali rubra, capitis tentaculis ſex, oculis* 2, *pedunculis conicis, retrorſum curvatis: apicis alteriuſque lateris ſetis in ventilabrum diſpoſitis.*

punctata. 19. N. ſubdepreſſa, pedunculis longiſſime cirratis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 62. *f.* 4. 5. *prodr.* 2633. *rar.* 2. p. 63. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 301. *n.* 284? Nereis roſea.

Habitat in Norwegiæ & Groenlandiæ *ſinubus, in teſtis oſtrearum aut ſabulo ſub lapidibus latens, flaveſcens: ſtriis tranſverſis fuſcis, lineaque dorſi longitudinali rubra, ca-*

pitis cirris, oculiſque 4, pedunculorum cono punctis 4 nigris notato, corporis ſegmentis 40 & ultra; caudæ cirris 2.

alba. 20. N. convexa, fronte cornuta, pedunculis bifidis. *Müll. zool. dan. 2. t. 62. f. 6. 7. prodr. 2634. rar. 2. p. 64.*
Habitat in Norwegiæ *ſinuum fundo argilloſo, alba, annulata, retrorſum attenuata, oculis nullis, proboſcide membranacea, pellucidiſſima, in duplam corporis latitudinem inflanda, pedunculis utrinque 77, verrucoſis.*

flava. 21. N. depreſſa, pedunculorum lamellis oblongo-ovatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 299. n. 282.*
Habitat in mari ſeptentrionali *procul a littore* Groenlandiæ *inter radices ulvarum, 27 lineas longa, viridi affinis, tota flava, ſolis pedunculorum ſetis, 2 oculis caudæque cirris nigris, roſtri cirris 2 breviſſimis, tentaculis 2 baſi unitis, corporis ſegmentis 140.*

longa. 22. N. ſubdepreſſa, papillis mammillaribus pro lamellis pedunculorum. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 300. n. 283.*
Habitat ad littora ſinuum Groenlandiæ *in fundo argillaceo vel arenoſo, præſertim ad fluviorum oſtia, ad 9 pollices longa, nunc alba, ſetis modo caudæque cirris nigricantibus, nunc ſupra rubicunda vel ex griſeo viridis, nunc ſupra vireſcens: lateribus obſcurioribus, ſubtus ex æneo albida, corporis ſegmentis 190, 200, 240, pedunculis bifidis.*

priſmatica. 23. N. triquetra, pedunculis diſtantibus: papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata. *Müll. prodr. zool. dan. 2637. O Fabr. Fn. groenl. 302. n. 285.*
Habitat in maſſa flava ſpongioſa fœtida, quæ lapides majores ad littus Groenlandiæ *ſubtus veſtit, rarius in arena, 6 lineis vix longior ochroleuca, lineis dorſi 3 griſeis, capitis colliquc cirris 11, plurimis, caudæque 2 albis, oculis 4, corporis ſegmentis 25.*

bifrons. 24. N. depreſſa, pedunculis papilla ſimplici ſetigera ſupra cirrata, mediis ſimul ramigeris. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 303. n. 286. Müll. prodr. zool. dan. 2638.*
Habitat cum priſmatica, *continuo ſe movens, pollicem longa; ex fulvo brunnea, priſmaticæ affinis, capite albo, oculis 4, cirris 7, corporis utrinque attenuati ſegmentis 56.*

cæca. 25. N. ſubconvexa, tentaculis duobus breviſſimis, lamellis pedunculorum duplicatis ciliatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 304. n. 287.*

Habitat in Groenlandiæ *littoribus arenoſis ſub lapidibus more lumbrici papilloſi cuniculos profundos agens, 8 pollices longa, candide lineatis, tentaculis obtuſe conicis, proboſcide ampla, ſphærica, corporis ſegmentis 89 - 100, oculis nullis; an eadem cum naide cæca.*

ebranchiata. 26. N. teres annuloſa utrinque attenuata: pedunculis cylindricis brevibus utrinque bifariam pinnata, tentaculis nullis.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 231. *t.* 5. *f.* 8-10.
Habitat (*cæruleſcens*) *in* mari germanico, (*ex griſeo fuſca*) *in* indico, *pannis ſegmentis corporis* 269, *ultimo crenato.*

lamelligera. 27. N. teres utrinque attenuata: proboſcide mucronibus quatuor carneis ſtellata, pedunculis compreſſis folio ſupra ſemilunato ſubtus majore ſemicordato auctis.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 233. *t.* 5. *f.* 11-17.
Habitat in mari indico, mediterraneo & ſeptentrionali, *inter plantas et quiſquilias marinas, bipedalis, ſegmentis* 200-550, *capitis tentaculis* 4, *oculis* 2 *nigris.*

ciliata. 28. N. depreſſa, ore cylindrico retractili, margine anteriori ciliato, tentaculis nullis.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 14. *t.* 89. *f.* 1-4.

* * * *ore tubulato.*

prolifera. 29. N. depreſſa, pedunculis cirratis, tentaculo frontis ſolitario. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 52. *f.* 5-9. *rar.* 2. *p.* 34.
Habitat rara in Norwegiæ *ſinubus, generationis modo naidibus ſimilis, rufa, capitis tentaculis* 3, *oculis* 4 *nigris, forcipe et proboſcide nulla, ſed loco ejus tubulo pellucido craſſo flexuoſo, corporis ſegmentis* 32-46, *caudæ cirris* 2.

NAIS.

Corpus repens, longum, lineare, pellucidum, depreſſum.
Pedunculi ſetis ſimplicibus.
Tentacula nulla.
Oculi duo aut nulli.

vermicularis. 1. N. ſetis lateralibus nullis, mento barbato. *Müll. von Würm.* *t.* 4. *f.* 1. 2. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 20. *n.* 151. *zool. dan. prodr.* 2647.
Roeſ. inſ. 3. *p.* 578. *t.* 93. *f.* 1-7.

Habitat in aquis ſtagnantibus, *lemnæ adhærens*, 2 *lineas longa, capite ſubclavato, oculis nullis, verrucis pedunculorum ſetis* 5-6.

ſerpentina. 2. N. ſetis lateralibus nullis, collari triplici nigro. *Müller. von Würm. p.* 84. *t.* 4. *f.* 3. 4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 20. *n.* 152. *zool. dan. prodr.* 2648.

Roeſ. inſ. 3. *p.* 567. *t.* 92.

Habitat in Europæ *aquis* ſtagnantibus *ad radices lemnæ, vermiculari minus depreſſa & longior*, 9 *quippe lineas longa, pedunculis verrucoſis: ſetis* 3 *uncinatis.*

proboſcidea. 3. N. ſetis lateralibus ſolitariis, proboſcide longa. *Müll. von Würm. p.* 14. *t.* 1. *f.* 1-4. *verm. hiſt.* I. 2. *p.* 21. *n.* 153. *zool. dan. prodr.* 2649.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1085. *n.* 2. Nereis (lacuſtris) linearis, lingua exſerta.

Roeſ. inſ. 3. *p.* 483. *t.* 78. *f.* 16. 17. & *t.* 79. *f.* 1.

Trembley hyſt. polyp. t. 6.

Lederm. microſc. t. 82. *f.* f. & h.

Schaeff. Armpolyp. 1754. *t.* 3.

Habitat in Europæ aquis*paludoſis, rivis*, piſcinis, &c. 2½-4 *lineas longa, hyalina, inteſtino flexuoſo nigricante, ſegmentis ſingulis utrinque ſeta ſimpliciſſima munitis, capite forficato, oculis* 2 *nigris, ore linguaque inſtructo, ano terminali, partibus & incolis aquæ inviſibilibus victitans.*

elinguis. 4. N. ſetis lateralibus ſolitariis, proboſcide nulla. *Müll. von Würm. p.* 74. *t.* 2. *f.* 1-4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 154. *zool. dan. prodr.* 2650.

Habitat rarior in aqua rivulari *proboſcideæ affinis, at anguſtior*, 4-5 *lineas longa, ore anterius obtuſo, forficis & proboſcidis experte, ano laterali.*

digitata. 5. N. ſetis lateralibus ſolitariis, cauda laciniata. *Müller. von Würm. p.* 90. *t.* 5. *f.* 1-4. *hiſt. verm.* I. 2. *p.* 22. *n.* 155. *zool. dan. prodr.* 2651.

Habitat in rivorum ſedimento arenoſo, *capite in limo condito, oculis nullis* 5 *lineas longa, ſubtus duplici verrucarum puſillarum ciliatarum inſtructa, cauda in* 6 *lacinias inæquales ſurſum porrectas diviſa, vena rubra.*

Naides *partitione tranſverſa naturali & artificiali mirifice multiplicandæ, plurimæ in aquis dulcibus degunt*; Nereides, Terebellæ, Amphitritæ, Spiones, Aphroditæ *omnes in aqua ſalſa.*

barbata. 6. N. ſetis lateralibus faſciculatis, proboſcide nulla. *Müller. von Würm. p. 80. t. 3. f. 1-3. hiſt. verm. I. 2. p. 23. n. 156. zool dan. prodr. 2652.*
Bonnet tr. d'inſectol. obſ. 21.
Habitat in foveis ſilvarum aquoſis, *helicibus planorbibus ſæpe adhærens, digitatæ ſimilis, at ſubtus pilis, & ad ſingula ſegmenta corporis utrinque ſetis* 4 *divergentibus munita, oculiſque* 2 *nigris gaudens,* 4 *lineas longa.*

cæca. 7. N. verrucis lateralibus ſetoſis, oculis nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2653.
Habitat in ſinubus Iſlandiæ, & Chriſtianienſi Norwegiæ; *an propria ſpecies hujus generis?*

littoralis. 8. N. ſetis lateralibus nullis ſolitariis geminatis faſciculatis varia. *Müll. zool. dan. 2. t. 80. f. 1-8. rar. 2. p. 120.*
Habitat in Havniæ *littore ſabuloſo, marina aqua tecto, fragiliſſima, elongata, filiformis, æqualis, rubra, raro ex albo griſea, ſegmentis plurimis* 16, 30, 37, *ſeta marginali diſtinguendis, ex annulis conſertis compoſita.*

marina. 9. N. ſetis lateralibus ſolitariis tubulo exſerendo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 315. *n.* 295.
Habitat in Groenlandiæ littoribus *ſub conſervis marinis, vix* 10 *lineis longior, ſupra convexa, ſubtus plana, poſterius acuminata, albicans, linea media longitudinali ex flavo griſea, oculis* 2; *an vere diſtincta a nereide prolifera?*

quadricuſpidata. 10. N. verrucis lateralibus bifidis ſetoſis, cirris abdominalibus et cauda quadrifida. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 315. *n.* 296.
Habitat ſatis frequens in Iſlandiæ *ſabulo maritimo ſub lapidibus, gordiis minutis victitans,* $2\frac{1}{3}$ *pollices longa, utrinque attenuata, ſubtus magis plana, oculis tentaculiſque carens, nunc pallide rubra, nunc ex rubicundo griſea, linea longitudinali, ſubtus præſertim pulchre purpurea, corporis ſegmentis* 104 *annularibus, caudæ brevis cylindricæ, cirris* 4.

287. ASCIDIA. *Corpus* fixum, teretiuſculum, vaginans.
Aperturæ binæ ut plurimum ad ſummitatem: altera humiliore.

papilloſa. 1. A. ſcabra, tuberculis coccineis.
Bohadſch mar. 130. *t.* 10. *f.* 1. Tethyum coriaceum.
Habitat in mari adriatico.

gelatinoſa. 2. A lævis coccinea ſubdiaphana.
Bohadſch mar. 131. *t.* 10. *f.* 3. Tethyum gelatinoſum.
Gunn. act. Nidroſ. 3. *p.* 101. Tethyum elegans.
Habitat in mari mediterraneo; *nonne eadem cum venoſa?*

inteſtinalis. 3. A. elongata lævis alba, ſacculo in collum producto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2733.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1087. *n.* 3. Aſcidia lævis alba membranacea.
Gunn. act. Nidroſ. 3. *p.* 81. *t.* 3. *f.* 3. 4. Tethyum ſociabile; Soepungen.
Bohadſch mar. 132. *t.* 10. *f.* 4.
Baſter opuſc. ſubſ. 2. *p.* 84. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat in Oceano europæo.

quadridentata. 4. A lævis alba, aperturis quadridentatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2721. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 317.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ſubgloboſa*, *roſtris* 2 *prominentibus, balanis adhærens,* 4 *lineas longa.* Koenig.

ruſtica. 5. A. ſcabra ferruginea aperturis incarnatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 49. *n.* 18. *t.* 15. *f.* 1-5. *prodr.* 2720. *rar.* 1. *p.* 30. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 330. *n.* 316.
Olaſſ. reſ. iſl. 900. C. b. Tethya corpore ovato rubro, auriculis duabus.
Rondel. piſc. 2. *c.* 19. *poiſſ. p.* 87. *Aldrov. zooph. p.* 582. *Geſn. Fiſch. anh. p.* 82. Tethya.
Jonſt. exang. t. 19. *f.* 8. Tethyorum ſpecies.
Habitat in mari ſeptentrionali & mediterraneo, *edulis, teſtaceis, lapidibus, fucis adhærens, ſubdiaphana, dolioli facie,* 2 *pollices circiter longa, cute exteriori craſſa coriacea, intus lævi albida, ſacculo molli lævi carnoſo, roſeo, infra flaveſcente, aqua a cute exteriori diſcreto.* Koenig.

echinata. 6. A. hemiſphærica hiſpida, oſculis hiantibus coccineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2722. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 318.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1087. *n.* 6. Aſcidia verrucoſa hiſpida.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *fuco ſcopario aliiſque adhærens, albida, verrucis adſperſa, ſingulis apice armatis, cacti inſtar, aculeis divergentibus ſubciliatis, ſupremis 2 majoribus incarnatis in aperturas terminatis.* Koenig.

Mentula. 7. A. compreſſa piloſa, ſacculo rubro, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 24. *n.* 6. *t.* 8. *f.* 1-4. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 24. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 331. *n.* 319.
Rondel. piſc. c. 2. *p.* 129. *poiſſ.* 2. *p.* 81. Pudendum alterum.
Aldrov. zooph. p. 589. Mentula marina altera.
Geſn. Fiſchb. p. 154. *f.* 1. *Anh.* 4. *p.* 84. Mentula marina, pudendi marini altera ſpecies.
Jonſt. exſang. t. 20. *f.* 2. Mentula marina.
Planc. conch. p. 109. *t.* 7. *Comment. Bonon.* 5. *p.* 243. *t.* 2. *f.* 4-7. Mentula marina informis.
Hill. anim. 1. *t.* 5. Salecia.
Dicquemar. Journ. de phyſ. 1777. *Mai. p.* 356. *t.* 2. *f.* 1. 2. 3. Reclus marin.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *rudis quaſi & indigeſta, ochroleuca, pellucida, gelatinoſa,* 5-6. *pollices longa, conſervarum fibrillis veſtita.*

venoſa. 8. A. elongata ſubcompreſſa toroſa rubra, ſacculo concolore. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 85. *t.* 25. *f.* 1-3. *prodr.* 2736. *rar.* 1. *p.* 52.
Habitat in mari Norwegico, *fucis in fundo ſinuum naſcentibus adhærens, firma, aperturis ſanguineis.*

Prunum. 9. A. ovata lævis hyalina, ſacculo albo, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 127. *n.* 61. *t.* 34. *f.* 1-3. *prodr.* 2730. *rar.* 1. *p.* 83.
Habitat in maris Norwegici ſinu Chriſtianenſi & glacialis Karikenſi, *pruni figura et magnitudine, cute lactea ſubtiliſſime rugoſa, aperturarum radiis fuſcis.*

conchilega. 10. A. fruſtulis teſtarum veſtita, ſacculo albo in cæruleum tranſeunte. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 128. *n.* 62. *p.* 34. *f.* 4-6. *prodr.* 2724. *rar.* 1. *p.* 84.
Muſ. Ad. Fr. 96. Microcoſmus gelatinoſus pellucidus.
Habitat in Norwegiæ ſinu Droebacenſi, *gelatinoſa, ſubdiaphana, cylindrica vel ovalis.*

Parallelo-gramma. 11. A. candida convexa hyalina, ſacculo reticulato luteſcente, aperturarum altera laterali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 1 – 3. *prodr.* 2737. *rar.* 2. *p.* 25.

Habitat haud frequens in fucis ſinus Norwegiæ Laurwigenſis, *oblonga, ſubquadrata; angulis obtuſis, lineis interdum coccineis picta.*

virginea. 12. A. elongato-compreſſa cryſtallina lævis: ſtriis tranſverſis coccineis, ſacculo rubente. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 49. *f.* 4. *prodr.* 2732. *rar.* 2. *p.* 27.

Habitat ſub initium Julii ad rupes orientales arcis Norwegicæ Stavern, *glaciem referens, parallelogramma durior; apertura utraque punctis raris coccineis cincta.*

canina. 13. A. elongata teres flaccida: ſacculo rubro. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 55. *f.* 1 – 6. *prodr.* 2734. *rar.* 2. *p.* 43.

Red. opuſc. 3. *t.* 21. *f.* 6. *et anim. viv. negl. anim. p.* 101. *t.* 15. *f.* 6. Mentula marina.

Planc. conch. p. 45. *t.* 5. *f.* 5. Tethyum ſ. mentula marina penem caninum referens.

Bohadſch anim. mar. p. 132. *t.* 10. *f.* 4. 5. Tethyum faſciculatum.

Dicquemar. journ. de phyſ. 1777. *Fabr. p.* 137. *t.* 1. *f.* 1 – 7. Sac-animal.

Habitat in mari Norwegico & atlantico, *cute ampla, glabra, alba, ſubpellucida, aperturarum anteriorum ambitu ruberrima.*

patula. 14. A. teretiuſcula luteſcens ſcabra, ſacculo rufo, orificiis coccineis patulis altero laterali. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 1. *prodr.* 2729. *rar.* 2. *p.* 71.

Habitat in fucis rupium Suenerne oceani Norwegici, *pellucida, ſacculo lagenæ formam mentiente.*

aſperſa. 15. A. ſubcompreſſa ſcabriuſcula alba, ſacculo maculis rubris, *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 65. *f.* 2. *prodr.* 2728. *rar.* 2. *p.* 72.

Dicquemar. journ. de phyſ. Oct. 1780. *p.* 304. *t.* 2. *f.* 1 – 3?

Habitat in mari Norwegico, *fucis racematim adhærens, cordiformis, cute pellucida intus lævi, ſacculo flavicante.*

Aſcidiæ, *in mari modo obviæ, ſe dilatant alternatim et contrahunt, exſpuunt tanquam e ſiphone aquam, magis minuſve gelatinoſæ, lapidibus, fucis, teſtaceis affixæ, mytilum interdum includentes, piſcium frequens eſca, nonnullæ etiam hominibus eſculentæ, paucæ olim officinales.*

ſcabra. 16. A. compreſſa albida ſcabriuſcula, ſacculo rubro, orificiis concoloribus. *Müll. zool. dan. 2. t. 65. f. 3. prodr. 2726. rar. 2. p. 73.*

Habitat in Norwegiæ *ſinu* Chriſtianienſi, *fucis latere adhærens, prima facie patulam referens, ab oculo glabra; digito tantum aſpera, aperturis potius coarctatis, collo utroque conico, ſacculo non maculato, cute exteriori pellucidiſſima, gelatinoſa, duriuſcula.*

orbicularis. 17. A. depreſſa albida, ſacculo punctis elevatis inæqualibus. *Müll. zool. dan. 2. t. 79. f. 1. 2. rar. 2. p. 117.*

Habitat ſolitaria Auguſto in ſinu Norwegiæ Chriſtianienſi, *fuco ruſo affixa, gelatinoſa, orbicularis, pollicis diametro, pellucida, diſco opaco, aperturis collateralibus 6-7 dentatis: puncto in apice dentium coccineo, ſacculo albido.*

corrugata. 18. A. elongata glabra, ſacculo cinereo: faſciis albis. *Müll. zool. dan. 2. t. 79. f. 3. 4. prodr. 2735. rar. 2. p. 118.*

Habitat in Norwegiæ ſinubus, *baſi ſibrilloſa fucis adhærens, teres, flaccida, plicata, rugoſa, cute exteriori hyalina, oriſiciis luteis.*

lepadiformis. 19. A. clavata hyalina, inteſtino flavo. *Müll. zool. dan. 2. t. 79. f. 5. prodr. 2738. rar. 2. p. 119.*

Habitat in Norwegiæ ſinubus, *fucis & cancris brachyuris adhærens, facile flacceſcens, clava compreſſa ſubquadrangula.*

complanata. 20. A. depreſſa inæqualis albida, interaneis nigris, orificiis fulvo punctatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 332. n. 320.*

Habitat frequens in littore arenoſo Groenlandiæ, *baſi ſua lapidibus arcte adhærens, ſubcarnoſa, oblonga, pellucida, 9 lineas longa.*

Tuberculum. 21. A. oblonga compreſſo-gibba flavicans, punctis eminentibus concoloribus, orificiis verticalibus rubris. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 332. n. 321.*

Habitat in fundo maris Groenlandiam *alluentis, ulvarum radicibus arcte adhærens, 3 lineis vix longior.*

villoſa. 22. A. obovata radicata albida lanugine conferta veſtita, aperturis terminalibus concoloribus. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 333. n. 322.*

Habitat in fundo maris Groenlandiam *alluentis, radice inter radices ulvarum fixa*, 4 *lineas longa, erecta, teres cute ſubſtupoſa, verrucis minutiſſimis confertis obſita.*

clavata. 23. A. ſtipite filiformi, aperturarum utraque laterali. *Müll. zool. dan. prodr.* 2740. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 333. *n.* 323. *Mant. plant. p.* 552. Vorticella Bolteni.
Bolten. epiſt. de nov. zooph. Hamb. 1771. 4.

Habitat in mari ſeptentrionali, *ſcopulis rupibuſque baſi ſua arctiſſima adhærens, ſerpulis & zoophytis ſæpius tota obducta*, 9 *pollices, & ultra longa, ſpadicea, rarius rubicunda, radicata, cute craſſa calloſa, intus glabra, alba, ſtipite filiformi, rigido, erecto, ſubflexuoſo, ſurſum incraſſato dilatato, nunc longiori, nunc breviori, clava ovata, nunc lævi, nunc ſubſulcata, aperturis rugoſis, eminentibus.*

pedunculata. 24. A. ſtipite ſenſim attenuato, capitulo fuſiformi, apertura utraque terminali.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 14. Vorticella (ovifera) ſimplex ſolitaria, flore ovali, ſtirpe ſimpliciſſima ſcabra.
Pall. ſpic. zool. 10. *p.* 25. *t.* 1. *f.* 16. Aſcidia clavata.
Edw. glean. t. 356.

Habitat in mari *inter* Aſiam & Americam borealem *intermedio, baſi variis marinis affixa, coriacea, rugoſiſſima, coccinea, orificiis papillaribus, rugis aliquot circularibus cinctis.*

mammillaris. 25. A. ſubparallelepipeda albicans, aperturis terminalibus concoloribus. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 24. *t.* 1. *f.* 15.

Habitat in ſalo Cornubienſi, *ſitu horizontali ſcopulis ſubmarinis tenaciſſime adnata, valde irritabilis, difformis, varie rugoſa & gibboſa, hinc inde ſetis mollibus adſperſa, coriacea ſordide albicans, aperturarum papilla hemiſphærica intus elegantiſſime coccinea.*

globularis. 26. A. ovali-ſphærica ſemipellucida, aperturis terminalibus vix prominentibus. *Pall. it.* 3. *p.* 709. *n.* 57.

Habitat copioſa in littoribus vadoſis arenariis Oceani glacialis, *ceraſi magnitudine, pedunculo breviſſimo affixa, cute duriuſcula extus lævi, arenulis adglutinatis obducta.*

Phuſca. 27. A. teres rubra, apertura utraque laterali.
Forsk. Fn. arab. æg. p. 129. *n.* 82. Alcyonium Phuſca.

Habitat in Smyrnam *et* Conſtantinopolin *alluente mari, ſaxis adhærens, 2½ pollices longa; lævis, utrinque obtuſa, nunc recta, nunc incurva, cortice ſtupoſo rejecto Græcis cum ſucco limoniorum edulis.*

Gelatina. 28. A. compreſſa lævis alba, ſacculo pallido, orificiis punctis luteis cinctis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2723.
Habitat in mari Norwegico.

cryſtallina. 29. A. compreſſa lævis, ſacculo albo atomis coccineis ſparſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2725.
Habitat in mari Norwegico.

octodentata. 30. A. oblonga biroſtris lævis albicans, aperturis hinc octo illinc ſexdentatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2731. *Act. Havn.* 10. *p.* 168. *f.* 7. *β.* 8. 9.
Habitat in mari Norwegico.

patelliformis. 31. A. alba, diſco rubro. *Müll. zool. dan. prodr.* 2739.
Habitat in mari Norwegico.

Pyura. 32. A. conica lævis intus papilloſa rubra, tubulis duobus terminalibus punctiſque inter hos duobus nigris. *Mol. hiſt. nat. Chil. p.* 172.
Habitat gregatim ſacco incluſa ad littus Chilenſe, *edulis, utrum hujus, an proprium genus?*

Aurantium. 33. A. ſubgloboſa: ſacculo coccineo punctis duriuſculis ſcabro, papillis terminalibus cylindraceis rugoſis.
Pallas n. act. Petrop. 2. *p.* 246. *t.* 7. *f.* 38.
Habitat in mari Curilas inſulas *alluente baſi teſtis lapilliſque adhærens pomi aurantii magnitudine.*

globularis. 34. A. ovato globoſa ſemipellucida glabra pedunculata: ſacculo extus ſubtiliſſime punctata, aperturis diſtantibus vix prominulis.
Pallas n. act. Petrop. 2. *p.* 247. *t.* 7. *f.* 39. 40.
Habitat frequens in maris hyperborei *littoribus vadoſis arena ſubtili ſtriatis* e. g. *ad ſinum* Caræ, *ceraſi majoris magnitudine, ſimpliciſſima, cineraſcens, arena tenera agglutinata ſcabra, pedunculo breviſſimo.*

SALPA. *Corpus* liberum gelatinoſum utroque apice apertum intus vacuum: inteſtino obliquo.

* *appendice inſtructæ.*

maxima. 1. S. corpore utroque apice appendiculato. *Forsk. Fn. ægypt. arab. p.* 112. *n.* 30.
Habitat in mari mediterraneo *et* Archipelago, *hyalina, ſpithamam longa ſubquadrangula, nucleo obſcure teſtaceo opaco ad anum, appendice poſteriore ſubulata, priore conica longiore.*

pinnata. 2. S. ore terminali, linea dorſali hinc flava inde alba, abdominis lineis duabus albo rubentibus. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 113. *n.* 31.
Habitat in mari mediterraneo, 2 *pollices longa, hyalina, ſubtriquetra, dorſi linea opaca, appendice pinnam æmulante, triquetro-priſmatica.*

democratica. 3. S. punctata faſciata, aculeis pone octo. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 113. *n.* 32.
Habitat numeroſiſſima ad Majorcam, *ovalis antrorſum truncata, digitum latum longa, nucleo baſeos opaco cæruleo, rarius ejus loco circulo multiradiato cæruleſcente, cauda biſeta.*

mucronata. 4. S. ore laterali, mucrone hyalino interno ad frontem dextro, ad anum ſiniſtro, nucleo cæruleo oblongo. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 114. *n.* 33.
Habitat ad Yvicam, *hyalina, oblongo-ovata, poſterius acuta, digitum tranſverſum longa, nucleo opaco.*

* * *appendice nulla.*

punctata. 5. S. ore ſubterminali, dorſo rubro-punctato pone mucronato, ano porrecto. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 114. *n.* 34.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *ſeſquipollicaris, hyalina, abdominis faſciis obſoletis, nucleo ad anum globoſo opaco ex ferrugineo flaveſcente.*

Salpæ, *gregariæ, ſæpius cohærentes, ſyſtoles et diaſtoles phænomena egregie monſtrantes, et aſcidiarum more aquam quaſi ex ſiphone expellentes, et* Dagyſa, *an proprium ambo conſtituant genus, huic ordini adſcribendum, judicent ipſæ vivorum animalium: Hujus ſpecies adhuc incognitæ a* Bankſio et Solandro *in mari hiſpanico captæ, Illuſtris Viri examen cum orbe litterario communicandum adhuc expectant, gregariæ, cohærentes, eximiis coloribus conſpicuæ.*

confœderata. 6. S. ore terminali, dorſo gibboſo. *Forsk. Fn. arab. ægypti p.* 115. *n.* 35.
Habitat in Mari Mediterraneo, & Archipelago, *pollice longior, ſubtetragona, hyalina, mollis, nucleo pone gibbum dorſi globoſo-ovato, opaco, obſcure brunneo: linea ex hoc exeunte pellucida.*

faſciata. 7. S. ovato-oblonga, ore terminali, abdomine faſciato, inteſtino filiformi incurvo ſupra nucleum. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 115. *n.* 36.
Habitat rarior ad ingreſſum Archipelagi, *ſeſquipollicaris, hyalina, abdominis faſciis* 5, *nucleo marginali ferrugineo, opaco.*

Sipho. 8. S. ſubcylindrica obtuſa hyalina, nucleo brunneo, fronte tubulis duobus: apicibus perforatis rubris. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 115. *n.* 37.
Habitat in mari rubro ad Djiddam, *baſi ſaxis marinis aut ſpongiæ affixa, vix digitum tranſverſum longa, nucleo prope baſin globoſo, opaco, inteſtino ex fuſco cæruleo.*

africana. 9. S. ſubtriquetra tranſverſe, decemſtriata, ore terminali, gibbo ad baſin aucto nucleis tribus. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 116. *n.* 38.
Habitat ad littora Tunetana, *ſeſquipollicaris, hyalina, nucleo priori opaco brunneo globoſo, reliquis albidis, ſubpellucidis.*

ſolitaria. 10. S. hyalina ovalis, ore terminali: tubulo cæruleo, ano laterali cæruleo. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 116. *n.* 39.
Habitat in mari rubro ad Djiddam, *gramini adhærens, digitum tranſverſum longa, depreſſiuſcula, nucleo prope baſin mediam globoſo pallide brunneo.*

polycratica. 11. S. ore infra apicem, fronte caudaque truncatis. *Forsk. Fn. arab. ægypt. p.* 116. *n.* 40.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipollicaris, congeneribus rigidior, abdominis faſciis* 5 *tranſverſis, nucleo globoſo fuſco.*

DA-

DAGYSA. *Corpus* angulatum cavum, utroque fine apertum.

notata. 1. D. altero fine macula fuſca notato. *Banks & Solander apud Hawkeſworth. it. 2. p. 2.*

Habitat in mari hiſpanico, 3 *pollices longa, at* 1 *craſſa, lateribus altera alteri adhærente.*

CLAVA. *Corpus* carnoſum, gregarium clavatum, pedunculo tereti affixum: apertura unica verticali.

paraſitica. 1. Cl. pedunculo albido pellucido, clava rubra opaca, mucronibus pellucidis conicis erectis obſeſſa. *Müller. Beſchr. berl. Naturf. 1. p. 406. t. 5. f. 3. 4.*

Habitat in maris balthici *fuco nodoſo, teſtaceis, palis, trabibus, parum vivida, os tamen dilatans & contrahens, hydris affinis.*

288. ACTINIA. *Corpus* rugoſum, cirris eccentricis, apertura unica terminali, baſi affixum.

rufa. 1. A. rufa, foramine roſaceo, cirris pallidis. *Müll. zool. dan. 1. p. 75. t. 23. f. 1-5. rar. 1. p. 47. prodr.* 2797.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 1. *Müll. zool. dan. prodr.* 2793. Actinia (equina) ſemiovalis læviuſcula.

Muſ. Ad. Fr. 1. p. 93. Tethys (mentula) ſemiovatus.

Brown. jam. p. 787. Actinia ſubfuſca mollis, fundo muſculoſo.

Rondel. poiſſ. p. 380. Urtica marina libera Ariſtotelis.

Aldrov. zooph. p. 567. Urtica parva Rondeletii.

Geſn. Fiſchb. 2. p. 10. Urtica parva marina.

Jonſt. exang. t. 18. Urtica parva.

Hill. anim. t. 5. Meduſa, ſpecies 1.

Dicquem. act. angl. vol. 63. t. 16. f. 1-3. Anemone de la première eſpèce.

Habitat in Oceano, *etiam* glaciali, & mari mediterraneo, *rupibus adhærens, rarius verſicolor, formæ variabilis, nunc cylindricæ, nunc globoſæ, nunc conicæ, nunc*

evolatæ, cirris albidis, tenuibus, flexilibus, mobiliſſimis, diametro corporis brevioribus, apice truncatis.

craſſicornis. 2. A. rubra, cirris conico elongatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 77. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1088. *n.* 2. Actinia (ſenilis) ſubcylindrica tranſverſe rugoſa.
Müll. zool. dan. prodr. 2792. Actinia rubra, cirris fuſiformibus.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 120. *t.* 13. *f.* 1. Actinia rugis longitudinalibus, proboſcidibus longis craſſis.
Fn. ſuec. 2103. Priapus ſenilis.
Forsk. fn. arab. æg. p. 101. Priapus ruber.
Rondel. poiſſ. p. 381. *c.* 14. *Bellon. aq. p.* 342. *Geſn. Fiſchb.* 2. *p.* 11. *Jonſt. exſang. t.* 18. *f.* 2. Urtica rubra.
Aldrov. zooph, p. 568. Urtica rubra, Urtica explicata Bellonii, Urtica contracta Bellonii.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *t.* 16. *f.* 10. & *t.* 17. *f.* 11. 12. Anémone de la ſeconde eſpèce.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 204.
Gunn. act. Stockh. 1767. *t.* 4. *f.* 4. 5.
Fabr. it. norw. p. 261.
Habitat in mari atlantico, mediterraneo, ſeptentrionali, glaciali.

plumoſa. 3. A. tentaculis parvis, margine penicillis cirrata. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 12. *t.* 88. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 77. *prodr.* 2791.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1088. *n.* 3. Actinia (folina) ſubcylindrica ſtriata lævis glande muricata.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 122. *t.* 13. *f.* 2. Actinia rugis orbicularibus, proboſcidibus multis tenuibus.
Olafs. it. iſl. 2. *p.* 1002. Actinia corpore ventricoſo molli, tentaculis numeroſis variis.
Gunn. act. Nidroſ. 5. *p.* 425. *t.* 7. Actinia (polymorpha) lævis rufa, baſi inæquabili & dilatabili, tentaculis duplicis generis.
Dicquem. act. angl. vol. 63. *p.* 397. Anémone de la quatrième eſpèce.
Planc. conch. min. nat. p. 43. *t.* 4. *f.* 6. Urtica ſoluta caryophyllum referens.

Actiniæ, *quibus pro ore & ano unica apertura data eſt, teſtaceis, piſciculis, aliis animalculis marinis victitant, ipſæ eſculentæ, nonnullæ perquam ſapidæ, forma ob tentacula nunc retracta, nunc magis minuſve exſerta mire variabili, abſciſſat partes redintegrant, lucem viridiſſime ſentiunt, plurimæ viviparæ.*

Habitat in Oceano europæo, *pulcherrima, nunc caſtanea, nunc ex luteo fuſca, nunc ex luteo virens, nunc alba; modo opaca, modo pellucidiſſima, faucis laciniis nunc albis, nunc ruſis, nunc aurantiis.*

judaica. 4. A. cylindrica lævis truncata, præputio interne undulato lævi.
Planc. conch. min. not. p. 43. *t.* 6. Colum marinum.
Habitat in mari mediterràneo.

effœta. 5. A. ſubcylindrica anguloſo-ſtriata.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *p.* 122. *t.* 14. *f.* 2.
Habitat in Oceano.

coccinea. 6. A. albo rubroque varia, cirris cylindricis annulatis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 1-3. *prodr.* 2794. *rar.* 2. *p.* 65.
Nov. act. nat. Cur. 6. *p.* 53. Actinia virginea.
Habitat rara in Norwegiæ ſinubus, *fucis lapidibuſque adhærens, cylindrica, truncata, glabra: margine ſupero tentaculorum conicorum alborum rubro annulatorum, duplici ſerie muricato, glande glabra: centro fiſſuris perforato.*

undata. 7. A. conica pallida, ſtriis duplicatis rugoſis fulvis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 4. 5. *rar.* 2. *p.* 66.
Habitat in Norwegiæ ſinu Chriſtianienſi, *fucis & millepore polymorphæ adhærens, truncatæ facie, porrecta cylindracea, retracta truncato-conica, tentaculis ex centro exeuntibus pallidis, pellucidis, longis.*

viduata. 8. A. griſea, ſtriis longitudinalibus cirriſque albis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 63. *f.* 6-8. *prodr.* 2799. *rar.* 2. *p.* 67.
Aldrov. zooph. p. 565. Urtica cinerea Rondeletii.
Habitat haud frequens in fuco ſaccharino maris norwegici, *conico-truncata, ſtrigis* 24, *aperturæ centro rugoſo rubro.*

truncata. 9. A. rufo-lutea conica glabra pellucida. *Müll. zool. dan. prodr.* 2795.
Dicquem. act. angl. 63. *p.* 387. *t.* 17. *f.* 13? Anémone de la troiſième eſpèce.
β) Actinia inteſtinalis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 350. *n.* 342.
Habitat in Oceano europæo.

nodoſa. 10. A. rugoſa ſulcata, utroque fine ampliori ſupero tuberculato cum cirris intermediis brevibus compreſſis coccineis.
O. Fabr. fn. groenl. p. 350. *n.* 341.

Habitat in maris Groenlandiam *alluentis profundis, fundo rupeſtri adhærens, 4 pollices longa, ex albo rubens, apertura cirrorum duplici ordine cincta.*

ſpectabilis. 11. A. cærulea lævis, cirris craſſis albo maculatis, foramine radiato. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 351. *n.* 342. b.
Habitat ad Groenlandiæ *littora, in cavernis rupium frequens, ad 2 pollices longa, ſtrigis longitudinalibus albo punctatis varia.*

ditata. 12. A. fulva punctis albis, cirris roſeis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2796.
β) Actinia craſſicornis. *O. Fabr. fn. groenl. p.* 348. *n.* 340.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis *rupibus littoreis in fiſſuris, β) tota mollis, lubrica, nunc lenticulæ magnitudine, nunc pollicem longa, albida, ſubgriſea vel rubicunda; lineis longitudinalibus albo punctatis.*

gigantea. 13. A. cinereo vireſcens, limbo plicato corpore multoties latiore, tentaculis papillæformibus vireſcentibus.
Forsk. fn. ar. ægypt. p. 100. *n.* 8. Priapus giganteus.
Habitat in mari rubro *ad littora vadoſa* Lahajæ & Moccæ, *in cœno ſabuloſo ſe recondens, 4 pollices longa, tentaculis apice violaceis.*

alba. 14. A. gelatinoſa albido-hyalina, tentaculis parvis papilliformibus oblongis.
Forsk. fn. æg. arab. p. 101. *n.* 9. Priapus albus.
Habitat in mari rubro, *lapidibus littoreis adhærens, vix pollicis diametro, vittis longitudinalibus obſcuris.*

viridis. 15. A. fuſco virens, tentaculis diametri longitudine.
Forsk. fn. æg. arab. p. 102. *n.* 11. Priapus viridis.
Habitat Alexandriæ *in* Ægypto, *lapidibus ſubmarinis inſidens, pollicis diametro, tentaculorum ſerie multiplici; ſub his glandulæ marginales.*

Priapus. 16. A. corpore cylindrico baſi dilatato, tentaculis maculatis.
Forsk. fn. æg. ar. p. 102. *n.* 12. Priapus Polypus.
Habitat in mari rubro *prope urbem* Ghomfoda, *teſtaceis adhærens, albida fuſco nebuloſa, ad 2 pollices longa, circulo circa os rubro, tentaculis diametro triplo brevioribus, exterioribus ruſeſcentibus, interioribus flavis.*

candida. 17. A. lævis foramine rugoſo, tentaculis ſetiformibus flexuoſis ad ſummum marginem diſpoſitis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 58. *t.* 115. *prodr. n.* 2798.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

bicornis. 18. A. hemiſphærico-ovalis glabra bicornis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2800.
Olafs. it. iſl. p. 900.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Volva. 19. A. corpore cylindrico ſuperne plano, appendicibus orificii ſex. *Müll. zool. dan. prodr.* 2801.
Olafs. it. iſl. 900. Gigarpuſſa.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus generis* ?

Caryophyllus. 20. A. rubro fuſca, tentaculis parvis penicilliformibus. *Martin in marine verm.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in mari britannico.

Iris. 21. A. corpore tentaculiſque obtuſis cylindricis: exterioribus rufis; interioribus cæruleis, centro albido. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 82. *f.* 5. 6.
Habitat in Oceano norwegico.

Fiſcella. 22. A. rugis longitudinalibus tranſverſim ſtriatis, tentaculis cylindricis obtuſis annulatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 13. *t.* 88. *f.* 3.
Habitat in mari norwegico.

puſilla. 23. A. elliptica lævis, radiis duplicis ordinis; exterioribus apice nigris. *Ol. Swarts n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in Oceano 57. *latitudinis*, *piſi majoris magnitudine*, *cataceorum pabulum.*

MAMMARIA. *Corpus* læve cirris nullis: apertura unica.

Mammilla. 1. M. conico ventricoſa alba. *Müll. zool. dan. prodr.* 2718.
Habitat in mari norwegico.

varia. 2. M. ovata, albo & purpureo varia. *Müll. zool. dan. prodr.* 2719.
Olafs. it. iſl. 900. Sættu Koppar i Sae.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Globulus. 3. M. globoſa cinerea. libera. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 329. *n.* 315.
Habitat frequens in Groenlandiæ *littore inter radices fucorum, terebellæ cirratæ cibus præcipuus, ſimpliciſſima, mollis, lævis, ſeſquilineæ diametro, gelatinoſa, cute tenuiſſima.*

PEDICELLARIA. *Corpus* molle pedunculatum: pedunculo rigido fixo, apertura unica.

globifera. 1. P. capite ſphærico, collo nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 52. *t.* 16. *f.* 1-5. *prodr.* 2782. *rar.* 1. *p.* 32.
Habitat inter echini Droebacenſis aculeos, *mucorem referens, capite rubeſcente, ceraſi facie, pedunculo ſpadiceo ſextuplo longiore: cute gelatinoſa hyalina.*

triphylla. 2. P. capite trilobo: lobis ſubquadrangularibus muticis, collo tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 20. *t.* 16. *f.* 6-9. *prodr.* 2781. *rar.* 1. *p.* 33.
Habitat rarior in echini Droebacenſis *aculeis, collo flexuoſo cyaneo, capitis lobis rubentibus aut hyalinis, interdum ovatis, pedunculo ſpadiceo.*

tridens. 3. capite trilobo; lobis ovalibus ariſtatis, collo tereti. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 54. *n.* 21. *t.* 16. *f.* 10-15.
Habitat frequens inter echinorum Droebacenſium *aculeos, collo lævi, hyalino, interdum rubente, lobis capitis interdum* 4, *collo triplo longioribus, rariſſime muticis: Pedunculus rubeſcens, collo triplo longior.*

189. TETHYS. *Corpus* liberum, oblongiuſculum, carnoſum, pedunculis nullis.
Os proboſcide terminali cylindrica, ſub labio explicato.
Foramina duo ad latus colli ſiniſtrum.

leporina. 1. T. labro ciliato.
Columm. aquat. 27. *t.* 26. Lepus marinus major.
Rondel. piſc. 526: Leporis marini tertia ſpecies.
Habitat in mari mediterraneo.

Fimbrica. 2. T. labro crenulato.
Bobadſch mar. 54. *t.* 5. *f.* 1. 2. Fimbria.
Habitat in mari adriatico.

PTEROTRACHEA. *Corpus* liberum, gelatinoſum, pinna gelatinoſa mobili ad abdomen vel caudam. *Oculi* duo intra caput.

coronata. 1. Pt. ventre caudaque pinniferis, capitis proboſcide tereti perpendiculari, frontis coronula aculeis decem. *Forsk. Fn. æg. ar. p.* 117. *n.* 41.
Habitat in mari mediterraneo & archipelago, *ſepithamæ fere longitudine, pollicis craſſitie, proboſcide* 2 *fere pollices longa, oculis ovalibus fuſcis, cauda verticali triangulari: lineis utrinque* 4 *aculeatis ſcabra, pinnula utrinque horizontali ſemicordata terminata, ventris pinna pone medium, orbiculari, & altera ſubtus in margine campanulata, hyalina.*

hyalina. 2. Pt. capite elongato porrecto lævi, pinnula centrali. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 118. *n.* 42.
Habitat in mari – – – *celerrime mota, vix pollicem longa; oculis fuſcis internis ad baſin capitis non coronati, pinnula ſubrotunda.*

pulmonata. 3. Pt. capite obtuſo hyalino, inteſtino reſpiratorio plumis ciliato. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 118. *n.* 43.
Habitat – – – – *ſubcylindrica, hyalino-ruſeſcens, capite a trunco non diſtincto, oculis pellucidis, tranſverſis, ovalibus, nigris, trunco ſubtus punctis albidis opacis vario: pinna ſubrotunda longitudinali, inteſtino reſpiratorio ante ſubalbido, pone ruſeſcente, inſinuato membro violaceo baſi fuſco, cauda hyalina, compreſſa, attenuata, dimidium pollicem longa.*

aculeata. 4. Pt. ventre aptero, cauda trunco longiore: lineis aculeatis pinnaque terminali horizontali. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 118. *n.* 44.
Habitat ad Archipelagi *ingreſſum,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, hyalina, nucleo opaco flaveſcente gelatina alba pellucida circumdato, cauda trunco plus duplo longiori enſiformi: pinna duplici ſemicordata.*

290. HOLOTHURIA. *Corpus* liberum craſſum, cylindricum. *Os* anticum inter tentacula ramoſa.

elegans. 10. H. tentaculis viginti racemoſis, corpore papilloſo ſupra rubeſcente, ſubtus albo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1-3. *prodr.* 2804. *rar.* 1. *p.* 3.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 205.
Gunn. act. Stockh. 1767. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat in mari norwegico, *aquam ſiphonis inſtar extrudens, ex foramine minori, 8-11. pollices longa, ex rubro alboque varia, papillis acuminato diſtantibus, dorſi in 6 ſeries digeſtis, tentaculis carnoſis albis, apice faſciculo fibrarum intus noduloſarum inſtructis.*

frondoſa. 1. H. tentaculis frondoſis, corpore lævi. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 344.
Gunner. act. Stockh. 1767.
Habitat in Oceano norwegico, *ovato oblonga, tentaculis* 10. *capite longioribus, foraminibus pone caput* 3 *approximatis &* 1. *laterali magis remoto.*

Phantapus. 2. H. tentaculis ramoſis, corpore poſterius attenuato ſubtus punctis ſcabro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 54. *t.* 112. 113. *prodr.* 2804.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1089. *n.* 2. Holothuria tentaculis ramoſis, corpore ſubſquamoſo trifariam punctato.
Aldr. zooph. p. 590. Pudendum miſſum a Sittardo, Epipetrum quorundam.
Geſn. Fiſchb. 2. *p.* 24. Pudendi marini alia ſpecies.
Act. Stockh. 1765. *p.* 265. *t.* 10.
Habitat in mari norwegico & mediterraneo, *ovata, ſubtus plana, poſterius conica, apice perforato, tentaculis* 10 *retractilibus.*

tubuloſa. 3. H. tentaculis vinginti racemoſis, corpore ſupra papilloſo, ſubtus tubuloſo.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1090. *n.* 3. Holothuria (tremula) tentaculis faſciculatis, corpore papillis hinc ſubconicis illinc cylindricis.
Rond. zooph. c. 17. *Aldr. zooph. p.* 508. Holothurii prima ſpecies.

Jonſt. exang. p. 56. *c.* 2. *t.* 19. *f.* 1. & *p.* 57. *c.* 4. Holothurius Rondeletii.
Aldr. zooph. p. 590. Epipetro zoographi ſimile, & *p.* 589. Genitale.
Bell. aq. p. 441. Genitale marinum.
Columu. aq. 16. Pudendum regale piſcatorium.
Planc. conch. min. not. 103. *t.* 8. *f.* A. B. & *vandell. diſſ. p.* 89. *t.* 3. *f.* 1-3. Mentula marina.
Bohadſch. anim. mar. p. 75. *t.* 6. & *t.* 7. *f.* 1-5. Hydra.
Forsk Fn. ægypt. ar. t. 39. *f.* A. Fiſtularia.
Geſn. Fiſchb. anh. 4. *p.* 82.
Habitat in mari mediterraneo & adriatico, *an hæc, quæ teſte Ill.* Pallas *ſiccata Sinenſibus in cibum cedit?*

Phyſalis. 4. H. cirris difformibus filiformibus pendulis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 254. *t.* 3. *f.* 6.
Rumpf. muſ. 49.? Holothuria.
Sloan. jam. 1. *p.* 7. *t.* 4. *f.* 5. Urtica marina ſoluta purpurea oblonga, cirris longiſſimis.
Brown. jam. 386. Arethuſa criſta ſubrubella venoſa.
Osb. it. 284. *t.* 12. *f.* 1. Phyſalis pelagica.
Habitat in pelago, mari atlantico, *ovata, ſubtrigona, hyalina, dorſo acuto obſcure viridi, anterius rufeſcens;* roſtrum *ſpirale rufeſcens;* tentacula *plurima inæqualia alia teretia, craſſiora breviora, alia media capillaria: apice luteo globoſo, alia longiora filiformia.*

Thalia. 5. H. criſta compreſſa: lineis lateralibus integris.
Brown. jam. 384. *t.* 43. *f.* 3. Thalia oblonga, criſta perpendiculari compreſſa quadrata: lineis læteralibus integris.
Habitat in pelago americano; *an hujus generis?*

caudata. 6. H. caudata, criſta compreſſa: lineis lateralibus interruptis.
Brown. jam. 384. *t.* 43. *f.* 4. Thalia oblonga caudata, criſta depreſſa rotundata: lineis lateralibus interruptis.
Habitat in pelago; *an hujus generis?*

denudata. 7. H. deſtituta criſta caudaque.
Brown. jam 384. Thalia oblonga lineis interruptis, cauda & criſta deſtituta.
Piſ. braſ. 296. Moucicòu.
Habitat in pelago americano; *an hujus generis?*

pentacta. 8. H. tentaculis denis, corpore quinquefariam verrucoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 110. *n.* 50. *t.* 31. & 3. *p.* 45. *t.* 108. *f.* 1-4.

prodr. 2806. *rar*. 1. *p*. 71. *O. Fabr. Fn. groenl. p*. 352. *n*. 343.
Plin. hiſt. nat. l. 9. *c*. 2. *Rondel. piſc*. 2. *c*. 25. *Aldrov. zooph. p*. 593. *Geſn. Fiſchb. anh*. 4. *p*. 85. *Johnſt. exang. c*. 5. *t*. 20. Cucumis marinus.
Vandell. diſſ. p. 87. *t*. 2. *f*. 12. Cucumer marinus.
Planc. conch. min. not. p. 99. *t*. 6. *f*. D. E. F. *Comm. Bonon*. V. *p*. 242. *t*. 2. *f*. 1-3. Echinus coriaceus ad os fimbriatus.
Hill. hiſt. an. t. 5. Aphrodita quarta.
Olaſſ. iſl. 2. *p*. 900. Brimbatus.
Penn. act. angl. 1761. *p*. 75. *t*. 1. *f*. 3. A. B. Hydra coralliflora, tentaculis retractilibus frondoſis.
Dicquemar. journ. de phyſ. Oct. 1778. *p*. 287. *t*. 11. *f*. 1-6. Fleurilarde.
Habitat in mari europæo *omni, ad 6 uſque pollices longa, in fundo maris decurrens, & longe a littoribus natans, vivipara, lævis, ex viridi brunnea, tentaculis apice rubicundis, cute craſſa*.

papilloſa. 24. H. tentaculis decem frondoſis, corpore ovato undique papilloſo. *Müll. zool. dan*. 3. *p*. 47. *t*. 108. *f*. 5.
Habitat in ſinubus inſularum Faeroe.

Spallanzani. 25. H. tentaculis 96 filamentoſis. *Spallanzan. act. ſoc. ital*. 2.
Habitat in mari mediterraneo.

Priapus. 9. H. ore papillis carnoſis, corpore ſtriis annularibus glandis longitudinalibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p*. 355. *n*. 347.
Amœn. acad. 4. *p*. 255. Priapus (humanus) cylindricus ſtriis annularibus, glande ſtriis longitudinalibus elevatis.
Müll. zool. dan. 3. *p*. 27. *t*. 96. *f*. 1. *prodr. n*. 2807.
Abildg. Schr. berl. Naturf. 9. *p*. 133. *t*. 3. *f*. 1.
Habitat in Oceano indico & ſeptentrionali, mari *quoque me*diterraneo, *ad 6 pollices longa, cotti gobionis eſca: Pars dimidia cylindrica ſtriis numeroſiſſimis annularibus exarata oſculo terminatur, ſtriis 3 rugoſis cincto, & faſciculum tentaculorum oblongum protrudente, altera obovata glandiformis ſtriis 24 longitudinalibus, parallelis, elevatis, diſtantibus, ciliato-ſcabris exarata, oſculo concavo*

Holothuriæ *omnes maris incolæ per aperturam anteriorem nutrimentum hauriunt, & fæces expellunt, per poſteriorem aquam ingreſſam ejiciunt, veram figuram non raro diu occultantes & tentaculis nunc emiſſis, nunc retractis mutantes, corpus quoque ipſum nunc expendendo, nunc contrahendo*.

ſtria annulari excavata cincto, intus aculeis plurimis recurvis: exterioribus majoribus. An hujus generis?

ſquamata. 11. H. tentaculis octonis ſubramoſis, corpore ſupra ſcabro, ſubtus molli. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 35. *n.* 10. *t.* 10. *f.* 1-3. *prodr.* 2810. *rar.* 1. *p.* 20. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 356. *n.* 348.

Nov. act. nat. Cur. 6. *p.* 54. Actinia ſquamata.

Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 244. *t.* 7. *f.* 34-37. Aſcidia ſquamata.

Habitat in Norwegiæ *ſinubus*, mari, Groenlandiam & *inſulas* Kurilas *alluente*, *ſaxis tenaciſſime adhærens*, *variæ magnitudinis.*

Penicillus. 12. H. tentaculis racemoſis octo, corpore oſſeo pentagono. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 39. *n.* 11. *t.* 10. *f.* 4. *prodr.* 2808. *rar.* 1. *p.* 21.

Habitat in Norwegiæ *ſinus* Droebacenſis *fundo limoſo profundo*, *immobilis*, *ventricoſa*, *lævis alba*, *torque fuſco*, *ad margines nigro*, *annuloque pone tentacula carinata ex nigro flava*, *parallelo*, *pallido*, *grenulato.*

Fuſus. 13. H. tentaculis denis, corpore fuſiformi tomentoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 37. *n.* 12. *t.* 10. *f.* 5. 6. *prodr.* 2809. *rar.* 1. *p.* 22.

Habitat in Norwegiæ *ſinus* Droebacenſis *limo profundo*; *cinerea*, *ſquamis minutis rugoſa*, *fibriſque breviſſimis obſita*, *corpus cavum cyathiforme protrudens*, *infra collo anguſto inſtructum*, *ſupra in orbiculum foramine medio nigro pertuſum dilatatum*, *tentaculis latere denticulatis.*

inhærens. 14. H. tentaculis duodenis corpore papilloſo ſexfariam lineato. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 109. *n.* 49. *t.* 31. *f.* 1-7. *prodr.* 2811. *rar.* 1. *p.* 70.

Forsk. Fn. æg. arab. p. 121. *t.* 38. *f.* A. Fiſtularia (reciprocans) tentaculis lineari lanceolatis utrinque ramoſis.

Habitat in Norwegiæ ſinuum *profundo*, *etiam in* mari rubro, *aliquando a* piſcibus *deglutita*, *papillis viſcoſis innumeris obſeſſa*, *quorum ope manui contingenti firmiſſime adhæret*, *porrecta*, *pellucida*, *ſpadicea*: *faſciis albis*, *tentaculis carnoſis*, *lanceolatis*, *rubris*, *utrinque denticulatis.*

lævis. 15. H. elongata, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam lineato punctatoque. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 353. *n.* 345.

Habitat ad ſcopulos maris Groenlandiam *alluentis in fundo argilloſo, quem tranat, & in quem ſe condit, tentacula ſena alternatim exſerens, mollis, lævis, candida, pellucida,* 1–6 *pollices longa, tentaculis mollibus, albidis, apice octofidis.*

minuta. 16. H. oblonga, tentaculis duodenis, corpore quinquefariam papillato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 354. *n.* 346.

Habitat ad littora Groenlandiæ *in fundo arenoſo papillas extendendo lente incedens, lævi proxime affinis,* 4 *lineas longa, glabra, ſubmembranacea, albida, rarius ſubrubicunda, papillis ſingularum ſerierum denis, tentaculis flavicantibus apice ſexfidis.*

forcipata. 17. H. ventricoſa, fine utroque anguſtato conico: anteriore forcipato. *O. Fabr. Fn. groenl.* 357 *n.* 349.

Habitat in fundo maris Groenlandiam *alluentis argilloſo, a cotto ſcorpio ſæpe comeſta,* 5 *pollices longa, mollis, lubrica, cute tenui punctis innumeris parum eminentibus ſubaſpera, forcipis rigidæ orichalceæ cruribus curvis.*

zonaria. 18. H. oblonga depreſſa, vagina incarnata, ſacco ex albido hyalino, zonis quinque luteis vario. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 26. *t.* 1. *f.* 17. A. B. C.

Habitat in mari, *inſulam* Antiguam *alluente, oris tranſverſi labiis extrinſecus prominulis hiantibus.*

vittata. 19. H. corpore molli laxo vittis albis fuſca punctatis vario, tentaculis lineari: lanceolatis ad latera dentatis.

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 121. *n.* 48.

Habitat in mari rubro *ad* Lohajam, *frequens inter zoſteras, papillis ſuis viſcoſis digito contrectanti firmiter adhærens ſeſquiſpithamali, vittis* 5 *albis nigro punctatis, rarius interruptis, & fuſcis albo-guttatis alternatim anguſtis, tentaculis* 12, *medio fuſcis, ad latera pallidis.*

maxima. 20. H. corpore rigido ſubtetragono ſupra convexo ſubtus plano marginato albo, tentaculis filiformibus apice peltato-laciniatis.

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 121. *n.* 50. Fiſtularia maxima.

Habitat in maris rubri *littore, pedalis, dura, papillis ſcabra, tentaculis cinereo-hyalinis.*

impatiens. 21. H. corpore rigido cinereo, tentaculis viginti filiformibus: apice pelta ſubſeptemfida denticulata.

Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 121. *n.* 51. Fiſtularia impatiens.
Habitat ad maris rubri *littora ſub lapidibus vel in poris ſpongiæ officinalis, diuriuſcula, cinerea, faſciis maculiſque varia, verrucis hemiſphæricis approximatis medio albidis aſpera, tentaculis hyalinis, nigro-punctatis, obtuſe denticulatis.*

nuda. 22. H. orbicularis cærulea, criſta nulla, tentaculis diſci nudis, radii trifariam glandiferis.
Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 103. *n.* 14. Holothuria denudata.
Habitat in mari mediterraneo *a* Maſſilia *ad* Moliten, *diametro digiti tranſverſi, paginæ ſuperioris diſco albido ſtriis concentricis radiato, margine diſci limboque cæruleo, tentaculis filiformibus hyalino-cæruleſcentibus;* utrum propria *ſpecies* hujus *generis, an meduſa umbella?*

ſpirans. 23. H. ovalis cærulea oblique criſtata, ſubtus tentaculis diſci albis, radii longioribus nudis cæruleis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 104. *n.* 15.
Habitat in mari mediterraneo, 2 *pollices longa, eſculenta, diu in aqua aſſervata aquam cæruleo colore inficiens, exuviis ſuis oniſcis & monoculis in habitaculum cedens, ſupra in umbonem albidum protuberans, criſta bipartita ſemiorbiculari, tentaculis filiformibus, mobiliſſimis;* utrum diſtincta hujus *generis ſpecies, an meduſa velella?*

LOBARIA. *Corpus* ſupra convexum ſubtus planum, lobatum.

quadriloba. 1. L. cauda lobalata. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 30. *t.* 100. *f.* 1-5. *prodr.* 2741.
Aſcanius act. Stockh. 1772. 4. 5. *t.* 10. *f.* A. B. Philina quadripartita.
Habitat in mari ſeptentrionali.

292. TRITON. *Corpus* oblongum.
Os proboſcide involuta ſpirali.
Tentacula XII. bipartita, utrinque ſex: poſterioribus cheliferis.

littoreus. 1. TRITON.
Habitat in rupium *ſubmarinarum foraminibus, in lepadibus obvius, tentaculorum articulatorum involutorum intror-*

ſum ciliatorum paribus ſex, poſterioribus tribus chelíferis, ad baſin tentaculorum os; inter extrema proboſcis. Figura ſimilis v. act. angl. 50. v. 2. p. 847. t. 34. f. A. Leeuwenh. arcan. 465. f. 7.

293. LERNÆA. *Corpus* oblongum teretiuſculum nudum, tentaculis 2-3 teretibus brachia æmulantibus ſe affigens.

Ovaria bina, tanquam totidem caudæ.

branchialis. 1. L. corpore tereti flexuoſo, ore laterali inter cornua tria ſubramoſa.
Müll. zool. dan. 3. p. 65. t. 118. f. 4. prodr. 2743. O. Fabr. Fn. groenl. p. 336. n. 325. Lernæa gadina.
Stroem. ſondm. 1. p. 209. t. 1. f. 18. Tokn trold.
) Lernæa minor. *Koelreuter comm. ac. Theod. Palat. 3. p. 57.*
Habitat in Oceani ſeptentrionalis gadorum *branchiis, Groenlandis eſculenta, digiti minimi longitudine, cava, membranacea, anterius & poſterius eminens, ſordide alba, vel obſcure rubra, cauda ſulco perpendiculari terminata, collo longo tubulari filiformi, ovariis ex cirris 2 longis contortuplicatis.*

cyprinacea. 2. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurco, tentaculis apice lunatis. *Fn. ſuec. 2100. t. 2. f. 2100.**
Fn. ſuec. 1. n. 1282. f. 1282. Lernæa tentaculis quatuor, duobus apice lunatis.
Habitat in piſcinis *frequens ſupra corpus* cyprini caraſſii, *quod maculis rubris vulnerat.*

ſalmonea. 3. L. corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus linearibus approximatis. *Fn. ſuec. 2102.**
Müll. zool. dan. prodr. 2744. O. Fabr. Fn. groenl. p. 337. n. 327. Lernæa corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus in orbiculum cartilagineum connatis.
Brander piſc. cumoënſ. 25. t. 1. f. 1.
Giſter. act. Stockh. 1751. p. 185. t. 6. f. 1-5. Pediculus ſalmonis.

Habitat in ſalmonum, *rarius in* gadi barbati *branchiis, congeneribus vividior, 6 lineas longa, pallida, mollis capite parvo, oblongo convexiuſculo, labiis 2 horizontalibus; ſuperiori uncinis 2 mobilibus rigidis armato, inferiori breviori biſido, abdomine obovato latiori, ovariis candidioribus, teretibus, intus granulatis, magnitudine totius animalis.*

aſellina. 4. L. corpore lunato, thorace cordato. *Fn. ſuec.* 2101. *It wgoth.* 171. *t.* 3. *f.* 4. Lernæa, cauda duplici tereti. *Habitat in* Oceani ſeptentrionalis gadi *branchiis.*

huchonis. 5. L. corpore nodoſo, tentaculis duobus, ovario duplici poſterius adnato. *Schranck it. bavar. p.* 99. *t.* 2. *f.* A. D. *Habitat in* ſalmonis huchonis branchiis *frequens, ſalmoneæ aſſinis, candidiſſima, ſubcartilaginea.*

clavata. 6. L. corpore cylindrico ſubſinuato triplicato infra apicem roſtri. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 119. *n.* 54. *t.* 33. *f.* 1. *prodr.* 2853. *rar.* 1. *p.* 75.

Habitat in percæ norwegicæ *pinnis, branchiis, ore, oculis, candida, pellucida, lineis rubris picta, collo anguſto, flaveſcente, apice acuminato, incurvo, nodoſo, ovariis tubuloſis: ovis extrinſecus adhærentibus.*

uncinata. 7. L. corpore ſubcordato, roſtro ſimplici curvo, ore terminali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 120. *n.* 55. *t.* 33. *f.* 2. *prodr.* 2745. *rar.* 1. *p.* 76. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 338. *n.* 328. *Habitat in* maris groenlandiam *alluentis* gadorum *variorum pinnis & branchiis, mollis, pallida, dorſi medii ſulco longitudinali, ovariis rotundis, apicem verſus incraſſatis.*

gobina. 8. L. corpore rhomboidali, brachiis duobus anterioribus totidemque poſterioribus nodoſis, cornubus duobus arietinis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 121. *t.* 33. *f.* 3. *prodr.* 2747. *rar.* 1. *p.* 77. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 339. *n.* 329. *Habitat in* cotti gobionis *branchiis, 7 lineas longa, ex albo cæruleſcens, inteſtino ſuperne tranſlucente obſcuro, depreſſa, ſubtus ſubconcava, oris inter cornua 2 curvata intermedii labiis 3, ano biſido, ovariis ſpiralibus, tereti ſubulatis.*

Lernææ, *oculis carentes piſcibus infeſtæ, quorum ſanguinem ſugunt, in pinnis potiſſimum & branchiis fixæ, oreque ſuo, corpore perpendiculari erecto, ovariis rigidis protenſis immobiliter & tenaciſſime adhærentes.*

radiata. 9. L. corpore quadrato depreſſo, brachiis utrinque tribus, cornubus quatuor rectis. *Müll. zool. dan. 1. p. 122. n. 57. t. 33. f. 4. prodr. 2748. rar. 1. p. 78. O. Fabr. Fn. groenl. p. 340. n. 330.*

Habitat in coryphænæ rupeſtris *oris angulis, rarior, lernææ ab* Ariſtotele & Rondeletio *in* thynno *obſervatæ proxima, 11 lineas longa, ſordide alba vel cinerea, tuberibus ſolidioribus lacteis inæqualis, ad latera crenata, capite depreſſiuſculo rotundato, ſubtus convexiori, papillis crebris minutis inæquali.*

nodoſa. 10. L. corpore quadrato tuberculato, brachiis ſubtus breviſſimis utrinque duobus. *Müll. zool. dan. 1. p. 123. n. 58. t. 33. f. 5. prodr. 2749. rar. 1. p. 79. O. Fabr. Fn. groenl. p. 341. n. 331.*

Habitat in percæ norwegicæ rictu, *radiata minor, mollis, dilute cinerea, ſupra convexa, ſubtus concava, medio dorſo tuberculis 4 duris lacteis inæquali, dentibus utrinque 5 pariter lacteis, capite rotundato, per ſtriam mediam candidam bipartito.*

cornuta. 11. L. corpore oblongo, brachiis quatuor rectis emarginatis, capite ſubovato. *Müll. zool. dan. 1. p. 124. n. 59. t. 33. f. 6. prodr. 2750. rar. 1. p. 80.*

Habitat in pleuronectis Plateſſa & Linguatula, *cute pellucida circumdata, verticis mucronibus, frontis cornubus 2, his dente ſolitario armatis, oris palpis 2, ovariis fuſcis: ovis ſpadiceis.* Zoega.

pectoralis. 12. L. capite orbiculato hemiſphærico, abdominis obcordati papilla terminali truncata. *Müll. zool. dan. 1. p. 125. n. 60. t. 33. f. 7. prodr. 2751. rar. 1. p. 81.*

Habitat in pleuronectarum & æglefini *pinnis, potiſſimum pectoralibus, monoculo piſcino ſimilis, alba, diaphana, punctis pullis adſperſa, verticis mucronibus 2 falciformibus, roſtro conico truncato: cornibus 4 minutis, mucronibus 2 breviſſimis, & prope mucronem 3 conicum palpis 2, brachiis 2 non curvatis, ovariis anguſtioribus ſubannulatis diametri inæqualis.*

lotæ. 13. L. ovariis quaternis inæqualibus. *Hermann Naturf. 19. p. 44. t. 2. f. 6.*

Habitat in gadi lotæ *branchiis, oris uncinulis 2, appendicibus cruciatis 4.* Zujef.

14. L.

cyclopterina. 14. L. corpore tereti flexuoſo, orificio duplici in medio roſtri cornibus tribus tripartitis terminati. *Müll. zool. dan. prodr.* 2745. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337. *n.* 326.

β) Lernæa minor, ovariis vireſcentibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 337.

Habitat in cyclopteri ſpinoſi, β) *in* liparis branchiis, *branchiali affinis, cornu tamen tenui ſurſum verſo, apice integro, cauda anguſtiori: lobis utrinque 2 convexis, ovariis ſimplicibus ſpiralibus, in longitudinem 5 pollicum extenſilibus.*

pinnarum. 15. L. rufa capite cylindrico anterius roſtrato, tentaculis duobus lunatis apice bifidis, brachio unico. *J. Chr. Fabr. it. norw. p.* 282. *n.* 3.

Habitat in gadi barbati *pinnis dorſalibus, depreſſa, carnoſa, dorſo canaliculato, brachio cylindrico dorſo antrorſum inſecto in canali recondendo, ovariis elongatis cylindricis.*

294. SCYLLÆA. *Corpus* compreſſum: dorſo canaliculato.

Os foramine edentulo terminali.

Tentacula ſ. *Brachia* ſubtus trium parium.

pelagica. 1. Sc. fixa, tentaculis extremis ſimilibus, mediis papilloſis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1094. Scyllæa.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 56. Lepus pelagicus.
Osb. it. 306. Zoopterygius.
Seb. muſ. 1. *t.* 74. *f.* 1.

Habitat in pelagi fuco natante, *cui foſſula dorſi crenata affigitur, quieſcens, oblonga, dorſo retrorſum latiore obtuſo, tentaculis extremis minoribus rotundioribus, mediis foliaceis oblongis repandis, obtuſioribus.*

ghomfodenſis. 2. Sc. vaga, tentaculis primis nudis apice cavis, reliquis introrſum vittis ramoſis. *Forsk. Fn. ægypt. ar. p.* 103. *n.* 13.

Habitat parcius in mari rubro *inter* Ghomfodam & Djeſan, *pollicaris, pellucida, flaveſcens: punctis ex fuſco ferrugineis, dorſo plano, ad margines fuſco punctato, ſerie media longitudinali punctorum cæruleorum, cauda compreſſa, dorſo in carinam rotundatam repandam*

margine fuſceſcentem anterius utrinque vittis ramoſis parvis conſpicuam elevato, abdomine cæruleo-punctato, utriuſque lateris medio ſerie papillarum 5 albarum aſpero, tentaculis primis minoribus obovatis, reliquis contiguis margine denticulato repandis.

295. CLIO. *Corpus* vaginatum natans oblongum, brachiis duobus dilatatis membranaceis.
Tentacula tria præter duo in ore.

caudata. 1. Cl. vagina compreſſa caudata.
Brown. jam. 386.
Habitat in Oceano.

pyramidata. 2. Cl. vagina triquetra pyramidata, ore oblique truncato.
Brown. jam. 386. *t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Oceano.

retuſa. 3. Cl. bitentaculata, ore horizontali bidentato, cauda acuminata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 334. *n.* 324. *nov. act. Hanv.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1094. *n.* 3. *Müll. zool. dan. prodr.* 2742. Clio vagina triquetra, ore horizontali.
Brown. jam. 136.
Habitat in Oceano, *ſeſquipollicem longa, gelatinoſa, pellucida, in aqua cæruleſcens, utroque fine coccineo, meduſarum ſocia, omni anni tempore obvia, brachiis ſ. alulis ſuis tanquam remis utens, anarhichæ, cyclopteri, lari tridactyli frequens cibus, capite anguſtiore globoſo, ſulco longitudinali in 2 buccas diviſo; os terminale labio utrinque inſtructum dentibus 3 aperto ore ſtellatis armatum, interiori apertura alia dentibus 4 minoribus cruciatis munita, tentaculis ad os 2 mollioribus;* thorax *fere globoſus brachiis ſive alis ſubmembranaceis, gula fulva.*

borealis. 4. Cl. albida, capitis lobis papilla carnea acuminata terminatis, tentaculis tribus carnoſis conicis ori appoſitis. *Pall. ſpic. zool.* 10. *p.* 28. *t.* 1. *f.* 18. 19.
Habitat in mari hyperboreo, *mollis, balænarum, ut fertur, eſca, cute ſcabriuſcula, capite ſubdidymo, ore bilabiato, tentaculis duobus minutis intra os, appendicibus foliaceis prope caput ſubtus quaternis, cauda vacua, expreſſa, acuta; an diſtincta a retuſa ſpecies?*

helicina. 5. Cl. nuda corpore ſpirali. *Phipps it. bor. p.* 195. *Martens Spitzb. p.* 141. *t.* Q. *f.* e. Snail ſlime-fiſh. *Habitat numeroſiſſima in* Oceano boreali, *piſi magnitudine, alis ovatis, obtuſis, expanſis, corpore majoribus.*

limacina. 6. Cl. nuda, corpore obconico. *Phipps it. bor. p.* 195. *Mart. Spitzb. p.* 169. *t.* P. *f.* 5. *Habitat numeroſiſſima in* mari boreali; *an diverſa a boreali? An hujus generis eſt vermis marinus, a* de la Martinière, *Journ. de phyſ.* 1787. *Nov. p.* 366. *deſcriptus & t.* 2. *f.* 15. 16. *delineatus?*

296. SEPIA. *Corpus* carnoſum: vagina excipiente pectus, ad cujus baſin tubus.
Brachia (præter bina tentacula pedunculata in pleriſque) octo interius adſperſa cirris verrucoſis.
Os inter brachia terminale, corneum.

octopus. 1. Corpore ecaudato, tentaculis pedunculatis nullis. *Muſ. Ad. Fr.* 1, *p.* 94.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2813. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 204. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 351. *Haſſelq. act. Upſ.* 1750. *p.* 33. Octopodia. *Jonſt. exang.* 5. *t.* 1. *f.* 1. *Seb. muſ.* 3. *t.* 2. *f.* 1-6. *Koelreut. act. petrop.* 7. *p.* 321. *t.* 11. 12. Polypus. *Rond. piſc.* 513. Polypus octopus. *Bell. aq.* 330. *t.* 331. *Habitat in* mari, *a* mediterraneo *&* rubro *ad* Groenlandiam *uſque, cibo ex ſuo condimento, quod coctione addito nitro in rubrum vertitur appoſito* Liſter. *aliquando firmiſſime adhærens corporibus, ut in humano inflammationem & dolores atroces excitet; brachiis baſi quaſi palmatis, verrucis ſeſſilibus alternis in* 2 *ſeries digeſtis, abdomine ovato, convexo molli, pinnis lateralibus nullis, aperto tantus effulſit ſplendor, ut remota veſpere candela totum palatium ardere videretur.* Bartholin. *act. Haſn.* 5. *obſ.* 109.

offi[illegible]na- 2. S. corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *Fn. ſuec.* 2106. *Amœn. acad.* 1. *p.* 325*. Sepia. *Seb. muſ.* 3. *t.* 3. *f.* 1-4. Sepia.

Geſn. aquat. 851.
Aldrov. exſang. 44.
Bellon. aquat. 336.
Rondel. aquat. 1. *p.* 498.
Olear. muſ. 97. *t.* 97.
Habitat in Oceano, & mari mediterraneo, *pleuronectæ limandæ, balænarum frequens præda, a congris quoque ejus brachia rodi, at, ſicut lacertus caudam, renaſci,* Plinius *refert hiſt. mund. l.* 9. *c.* 29. *Huic, quemadmodum ſequentibus, ſquama dorſalis oſſea, os ſepiæ vulgo dicta, & atramentum, quo effuſo hoſti perſequenti ſe occultat, quo litteræ pingi, alia tingi poſſunt.*

ungui-culata. 6. S. corpore ecaudato, brachiis unguiculatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 174.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, rarior, ſapidiſſima, brachiis loco verrucarum unguiculis armatis in proprias vaginas retractilibus.*

hexapus. 7. S. corpore caudato quadri-vel quinquearticulato, brachiis ſex. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 175.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, circiter ſemipedalis, digiti indicis craſſitie, capite difformi breviſſimo, brachiorum verrucis minimis, manum contrectantem per breve temporis ſpatium rigefaciens.*

media. 3. S. corpore depreſſo caudato ancipiti.
Rondel. piſc. 508. Loligo parva.
Habitat in Pelago, *officinali ſimilis, at latera membrana acuta non longitudinali, ſed ad dimidium modo affixa.*

Loligo. 4. S. corpore ſubcylindrico ſubulato, cauda ancipiti-rhombea. *Fn. ſuec.* 2107. *Osb. it.* 66.
Rondel. piſc. 506. *Stroem. ſondm. p.* 1. 173. Loligo.
Bellon. aquat. 339.
Seb. muſ. 3. *t.* 4. *f.* 1-4. & *t.* 3. *f.* 5. 6.
Olear. muſ. 44. *t.* 26. *f.* 2.
Needh. microſc. 1. *t.* 12.
Monro ſtruct. & phyſiol. piſc. n. 12.
Habitat in pelago, *media quaſi inter piſces & vermes, corde triplici, arteriis aorta & pulmonali valvula munitis, aqua infuſcata effuſo atramento, bilis ſpecie, ſe abſcondens, cauda tamen extra aquam exſiliente, oniſcis, cancris, meduſis victitans, phocarum & monodontis præda, ad 9 pollices longa. Hujus ſquama dorſalis oſſea a* Seba *muſ.* 3. *p.* 40. *t.* 16. *f.* 9. *nomine*

Pennæ marinæ maximæ *delineata*, & *in Syſt. nat.* X. *p.* 108. *n.* 230. *inter pinnas relata eſt.* Pinna (pennacea) pellucida pennam referens.

Sepiola. 5. S. corpore poſterius alis duabus ſubrotundis. ✝
Jonſt. aquat. t. 1. *f.* 8. Sepiola.
Rondel. piſc. 519.
Habitat in mari mediterraneo, *parva.*

tunicata. 8. S. corpore toto tunicæ nigræ pellucidæ incluſo, poſterius alis duabus ſemicinularibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 174.
Habitat in mari pacifico, *regnum* Chilenſe *alluente, ſapidiſſima, magna, ut* 150 *libras æquare interdum pondere feratur.*

LUCERNARIA. *Corpus* gelatinoſum, rugoſum, ramoſum. *Os* inferum.

quadricornis. 1. L. corpore elongato tortili, brachiis quatuor dichotomis, apice tentaculatis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 147. *n.* 72. *t.* 39. *f.* 1-6. *prodr.* 2754. *rar.* 1. *p.* 102. *Leske Naturg.* 1. *p.* 508. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat in maris norwegici *fucis, hydris monoculiſque minimis victitans, capite oculiſque carens, aſteriis affinis, fuſca, pellucida, tetragona: angulis ſingulis in brachium exeuntibus, cujus ſinguli rami faſciculo* 30-40 *tentaculorum terminantur, caudà media flexuoſa in multas plicas compoſita, baſi incraſſata, ſenſim attenuata, apice obtuſa, tentaculorum inſtar extenſili, & in omnes partes mobili, ore albo cinereo-ſtriato quadridentato.*

phrygia. 2. L. corpore elongato papilloſo, brachiis numeroſis globiferis in hemiſphæria deflexis, baſi byſſo fixa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 343. *n.* 233.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis profundo, locum vix, formam ſæpius mutans, hydris perquam affinis, ſemipollicaris, rubicunda, globulis papilliſque albidioribus, collo erecto craſſo papillis innumeris exſertilibus obſito, ipſo exſertili, brachiis tenuibus, brevibus, implicatis.*

Auricula. 3. L. lagenam referens, collo tereti, extremitate ampliori: faſciculis octonis tentaculorum cincta. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 341. *n.* 332.

Müll. prodr. zool. dan. 2817. Holothuria lagenam referens, tentaculis octonis faſciculatis.
Habitat in mari Groenlandiam *alluentis profundo, ulvarum maximarum foliis pertinaciſſime adhærens, raro locum mutans, oniſcis victitans, ad ſeſquipollicem uſque longa, nigra aut rubicunda, rarius ex brunneo aurea nitens, lubrica, glaberrima, margine tuberculis 8 granulatis cincto, quæ prolongata totidem faſciculos tentaculorum* 60 *& ultra nigrorum apice alborum referunt, ore albo.*

297. MEDUSA. *Corpus* gelatinoſum, orbiculatum, depreſſum. *Os* ſubtus centrale.

* *corpore coſtata: coſtis ciliatis*, Bercæ Mülleri.

Infundibulum. 13. M. ovata, coſtis ciliatis novem. *Müll. prodr. zool. dan.* 2816. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 352.
Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 111. *n.* 29.
Syſt. nat. X. 2. *p.* 660. Meduſa Beroë.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1324. *n.* 1. Volvox (Beroë) ovatus, angulis ciliatis novem.
Baſter opuſc. ſubſ. 3. *p.* 123. *t.* 14. *f.* 5. Meduſa ovata.
Brown. jam. 384. *t.* 43. *f.* 2. Beroë.
Mart. Spitzb. t. p. *f.* h.
Habitat in mari ſeptentrionali, rubro, mediterraneo.

Pileus. 14. M. globoſa, coſtis octo cirriſque duobus ciliatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2817. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 360. *n.* 354.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1325. *n.* 2. Volvox (bicaudatus) octagonus, tentaculis duobus elongatis.
Gron. act. helv. 3. *p.* 36. Beroë corpore octagono tentaculis longiſſimis.
Baſt. opuſc. ſubſ. 3. *p.* 126. *t.* 14. *f.* 6. 7.
Mart. Spitzb. t. p. *f.* g.
Habitat in mari ſeptentrionali.

Cucumis. 15. M. oblonga, coſtis octo ciliatis, cirris nullis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 361. *n.* 353.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente, minus vivida, cilia coſtarum movendo tarde ingrediens, tacta in pomi figuram ſe contrahens, cæruleo intermiſto alba, punctis multis ſanguineis conſperſa, aperturis* 2 *terminalibus in cavitatem medium oblongam coëuntibus.*

Ovum. 16. M. ovata, coſtis ciliatis octo, cirrorumque duobus paribus: altero longiſſimo. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 362. n. 355.*

Habitat in Groenlandiæ *ſinubus, pileo affinis, avi columbini, rarius anatini magnitudine oniſcis victitans, cyclopteri lumpi frequens præda, ſatis vivida fragiliſſima: fragmentis adhuc vivis, cærulea.*

** *corpore lævi.*

Porpita. 1. M. ſupra plana ſubtus convexiuſcula ſulcata villoſa. *Amœn. acad. 4. p. 255. t. 3. f. 7-9.*

Muſ. Teſſin. 96. Meduſa parva figura porpitæ.

Act. angl. 301. *p.* 2051. Animalcula ex Yvica maris mediterranei.

Habitat in India.

cruciata. 2. M. cruce alba. *Fn. ſuec.* 2110.*

Habitat in Oceano europæo.

hyſocella. 3. M. convexa ſedecimradiata: ſubtus tentaculis quatuor unitis. *Baſt. op. ſubſ. 2. p. 62. t. 7. f. 5 ?*

Habitat in Luſitaniæ Tago, *ſupra albeſcens, radiis ex punctis minimis e fuſco rufeſcentibus, ſubtus concava, tentaculis corpore longioribus lanceolatis rufeſcenti ſtriatis.* Vandelli.

æquorea. 4. M. planiuſcula, margine inflexo villoſo tentaculato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2819. *Forsk. Fn. ægypt. arab. p.* 110. *n.* 28.

O. *Fabr. Fn. groenl. p.* 364. *n.* 357. Meduſa orbicularis planiuſcula, margine inflexo ciliato.

Baſt. opuſc. ſubſ. 2. p. 55. t. 5. f. 2. 3.

Habitat in pelago, *ſimpliciſſima, mollis, marginis ciliis albis.*

aurita. 5. M. civitatibus ſubtus quatuor. *Fn. ſuec.* 2109.* *It. oel.* 160. *It. wgoth.* 172. *t. 3. f. 2. Müll. zool. dan. 2. t. 76. 77. rar. 2. p. 109. prodr.* 2820. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 363. n. 356.*

Rondel. poiſſ. t. 17. p. 384. Sixième eſpèce d'ortie.

Meduſa *cyclopterorum aliorumque piſcium majorum aviumque pelagicarum cibus, noctu vagatur; vis pruritu (ſæpius) mordax; contrahit ſe rigens, ac prænatante piſciculo frondem ſuam ſpargit, complectenſque devorat; ora ei in radice eſſe, excrementa per ſumma reddi Plin. IX. 45. marginem alternatim contrahendo & expandendo progrediuntur; aquæ fluviali immiſſæ cito pereunt.*

Aldrov. zooph. l. 4. p. 574. f. inf. Urtica ſexta.
Kalm. it. 2. p. 109.
Loeſt. it. 105.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. p. 123. t. 14. f. 3. 4. & 2. p. 58-60.
Merret pin. p. 195. t. 76. 77.
Stroem. ſondm. 1. p. 172. n. 2.
Habitat in mari balthico, Oceano *hemiſphærica, hyalina 2-4 pollicum diametro, piſciculis, & ſcorpiorum præſertim pullis victitans, cavitatum corporiſque marginibus ciliatis flavis.*

capillata. 6. M. convexa, margine ſedecies emarginato, ſubtus piloſa. *Fn. ſuec. 2108.* It. wgoth. 172. t. 3. f. 3. Müll. prodr. zool. dan. 2821. O. Fabr. Fn. groenl. p. 364. n. 358.*
Baſter op. ſubſ. 2. p. 60. t. 5. f. 1.
Stroem. ſondm. 1. p. 172. n. 1.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *congenerum maxima, diametri 8 pollicum, ut cyprini minuti ab aliis piſcibus agitati ſub hac aſylum reperiant, oniſcis victitans, marginis lobos flectendo progrediens, intus purpurea, ſupra lævis, cute tenuiſſima, annexis veſiculis materiem purpuream (an ova?) continentibus aucta.*

pilearis. 7. M. diſco capitato, limbo foraminibus octo, ſubtus forniculato piloſa.
Habitat in Pelago.

marſupialis. 8. M. ſemiovata, margine tentaculis quatuor.
Planc. conch. rar. 41. t. 4. f. 5. Urtica ſollata marſupium referens.
Habitat in mari mediterraneo.

hemiſphærica. 9. M. hemiſphærica, coſtis tranſverſalibus quatuor, tentaculis globuliſque marginalibus, margine integro. *Müll. zool. dan. 1. p. 22. n. 5. t. 7. f. 1-5. prodr. 2822. rar. 1. p. 13.*
Gronov. act. helv. 4. p. 38. t. 4. f. 7.
Habitat in oceano belgico & norwegico, *hyalina, diametro 2 lineas æquans, marginem alternatim contrahendo & expandendo progrediens.*

pelagica. 10. M. hemiſphærico-concava, margine crenato-incurvato, tentaculis octo. *Loeſl. it. 105.* †.

noctiluca. β. Meduſa depreſſa, verrucis punctiſque brunneis, marginis tentaculis octo rubris. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 109. n. 24.*
Habitat in mari americano, atlantico, mediterraneo, *gregaria, magniſque ſæpe in glomeribus obvia, mare*

irradians, *ß*) *hyalino rufeſcens*, *rarius ſubopaca punicea*, *diametro tripollicari*, *in aqua marina concuſſa mirifice ſcintillans.*

brachiata. 11. M. margine brachiis novem: apicibus novem, extimo tentaculis novem. †
Habitat in pelago.

Velella. 12. M. ovalis concentrice ſtriata, margine ciliato, ſupra velo membranaceo.
Loefl. it. 204. Meduſa Velella ſ. Galera.
Bronw. jam. 387. *t.* 48. *f.* 1. Pyllidoce labris cæruleis.
Imperat. nat. 912. *t.* 912. Velum marinum cotocis cærulei.
Col. ecphr. 20. *t.* 22. Urtica marina ſoluta.
Habitat in pelago, mari mediterraneo, atlantico, *centro prominulo*, *ſupra linea oblique tranſverſa*, *ſupra etiam membrana lineam dorſalem inferiorem ſecans*, *rigidula*, *latitudine corporis.*

Pulmo. 17. M. hemiſphæri-concava, margine fimbriato, ſubtus ſtriata, caudice quadri-feneſtrato, brachiis octo.
Macri obſerv. del polm. mar. Nap. 1778. *t.* 1.
Habitat in mari tyrrheno, *hyalina dura*, *tenax*, *nitida*, *cæruleſcens brachiis magnis*, *æqualibus*, *ſubcylindricis*, *poſterius criſpis*, *in corpore magna oblonga*, *craſſa*, *lævia*, *tandemque in plana tria membranacea acuta terminatis*, *appendicibus* 16 *ſubtrigonis*, *anterius bifidis*, *reſciſſa membra redintegrans.*

tyrrhena. 18. M. convexa, margine crenato: filis longiſſimis, ſubtus tentaculis quatuor. *Macri obſerv. del polm. mar. p.* 19.
Habitat in mari tyrrheno, *lævis*, *tenera*, *hyalina*, *rubro maculata*, 2 *uncias pondere æquans*, *cavitatibus ſubtus* 4, *ſingulis ſtria rubra notatis*, *an varietas auritæ?*

tuberculata. 19. M. diſco prominulo, margine octies diviſo ſubtus-ſtriata, tuberculis octo. *Macri obſerv. del polm. mar. p.* 20.
Habitat in mari tyrrheno, *hyalina*, 2 *libras pondere æquans*, *ſubtus fulva fibris innumeris curvis*, *tuberibus ex albo cæruleis in duos truncos membrana pellucida*, *albicante apice flaccoſa cærulea aut lactea terminatos abeuntibus*, *pruritum contrectata nullum excitans.*

Utriculus. 20. M. utriculoſa, ſubtus centri tentaculo longiſſimo granuloſo, margine tentaculis numeroſis cæruleis apice

flavicantibus. *de la Martinière, Journ. de phyſ. Nov.* 1787. *p.* 365. *t.* 2. *f.* 13. 14.
Habitat in pelago, *hyalina, marginis cirris circiter* 30.

Caravella. 21. M. ovata, ſubtus medio tentaculis longiſſimis, ſupra velo crenulato. *Müll. Beſch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 190. *t.* 9. *f.* 2.
Sloan. jam. 1. *p.* 7. *t.* 4. 5. Urtica marina ſoluta purpurea oblonga, cirris longiſſimis.
Brown. jam. p. 287. Aretuſa criſta ſubrubella venoſa.
Habitat in mari atlantico, *pituita ſua contrectantis manus inflammans, tenuis, lævis, nitens, cæruleſcens, hyalina utrinque attenuata, criſta per totam dorſi longitudinem excurrente, ſemilunata, compreſſa, ſulcis ramoſis exarata, venis roſeis picta, filis ſubtus cubitalibus articulatis, cæruleis, fragilibus: tubulis brevioribus intermiſtis.*

Umbella. 22. M. tentaculis diſci nudis, marginis glanduloſis. *Müll. Beſch. der berl. Naturf.* 2. *p.* 295. *t.* 9. *f.* 2. 3.
Habitat in mari mediterraneo & indico, *rigida, depreſſa, ſupra ſulcis radiatis, limbo membranaceo crenato, ſubtus in medio proboſcide quaſi clavata, tubulis brevibus clavatis cincta, tentaculis articulatis æqualis diametri, trifariam noduloſis.*

Dimorpha. 23. M. dorſo eminente, ſubtus cruce minuta foraminibus quinque cincta, margine ciliato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2823. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 365. *n.* 359.
Habitat in mari, *potiſſimum* ſeptentrionali, *æquorea paulo minor, expanſa orbicularis, margine inflexo quadrata, dorſo per radios ſulcatos in 4 areas diviſo, cruce centrali elata ciliiſque albis, ſubtus concava.*

Campanula. 24. M. diſco gibbo, limbo ampliato ciliato, ſubtus cruce piloſa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 360.
Habitat in Groenlandiæ *ſinubus, auctumno haud infrequens, oniſcos prædans, capillatæ inſtar incedens, dimorphæ magnitudine, conico-orbicularis, marginis crucisque ciliis flavis, his interdum albis, ſubtus cava, nivea.*

An hujus etiam generis Meduſa palliata. *Bohadſch t.* 11. *f.* 1. *Stroem ſundm.* 1. *p.* 164. *balænarum eſca; plures etiam in maribus auſtralibus viderunt ſpecies* Solander & *uterque* Forſterus, *ut videtur novas, nondum, quantum novi, amplius deſcriptas.*

Digitala. 25. M. hyalina ſubtus centro piſtillifero, margine ciliato. *Müll. prodr. zool. dan.* 2824. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 366. *n.* 361.

Habitat in mari Groenlandiam *alluente, ſatis vivida, margine flexo in aquam ſaliens, minima, conica, ſtriata, ciliis introrſum hamatis flavis albiſque, piſtillo in penicillum nunc flavum, nunc album terminato.*

frondoſa. 26. M. diſci margine maſculis guttiſque opacis albis vario; tentaculis octo dichotomis verrucis albis pedunculatis obſeſſis in floccos terminatis. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 29. *t.* 2. *f.* 1-3.

Habitat in archipelago caribæo, *volam implens, planiuſcula, ſupra convexior, limbo membranaceo faſciolis albis fimbriato, nucleo ſubtus villoſo, minoribus octogono, majoribus decagono.*

octopus. 27. M. marginis papillis ſemicircularibus, ſubtus cruce media, tentaculis octo, & foraminibus lunulatis intermediis. *Borl. corn. p.* 258. *t.* 25. *f.* 16. 17.

β) Urtica marina ex trunco octopedalis limbo imbricatim undante. *Borluſ. cornw. p.* 257. *t.* 75. *f.* 15.

Habitat in Cornubiæ *littore &* mari Belgium *inter &* Angliam *intermedia, magna, hyalina, interdum vireſcens, appendicibus ſubtus* 8, *quarum* 4 *ſcutiformes,* 4 *cordatæ; ſulco intermedio, marginis papillis apice cæruleis.*

tetraſtyla. 28. M. hemiſphærica, tentaculis nullis, tubulis marginalibus quatuor in priſma coadunatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 106. *n.* 17.

Habitat in mari rubro, *hyalina, rigidiuſcula, diametri ſeſquiſpithamalis, marginis tubulis linearibus, tripollicaribus rectis, planis.*

octoſtyla. 29. M. hemiſphærica, marginis tentaculis nullis, ſubtus columna quadriplicata: apice lobis octo multifidis, laterumque appendicibus ſedecim. *Forsk. Fn. ægypt. arab. p.* 106. *n.* 18.

Habitat in mari rubro, *hyalino-cæruleſcens, diametri pedalis, columna ſubtus ſeſquipollicaris.*

Andromeda. 30. M. hemiſphærica, marginis brachiis nullis, brachiis octo teretibus ramoſiſſimis inferius foliaceis. *Forsk. Fn. arab. p.* 107. *n.* 19.

Habitat copioſa in fundo littoris maris rubri *prope* Tor, *pulcherrima, ex hyalino fuſca, radiis albis margine*

integerrima, centri cruce nigra, obſoleta, brachiis albis ad baſin penna anſerina craſſioribus.

corona. 31. M. hemiſphærica, marginis tentaculis nullis, ſubtus brachiis octo cultratis, infra utrinque dentatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 107. *n.* 20.

Habitat in mari rubro *ad* Saez *ex hyalino ruſeſcens, diametri quadripollicaris, centri cruce cærulea, brachiis ſubtus latis apice bilobis.*

Perſea. 32. M. hemiſphærica hyalina, intus annulo opaco albo quater interrupto, marginis tentaculis nullis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 107. *n.* 21.

Habitat in mari mediterraneo, *diametri bipollicaris, margine longe prominente, brachiis* 4, *ſublanceolatis, fere pollicaribus, margine undulatis.*

Cephea. 33. M. hemiſphærica tuberculata fuſco-ruſeſcens, margine crenato, brachiis ſubtus octo lanatis. *Forsk. Fn. ægypt. arab. p.* 108. *n.* 22.

Habitat in Djiddae *ad littus* maris rubri, *pellucida radiis octo pallidioribus, brachiis hyalino-fuſcis.*

proboſcidalis. 34. M. hemiſphærica, ſubtus in medio proboſcide longa, marginis tentaculis ſex. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 108. *n.* 23.

Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, diametri pollicum* 2½, *margine prominente æquali, proboſcide ſubflexili apice truncata, membrana plicata verſatili fimbriata.*

mollicina. 35. M. depreſſa, foraminibus lateralibus tentaculiſque duodecim. *Forsk. Fn. æg. ar. p.* 109. *n.* 25.

Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, diametri ſeſquipollicaris, marginis prominentis plicis* 12.

pileata. 36. M. ovato-campanulata ſuperne globo hyalino, intus nucleo rubro oblongo, marginis tentaculis numeroſis baſi flavis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 110. *n.* 26.

Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipollicem alta, margine parum coarctato.*

crucigera. 37. M. hemiſphærica, cruce ruſeſcente corporis latitudine. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 110. *n.* 27.

Habitat - - - - - ceraſi dimidii magnitudine, annulis ſupra 4 *minutiſſimis albis approximatis, margine tenui prominente, varie flexili ſæpe ruſeſcente, tentaculis innumeris hyalinis corporis ſemidiametro vix longioribus.*

unguiculata. 38. M. orbicularis ſupra plana ſedecimradiata: margine crenato; unguibus ſedecim ſubincurvis. *Ol. Swarts. n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 7. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat ad Jamaicæ *littora, diaphana, cæruleſcens, maculata, nucis moſchatæ minoris magnitudine.*

PHYSSOPHORA. *Corpus* gelatinoſum e veſicula aërea pendens, membris gelatinoſis ad latera ſeſſilibus, tentaculis ſubtus plurimis.

hydroſtatica. 1. Ph. ovalis, veſiculis lateralibus trilobis plurimis extrorſum apertis, inteſtino medio tentaculiſque quatuor majoribus rubris. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 119. *n.* 45.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipollicem longa, compreſſa veſiculæ apice ſemper in aquæ ſuperficie conſpicuo natans.*

roſacea. 2. Ph. orbicularis, foliolis oblongis horizontalibus veſicæ affixis imbricata. *Forsk. Fn. æg. ar. p.* 120. *n.* 46.
Habitat in mari mediterraneo, *hyalina, pollicis diametro, flori pleno deorſum inclinato ſimilis, veſica media obtuſa ovata ruſeſcente: foliolis planis, obtuſis, curvis in denſas ſeries congeſtis tecta.*

filiformis. 3. Ph. membris lateralibus oblongis filiformibus dependentibus. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 120. *n.* 47.
Habitat in mari mediterraneo, *tenerrima, fili craſſitie, ad ſpithamam uſque longa, hyalina, capitulo ovato, obtuſo, ſeminis oryzæ magnitudine.*

Phyſſophoræ *vix proprium conſtituere genus videntur, ad meduſas forte referendæ.* Aſteriæ *omnes ſupra macula alba, rugoſa, lapidea notatæ, partes abſciſſas facile redintegrant, motu orbiculari jam dextrorſum jam ſiniſtrorſum incedunt, dorſo incumbentes radios flectunt, ut papillis junco ſe affigant.*

298. ASTERIAS. *Corpus* depreſſum ſubtus ſulcatum : cruſta coriacea tentaculis muricata.
Os centrale quinquevalve.

* *lunatæ.*

nobilis. 17. A. granuloſa, margine pulvinato, diſco pulvilli glabro. *Müll. zool. dan. prodr.* 2826. Aſterias equeſtris.
Pontopp. norsk. Naturg. 2. *c.* 7. *p.* 291.
Habitat in mari Norwegico.

Pulvillus. 18. A. lubrica, margine integro mutico. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 64. *n.* 25. *t.* 19. *f.* 1. 2. *prodr.* 2827. *rar.* 1. *p.* 40.
Habitat rarior in Norwegiæ ſinu Droebacenſi *ad inſulam* Kaholm, *ſupra convexa, cute lævi ſanguinea, hinc inde transverſim ſtriata marginem verſus mucronibus mollibus obtuſis, albis, ſeminis milii magnitudine, in* 10 *areas digeſtis obſeſſa, margine non articulato, at in angulis papillis acutis* 10 *& ultra aſpero, ſubtus concava, lævis, albida; roſeo tincta, ſulcis* 5 *utrinque baculis horizontalibus tectis exarata, aquam calidam ſpadiceo colore tingens.*

militaris. 19. A. undique granuloſa, margine pulvinato conſimili. *Müll. zool. dan. prodr.* 2828.
Habitat in mari Norwegico.

Luna. 1. A. integra orbicularis. *Amœn. acad.* 4. *p.* 256. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in India, *imperialis magnitudine, compreſſa; punctis eminentibus undique adſperſa.*

** *ſtellatæ.*

papposa. 2. A murica, marginali ſerie penicillata. *Müll zool. dan. prodr.* 2832.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 369. *n.* 364.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1098. *n.* 2. Aſterias ſtellata, radiis XIII. undique muricata faſciculis.
Retzius nov. act. Stockh. 1783. *p.* 230. *n.* 4. Aſterias ſtellata, radiis tredecim, undique aculeata, aculeis ſubtus penicillatis ſupra pectinatis.
Jonſt. inſt. t. 26. *f.* 16. Stella marina.
Pontopp. norsk. Naturl. 2. *p.* 291. Soeſtierne.
Olaſſ. iſl. 689.

Linck aſt. t. 32. *f.* 52. & *t.* 34. *f.* 54.
Cluſ. exot. 114.
Seb. muſ. 3. *t.* 8. *f.* 5.
Columm. ecphr. t. 38. *f.* A ?
β) *Linck ſtell. mar. t.* 17. *f.* 28.
Habitat in Oceano europæo & aſiatico, *ſupra ſubferruginea: diſco albo maculato radiiſque pallidioribus apice coccineis & interſtitiis albidis, ſubtus alba, papillis pallidioribus, diſco rubro tincto, interſtitiiſque radiorum cæruleſcentibus, diametro ad 3 pollices & 9 lineas æquante, radiis utplurimum* 13, *interdum* 11, 12 & 15, *lanceolatis, ſupra parum convexis.*

ſpongioſa. 20. A. ſcabriuſcula, radiis ſemicylindricis obtuſis, margine mutico. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 368. *n.* 363.
Habitat rarior in profundo maris Groenlandiam *alluentis inter ulvas rubenti affinis, diametro* 7 *linearum, pallide rubicunda, verruca minutiſſima dorſi centrali ſanguinea, aculeis minutiſſimis confertis decumbentibus aſpera, radiis* 5: *margine inflexo.*

rubens. 3. A laxa, radiis convexis: ſuperne ſpinulis ſolitariis ſeriatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2830. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 367. *n.* 362.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1099. *n.* 3. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95.
Fn. ſuec. 2111.* Aſterias ſtellata, radiis lanceolatis gibbis, undique aculeata.
It. wgoth. 172. Aſterias radiis quinis latiuſculis aſperis.
Pet. muſ. 6. *n.* 20. Aſterias.
Barr. rar. 130. *t.* 1288. Stella marina lacte rubens ſpinoſa.
Linck ſtell. mar. t. 7. *f.* 9. *t.* 9. 10. *f.* 19. *t.* 11. *f.* 15. *t.* 14. *f.* 23. *t.* 15. 16. *f.* 18. *t.* 30. *f.* 50. *t.* 34. *f.* 55. 58. *t.* 35. 36. *f.* 61. *t.* 37. *f.* 67. *t.* 40. *f.* 70. Stella marina.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 116. *t.* 2. *f.* 1-4.
Plot. oxfordsh. 85. *n.* 16. *t.* 2. *f.* 2. 3.
Olear. muſ. 55. *t.* 8. *f.* 4.
Seb. muſ. t. 5. *f.* 3. & *t.* 6. *f.* 3. 4.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 178. *n.* 1.
Olaſſ. iſl. 1005. a.
Jonſt. inſ. 26. *f.* 5 ?
β) *Baſt. op. ſubſ.* 3. *p.* 116. *t.* 12. *f.* 1-6.
Columm. aq. 5. *t.* 6.
γ) *Linck ſtell. mar. t.* 38. *f.* 69.

Habitat frequens in Oceano, mari mediterraneo, *rarius pallida frequentius ſupra rufa, ſublutea, cinerea, nigra, rubra, violacea vel brunnea, ſubtus rubicunda vel flavicans, diametro ad 9 pollices æquante, radiis lanceolatis, ſubtus quadrifariam papilloſis, frequentiſſime 5, rarius 6 aut 4, tuberculis nunc nullis, nunc raris, nunc ſparſis, nunc in ſeries digeſtis, aculeis nunc nullis, nunc ſetis ſubtilioribus, nunc validis.*

Sepoſita. 21. A radiis quinque teretibus ſubtus reticulatis, ſupra aculeatis: aculeis pectinatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 2.
Linck ſtell. mar. t. 4. *f.* 5. *t.* 9. *f.* 16. *t.* 30. *f.* 62.
Habitat ad Scaniæ *littus, minuta.*

endeca. 22. A radiis novem undique aculeatis: aculeis pectinatis. *Mant. p.* 543. *Retz. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 229. *n.* 3.
Müll. prodr. zool. dan. 2855. Aſterias (aſpera) ſtellata aſpera, ſerie marginali pectinata.
Linck ſtell. mar. t. 14. *f.* 25. *t.* 15. 16. *f.* 26. *t.* 17. *f.* 27.
β) *Rumpf. muſ. t.* 15. *f.* F.
Habitat in mari ſeptentrionali, *radiis* 5, 8, 10, *utplurimum* 9.

minuta. 4. A. margine pinnulis porrectis diſtantibus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2835. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 370. *n.* 39.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1099. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 2112. * Aſterias ſtellata obtuſa ciliata.
Seb. muſ. 3. *t.* 5. *f.* 14. 15.
Habitat frequens in mari norwegico & Groenlandiam *alluente, ochroleuca, utrinque plana, diametri vix* 5 *linearum, radiis* 6.

glacialis. 5. A. radiis angulatis, angulis verrucoſo-aculeatis. *Müll. dan.* 2. *t.* 41. *rar.* 2. *p.* 3.
α) Aſterias radiata, radiis pentagonis: angulis verrucoſo-aculeatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2838.
Aldr. inſ. p. 749. Stella pectinata tertia ſpinoſa tuberculis plurimis.
Linck ſtell. mar. p. 33. *t.* 38. & 39. *f.* 69. Sol echinatus cancellatus.
Linck ſtell. mar. p. 34. Pentadactylos aſter echinatus tuberculoſus.
β) Aſterias ſtellata, radiis heptagonis: angulis aculeatis. *Syſt. nat.* XII. *p.* 1099. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 2113. *Habitat*

Habitat in Oceano *ſeptentrionali, viva læte rufa albo undulata, rarius ex cinereo fuſca aut viridis, diſco ſupra tuberculis in circulum diſpoſitis aſpero, ſubtus cavo, radiis 5 craſſis lanceolatis, tentaculis innumeris pellucidis, utrinque ſerie pinnularum agilium ſtipatis.*

reticulata. 6. A. radiis reticulato-aculeatis.
Muſ. Teſſ. 114. *t.* 9. *f.* 1. Aſterias radiata, centro dorſali nodis 5 circumvallata.
Rondel. aq. 122. Stella reticulata.
Sloan. jam. 2. *p.* 272. Stella marina maxima reticulata
Rumpf. muſ. t. 15. *f.* D.
Linck ſtell. mar. t. 23. *f.* 36. *et t.* 41. *f.* 72.
Seb. muſ. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat in mari indico.

phrygiana. 23. A. ubique papillis ſubtus roſaceis obſita. *Müll. zool. dan. prodr.* 2829.
Act. nidr. 4. *p.* 424. *t.* 14. *f.* 1. 2.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 178. *n.* 2.
Habitat in mari Norwegico, *an eadem cum reticulata?*

nodoſa. 7. A. radiis convexis longitudinaliter elevatis muricatis. *Muſ. Teſſin.* 114. *t.* 9. *f.* 2.
Grew. muſ. 123. *t.* 8. Stella marina coronalis.
Rumpf. muſ. 39. *t.* 15. *f.* A. Stella marina quarta.
Linck ſtell. mar. t. 3. *f.* 3. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 25. *f.* 40. *t.* 26. *f.* 41.
Seb. muſ. 3. *t.* 5. *f.* 7. 8. *t.* 6. *f.* 1. 2. 11. 12. *et t.* 7. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico.

violacea. 24. A. laxa, ſurperficie griſeo-fuſca: tuberculis violaceis, *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 46. *rar.* 2. *p.* 17.
Aldrov. inſ. 7. *p.* 753. Stella reticulata noſtra.
Laid. apud Linck ſtell. mar. p. 80. Echinaſtrum ſeu ſtella marina pentadactyla echinata.
Kade apud Linck ſtell. mar. p. 97. *f.* 1-9. Stella marina quinque radiorum holſatica coloris violacei.
Fn. ſuec. p. 512. Stella pentadactyla violacea.
Habitat in mari ſeptentrionali *et* mediterraneo, *jam tota ſuperficie, jam ſolis tuberculis violaceis, iisque nunc in ſeries diſpoſitis, nunc ſine ordine ſparſis, diſco orbiculari, radiis 5 lanceolatis, apice rubicundis, trifariam tuberculatis, ſubtus in ſulco luteſcentibus.*

ſanguinolenta. 25. A. ſupra ſanguinea, radiis apice albis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2836.
Habitat in mari norwegico.

perforata. 26. A. mutica, dorſo punctis pertuſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 2834.
Habitat in mari norwegico.

aranciaca. 8. A. diſco lato, radiis ſubdepreſſis, ſummo margine aculeato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 3. *t.* 83. *f.* 1-3. *prodr.* 2031.
Act. nidr. 4. *p.* 425. 426. *t.* 14. *f.* 3-6.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1100. *n.* 8. *Muſ. Lud. Ulr.* 719. *Muſ. Teſſ.* 114. *t.* 9. *f.* 3. Aſterias ſtellata, diſco tentaculis hiſpidis muricato, margine articulato varie aculeato.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 230. *n.* 5. Aſterias ſtellata, radiis quinque, ſubtus aculeis apice ſtellato-echinatis confertis, margine articulato aculeato.
Barr ic. 1281.
Linck ſtell. mar. t. 4. *f.* 14. *t.* 5. 6. *f.* 6. *t.* 8. *f.* 12. *t.* 27. *f.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 6. *f.* 5-8.
Habitat in mari mediterraneo & ſeptentrionali.

equeſtris. 9. A. diſco reticulato punctis pertuſo, tuberculis quinque, margine ſubarticulato, ſubtus ſimplici ſerie tentaculato.
Barr. ic. 1285.
Linck ſtell. mar. t. 6. *f.* 13. *t.* 12. *f.* 21. *t.* 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37. *t.* 24. *f.* 39. *t.* 27. *f.* 45. *t.* 33. *f.* 53.
Seb. muſ. 3. *t.* 8. *f.* 6. 8.
Habitat in mari mediterraneo, *ſubtus etiam diſco gaudens.*

lævigata. 10. A. radiis ſemicylindricis obtuſe octogonis muticis.
Rumpf. muſ. t. 15. *f.* E.
Grew. muſ. t. 8. *f.* 1. 2.
Linck ſtell. mar. t. 28. *f.* 47.
Habitat in mari mediterraneo & indico, *radiis tectis verrucis obſoletis, ad latera inter verrucas punctis excavatis, ſubtus verrucis in quincuncem diſpoſitis.*

membranacea. 27. A pentagona utrinque tuberculis pectinato-aculeatis hiſpida, ſubtus coſtis quinque elevatis convexis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 230. *n.* 6.
Linck ſtell. mar. t. 1. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo.

granularis. 28. A. pentagona inermis utrinque teſſellato-granulata, margine articulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 231. *n.* 7.

Linck. ſtell. mar. t. 13. *f.* 22. *t.* 23. *f.* 37. *t*?. 24. *f.* 39.? *t.* 27. *f.* 45.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 19. *t.* 92. *f.* 1-4.
Habitat ad inſulam S. Crucis.

*** *radiatæ.*

roſea. 29. A. aſpera, granulis reticulata, radiis teretibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 67. *rar.* 2. *p.* 76. *prodr.* 2838.
Seb. muſ. 3. *p.* 13. *t.* 7. *f.* 5. Stella marina vulgaris batava.
Habitat in mari belgico & norwegico, *elegans, ſupra læte roſea, rarius aurantia, areolarum punctis nigricantibus ſparſis, ſubtus albida: ſulcis dilatatis, tentaculorum ſerie quadruplici, pinnularum divergentium quintuplici, radiis ſummo apice albis.*

pertuſa. 30. A. ſcabra, radiis teretibus baſi anguſtatis gibbis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2839.
Habitat in mari norwegico.

ophiura. 11. A. diſco ſquamoſo: ſquamula angulorum ſerrata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2840. *Act. Nidroſ.* 4. *p.* 54. *t.* 2. *f.* 15. 16. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 371. *n.* 366.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1100. *n.* 11. Aſterias radiata radiis quinque ſimplicibus, ſtella orbiculata quinqueloba.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 231. *p.* 8. Aſterias radiata, radiorum pectinibus appreſſis, diſco pentagono tunicato.
Sloan. jam. 2. *p.* 272. *t.* 244. *f.* 8. 9. Stella marina minor echinata purpurea.
Planc. conch. minor. 38. *t.* 4. *f.* 4.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 7.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 179. *n.* 4. 5.
Mart. Spitsb. t. P. *f.* D.
Linck ſtell. mar. t. 11. *f.* 17.
) Aſterias radiis in morte diſſilientibus. *Olafs. iſl. p.* 900.
Habitat in Oceano, *etiam maxime* ſeptentrionali, *inter minores hujus generis celerius incedit, rarior tota candida, ſed ſupra griſea, rubra vel violacea, aculeis 4 ſuperioribus cum apicibus ſtriiſque tranſverſis albis, glabra; radiis 5 corpore orbiculari quadruplo longioribus, quadrangularibus, gracilibus, flexuoſis, ſquamarum ſerie ſimplici obtectis, divergentibus, ſolidis: In hac acri ſpecie certis anni temporibus a mytilo eduli frequentius comeſta probabilis cauſa funeſtorum effectuum, quos hujus uſus aliquando excitat, latet. v. de Beunie act. Bruxell.* 1. *n.* 8.

aculeata. 12. *A.* aculeis glabris, latitudine radii brevioribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2841.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 12. Aſterias radiata, *radiis* quinque aculeatis.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 232. *n.* 10. Aſterias radiata, radiorum pectinibus divergentibus, diſco orbiculato ſquamato muricato.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 29. *t.* 99. *f.* 1–3. *prodr.* 2841.
Linck ſtell. mar. t. 26. *f.* 42. *t.* 40. *f.* 71.
Habitat in Oceano, *colore ſummopere varians, orbicularis, ſubtus ſquamis minutis obtecta, quarum ſex corollam referunt.*

ciliaris. 13. A. ſpinis aſperis latitudine radii longioribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2842.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 13. Aſterias radiata imbricata: radiis utrinque ciliatis.
Retz. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 232. *n.* 9? Aſterias (ciliata) radiata, radiorum pectinibus patulis, diſco ſquamato lævi ſquamato.
Barr. rar. 131. *t.* 1295. *f.* 1. Stella marina minor ophiocnemos ſ. ophiurus.
Linck ſtell. mar. t. 34. *f.* 56. *t.* 37. *f.* 65. *t.* 40. *f.* 71.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, auſtraliori & indico.

filiformis. 13. A. diſco ſquamoſo, aculeis latitudine radii æqualibus. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 59. *rar. p.* 55. *prodr.* 2843.
Habitat in Norwegiæ *fundo argillaceo maritimo, gracillima; radiis flexuoſis fragilibus aliis corporibus adhærens, orbicularis ſupra ex rufo fuſca marginis nigricans, ſubtus nigra, quinqueloba, ſacculorum rubrorum ſerie ad baſin radiorum poſita; hi* 5, *ex luteo fuſci in filii tenuitatem abeuntes, diſco decuplo longiores, articulis ſingulis aculeis* 5 *puncto nigro et linea rubra notatis, et tentaculis* 2 *lateralibus inſtructis.*

tenella. 32. A. radiis duplicatis: ſuperioribus quinque bifidis pectinatis, inferioribus filiformibus: geniculis incraſſatis. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 233. *n.* 11.
Habitat in mari *inſulam* S. Crucis *alluente, pectinata multo minor, alba, caudice radiorum longiore.*

pectinata. 14. A. radiis duplicatis: ſuperioribus quinque bifidis pectinatis: inferioribus filiformibus paucioribus: geniculis æqualibus, diſco ſupra lævi. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 12.

Syſt. nat. XI. 2. *p.* 1101. *n.* 14. *Amœn. acad.* 4. *p.* 256. Aſterias radiata, radiis duplicatis: ſuperioribus pinnatis, inferioribus filiformibus.
Barr. rar. t. 1282. *f.* 1. Stella marina decanemos fimbriata.
Column. phytob. 109. *t.* 29. Stella marina altera.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 6. Stella chinenſis perelegans dupliciter radiata.
Linck ſtell. mar. t. 37. *f.* 64. 66.
Seb. muſ. 3. *t.* 9. *f.* 3. 4.
Habitat in mari indico, *lævis, radiorum caudice vix conſpicuo.*

multiradiata. 15. A. radiis duplicatis: ſuperioribus decem palmato-ſubquadrifidis pectinatis; inferioribus filiformibus pluribus, diſco granulato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 15. Aſterias radiata, radiis palmato-multiplicatis pinnatis; inferioribus filiformibus.
Linck ſtell. mar. t. 21. *f.* 33. *t.* 22. *f.* 34.
Habitat in mari indico.

Caput Meduſæ. 16. A. radiis dichotomis, diſco radiiſque granulatis, ore depreſſo. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 234. *n.* 34.
Müll. zool. dan. prodr. 2844. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 367. Aſterias radiata, radiis duplicatis dichotomis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1101. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 2114. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 95. Aſterias radiata radiis dichotomis.
Jonſt. inſ. t. 26. *f.* 11. Stella marina.
Pontopp. norſk. Naturh. 2. *p.* 292. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 179. *n.* 6. Soë-Soël.
Martens Spitsb. t. P. *f.* E.
Linck ſtell. mar. t. 18. *f.* 29. *t.* 19. *f.* 30. *t.* 20. *f.* 32.
Seb. muſ. 3. *t.* 9. *f.* 1. 2. *t.* 11. *f.* 1.
Knorr. delic. nat. ſel. t. G.
Thunb. nov. act. Stockh. 1783. *p.* 236.
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, indico, æthiopico, ad Caput Bonæ Spei, *viridis aut rufa.*

Euryale. 33. A. radiis dichotomis, diſco papilloſo radiiſque granulatis; ore ſubelevato. *Retz. nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 235. *n.* 15.
Linck ſtell. mar. t. 29. *f.* 48. *t.* 30. *f.* 49.
Rumpf. muſ. 41. *t.* 16.
Habitat ad Caput Bonæ Spei, *fulva.*

oligætes. 34. A. radiis longiſſimis ſimplicibus: articulis ſingulis baſi ſtylis binis mobilibus acutis. *Pallas nov. act. Petrop.* 2, *p.* 239. *t.* 6. *f.* 23. A. B.

Habitat ad Caraſſuo, *Gorgoniis adhærens, pentagona, exigua, duriuſcula ochroleuca.*

nigra. 35. A. radiiſque quinque articulatis ſuperne imbricatim ſquamatis: pectinibus lateralibus patulis diſco obtuſe pentagono granulato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 20. *t.* 93. *f.* 1-4.

tricolor. 36. A. radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus ſcabris, diſco hiſpido. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 97. *f.* 1-5.

Habitat ad inſulam Foeroe.

fragilis. 37. A. diſco orbiculato muricato, dorſo ſpinoſo, radiis quinque articulatis ad latera pectinatis: dentibus ſerrato-muricatis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 28. *t.* 98. *f.* 1-3.

Habitat in mari norwegico & groenlandico.

299. ECHINUS. *Corpus* ſubrotundum, cruſta oſſea tectum, ſpinis mobilibus ſæpius aſpera.

Os ſubtus, (ſæpius) quinquevolva.

* *ano verticali, tentaculis undique ſimplicibus,* Anocyſti Kleinii.

† *hemiſphærici vel ſphæroidales,* Cidares Kleinii.

eſculentus. 1. E. hemiſphærico-globoſus ambulacris denis, areis obſolete verrucoſis. *Fn. ſuec.* 2116. *Muſ. Lud. Ulr.* 705.

Fn. ſuec. 1. 1289. Echinus ſubgloboſus vertice plano.

Rondel. piſc. l. 18. *c.* 32. *p.* 581. Echinometra.

Aldrov. aq. p. 405. 409. Echinometra.

Planc. conch. min. nat. p. 20. Meio marinus.

Gualt. ind. teſt. t. 107. *f.* B. E. Echinometra ſpinis denudata.

Phelſum Br. over de Zee-egelen. *p.* 28. *n.* 21. etbare Zee-egel.

Klein echinoderm. ed. Lesk. p. 76. *t.* 38. *f.* 1. Cidaris miliaris.

Liſt. angl. 69. *t.* 3. *f.* 13. Echinus marinus aculeorum veſtigiis nonnihil eminentibus.

Rumpf. muſ. 31. *t.* 13. *f.* B. C. Echinus eſculentus.

Seb. muſ. 3. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 4. a. b. *et t.* 12. *f.* 1. 6-8. 9.

Davila catal. p. 410. *n.* 926-928.

Argenv. conchyl. p. 307. *t.* 25. *f.* F.
Delic. nat. Select. t. D. *f.* 1. *t.* D. II. *f.* 1.
α) *Phelſ. ov. de Zee-egel. p.* 28. *n.* 11. Bontgeringde Zee-egel met Korte gruppels.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 14.
β) *Phelſum. Zee-egel. p.* 28. *n.* 10. Bontgeringde Zee-egel met lange gruppels.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 6.
γ) *Phelſ. Zee-egel. p.* 28. *n.* 17. Kegelvormige Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 7.
δ) *Phelſ. Zee-egel. p.* 28. *n.* 14. Tienſtraalige Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 9.
ε) Echinus albus. *Molina hiſt. nat. Chil. p.* 175.
Habitat in Oceano europæo & indico, mari mediterraneo, ε) *in* pacifico *ruber, coccineus, flaveſcens vel ſpadiceus,* ε) *albus altitudinis interdum magis quam dodrantalis, verrucis ochroleucis, tuberculorum minorum circulo cinctis, ſpinis albidis, vel violaceis apice albis, ambulacris trifariam poroſis, ano membrana coriacea ſpinulis hiſpida clauſo.*

Sphæra. 18. E. ſubſphæricus ruber, ſpinis ſubcæruleis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2845.
Pontopp. norſk. Naturh. 2. c. 7. *p.* 275.
Habitat in Oceano norwegico, *utrum ſatis diſtincta ab eſculento ſpecies, an ſardicus?*

Droebachienſis. 19. hemiſphæricus pallidus, ſpinis longis pallidis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2846.
Habitat in Norwegiæ ſinu Droebachienſi.

miliaris. 20. E. hemiſphærico-depreſſus, ambulacris denis, areis bifariam verrucoſis.
Klein echinod. ed Lesk. p. 82. *t.* 2. A. C. D. *t.* 31. A. D. *t.* 38. *f.* 2. 3. Cidaris miliaris ſaxatilis.
Rondel. aquat. p. 578. *Geſn. aquat. p.* 416. *aldrov. exans. l.* 3. *p.* 402. Echinus ovarius.

Echini, *multi eſculenti, olim, petrefacti quoque, ad præcavendos et ſanandos morbos, nunc aliis, nunc aliis partitus prioribus habitis commendati, et adhibiti: maris omnes incolæ, quoad ad teſtam attinet, inter petrificata frequentiſſimi, inter molluſca et teſtacea ambigui, nervis gaudent, cerebro carent. Ideam ſculpturæ diſtinctam formaturus computationem ejuſdem inſtituat cum horto in areas, ſive pulvillos diviſo, ambulacris diſtincto.*

Phelſ. ov. Zee-egel. p. 28. *n.* 23. 24. Frieſthe Zee-egel. et Klipegel platte.
Müll. zool. dan. prodr. 2847. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 372. *n.* 368. Echinus (ſaxatilis) hemiſphærico-depreſſus vel orbicularis, ſpinis diverſicoloribus.
Sloan. jam. 2. *p.* 268. *t.* 244. *f.* 1-3.
Rundm. rar. nat. et art. p. 97. *t.* V. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* G. H. I. L. N.
Davila catal. 1. *p.* 410. *n.* 928.
Seb. muſ. 3. *p.* 18. *t.* 10. *f.* 1-4. 12. *p.* 24. *t.* 11. *f.* 5-8. *p.* 25. *t.* 12. *f.* 1? 2. 7.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 94. *t.* D. II. *f.* 3. 4. 5. *et t.* D. III. *f.* 4.

Baſteri. β) E. teſta depreſſa: tuberculis rarioribus, linea media arearum argute ſerrata, poris ambulacrorum in ſeriebus alternis trium et duorum foraminum poſitis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 87. *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 49. *f.* 1. 2.
Phelſum ov. de Zee-eg. p. 18. *n.* 16. Zee-Klit.
Baſt. op. ſubſ. 3. *p.* 112. *t.* 11. *f.* 2-8.
Reaum. act. par. 1712. *p.* 177. *t.* 8.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* A.
Habitat frequens in Oceano europæo, *teſta minore, vertice magis depreſſo, ambulacris anguſtioribus ab eſculento diſtinctus, nunc ex viridi cinereus, nunc ex olivaceo viridis, nunc ex violaceo ſubruber, areis majoribus tuberculorum minorum præter interſperſa minima ſerie octuplici, minoribus majorum duplici minorumque ſimiliter duplici inæqualibus, ambulacris pororum duplicium ſerie triplici, ſpinis 3-4 lineas longis, ſtriatis, acutis vel obtuſis, albidis, violaceis, viridibus, vel ex olivaceo nigricantibus.*

hemiſphericus. 21. E. hemiſphærico depreſſus, ambulacris denis, arearum ſutura media ſerrata lineiſque tranſverſis, ore pentagono: angulis obtuſis. *Klein echinod. ad. Lesk. p.* 90. *t.* II. *E. et t.* XL. *f.* 7.
Muſ. Linck 1. *p.* 116. *n.* 43.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* M.
Delic. nat. ſel. p. 88. *t.* D. *f.* 6.
Habitat - - - - ex flaveſcenti ruber, ambulacris pallidioribus, baſi ochroleuca, eminentiis majoribus minoribuſque et granulis arearum poris interſitis aſper; an varietas eſculenti?

anguloſus. 22. E. hemiſphærica, areis granulatis bifariam verrucoſis, majoribus ſutura media ſerrata bipartitis, ambulacris tri-

ſariam poroſis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 92. *t.* 2. F. *t.* 42. *f.* 1.

Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 15. Fyn wratje Zee-egel.

β) Echinus minor ex cinereo virideſcens. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 94. *t.* 3. A. B.

Phelſ. Zee-eg. p. 29. *n.* 28. Kleine Vyfhoek.

Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 20.

Argenv. conch. 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* H.

Gualt. teſt. t. 108. *f.* A.

Delic. nat. ſel. 1. *p.* 88. *t.* D. *f.* 4. 5.

Habitat - - - ex cinereo colore in violaceum vergens, diametro tranſverſa $2\frac{1}{2}$ *digitorum* β) *duorum, areis granulorum ſeriebus, majoribus quidem decem, minoribus 6; verrucarum ordinibus ex 30 circiter conflatis, areis minoribus & ambulacris magis convexis & prominentibus, ambulacris potius ex luteſcente cinereis: poris diſtantibus duplicibus.*

excavatus. 23. E. hemiſphæricus, areis granulatis, omnibus bifariam verrucoſis, ambulacris excavatis bifariam poroſis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 95. *t.* 44. *f.* 3. 4.

Scill. de corp. mar. petriſ. t. 22. *f.* 2. D.

Habitat in calcareum mutatus ex flavo cinereum Veronæ, *an mera varietas miliaris?*

Globulus. 2. E. hemiſphærico ſubgloboſus, ambulacris denis, areis latere muricatis, medio poroſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 706.

Habitat in Oceano indico; *an idem cum granulato?*

ſphæroides. 3. E. hemiſphærico-gibboſus, ambulacris denis undique muricatis medio poroſis.

Habitat in Oceano indico.

Gratilla. 4. E. hemiſphærico-gibboſus, ambulacris denis triplicatis, areis decuſſatim muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 707.

Habitat in Oceano indico.

Lixula. 5. E. hemiſphæricus ambulacris denis: paribus approximatis, areis tranſverſe punctatis muricatis. *Muſ. Ludw. Ulr.* 707.

Habitat in Oceano indico.

ſaxatilis. 6. E. hemiſphærico depreſſus, ambulactorum poris arcuatis: arcubus in baſi obliquis, propius à vertice magis erectis.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1102. *n.* 6. *Muſ. Lud. Ulr.* 708. Echinus hemiſphærico-depreſſus, ambulacris denis: paribus approximatis, areis longitudinaliter verrucoſis.
Rumpf. amb. p. 31. *t.* 14. *f.* A. Echinus ſaxatilis.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 111. *t.* 5. & 30. A. B. Cidaris rupeſtris.
Planc. conch. min. not. p. 21. Secundum echinorum genus.
Delic. nat. ſel. 1. *t.* D. III. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 11.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 13. *f.* 10. Echinometra muſcoſa amboinenſis.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 39. *f.* 4.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. *n.* 1. Byna ronde Egelmoeder.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. *f.* c.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. Breed band.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 5. *f.* b.
Habitat in mari mediterraneo, β) *in* indico, *mediæ magnitudinis, ſubelliptica, altitudine dimidii digiti, ex violaceo cinerea, vel alba, verrucis mediæ magnitudinis violaceis, ſubrubris, aut flaveſcentibus, areis verrucarum maximarum ſerie duplici, minoribus interjectis, ambulacrorum poris duplicibus: paribus 5 in ſeriem diſpoſitis, ore amplo, ano ſcutis ovato-acutis cincto, ſpinis rigidis brunneis apice violaceis.*

feneſtratus. 24. E. orbicularis, baſi plana feneſtrata, areis decem verrucaris magniſque inæqualibus, ore decagono. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 107. *t.* 4. A. B. *t.* 39. *f.* 5.
Rumpf. amb. p. 36? Echini ſecunda ſpecies.
Walch diluv. 2. *p.* 177. *t.* E. I. a. 1.
Habitat --- *albus, granulis per omnes areas et ambulacra inæqualis, in majoribus areis verrucarum papillas æquantium ſeriebus* 6, *ambulacris latis: pororum paribus* 3, *verſus verticem* 2, *ſpinis ex violaceo nigris, ano pentagono.*

ſubangularis. 25. E. hemiſphærico orbicularis, areis decem: minoribus elevatis, verrucarum in ſingulis ſeriebus decem. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 106. *t.* 3. C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 5?
Habitat --- *ex cinereo viridescens, pauliſper in brunneum vergens, baſi pulvinata, arearum tuberculis* 4 *vicinis rhombum mentientibus, ambulacrorum poris per* 4-5 *paria arcuatis.*

ovarius. 26. E. ovatus, areis majoribus bifariam verrucoſis.
Lang. hiſt. lap. fig. Helv. p. 124. Echinus ovarius minor.
Plot Oxfordſh. p. 108. §. 85. *t.* 5. *f.* 6.
Laid. lithoph. p. 46. *n.* 934-949. *t.* 9. *f.* 940.
Bourg. petrif. p. 76. *n.* 340. *t.* 52. *f.* 340. 345. 346.
Davil. catal. 3. *p.* 177. *n.* 213.

Habitat in Anglia, Normandia, Helvetia *in lapidem converſus.*

Diadema. 7. E. hemiſphærico-depreſſus, ambulacris quinis longitudinaliter verrucoſis, areis lanceolatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 709.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 14. 100. *t.* 37. *f.* 1. 2. *t.* 51. *g.* 1. *g.* 2.
Rumpf. muſ. p. 35. *t.* 13. *n.* 5. *t.* 14. *f.* B.
Petiv. amboin. t. 8. *f.* 5.
β) *Phelſ. Zee-egel. p.* 29. *n.* 27. Cidaris faſciis tuberculatis.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 11. *f.* 10. Echinus ex viridi flavus.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 29. *n.* 39. Steekelpen.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 9. Echinometra ſetoſa ſinenſis.
ε) *Davil catal. p.* 412. *n.* 933. 935. 938. Cidaris nigreſcens, ſpinis longis, Cidaris variolata rufo-cinerea, & Cidaris variolata americana.
Seb. muſ. 6. *t.* 13. *f.* 5. Echinometra nigra americana.
ζ) Cidaris variolata. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 46. *f.* 1.
η) Echinus ſpinis nigris albo annulatis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 101.

Habitat gregarius in maris indici *arenoſis, orbicularis, vertice depreſſo, teſta vivi cærulea, alias ex cæruleo cinerea, ore amplo, ano circulari corio pentagono cincto, areis* 5 *majoribus bifariam verrucoſis; verrucis apice perforatis, pororum in ambulacrorum baſi paribus* 3, *verſus apicem* 1, *ſpinis minoribus violaceis & ex cæruleo cinereis.*

calamarius. 27. E. ſphæroideo depreſſus, ambulacris quinis margine poroſis nigris, medio granulatis: punctorum prominulorum majorum ſerie duplici. *Pall. ſpicil. zool.* 10. *p.* 31. *t.* 2. *f.* 4-7. *Leske apud Klein echinod. p.* 115. *t.* 45. *f.* 1-4.

Habitat in mari indico, *ex albo vireſcens, ſetis verrucis minoribus inſidentibus viridibus, fragiliſſimis, ſpinis equiſeti culmum ſimulantibus albidis viridi-annulatis, apice griſeis.*

araneiformis. 28. E. orbicularis griſeus, aculeis dilate griſeis purpureo nitentibus medio craſſioribus.

Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 6. Echinometra multipes ſ. ſpinoſiſſima americana.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 38. Spinnekopf.
Habitat in mari americano.

ſtellatus. 29. E. ſpinis inſimis capillaribus.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 37. Kleine Komeet.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 7. Echinometra purpurea americana.
Pontopp. norſk. Naturh. p. 320. Erinaceus marinus.
Habitat in mari americano.

radiatus. 30. E. ambulacris quinque radiatis apice bifurcis. *Leske apud Klein echinod. p.* 116. *t.* 44. *f.* 1.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 36. Groote Komeet.
Seb. muſ. 3. *t.* 14. *f.* 1, 2. Echinanthus major ſpinis orbus.
Habitat - - - ambulacris ſingulis radiis binis albicantibus terminatis, foraminibuſque dilute rubellis pertuſis.

circinatus. 31. E. areis decem granulatis bifariam verrucoſis, majoribus excavatis, minoribus elevatis, baſi ſubpulvinata. *Leske apud Klein echinod. p.* 119. *t.* 45. *f.* 10.
Rumpf. amb. 59. *f.* C. *p.* 336. Echinites, cui teſta remanſit, &c.
Breyn. echin. p. 55. Echinometra circinata.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 30. Kransje.
Davil. catal. 3. *p.* 177. *n.* 214? Echinites eminentiis variolatis.
Scill. corp. mar. t. 25. *f.* 1?
Habitat - - - hactenus non niſi inter lapides inventus.

Cidaris. 8. E. hemiſphærico-depreſſus, ambulacris quinis repandis linearibus, areis alternatim bifariis. *Fn. ſuec.* 2118. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 710.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 125. *t.* 7. Cidaris papillata.
α) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 126. *t.* 7. A. *t.* 39. *f.* 1. 2. *t.* 51. *f.* h. 1. 2. Cidaris papillata major.
Imper. hiſt. nat. p. 784. Eſtrice marino.
Shaw it. 2. *p.* 74. Grand heriſſon de mer, &c.
Seb. muſ. 3. *p.* 30. *t.* 13. *f.* 11. 12. Echinometra ſpinis orba, &c.
Delic. nat. ſel. t. D. *f.* 2. *p.* 87. Groſer türkiſcher Bund.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 32. 34. *t.* 3. *f.* 10. Groote Tulband et Vootangel.
β) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 127. *t.* 7. B. & 36. *f.* 3. Cidaris papillata minor.

Aldrov. exang. p. 403? Echinus cum ſpina adjuncta & ſpinis ſpoliatus.
Rumpf. amb. p. 33. *t.* 12. *f.* 3. 4. & *muſ. Richter p.* 119. Echinometra digitata ſecunda vel rotunda.
Phelſ. Zee-egel. p. 29. *n.* 31. 33. Schubmond & kleine Tulband.
Argenv. conch. p. 310. *t.* 25. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *p.* 30.
Delic. nat. ſel. t. D. III. *f.* 5. *p.* 97.
γ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 129. *t.* 41. *f.* 4. & *t.* 7. D. E. Cidaris papillata ſpinis fuſiformibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 8. Echinometra ex Indiis.
Scill. corp. mar. t. 22. *f.* 1-3. Echinus maris e ſiculo mari.
Davil. catal. 1. *p.* 415. *n.* 943-945. Turban maure.
Valent. muſ. 2. *p.* 177? Echinus marinus.
Bonann. muſ. p. 92. *f.* 17-18.
Breyn. echin. p. 55. *t.* I. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 108. *f.* D. E.
Petiv. amb. t. 7. *f.* 2.
δ) ? *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 134. *t.* 46. *f.* 2. 3. Cidaris papillata ſpinis claviculatis.
Imper. hiſt. nat. p. 671.
Lang. lap. fig. t. 36. *fig. med.*
Deluc Naturf. 8. *p.* 278. *t.* 8.
Andreæ Brief. aus der Schweiz. p. 40. 267. *t.* 5. e. f. *t.* 14. *f.* d. & 4.
ε) *Müll. zool. dan. prodr.* 2848. Echinus ſpinis obtuſis.
Pontopp. norsk. Naturh. 2. *c.* 7. *p.* 278. f.
Stroem. ſondm. p. 175.
ζ) *Rumpf. amb. p.* 34. Echini ſiamenſes.
Habitat in Oceano, *utplurimum ex livido cinerea, baſi plana, areis majoribus* 5 *granulatis, verrucarum papillis apice perforatis alternarum & granulorum circulo, ſæpius duplici cinctarum, & ſulco circumeunte diſtinctarum ſeriebus duabus, minorum loco faſcia eminente inter ambulacra, ore ſatis amplo.*

mammillatus. 9. E. hemiſphærico-ovalis, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis verrucoſis: anguſtioribus abbreviatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 711.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 121. *t.* 6. *t.* 34. & *t.* 39. *f.* 1. Cidaris mammillata.
Rumpf. amb. p. 32. *t.* 13. *f.* 1. 2. Echinometra digitata prima oblonga.

Phelſ. Zee-egel. p. 30. *n.* 8. Groote Wydbeck.
Breyn. echin. p. 56. *t.* 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 108. B. C.
Argenv. conch. p. 310. *t.* 25. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 17.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 7. Kleine Wydbeck.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. Karmoiſine Egel-moeder.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 1. 2.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 6. Holleband.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 3.
ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 30. *n.* 12. Roſgeele Egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 13. *f.* 4.
Delic. nat. ſel. 1. *t.* D. *f.* 3. *p.* 87. & *t.* D. III. *f.* 7. 8.
Davil. catal. p. 414 *n.* 939-941.
Habitat in maribus *magis* meridionalibus, *depreſſus et flavo cinereus in fuſceſcentem colorem vergens, ſubtus magis albidus; arearum decem papillis omnibus non perforatis, circulis elevatis cinctis, in majoribus* 16-18, *quarum mediæ maximæ, in minoribus* 14 *magis ambulacris pororum ad baſin paribus* 4-5, *ore amplo, ano rotundo,* 10 *ſquamis cincto, quarum* 5 *perforatæ, ſpinarum colore vario.*

Lucunter. 10. E. hemiſphærico-ovatus, ambulacris denis flexuoſis, areis muricatis[*]: anguſtioribus longitudinalibus.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 109. *t.* 4. C. D. Cidaris Lucunter.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 6. 16. & *t.* 11. *f.* 11.
Breyn. echin. p. 56. *t.* 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* C.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 89. *t.* D. I. *f.* 8.
Davil. catal. p. 412. *n.* 934.
β) Cidaris Lucunter ambitu ſuborbiculari. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 4. *f.* E. F.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 3. Smalband.
Habitat in Oceano indico, *magnitudine & colore varians, ex flavo cinereus, cæruleſcens vel nigreſcens, baſi pulvinata, ore amplo, verrucarum maximarum in ſingulis areis ordine duplici, paulo minorum in majoribus areis ſextuplici, in minoribus quintuplici, pororum in ambulacris verſus utrumque finem paribus,* 4-5, *in medio* 6.

[*] *An hujus familiæ Echinus totus niger, ovatus, ambulacris quinis, areis muricatis verrucoſis, teſte Molina hiſt. nat. Chil. p.* 156, *ad litus Chilenſe obvius?*

atratus. 31. E. hemiſphærico-ovalis depreſſiuſculus: ſpinis truncatis breviſſimis obtuſiſſimis: marginalibus clavatis depreſſis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 117. *t.* 47. *f.* 1. 2. & 1. f. *t.* 44. aa. *t.* 54. *f.* 5. Cidaris violacea.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. *n.* 9. Violette Egel-moeder.
Argenv. conchyl. 1. *p.* 310. *t.* 25. *f.* F. G.
Davil. catal. 1. *p.* 413. *n.* 936.

Habitat in India, *ambitu ſuborbicularis, cinereus, in violaceum vergens, areis decem ſubtiliſſime granulatis, majorum verrucis majoribus ſerie interdum octuplici, in quincunce poſitis, minorum ſerie duplici, ambulacris fuſcis, excavatis, granulatis, latis: pororum ſeriebus* 4, *ſpinis violaceis, aliis clavatis, aliis apice angulatis, aliis cylindricis.*

coronalis. 32. E. hemiſphærico-orbicularis, areis decem: alternis anguſtioribus; papillis ſparſis, ambulacris planis, ante verticis aream per paria confluentibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 136. *t.* 8. A. B.
Phelſ. Zee-egel. p. 28. *n.* 5. Gierſt-korlige Zee-egel, & kranſwyze Geweloſtek.
Geſn. petrif. c. 12. *p.* 34. Echinites eminentiis per quinque ordines triangulares, &c.
Luid. lithoph. brit. n. 979-981.
Morton Northampt. p. 234. *t.* 10. *f.* 10.
Lang. lap. fig. p. 122. *t.* 35.
Bourg. petrif. t. 51. *f.* 334. 335.

β) Cidaris corollaris tenuis. *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 138. *t.* 8. C.
Geſn. petrif. c. 12. *p.* 34. Ombria.
Boët de Boodt gemm. p. 486. Brontia ſ. Ombria.
Dav. cat. 3. *p.* 178. Turban à couralle.
Mercat. muſ. metall. p. 247.
Hook Works p. 284. *t.* 2. *f.* 2. 3.
Plot ſtaffordſh. p. 178-198. *t.* 13. *f.* 21.
Liſt. lap. angl. p. 120. *tit.* & *f.* 19.
Luid. lith. brit. p. 46. *n.* & *f.* 942. 943.
Valent. muſ. 2. *t.* 3. *f.* 8.
Lang. lap. fig. p. 124. *t.* 35.
Bourguet petrif. p. 76. *t.* 52. *f.* 345. 346.
Scheuchz. oryctogr. p. 317. *f.* 134.
phyſ. ſacr. t. 56. *f.* 65.
Baier oryctogr. noric. t. 3. *f.* 36.

γ) *Klein echinod. ed. Lesk. p.* 140. *t.* 45. *f.* 2.

Rumpf. amb. p. 337. *t.* 59. *f.* E.
Phelſum Zee-eg. p. 27. *n.* 1.
δ) *Klein echinod. ed. Leſk. p.* 141. *t.* 8. D. E. Cidaris corollaris craſſa.
Habitat - - - frequenter in cretam et ſilicem converſus; an vera diſtincta ſpecies protypus?

aſteri-zans. 33. E. orbicularis depreſſus, tuberculis ſulco ad apicem uſque exaratis et granulorum circulo cinctis.
Klein echinod. ed. Leſk. p. 141. *t.* 8. F. *et t.* 46. *f.* 5.
Phelſ. Zee-eg. p. 29. *n.* 35. Sterre-wrat Zee-egel.
Habitat - - - inter lapides creta repletos, teſta in ſpatum converſa; vix diſtincta ſpecies protypus.

aſſulatus. 34. E. teſta ſcutellata: ſcutellis per ſuturas tranſverſas nexis. *Klein echinod. p.* 15. §. 26.
β) Cidaris teſſulata. *Klein echinod. ed. Leſk. p.* 16. §. 27.
Habitat - - - vix vere diſtincta ſpecies.

ſardicus. 35. E. orbicularis depreſſus tuberculatus, ambulacris denis impreſſis, areis multifariam verrucoſis: ſutura media impreſſa. *Leske apud Klein echinod. p.* 147. *t.* 9. A. B. *t.* 54. *f.* 4. 6.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 18. Sardiſche Zee-egel.
Planc. comm. Bonon. V. 1. *p.* 236. *t.* 1. *f.* 4. 5. Echinometra magna, malo marinus.
Bonann. recr. 2. *p.* 92. *n.* 19. *f.* 19.
Scill. corp. mar. t. 13. *f.* 1. & *t.* 36. *f.* B.
Habitat in mari tyrrheno & adriatico, *magnus, ex cirenco flaveſcente ruber, baſi fere plana magis flaveſcente, arearum majorum verrucis in 8-12 ſeries digeſtis: interſtitiis minoribus et minimis tuberculis obſitis, minorum verrucis minoribus in 4-6 ſeries diſpoſitis, pororum in ambulacris paribus 5, arcuato ordine ſitis, ore parvo decies ſinuato.*

flamme-us. 36. E. hemiſphæricus depreſſus, arearum medio ſuperiora verſus verrucis vacuo, minoribus elevatioribus ambulacris anguſtis, utrinque verrucarum ſerie cinctis. *Leske apud Klein echinod. p.* 148. *t.* 10. A.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 13. Gevlamde Zee-egel.
Habitat - - - ex olivaceo viridis, tuberculis & ambulacris baſique albidioribus; arearum majorum latiſſima parte verrucarum ſeriebus 12, *areis minoribus 3 aſperis ſingulis*

ſingulis verrucis tuberculorum minorum circulo cinctis; ambulacris vix 2 lineas latis: pororum paribus ternis granulis interſtinctis, ore parvo, ano ſquamis pentagonis cincto.

variegatus. 37. E. orbicularis ſubanguloſus, areis mediis roſeis utrinque læte viridibus, ambulacris ex viridi albicantibus, baſi albida. *Leske apud Klein echinod. p.* 149. *t.* 10. B. C.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 12. Buntgeſlamte Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *p.* 20. *t.* 10. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 107. *f.* F.
Habitat - - - rarior, arearum majorum parte latiſſima verrucarum: granulis circumdatarum veſtigiis 3-4 obſita, areis minoribus paulo elevatioribus: verrucarum ſeriebus 3, pororum in ambulacris paribus 3, ore ſubrotundo leviſſime ſinuoſo.

puſtuloſus. 38. E. arearum majorum medio ſutura interſtincto: verrucarum ſeriebus tranſverſis plurimis medium verſus numero increſcentibus, areis minoribus elevatioribus. *Leske apud Klein echinod. p.* 150. *t.* 11. A. B. C. D.
Phelſ. Zee-eg. p. 28. *n.* 7-9. Digtpniſtige, ylpuiſtige & bynanaakte Zee-egel.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 8-10. 15.
Habitat - - - vix pollicem altus, diametri bipollicaris, ex brunneo cinereus, in rubrum vergens, areis minoribus dilutioribus, baſi magis albida, verrucis rubellis, areis decem majorum diſco aſpero, ſutura utrinque granulis minimis cincta, extimo utrinque verrucarum ordine ſolitaria verruca, altero duabus compoſito, ut in medio ſenarium numerum aſſequatur, areis minoribus verrucarum ordinibus 2, quibus linea ſerrata, et granula minima interjacent; pororum in ambulacris paribus 4-5, in lineis obliquis excurrentium, ore late ſinuoſo.

granulatus. 39. E. ſuborbicularis ſubangulosus, arearum medio nudo ſutura utrinque ſerrata diſtincto, verrucarum in majoribus utrinque ordinibus ſeptem in minoribus quatuor. *Leske apud Klein p.* 150. *t.* 11. E. F.
Phelſ. Zee-eg. p. 27. *n.* 4. Zand-korlige Zee-egel.
Habitat - - - ¾ pollicis altus, diametri ſeſquipollicaris, baſi pulvinata cum arearum majorum margine ex viridi cinereus, arearum majorum medio areiſque minoribus obſcure viridibus, pororum in ambulacris paribus 3 in triangulo ſitis, ano circulari, ad marginem ſquamis 10, roſæ inſtar expanſis cincto.

teſſellatus. 40. E. areis decem ſutura media diverſis aſſulatis, ambulacris decem biporoſis ore circulari. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 153. t. 11. G.*
Phelſ. Zee-eg. p. 27. n. 2. Leyendak.
Beſchr. d. Merkw. Baſels. p. 259. t. 22. G?
Habitat --- hactenus modo inter lapides repertus.

botryoides. 41. E. areis ſutura media longitudinali bipartitis, majoribus bifariam verrucoſis, pororum in ambulacris ſerie duplici arcuata. *Leske apud Klein echin. p. 154. t. 11. H.*
Phelſ. Zee-eg. p. 27. n. 3. Geribde Zee-egel.
Aldrov. muſ. metall. p. 457. Echinites lævis valde durus & lucidus, figuram meſpili æmulans.
Habitat --- hactenus modo inter lapides inventus.

toreumaticus. 42. E. hemiſphæricus, areis decem bifariam verrucoſis: verrucis crenatis granulorum circulo cinctis, areis majoribus ſulcis longitudinalibus quatuor, minoribus duobus exaratis. *Leske apud Klein echin. p. 155. t. 10. D. E. t. 44. f. 2.*
Phelſ. Zee-eg. p. 28. n. 6. Gegraveerde Zee-egel.
Habitat --- cinereus leviſſime vel cæruleſcens vel vireſcens, baſi & ambulacris flaveſcentibus, ambulacris biporoſis: poris in linea argute ſerrata poſitis, baſi pulvinata, ore parvo, ano ſquamis 10 *cincto.*

† † *figura ad clypei figuram accedente*, Clypei Kleinii.

ſinuatus. 43. E. convexus ambulacris ſtriatis areiſque decem, verrucis granulorum circulo cinctis. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 157. t. 12.*
Plot oxfordſh. p. 91. 92. t. 2. f. 9. 10. Polar ſtone.
Liſt. lap. cochl. p. 224. tit. & fig. 27.
Luid. lithoph. brit. p. 48. n. 971.
Mort. Northampt. p. 233. n. 1.
Habitat --- hactenus modo inter lapides inventus, arearum una ſinu excavato diviſa, ambulacris latis margine utroque punctatis, baſi parum excavata, & ſulcis 5 *divergentibus exarata, ore parvo pentagono.*

ſemigloboſus. 44. E. hemiſphæricus ſulcatus, baſi plana, verrucis ſeriatis. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 158. t. 43. f. 1.* Clypeus hæmiſphæricus.
Lang. lap. fig. p. 119. t. 34.
Volkm. Sil. ſubt. 1. p. 179. t. 30. f. 5.
Bourg. petrif. t. 52. f. 342.

Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia deprehenſus ; an propria ſpecies protypus ?

quinque-labiatus. 44. E. annulis innumeris pictus : media foſſula, ſtellulam convexam cingente. *Leske apud Klein echinod, p.* 159. *t.* 41. *f.* 3.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. *n.* 2. Vyflip.
Walch monum. diluv. 2. *p.* 181. *t.* E. III. *f.* 4.
Verſ. der baſel. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* 1.

Habitat - - - adhuc modo inter foſſilia obvius.

conoideus. 45. E. ſubconicus ambitu elliptico, areis & ambulacris decem, his tranſverſe ſulcatis, & margine poroſis, illis ſutura excavata recta diviſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 159. *t.* 43. *f.* 2.
Hacquet Naturf. 11. *p.* 105.
Aldrov. muſ. metall. p. 456.
Davil. catal. 3. *p.* 182. *n.* 225.

Habitat - - - hactenus tantum inter foſſilia occurrens, baſi plana, arearum verrucis creberrimis, granulorum circulo cinctis, baſi plana ſulcata ; ano circulari.

* *ano infero, tentaculis oris nullis,* Briſſi Mülleri.
† *baſi circulari, in cujus peripheria anus,* Fibulæ Kleinii.
⊤ *in conum elevati,* Conuli Kleinii.

albo-galerus. 46. E. areis tuberculis albis minimis denſe obſitis ambulacriſque denis, his biporoſis, areis majoribus ſutura ſerrata nexis & tranſverſim lineatis, minoribus foramine urticis terminatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 162. *t.* 13. A. B.
Phelſ. Zee-egel. p. 31. *n.* 15. Egelſteen tienband rondtop.
Aldrov. muſ. metall. p. 455. *f.* 4.
Beſl. gazoph. contin. t. 19.
Plot. oxfordſh. §. 35. *t.* 2. *f.* 13.
Morton. Northampt. p. 235. *n.* 1.
Luid. lithoph. brit. p. 47. *n.* 958. 959.
Lachm. oryctogr. Hildeſ. p. 23.
Lang. lap. fig. p. 125. *t.* 36. *f.* 1.
Mell. ech. wagr. p. 7. *f.* 6.
Breyn. ech. p. 57. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Bourg. petrif. p. 77. *t.* 53. *f.* 361.
Davil. catal. 3. *p.* 179. *n.* 220.

Habitat - - - hactenus ſolum inter foſſilia inventus, ſubovalis, ore orbiculari parvo, ano ovato.

depreſſus. 47. E. areis decem: majoribus ſutura media diviſis, ambulacris decem biporoſis, vertice depreſſo, ano orbiculari.
Leske apud Klein echinod. p. 164. *t.* 40. *f.* 5. 6.
Phelſ. Zee - eg. p. 31. *n.* 16. Egelſteen tienband plattop.
Walch diluv. monum. 2. *p.* 180. *t.* E. II. *f.* 6. 7.
Mell. ech. Wagr. p. 7. *t.* I. *f.* 2.
Kundm. rar. nat. & art. 5. *f.* 12.
Natürl. baſel. Merkw. 22. *t.* 22. *f.* H.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſillis, oris mediocris ſinubus 10 *acutis, ano magno avato.*

vulgaris. 48. E. orbicularis ambulacris decem: binis ſibi ſemper vicinis.
Leske ap. Klein echinod. p. 165. *t.* 13. *f.* c-*k. t.* 14. *f.* a-k. *t.* 40. *f.* 2. 3.
Waller. ſyſt. miner. p. 507. Echiniti fibulares.
Phelſ. Zee - eg. p. 31. *n.* 1 - 11.
Walch. diluv. monum. 2. *p.* 176. 177. & *ſuppl. p.* 217. *t.* E. I. *f.* 1. 2. *t.* E. I. a. *f.* 2. *t.* IX. d. *f.* 2. *t.* IX. g. *f.* 1.
Aldrov. muſ. met. p. 455. *f.* 3. 6.
Bocc. obſ. nat. p. 219. *fig. ad fin. tab.*
Olear. muſ. Gottorp. t. 21. *f.* 5. 6.
Beſl. gaz. contin. t. 19. Scholopendrites, Ovum anguinum.
Muſ. Calceol. p. 353. Bufonites.
Worm. muſ. p. 107. Bufonius lapis.
Mort. Nortchampt. p. 235. *n.* 2. *t.* X. *f.* 11.
Liſt. lap. cochl. p. 219. *tit.* & *f.* 18.
Luid. Lith. brit. p. 46. *n.* 944 - 950. 957?
Rumpf. amboin. t. 1. *f.* 6 - 9.
Mercat. metall. p. 246. *f.* 1 - 4.
Mell. ech. Wagr. p. 7. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Myl. memor. Saxon. p. 45 - 47. *f.* 2. 4. 5. 9. 10.
Volkm. Sileſ. ſubterr. p. 179. *t.* 30. *f.* 6. E.
Helw. lithogr. angerb. p. 71. *t.* 8. *f.* 13.
Breyn. echin p. 57. *t.* 2. *f.* 3. 4.
Bytem. biblioth. app. t. 23. *f.* 270.
Brom. mineral. p. 51.
Schreb. lithogr. Hal. p. 103. 1. *α.*
Lerch. oryctogr. Hal. 33.
Geſn. petr. p. 24.
Davil. catal. 3. *p.* 180. *n.* 220.

Habitat - - - hactenus ſolummodo, ſed frequentiſſime, foſſilis, innumera priſtinæ nunc melius conſervatæ, nunc magis deletæ formæ varietate.

quadrifaſciatus. 49. E. ambulacris quaternis. *Leske apud Klein echinod. p.* 170. *t.* 47. *f.* 3-5.
Phelſ. Zee-eg. p. 30. 31. Vierbandige Egel-ſteen.
Gehler char. foſſil. extern. p. 13. *f.* 1.
Walch diluv. monum. ſuppl. p. 218 223 *t.* IX. d. *f.* 3. & *t.* IX. g. *f.* 7-9.
Habitat - - - - hactenus non niſi foſſilis, ambitu nunc orbiculari, nunc propius ad ovalem accedente.

ſexfaſciatus. 50. E. ambulacris ſenis. *Leske apud Klein echinod. p.* 170. *t.* 50. *f.* 1. 2.
Klein act. nat. Cur. Gedan. 2. *p.* 292. *t.* 5. *f.* 14. 15. Echinus Terdorpſii.
Phelſ. Zee-eg. p. 31. *n.* 14. Zesband.
Gehl. charact. foſſ. ext. p. 13. *f.* 2.
Walch diluv. monum. ſuppl. t. IX. g. *f.* 4-6.
Habitat. - - - adhuc tantum foſſilis.

†† *baſi exacte circulari*, Diſcoidei Kleinii.

Subuculus. 51. E. ambulacris biporoſis areiſque decem, ore anoque parvis orbicularibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 171.
Geſn. petrif. p. 35. *n.* 6.
Davil. catal. 3. *p.* 180.
α) *Phelſ. Zee-egel. p.* 37. Rooſe-top-Egelmots.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 14. *f.* l. m.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 37. Kreeſt vagie Egelnaapje.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 14. *f.* n. o.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis, areis circulis minimis obſeſſis, 5 majoribus, 5 minoribus, ambulacrorum poris ſubtiliſſimis denſe ſibi adjacentibus.

††† *baſi ovali*, Echinonei Phelſumii & Leskii.

cycloſtomus. 52. E. oblongus ſubdepreſſus, verticis poris quinque, ore medio rotundo, ano oblongo vicino. *Leske apud Klein echinod. p.* 173. *t.* 37. *f.* 4. 5.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 18. *t.* 91. *f.* 5. 6. *prodr.* 2851. Spatagus puſillus.
Phelſ. Zee-eg. p. 32. *n.* 11. Rond-mond.
Bocc. obſ. nat. p. 219.

Rumpf. amb. p. 6. t. 14. f. D.
Breyn. echin. p. 57. t. 2. f. 5. 6.
Seb. muſ. 3. p. 36. t. 15. f. 30-33-35-37.
Delic. nat. ſel. p. 90. t. D. I. *f.* 11.
Baier oryctogr. nor. t. 3. f. 35.

Habitat - - - cinereus, ſubflaveſcens, baſi pulvinata, areis 10, linea media argute ſerrata diviſis tuberculis minimis circulo incluſis obſitis, ambulacris 10 biporoſis, ad os uſque protenſis.

ſemilunaris. 53. E. ano oblongo longitudinali, ore tranſverſo ſemilunari.
Muſ. Telſin. p. 114. t. 6. f. 2. Echinus ovalis.
Leske ap. Klein echinod. p. 174. t. 49. f. 8. 9. Echinoneus minor, ore ſemilunari.
Phelſ. Zee-eg. p. 32. n. 2. Splect-mond.
Seb. muſ. 3. p. 19. t. 10. f. 7.
Habitat in mari aſiatico, *dilute ex cinereo flaveſcens.*

ſcutiformis. 54. E. ore pentagono, ambulacris decem ſtriatis, areis majoribus aſſulatis: aſſulis pentagonis. *Leske ap. Klein. echinod. p.* 174.
Scill. corp. mar. t. 11. *f.* 1. 2.
Habitat - - - an hujus tribus?

✝✝✝✝ *baſi ex ovali acuta, ano ori oppoſito,* Caſſides Kleinii, Echinocoryes Leskii.
⁊ *majores,* Galeæ Kleinii.

ſcutatus. 55. E. convexus ſubtus planus, areis tuberculis alternatim majoribus: majoribus ſutura media ſerrata diviſis, ore tranſverſo reniformi. *Leske ap. Klein echinod. p.* 175.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 175. Galea vertice ſcutato.
Phelſ. Zee-egel. p. 37. n. 1. Ocean-Egel, Vyſblad.
Luid. lith. brit. p. 46. n. 951-953.
Scheuchz. muſ. diluv. p. 88. n. 851-854.
Breyn. ech. p. 58. t. 3. f. 1. 2.
Abildg. Stevenſkl. p. 22. t. 2. f. 1-5.
Davil. catal. 3. p. 179. n. 219.
α) *Phelſ. Zee-eg. p. 36. n.* 2. Geſtreepte Zont-egel.
Walch diluv. monum. 2. p. 179. n. 4. t. E. I. a. *f.* 4.
Leske apud Klein echinod. t. 42. f. 4.
β) *Phelſ. Zee-egel p.* 37. Getaufelde Ocean-Egel.
Walch diluv. monum. 2. p. 176. t. E. I. *f.* 3. 4.
Leske apud Klein echinod. t. 42. f. 2. 3.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis, arearum tuberculis granulis minimis interſperſis, ore tuberculis paulo majoribus triangulum formantibus cincto, ano ſubovato, baſi marginem verſus convexiuſcula, plaga media eminentiore, utrinque faſciis duabus ſubtiliſſime granulatis cincta.

ovatus. 56. E. ovatus aſſulatus: aſſulis hexagonis, vertice nudo, ano ſubovali. *Leske apud Klein echinod. p. 178. t. 53. f. 3.*
Aldrov. muſ. met. p. 455. f. 10.
Grew muſ. p. 255?
Hook Works t. 2. f. 4?
β) *Leske apud Klein echinod. t. 42. f. 5.*
Walch diluv. monum. 2. p. 179. t. E. I. a. *f.* 5.
Aldrov. muſ. met. p. 455. f. 3.
Bgtem. biblioth. app. t. 23. f. 270.
γ) *Leske apud Klein echinod. p. 143. ic. tit. & t. 8. f.* G.
Brontias favagineus.
Worm. muſ. p. 77.
Encel. re metall. c. 47. p. 232.
Olig. Jacob. muſ. p. 35.
Walch diluv. monum. 2. p. 177. t. E. a. *f.* 3.
Habitat - - - adhuc modo inter foſſilia repertus, 20 aſſularum (rariorum 7. aut 5 generum) ſeriebus, 10 majoribus, 10 minoribus, omnibus ſutura ſerrata connexis, & ſimilarium duabus vicinis, areis 10 majoribus, 10 minoribus, in ſingulis his 2 punctis impreſſis, ore rotundo minori, ano ſubovali.

puſtuloſus. 57. E. areis obſoletis non tuberculatis, ambulacrorum punctis duobus per paria diſpoſitis eminentibus, vertice impreſſo. *Leske apud Klein echinod. p.* 180. *t.* 16. A. B.
Plot oxfordsh. §. 36. t. 2. f. 14.
Mort. northampt. p. 335. t. 10. f. 12.
Liſt. lap. cochl. p. 225. t. 7. f. & tit. 29-31.
Luid. lith. brit. p. 47. n. 954.
Grew muſ. p. 259.
Hook Works p. 284. t. 3. f. 7.
Hellw. lith. angerb. p. 70. t. 8. f. 12.
Mell. ech. wagr. t. 1. f. 7. 8.
Kundm. rar. nat. & art. p. 95. t. 5. f. 8. 9.
Schreb. lithogr. hal. p. 41. γ.
Friſch muſ. Hoffm. p. 33.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis, figura & ambitu, ore anoque ſcutato ſimilis.

quadrira- 58. E. punctorum ordinibus quatuor geminatis. *Leske apud*
diatus. *Klein echinod. p.* 182. *t.* 54. *f.* 1.
Mell. de lap. fig. Lubec. p. 28. *t.* 2. *f.* 7. Echinites Niendropienſis.
Habitat - - - adhuc tantummodo foſſilis.

┤┤ *minores*, Galeolæ Kleinii.

minor. 59. E. ovatus baſi plana vel concava ambulacris biporoſis areiſque decem, ore tranſverſo ſubrotundo, ano ſubovali. *Leske apud Klein echinod. p.* 183.
papilloſus. α) E. *echinod. ed. Lesk. t.* 16. C. D.
Phelſum Zee-eg. p. 36. *n.* 5. Kneſtagtige Zont-egel.
Aldrov. muſ. met. p. 455.
undoſus. β) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 17. a. b.
Phelſum Zee-eg. p. 36. *n.* 6. Gevlamde Zont-egel.
Breyn. echin. p. 58. *t. f.* 3. 4.
lævis. γ) E. *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 17. c. d.
Bromel. miner. p. 50.
Volkm. Sileſ. ſubt. t. 30. *f.* 7.
Habitat - - - hactenus ſolum inter foſſilia deprehenſus.

dubius. 60. E. ovatus, ambulacris denis ſimpliciter poroſis, ani dimidia parte marginali. *Leske apud Klein echinod. p.* 184. *t.* 44. *f.* 5.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus, areis 5 majoribus circulis impreſſis inſignitis.

┼┼┼┼┼ *baſi irregulari, flore quaſi pentapetalo in ſuperficie expanſo*, Scuta Kleinii Echinanthi Leskii.
┐ *angulares peripheria per ſinus anguloſa.*

roſaceus. 14. E. planiuſculus ovato-ſubrotundus, ambulacris quinis ovalibus: ſuperficie punctata. *Muſ. Lud. Ulr.* 713.
Klein echinod. ed. Lesk. p. 185. *t.* 17. A. Echinanthus humilis.
Phelſ. Zee-eg. p. 38. *n.* 4. Groot Egel-roozen Stomp-blad.
Sloan. jam. t. 242. *f.* 6-11.
Rumpf. amb. 36. *t.* 14. C.
Petiv. amb. t. 1. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 11. *f.* 2. 3.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 91. *t.* D. I. *f.* 12.
Davil. cat. 1. *p.* 421.
) *Klein echinod. ed. Lesk. t.* 19, A. B.
Phelſ. Zee-eg. p. 38. *n.* 5. Kleine Egel-roozen Stomp-blad.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 11. 12.

Gualt. teſt. 1. *t.* CX. A.

γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 34. Eeglkoeken vyfhoek groote.
Klein echinod. ed. Lesk t. 18. B.
Boccon. obſ. p. 324. *t. f.* 1.

δ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 6. Egel-roozen Dikrand.
Seb. muſ. 2. *t.* 15. *f.* 13. 14. 23. 24.

ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. Egel-roozen Scherpblad.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 40. & 41. *f.* 1.

Habitat in Oceano aſiatico, (ε) *non niſi foſſilis) ex brunneo flaveſcens, interdum ſordide cinereus, tuberculis arenam granula æquantibus, multis in quicunce poſitis.*

altus. 61. E. vertice elato orbiculari, ambulacris lutis apice convergentibus granulatis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 189. *t.* 53. *f.* 4.
Scill. corp. mar. t. 9. *f.* 1. 2.
Mercat. met. p. 233. Cucurbites.
Bonann. recr. t. 36. *f.* 1.
Dav. catal. 3. *p.* 153. *n.* 227.
Walch dil. monum. ſuppl. p. 215. *t.* IX. d. *n.* 1.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, roſaceo altior, ut 2 pollices altitudine, diametro baſeos longitudinali 6 æquet.

†† *ovati, margine integro.*

oviformis. 62. E. convexus ſubtus planus, ambulacris decem biporoſis ſtellæ in modum expanſis, verticis poris quatuor. *Leske apud Klein echinod. p.* 191. *t.* 20. c. d.
Rumpf. amb. t. 14. *n.* 3.

α) *Phelſum Zee-eg. p.* 38. *n.* 1. Eyronde Egelroos.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 18. C. D. Scutum ovatum Chaumontianum.

β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 38. *n.* 2. Hartagtige Egelroos.
Klein echinod. ed. Lesk. t. 20. a. b. Scutum ovatum Iſſyavienſe.
Aldrav. muſ. met. p. 498. *f.* 1. 2. Pentaphyllites.
Mercat. metall. p. 23. Monoſtroites vel cryptopetræ ſpecies altera.
Rumpf. amb. t. 59. *f.* D.
Breyn. echin. p. 59. *t.* 2. *f.* 45.
Walch dil. monum. 2. *p.* 181. *t.* F. III. *n.* 5.

γ) *Phelſum Zee-eg. p.* 37. *n.* 5. Rondhart.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 23.

Habitat - - - ſupra ex cinereo fuſceſcens, ſubtus ex cinereo albidus, granulatus, granulis circulo circum-

datis, ore tranſverſo ſubreniformi ſlabiato, ano margini vicino, baſeos linea media glabra, albidiore, ab altero teſtæ fine ad alterum extenſa.

orbiculatus. 63. E. granulatus, ambulacris biporoſis: poris lineola tranſverſa impreſſa conjunctis, ſpatiiſque intermediis ſutura media ſerrata bipartitis, reliqua ſuperficie quinquepartita. *Leske apud Klein echinod. p. 194. t. 41. f. 2.*
Mercat. met. p. 232. Monoſtroites minor.
Walch monum. dil. 2. p. 181. t. 41. f. 2.
Natürl. baſ. Merkw. 22. t. 22. f. 3?
Bourg. petrif. p. 77. t. 53. f. 352.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis; an vere diſtincta ab aliis, præſertim a quinquelabiato ſpecies?

✝✝✝✝✝✝ *utrinque plani, ambulacris petalorum figuram æmulantibus, ore centrali plano dentato, verticis poris quatuor,* Placentæ Kleinii, Echinodiſci Leskii.

ɜ *margine ſinuoſo.*

⊥ *ſuperficie perforata;* Mellitæ Kleinii.

biforis. 64. E. baſi ſulcis quinque lineiſque flexuoſis radiatis decemexarata, foraminibus oblongis ad anum duobus. *Leske apud Klein echinod. p. 169. t. 21. A. B.*
Delic. nat. ſel. 1. p. 92. t. D. I. f. 1. Echinodiſcus.
Phelſ. Zee-eg. p. 35. n. 12. Onregelmatige Egelkoek. *p. 34. n. 3.* Stomphart met twot buiſen.
Davl. catal. 1. p. 423. n. 955.
St. Müller Linneiſch. Naturf. 6. B. t. 8. f. 8.
Habitat - - - ſupra convexiuſculus ex dilutiore flaveſcente cinereus, ſubtus ochroleucus, nunc ſubrotundus, nunc obtuſe trigonus, margine nunc ſinuato, nunc potius repando, ore obtuſe pentagono, ano nunc circulari, nunc tranſverſe ovali, foraminibus ei appoſitis nunc brevioribus ſubovatis, nunc longioribus, anguſtioribus, linearibus, ambulacris petala ovata mentientibus, ſimplici punctorum interiori ſerie, & ſtriarum obliquarum teſtam penetrantium ordine conflatis.

Cui tribui accenſendi, quos echinanthos appellat Cl. v. Phelſum, ſiquidem vere diſtinctæ ſint ſpecies, Vyſhoekje & Sherprugge Egebloim, *&* Echinites oblongus *quinqueradiatus?*

pentaporus. 65. E. ambulacris apice emarginatis, ano ori proximo: foraminibus quinque. *Leske apud Klein echinod. p.* 197. *t.* 21. C. D.

Phelſ. Zee-eg. p. 35. *n.* 11. Vyfbuizige Egelkock.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. V.
Hugh barb. 280. *t.* 24. *f.* 3. 4.
Broxm. obſerv. p. 296.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 9. 10.
Argenv. conch. 2. *p.* 63. *t.* 7. *f.* C.
Gualt. teſtac. t. 110. *f.* E.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 16.
Dav. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.

Habitat - - - *obtuſe pentagonus, ſupra ex albo cinereus leviſſime rubeſcens, ſubtus medium verſus excavatus, albus, parum flaveſcens, venis cæruleſcentibus, teſtæ aſſulis prominentibus, ambulacris ovalibus, ore obtuſe pentagono: labiis parum prominentibus foramine pertuſis, ano fere tetragono: foraminibus appoſitis linearibus & ſubovalibus, vertice ſtella pentagona picto.*

hexaporus. 66. E. orbicularis, ambulacris anguſtis, foraminibus ad anum ſex anguſtis. *Leske apud Klein echinod. p.* 199. *t.* 50. *f.* 3. 4.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 2. Doorgeboorde Egelſchyf.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 7. 8.
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 93. *t.* D. I. *f.* 17.
Davil. catal. 1. *p.* 423. *n.* 955.

Habitat in Oceano indico, americano, ſeptentrionali, *vix diverſus a pentaporo, cinereus vertice umbilicato, baſi parum excavata: lineolis picturam frondoſam referentibus obſcuriori.*

emarginatus. 67. E. ſubpentagonus, ambulacris ovatis, ano ovali ab ore magis remoto: foraminibus ſex marginem attingentibus. *Leske apud Klein echinod. p.* 200. *t.* 50. *f.* 5. 6.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 6. Loefwerk.

Habitat ad Inſulam Burboniæ, *ex bruno cineraſcens, ſubcordato-ovalis, leviter pulvinata, ſinuoſa, diametro longitudinali* 4 *pollices &* 8 *lineas, tranſverſa* 4 *pollices & lineas æquante, vertice patulo, baſi planiore, lineis flexuoſis ramoſis inſculptis picta.*

auritus. 68. E. margine undato: inferiori rotundato; ſuperiore ſubquadrato bis inciſo, inter ſingula bina ambulacra poro hians. *Leske apud Klein echinod. p.* 202.

Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 1. Geoorde Stomp-hart.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 1, 2.
Habitat in ſinu perſico, *ex cinereo flavus, margine ſuperiori ſpadiceo, baſi plana, punctata, radiatim ſtriata, ano oblongo ori proximo.*

inauritus. 69. E. ſubcordatus aſſulatus: aſſulis hexagonis, ambulacris quinque ovalibus apice emarginatis: quinto longiore, ſingulis binis poro interſito. *Leske apud Klein echinod. p.* 202.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 2. Ongeoorde Stomphart.
Rumpf. amboin. p. 37. *t.* 14. F.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 34. Schyfgeſcheurde Egelkoek zonder buizen.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 3. 4.
Habitat in Amboinæ fluvio Wagnitoe, 5-6 *pollices longus latuſque, latiore fine bis inciſus, tenuis, granulis ſpinis baſin præbentibus denſe obſitus, ſupra ex rufeſcente cinereus, ſubtus ex violaceo ruber.*

tetrapo-rus. 70. E. orbicularis leviter ſinuoſus, quatuor foraminibus utrinque pertuſus, ano circulari. *Leske apud Klein echinod. p.* 204.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. *n.* 5. Schyf geſcheurde Egelkoek met buiſen.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 5. 6.
Habitat - - - ex flavo dilute cinereus, vertice quinque foraminibus pertuſo, ambulacris apice obtuſis, baſi ſulcis 10 *flexuoſis apice bifidis exarata, ore rotundo quinque-dentato.*

⁂ *ſuperficie integra*, Lagana Kleinii.

Laganum. 71. E. ambulacris ovalibus ſubtiliſſime ſtriatis apice fiſſis, vertice prominente, ano circulari margini vicino. *Leske apud Klein echinod. p.* 204. *t.* 22. *f.* a. b. c.
Rumpf. amb. p. 36. *t.* 14. *f.* E. Zeereal.
Bocc. obſ. p. 296. *f.* 2.
Gualt. teſt. CX. *f.* C. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 25. 26.
Plot. oxfordſh. p. 92. §. 53. *f.* 12.
Habitat - - - granulatus, ochroleucus, ovatus, ſubpentagonus, baſi radiis 5 *excavatis in totidem areas æquales diviſa, ore obtuſe pentagono, ano vix li-*

latitudine a margine diſtante, vertice 5 foraminibus inter ambulacra pervio.

ſubrotundus. 72. E. orbicularis, ambulacris radiatis. *Leske apud Klein echinod. p. 206. t. 47. f. 7.*
Aldrov. muſ. met. p. 458.
Scill. corp. mar. t. 8. f. 1-3.
Andreæ Br. a. d. Schw. t. 5. f. g.
Davil. catal. 3. p. 184. n. 229.
Valent. muſ. t. 3. f. 7. b.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis inventus.

reticulatus. 15. E. ovatus, ambulacris quinis ovalibus, ſuperficie reticulata.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. Echinoglycus ovalis.
Leske apud Klein. echinod. p. 207. t. 45. f. 8. 9.
Rumpf. amboin. t. 14. C.
Gualt. teſt. t. CX. *f.* D.
Seb. muſ. 3. t. 15. f. 23. 24. 35. 36. 38.
β) *Phelſ. Zee-eg. p. 34.* Echinoglycus pentagonus.
*Seb. muſ. 3. t. 15. f.**
Habitat in Oceano americano & indico.

orbicularis. 73. E. circularis, ambulacris ovalibus acutis, baſi radiis decem impreſſis poroſis ano inter os & marginem medio cum ore circulari. *Leske ap. Klein echinod. p. 208. t. 45. f. 6. 7.*
Rumpf. amb. p. 37. Zeeſchelling.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. δ.
Gualt. teſt. 1. CX. *f.* B.
Breyn. ech. t. 7. f. 1. 2.
Bocc. obſ. p. 269. f. 2. 3.
Lang. lap. fig. p. 122. t. 35. f. ult.
Habitat in mari indico.

corollatus. 74. E. orbicularis ambulacris ovalibus obtuſis brevibus. *Lesk. ap. Klein echinod. p. 209. t. 40. f. 4.* Echinodiſcus roſaceus.
Phelſ. Zee-eg. p. 34. n. 8. Rooſe topje.
Walch dil. monum. 2. p. 180. t. E. II. *f.* 8.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis repertus.

†† *margine dentato*, Rotulæ Kleinii.

decadactylos. 75. E. teſta foraminibus quatuor oblongis pervia, marginis dentibus decem. *Leske apud Klein echinod. p. 209. t.* 22. A, B.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. β.
Gualt. teſt. t. 110. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 17. 18.
Davil. cat. 1. *p.* 425. *n.* 960.
Habitat - - - granulis aſper, ſupra ex viridulo cærulescente & cinereo varius, ambulacris ſuturiſque pallide carneis, baſi ex flaveſcente carnea: ſulcis 10 *impreſſis flexuoſis apice bifidis, ex virideſcente cinereis, ambulacris ex lanceolato ovalibus, integris, biporoſis, per ſtrias obliquas nexis, marginis dentibus alternatim brevioribus, ore rotundo, ano ovato.*

octodactylos. 76. E. anterius orbicularis, foraminibus duobus pervius, poſterius octodentatus, ambulacris lanceolatis. *Leske apud Klein echinod. p.* 211. *t.* 22. *f.* C. D.
Phelſ. Zee-eg. p. 33. *n.* 6. Agtvingerige Egelſchyv.
Breyn. echin. p. 64. *t.* 7. *f.* 5. 6.
Gualt. teſt. t. 110. *f.* F.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 33. Echinotrochus decemdentatus.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 15. 16.
Habitat - - - rarior, ex cinereo albicans, aſſulatus, aſſulis convexis, concoides, vertice umbilicato, ambulacris emarginatis.

Orbiculus. 17. E. anterius orbicularis integer, poſterius inæqualiter dentatus, ambulacris lanceolatis apice fiſſis hinc flexis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105. *n.* 17. Echinus planus ſuborbicularis; ambulacris quinis ovalibus, ano ſubremoto.
Leske ap. Klein echin. p. 212. *t.* 22. E. F. Echinodiſcus dentatus.
Rumpf. amb. t. 14. *f.* I. Zonne-ſtrualde Pannekoek.
Breyn. echin. t. 7. *f.* 3. 4.
Bocc. obſ. p. 273. *f.* 15.
Valent. muſ. 3. *p.* 177. *f.* 2.
Argenv. conch. 2. *t.* 7. *f.* D.
Davil. catal. 1. *p.* 425. *n.* 959.
β) *Leske apud Klein echinod. t.* 49. *f.* 6. 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 19. 20.
Habitat in mari indico, *non perforatus, ex aſſulis planis hexagonis compactus, baſi plana ſulcis impreſſis diſtincta, ore rotundo, ano ovali.*

††††††† *ambulacris* 10 *e vertice radiis rectis biporoſis ſtellatis, ore anoque in media baſeos parte vicinis*, Echinocyami Phelſumii & Leskii.

Nucleus. 77. E. ſuperficie globoſa, ambitu orbiculari, baſi anguſtata medio plana, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1-5. *Leske apud Klein echinod. p.* 213. *t.* 48. 2a-2e.
Habitat - - - ex flaveſcente cinereus, vertice 4 *poris pervio, ore circulari, anum oblongiuſculum ſuperante.*

centralis. 78. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſuborbiculari, baſi pulvinata, lateribus tenuiſſime ſulcatis, ambulacris vix pulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 6-10. *Leske apud Klein echinod. p.* 213.
Habitat - - - ano minimo orbiculari, an vere diſtinctus a nucleo?

Ervum. 79. E. ſuperficie globoſa, ambitu ſubovali, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 131. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 11-15. *Leske apud Klein echinod. p.* 213.
Habitat - - - nucleo paulo major, ore anoque æqualibus.

craniolaris. 80. E. ſuperficie anterius globoſa, poſterius ſubquinquangulari pulvinata declivi, ambitu elliptico, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice excentrico. *Phelſ. Zee-eg. p.* 132. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 16-20. *Leske apud Klein echinod. p.* 214. *t.* 48. 3a-3c. *Pall. ſpicil. zool.* 9. *t.* 1. *f.* 24. Echinus minutus ſubgloboſus ex orientali India.
Habitat in India, *albus, granulis circulo inſculpto cinctis obſeſſus, verticis poris* 4.

turcicus. 81. E. ſuperficie baſique pulvinatis, ambitu elliptico, lateribus vix ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice depreſſiore centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 35. 132. *t.* 1. *f.* 21-25. *Leske ap. Klein echinod. p.* 214.
Habitat - - - an vere diſtinctus a craniolari?

Vicia. 82. E. ſuperficie globoſa, ambitu obtuſe ovali, baſi ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris planiuſculis, ver-

centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 133. *t.* 1. *f.* 26-30. *Leske ap. Klein echinod. p.* 215.

Habitat in mari adriatico, *an vere diverſus a craniolari?*

Ovulum. 83. E. ſuperficie pulvinata, ambitu obtuſe ovali, baſi globoſa, lateralibus vix ſulcatis, ventrice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 1. *f.* 31-35.

Habitat - - - an revera diſtincta a craniolari ſpecies?

Lathyrus. 84. E. ſuperficie baſique pulvinatis ambitu ovali, lateribus vix ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 133. *t.* 2. *f.* 1-5. *Leske apud Klein echinod. p.* 215. *t.* 48. 1 *a*-1 *c*.

Habitat - - - obſcurus ex flaveſcente cinereus, medii inter nucleum & craniolarem magnitudinis.

equinus. 85. E. ſuperficie baſique pulvinatis ambitu elliptico, lateribus lævibus, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 134. *t.* 2. *f.* 6-10. *Leske apud Klein echinod. p.* 215.

Habitat - - - -

minutus. 86. E. ſuperficie pulvinata fere plana, ambitu ovato ſubquinquangulari, baſi anguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. p.* 134. *t.* 2. *f.* 11-15. *Leske apud Klein echinod. p.* 215.

Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 34. *t.* 1. *f.* 25.

Aldrov. teſt. p. 412.

Habitat frequens, vere præſertim, in littoris Belgici *arena, ore orbiculari.*

Faba. 87. E. ſuperficie baſique pulvinatis, ambitu obtuſe ovali, lateribus vix ſulcatis, ambulacris planis, vertice prominulo centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 16-20. *Leske apud Klein echinod. p.* 216. *t.* 37. *f.* 6.

Delic. nat. ſel. p. 90. *t.* D. I. *f.* 10.

Habitat - - - piſi magnitudine, ochroleucus, granulatus.

inæqualis. 88. E. ſuperficie anterius gibba, poſterius plana declivi, ambitu oblongo-ovali ſubquinquangulari, baſi globoſa ſubanguſtata, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t.* 2. *f.* 21-25. *Leske apud Klein echinod. p.* 216.

Habitat - - - - dorſo inæquali.

89.

taninus. 89. E. ſuperficie globoſa poſterius magis declivi, ambitu acute ovali, baſi globoſa, lateribus ſulcatis, ambulacris ſubpulvinatis, vertice centrali. *Phelſ. Zee-eg. t. 2. f. 26-30. Leske apud Klein echinod. p. 216.*
Habitat - - - - nonne varietas minuti?

bufonius. 90. E. ſuperficie globoſa, ambitu ovato-cordato ſubtrigono, baſi pulvinata, lateribus ſubſulcatis, ambulacris pulvinatis, vertice fere centrali. *Zee-eg. p. 136. t. 2. f. 31-36. Leske apud Klein echinod. p. 217.*
Habitat - - - - nonne varietas minuti?

*** *ano laterali, oris tentaculis penicillatis;* Spatangi Mülleri.

† *Ambitu per anfractus circulari, ore centrali, ano quadrato in ſuperficie,* Arachnoides Kleinii.

Placenta. 76. E. ſubconicus, areis decem: alternis anguſtioribus; ambulacris quinque laxis planis apice dehiſcentibus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1105 *n.* 16. *Muſ. Lud. Ulr.* 714. Echinus planus orbicularis, ambulacris quinis bipartitis, ano marginali.
Leske ap. Klein echinod. p. 217. *t.* 20. A. B. Echinarachnius.
Petiv. amboin t. 11. *f.* 5.
Rumpf amb. t. 14. *f.* G.
Breyn. echin. p. 64. *t.* 7. *f.* 7. 8.
Gualt. teſtac. t. 210. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 15. *f.* 21. 22.
Davil. catal. 1. *p.* 424. *n.* 958.
Habitat in Oceano *meridionali, parum convexus, conoideus, ambitu ſubanguloſo, baſi plana, areis lineâ verticali obtuſe dentata bipartitis.*

†† *cordati*, Spatangi Leskii.

⊢ *vertice ſulcato*, Stapangi Kleinii.

Cor anguinum. 91. E. ſupra convexus, ambulacris impreſſis quadrifariam poroſis areiſque quinque.
α) Cor anguinum anglicum. *Klein echinod. ed. Leske p.* 221. *t.* 23. C.
Phelſ. Zee-eg. p. 49. *n.* 3. Pokhart.
Mort. northampt. p. 235.
Luid. lith. brit. 17. *n. & f.* 964-967.
Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 8.

Breyn. echin. p. 62. t. 5. f. 5. 6.
Ritt. oryctol. goſl. p. 226. t. 1. f. 7.
Davil. catal. 3 p. 181. n. 222.
β) *Phelſ. Zee-eg. p. 40. n. 12.* Geknotte Egelhart.
Walch. monum. dil. 2. p. 176. t. F. I. f. 5. 6
γ) *Phelſ. Zee-eg. p. 40. n. 14.* Roodagtige Egelhart.
Walch. monum. dil. 2. p. 181. t. E. III. f. 1.
δ) *Phelſ. Zee-eg. p. 40.* Pluimhart.
ε) Cor anguinum, ſulcis criſpis. *Leske apud Klein echinod. p. 224 t. 45. f. 12.*
Phelſ. Zee-eg. p. 40 n. 15. Kruishald.
Davil. catal. 3. d. 181. n. 222. §. 2.
ζ) Cor anguinum norwegicum. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 225. t. 23.* A. B. E. F.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. n. 7. Bandhart.
Boccon. obſ. p. 219. & 304 fig. med.
Plot oxfordſh. p. 92. §. 13. & 102. t. 2. f. 11. & t. 7 f. 9.
Liſt. lap. cochl. p. 224. tit. & f. 28. 29.
Luid. litth. brit. p. 47. n. 968. 969.
Melle lap. fig. Lubec. t. 2. f. 4.
Bytem. biblioth. app. p. 37. t. 9. f. 33. & p. 51. t. 23. f. 271.
Baier oryctogr. Noric. p. 35. t. 3. f. 41. 42.
Walch. diluv. monum. ſuppl. p. 224. t. 9. h. f. 13.
Davil. catal. 3. p. 181. n. 222. §. 3.
Mercat. metall. p. 282? Pentexoche minor ſ. meſpileus lapis.
Habitat - - - - hactenus non niſi foſſilis inventus; an forte prototypus hujus purpureus? an earum, quas Kleinius, t. 23. f. E. F. expreſſit Spatagus?.

lacunoſus. 13. E. ovatus gibbus, ambulacris quinis depreſſis. *Muſ. L. Ulr. 713.*
Klein echinod. ed. Lesk. p. 221. t. 23.* A. B. *t. 24. a. b. t. 27.* A. Spatangus lacunoſus.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. n. 8. Groote Holblad.
Rumpf amb. p. 36. t. 14. f. 2.
Gualt. teſtac. t. 109. f. C.
Delic. nat. ſel. 1. p. 96. t. D. III. f. 3.
Davil. catal. 1. p. 418. n. 947. & 3. p. 181. n. 222.
Aldrov. teſtac. p. 404. f. 1. 2.
muſ. met. p. 470 f. 2. 3.
Imper. hiſt. nat. p. 731.
Bocc. obſ. p. 296. f. 1.
Bonann. recr. 2. p. 92. n. 16. f. 16.
Scill. cor. p. mar. t. 7. f. 1. t. 10. f. 4. t. 25. f. 2.

Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 9.
Allion. oryct. p. 17. *n.* 1.
Kundm. rar. nat. & art. p. 95. *t.* 5. *f.* 7.
β) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 9. Kleine Holblad.
γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 13. Egwyzige Steekeltonne.
δ) *Leske apud Klein. echinod. p.* 230. *t.* 24. *f.* c. d. e. *t.* 38. *f.* 5. Spatagus lacunoſus.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 10. Groote Hertogs muts.
Hook works p. 285. *t.* 3. *f.* 10.
Liſt. anim. angl. app. p. 28. *f.* 3.
Breyn. echin. p. 61. *t.* 5. *f.* 1. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 21. a. b.
Argenv. conch. p. 311. *t.* 25. *f.* 1. *t.* 29. *f.* 22 ?
Delic. nat. ſel. 1. *p.* 92. *t.* D. I. *f.* 14. & *p.* 95. *t.* D. II. *f.* 6. 7.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. 2.
ε) *Phelſ. Zee-eg. p.* 40. *n.* 11. Kleine Hertogs muts.
Habitat in mari indico, americano, atlantico, adriatico, belgico.

†† *vertice non ſulcato*, Spatangoidæ Kleinii.

radiatus. 92. E. ambulacris quatuor, ſtriis impreſſis utroque latere poroſis, verticis poris quatuor, areis decem ſutura media ſerrata ſuturiſque tranſverſis arcuatis diviſis. *Leske apud Klein echinod. p.* 234. *t.* 25.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 1. Straalblad.
Walch diluv. mon. p. 182. *t.* E. IV. *n.* 1. 2.
Habitat – – – – hactenus non niſi foſſilis obvius, baſi plana, ore ſubreniformi, ſtella pororum ſubpentagona circumlato, ano ſubrotundo: margine 3 angulis prominente, ambulacris ex ſerie pororum per paria confertim poſitorum, in vertice ſingulis convergentibus conflatis.

purpureus. 93. E. ambulacris quaternis pentaloideis lanceolatis, tuberculis majoris in ziczac poſitis, ſpinis acicularibus incurvis altis. *Leske ap. Klein echinod. p.* 235. *t.* 43. *f.* 3-5. *t.* 45. *f.* 5. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 17. *n.* 4. *t.* 6. *prodr.* 2850. *rar. p.* 11.
Phelſ. Zee-eg. p. 40. *n.* 2. Dikblad.
Rondel. piſc. 1. *p.* 580. *Geſn. aquat. p.* 426. *Aldrov. teſt.* 403. Echinus Spatagus & Briſſus.
Argenv. conch. p. 311. *t.* 25. *f.* 3. Pas de poulain.
Davil. catal. 1. *p.* 418. *n.* 947. 1. Cœur marin.
Hill anim. t. 11. High backed Sea-egg.
Aldr. muſ. met. p. 475. Scolopendrites.

Scilla corp. mar. t. 11. f. 1.
Allion. oryctogr. p. 18. n. 2.
Habitat rarior in mari norwegico, *ſupra convexus, ad latera declivis, anterius bicollis, poſterius truncatus, ſubtus planus, ab ore ad anum convexiuſculus purpurens, ſubtiliſſime granulatus, ſetis ſubtiliſſimis ſubclavatis, ſpinisque ſpatulatis, tuberculis albis inſidentibus aſper, tænia prope anum reniformi, e granis minimis albis multifariam conſlata, tuberculis albis copioſiſſimis cincta.*

puſillus 94. E. ovalis, ambulacris quinis, ano remoto.
Müll. prodr. zool dan. 3. p. 17. t. 91. f. 1-4. 2839. Spatagus flaveſcens.
Habitat in mari Norwegico, *minutus, a lacunoſo diſtinctiſſimus, an hujus familiæ?*

complanatus. 95. E. utrinque ſubplanus, areis ambulacriſque decem, duobus in lacuna dorſi poſitis. *Leske apud Klein echinod. p. 238. t. 51. f. 1. 2.*
Lang. lap. fig. p. 119. & 121. t. 35. f. 1. 2.
Scheuchz. lith. helv. p. 61. f. 84.
muſ. diluv. n. 811. 813. 815.
oryctol. p. 318. f. 135.
Breyn. echin. p. 63. t. 6. f. 1. 2.
Bourg. petr. p. 76. t. 51. f. 330. 333. 343.
Davil. catal. 3. p. 181. n. 222.
Habitat - - - - hactenus modo foſſilis repertus, ſubrotundus.

ſublogoboſus, 96. E. utrinque convexus ſugloboſus aſſulatus, ambulacris denis ſtriato-biporoſis, ano ovato. *Leske apud Klein echinod. p. 240. t. 54. f. 2. 3.*
Mort. northamp. p. 233. n. 2. 3. t. 10. f. 8. 9.
Liſt. lap. cochl. p. 323. tit. & f. 26.
Luid. lith. brit. p. 49. n. 983-994.
Lang. lap. fiſſ. 121. t. 35. f. 1. 2?
Scheuchz. muſ. diluv. p. 85. n. 800. 814.
oryctol. p. 317. 318.
Breyn. echin. p. 61. t. 5. f. 3. 4.
Buſal. nat. Merkw. p. 2598 t. 22. f. k.
Walch diluv. monum. 1. p. 182. t. E. IV. f. 3. 4.
Habitat - - - - - hactenus tantum inter foſſilia obvius, granulatus, verticis poris quatuor, areis ſutura ſerrato longitudinali diviſis, lineiſque tranſverſis arcuatis

exaratis ; aſſulis heptagonis , ore ſubreniformi , tuberculis ſtellatim diſpoſitis cincto.

Ananchytis. 97. E. oblongo-cordatus ſubconicus , baſi planiore , ambulacris areiſque decem , ore ſubrotundo margine elevato cincto , ano ovali inferius emarginato. *Leske apud Klein echinod. p.* 243. *t.* 53. *f.* 1. 2.

Mercat. met. p. 316. & *app. p.* 89. Ananchytis ſ. Synochitis.

Habitat - - - - hactenus modo foſſilis , rarior , arearum , majorum aſſulis heptagonis , minorum hexagonis & pentagonis , ano faſcia elevata circumdato.

bicordatus. 98. E. vertice duplici. *Leske apud Klein echinod. p.* 244. *t.* 47. *f.* 6.

Andreæ Br. a. d. Schw. p. 16. *t.* 2. *f.* C.

Habitat , rarior - - - - hactenus modo inter foſſilia repertus.

carinatus. 99. E. dorſi medio carinato. *Leske apud Klein echinod. p.* 245. *t.* 51. *f.* 2. 3.

Baier oryct. nor. t. 3. *f.* 43.

Valent. muſ. 2. *t.* 3. *f.* 7. *n.* 1.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis , bicordato affinis ; at poſterius anguſtior , ore reniformi , ano obſoleto.

††† *ovati.*

† *ambulacris ſulcatis* , Briſſi Kleinii.

Spatagus. 12. E. ovatus gibbus , ambulacris quaternis depreſſis. *Fn. ſuec.* 2117. *Muſ. Lud. Ulr.* 712.

Leske apud Klein echinod. p. 246. Spatagus Briſſus.

Müll. zool. dan. prodr. 2849. Spatagus flaveſcens.

Bocc. obſ. p. 296.

Ginann. adv. 2. *p.* 41. *t.* 29. *f.* 174.

maculoſus. α) E. *Leske ap. Klein echinod. p.* 247. *t.* 24. A. B. *t.* 26. A.

Phelſ. Zee-eg. p. 39. *n.* 4. Egelnoot. ſmalle buyk.

Imperat. hiſt. nat. p. 780.

Scill. corp. mar. t. 4. *f.* 2. 3.

Rumpf. amb. p. 36. *t.* 14. *n.* 1.

Gualt. teſt. t. 109. *f.* A.

Davil. catal. 1. *p.* 419. *n.* 949.

major. β) *Phelſum Zee-eg. p.* 39. *n.* 5. Egelnoot breede buyk.

nodoſus. γ) *Phelſ. Zee-eg. p.* 39. *n.* 3. Geknotte Egelnoot.

Seb. muſ. 3. *t.* 10. *f.* 19.

orthopetalus. δ) *Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 6.* Egelnoot regtblad.
Seb. muſ. 3. t. 10. f. 22.

unicolor. ε) *Leske apud Klein echinod. p. 240. t. 26.* B. C. Spatangus Briſſus unicolor.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 7. Effene Egelnoot.
Sloan. jam. 2. p. 268. t. 242. f. 3-5.

ovatus. ζ) *Leske apud Klein echinod. t. 38. f. 4.*
Delic. nat. ſel. 1. p. 91. t. D. I. f. 13.

carinatus. η) *Leske apud Klein echinod. p. 249. t. 43. f. 4. 5.* Briſſus late carinatus.
Phelſ. Zee-eg. p. 39. Breed gekielde Egelnoot.
Davil. catal. 1. p. 420. n. 420. n. 931.
Seb. muſ. 3. t. 14. f. 3. 4.
Gualt. teſtac. t. 108. f. G. G.

grandis. ϑ) *Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 8.* Groote Egelnoot.
Seb. muſ. 3. t. 14. f. 5. 6.
Gual. ind. teſt. t. 109. f. B. B.
Habitat in Oceano *omni, recens ſulphureus, colore ſenſim evaneſcente.*

┼ ┼ *ambulacris non ſulcatis*, Briſſoidæ Kleinii.

briſſoides. 100. E. oblongus, ambulacris quatuor biporoſis ex ovato lanceolatis per ſulcos tranſverſos connexis: tuberculis majoribus arcuatim interſitis. *Leske ap. Klein echinod. p. 257. t. 27.* B.
Phelſ. Zee-eg. p. 38. n. 1. Slingerblad Egeley.
Aldrov. muſ. met. p. 455. f. 11.
Scilla corp. mar. t. 10. f. 1.
Geſn. petrif. p. 35. n. 11.
Breyn. ech. t. 4. f. 3?
Mercat. metall. p. 374?
Walch dilav. monum. II. *p. 181. t.* E. III. *f. 5? & 9.*
Dav. catal. 3. p. 181. n. 224.
β) *Phelſ. Zee-eg. p. 38. n. 2.* Gebogen blad Egeley.
Habitat - - - ſæpius foſſilis, aſſulatus, granulis aſperi, ore reniformi, pororum ſtella pentagona cincto.

teres. 101. E. convexus, ambulacris quatuor biporoſis petaloideis non connexis. *Leske apud Klein echinod. p. 252. t. 49. f. 12. 13.*
Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 3. Peeiſwyze Egeley.
Seb. muſ. 3. t. 15. f. 27. 28.
Habitat - - - briſſoidæ affinis, at ore latiore, linea carinata utrinque poris pertuſa a vertice deſcendente diſtinctus.

Oliva. 102. E. ſupra convexus punctatus olivaceus, faſcia duplici nuda ab ore ad anum extenſa. *Leske apud Klein echinod. p. 252. t. 14. f. f. g.*
Phelſ. Zee-eg. p. 39. n. 1. Kleine Egelnoot.
Seb. muſ. 3. t. 15. f. 31. 32?
Habitat - - - radiis ſupra 4 ſtellatis.

Amygdala. 103. E. figura amygdalæ. *Klein echinod. ed. Lesk. p. 253. t. 24. f. h. i.*
Habitat - - - -

Ovalis. 104. E. aſſulatus, ovalis, ambulacris areiſque decem, his ſutura media ſerrata diviſis. *Leske apud Klein echinod. p. 253. t. 41. f. 5.*
Phelſ. Zee-eg. p. 32. n. 3. Egelſchuitje twee top.
d'Annon. act. Helv. 4. p. 275. t. 14. f. 1-3.
Walch diluv. monum. 2. p. 182. t. E. III. f. 6.
Beckm. nov. act. Goett. 3. p. 115.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia repertus; an hujus familiæ?

Pyriformis. 105. E. ovatus, altero fine gibbus, baſi planus, ambulacris quinis ſubpetaloideis, obſolete poroſis. *Leske apud Klein echinod. p. 255. t. 44. f. 7. t. 51. f. 5. 6.*
Walch Naturf. 9. p. 268.
Habitat - - - hactenus non niſi foſſilis, ore anoque rotundatis, illo ſub eptagono quinquelabiato; ad quam familiam referendus?

Lapis cancri. 106. E. obtuſe ovatus, convexus, vertice excentrico poris quatuor pertuſo, ambulacris quinis biporoſis ovato-lanceolatis apice ſitus. *Leske apud Klein echinod. p. 256. t. 49. f. 10. 11.*
Habitat - - - foſſilis hactenus modo repertus, oris ſitu & ſtructura pyriformi ſimilis, ano ſupra marginem teſtæ anteriorem poſito, rotundo, ore ſini anguſtiori propiore baſi plana, leviſſime excavata, medio nuda, ceterum tuberculis circulo cinctis in ſeries digeſtis aſpera; cui familiæ adſcribendus?

Patellaris. 107. E. maxime depreſſus, ambulacris ſtellam imitantibus. *Leske apud Klein echinod. p. 25. t. 53. f. 5-7.*
Habitat - - - - hactenus modo foſſilis obvius, ambitu ovato, dorſo leviſſime convexo, baſi leniter excavata, tuberibus granulatis, ore orbiculari.

III. TESTECEA.

Animalia *Molluſca ſimplicia, domo ſæpius calcarea propria, obtecta.*

300. CHITON.

Animal Doris.
Teſtæ plures, ſecundum longitudinem ſibi appoſitæ dorſo incumbentes.

hiſpidus. 1. Ch. teſta ſexvalvi ſtriata. *Schroet. Conchyl* 3. *p.* 493. *t.* 9. *f.* 18.
Habitat in America, *mediæ magnitudinis, ex atro cinereus: maculis punctiſque albis, ſubtiliſſime ſtriatus: ſtriis ſubtiliſſime granulatis.*

tuberculatus. 2. Ch. teſta ſeptemvalvi, corpore tuberculato.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 96. Chiton oſcabrion.
Schroet. Conch. 3. *p.* 494. *t.* 9. *f.* 19. Chiton cylindricus.
Sloan. jam. 2. *p.* 233? Patella oblongo articulata.
Habitat in America, *oblongo-ovalis, anguſtus, ſupra tuberculis in quincuncem poſitis inæqualis, ad latera cinereus albo miſtus: faſciis undulatis fuſcis dorſo vireſcente: faſcia lata nigerrima.*

aculeatus. 3. Ch. teſta octovalvi ſtriata, corpore ſubaculeato. *Amæn. acad.* 8. *t.* 3. *f.* 1. *Murr. teſtac. p.* 40. *t.* 2. *f.* 1. *Schroet. Conchyl. p.* 495.
Rumpf muſ. t. 10. *f.* 4. Limax marina.
Edw. glean. t. 286. *f.* B.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 4.
Chemn. Conch. 10. *t.* 173. *f.* 1692.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1691?
Habitat in Aſia, *facie tuberculati, ovalis, ſupra aculeis anguſtis ſubulatis rubris ſubcrenatis inæqualibus hiſpidus, teſtis conchiformibus, ultima reliquis minore.*

faſcicularis. 4. Ch. teſta octovalvi, corpore ad valvulas utrinque faſciculato. *Schroeter Conch.* 3. *p.* 496. *Müll. zool. dan. prodr.* 3017.

Animal nonnullas chitonis *ſpecies inhabitans, edule.*

Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 801? 10. *t.* 173. *f.* 1688. *Chiton. t.* 1. *f.* 2. a? b?

Habitat in Barbaria, *cinereus, lævis, teſtis leviter carinatis, juxta quarum latera animali, incluſo faſciculi pilorum totidem albidi.*

ſquamoſus. 5. Ch. teſta octovalvi ſemiſtriata, corpore ſquamuloſo.
Muſ. Lud. Ulr. 465.* *Schroet. Conchyl.* 3. *p.* 497. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 788-791. *Chit. t.* 1. *f.* 1.
Petiv. gazoph. t. 1. *f.* 4. Oſcabrion.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 3.
Spengler Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 292. *t.* 7. *f.* L. M.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſtac. t. 1. *f.* 1. 2.
β) Chiton ſcaber variegatus *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 792. 793. *Chit. t.* 1. *f.* 3. a. b.
γ) Chiton lævis variegatus. *Chemn. Chiton. t.* 1. *f.* 4.
δ) Oſcabrion gallicum. *Argenv. conch. t.* 25. *f.* M.
ε) Chiton ſquamoſus, teſta ſeptemvalvi *Schroeter in Litter.* 4. *p.* 14. *t.* 1. *f.* 2.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1689.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 173. *f.* 1690.

Habitat in America, *aliquando ſat magnus, valvis rariſſime 7, in 2 partes diviſis, quarum altera granulata, altera ſubtiliſſime ſtriata, carinatus, utraque teſta extrema lunulata, vireſcens, β) thalaſſinus, faſciis alternis nigris et flavis vel albicantibus pictus.*

punctatus. 6. Ch. teſta octovalvi lævi, corpore punctis excavatis.
Amœn. acad. 3. *p.* 256. Chiton corpore punctato teſtis octo.
Müll. zool. dan. prodr. 3021. Chiton teſta octovalvi lævi carinata.
Eph. nat. cur. 1727. *p.* 63. *t.* 1. *f.* 1. 2. Calva ſerpenris diadema.
Osb. it. 62.
Seb. muſ. 3. *t.* 1. *f.* 13.

Habitat in Aſia, Europa, America.

ruber. 7. Ch. teſta octovalvi arcuato ſubſtriata, corpore rubro.
Fn. ſuec. 2119. *Müll. zool. dan. prodr.* 3018. *Act. Nidroſ.* 3. *p.* 364. *t.* 6. *f.* 14. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 96. *f.* 813. *Chit. t.* 2. *f.* 8.
β) Chiton marmoreus. *O. Fabr. Fn. groenl p.* 420. *n.* 420. *Chemn. Conch.* 8. *t.* 96. *f.* 812.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *patellæ more affixus, ovalis, oblongiuſculus dorſo carinatus, ad pollicem uſque longus, ſpadiceus: ſtria dorſi obſcuriore albo limbata, animalis margine fuſco, aut flavus maculis punctisque rubris, β) ex albo rubroque varius.*

albus. 8. Ch. teſta octovalvi lævi dorſata, corpore albo. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 422. *n.* 421.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1107. *n.* 8 *Müll. zool. dan. prodr.* 3019. *act. Nidroſ.* 2. *p.* 54. Chiton teſta octovalvi lævi, valvula prima poſtice emarginata.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 817. *Chiton. t.* 2. *f.* 9.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ovalis, lævis.*

cinereus. 9. Ch. teſta octovalvi lævi carinata, corpore rubicundo: limbo ſubciliato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 423. *n.* 422.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1107. *n.* 9. *Müll. zool. dan. prodr.* 3020. Chiton teſta octovalvi ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſta. *t.* 1. *f.* 3.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 818.
Habitat in Oceano Norwegico, *inter radices ulvarum, 2 lineas longus, depreſſus, anterius anguſtior, ſulcis 2 dorſi longitudinalibus, carinam mediam cingentibus, vivus, tum quoad teſtam tum quoad incolam rubicundus, mortuus & areſactus cinereus.*

bicolor. 10. Ch. teſta octovalvi craſſa dorſata extus thalaſſina intus nivea margine nigra.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 94. *f.* 794.
Habitat - - - *ſat magnus, valvis medio repandis, anteriori radiatim ſtriata.*

ceraſinus. 11. Ch. teſta octovalvi ceraſina lævi: marginis dentibus niveis. *Chemn. Conchyl.* 8. *t.* 94. *f.* 796.
Habitat - - - *incola ſiccatus niger.*

magellanicus. 12. Ch. teſta octovalvi craſſa ex fuſco atra ſupra convexa: faſcia dorſi rugoſicante media, ſtriis lateralibus flavicantibus.
Seb. muſ. 3 *t.* 1. *f.* 14. 15.
Habitat in freto magellanico, *magnus, teſta intus medio atra, ceterum læte viridi, margine omni fuſco.*

fuſcus. 13. Ch. teſta octovalvi fuſca glaberrima, intus magniſque dentibus nivea, dorſi maculis trigonis nigris: utrinque faſciis obſcure flavicantibus.

Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 799. 800.
Habitat in India, *magellanico anguſtior, dentibus marginis pluribus, & utriuſque valvæ extremæ majoribus, dorſo magis elevato & carinato.*

macu-latus. 14. Ch. teſta octovalvi glaberrima intus thalaſſina margine, ſquamis ex cinereo albis veſtita, valvis mediis anterius, nonnullis utrinque fuſco maculatis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 802.
Habitat – – – – – *rarior.*

marmo-ratus. 15. Ch. teſta octovalvi glaberrima albo & nigricante varia, valvis mediis intus virentibus.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 95. *f.* 803-805.
Chiton. t. 1. *f.* 5.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 3. 4.
β) Chiton marmoratus, teſta ſeptemvalvi. *Schroeter n. Litterat.* 4. *p.* 40. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Oceano americano, *nunc magis, nunc minus anguſtus & convexus, faſciis, ſtriis, venis, maculis nigricantibus & albis alternis, limbo tumido ſquamoſo: areis albidis, chalybeis & nigricantibus alternis.*

granu-latus. 16. Ch. piceus ſupra planus, punctis elevatis numeroſis in ſeries digeſtis, limbo lato coriaceo ſpinoſo: areis nigris albiſque alternis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 806.
Habitat in Oceano americano *valvis* 8, *rarius* 7.

piceus. 17. Ch. teſta octovalvi ſupra glabra picea nigro albidoque varia.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 807-810.
Chemn. Chit. t. 2. *f.* 6 & 6. a. b. c.
Habitat in mari americano & rubro, *granulato affinis, intus medio niger, ad latera vireſcens, maculis dorſi nigris & maculis faſciis veniſque albidis aut vireſcentibus alternis, valvis rarius* 7 *aut* 6.

indus. 18. Ch. teſta octovalvi ex cinereo albida, limbo ſquamoſo, valvis mediis ſubtiliſſime punctatis.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 811.
Habitat in mari americano.

mini-mus. 19. Ch. teſta octovalvi, glabra nigra hinc inde farinoſa.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 814.
Habitat in mari norwegico, *prope* Bergam *repertus, minutus.*

Cimex. 20. Ch. teſta octovalvi, carinata diaphana faſciata, valvis utraque extrema tenuiſſime punctata.
Chemn. Conchyl. 8. *t.* 96. *f.* 815.
Habitat in mari norwegico, *parvus, intus ex cinereo albidus, faſciis nigricantibus & dilutioribus alternis.*

Aſellus. 21. Ch. teſta octovalvi nigerrima ſupra convexa, dorſi macula in ſingulis valvis flavicante.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 816.
Habitat in mari norwegico, *Mytilo Modiolo affixus.*

Gigas. 22. Ch. teſta octovalvi craſſa convexa alba, valva prima crenata, poſtrema dentata, mediis emarginatis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 96. *f.* 819.
Chiton. t. 2. *f.* 10.
Habitat ad Caput Bonæ Spei, 4 *pollices & ultra longus, limbo tumido, coriaceo, ex atro fuſco.*

thalaſſinus. 23. Ch. teſta ſexvalvi glabra ovali thalaſſina, ſupra linea media dilutiori, limbo tenui hyalino.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 509. *n.* 18.
n. Litterat. 4. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat - - - - parum convexus.

iſlandicus. 24. Ch. teſta octovalvi ſubcylindrica tenuiſſime punctata nigra: limbo cinereo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 509. *n.* 19.
Habitat - - - - veneri iſlandicæ adhærens, minimus, utrinque anguſtus.

crinitus. 25. Ch. teſta ſeptemvalvi pilis brevibus denſe obſita.
Brit. zool. 4. *p.* 60. *t.* 36. *f.* 1.
Habitat in mari ſcotico *prope* Aberdeen, $\frac{5}{8}$ *pollicis longus.*

marginatus. 26. Ch. teſta octovalvi: margine ſerrato reflexo lævi.
Brit. zool. 4. *p.* 61. *t.* 36. *f.* 2.
Habitat in mari britannico *prope* Scarborough.

lævis. 27. Ch. teſta octovalvi glaberrima: faſcia dorſi longitudinali elevata.
Brit. zool. 4. *p.* 61. *t.* 36. *f.* 3.
Habitat in mari ſcotico *prope* Loch Broom.

amiculatus. 28. Ch. teſta octovalvi reniformi fragiliſſima, corio extus ſcabro obducta. *Pall. nov. act. Petr.* 2. *p.* 241. *t.* 7. *f.* 26-30.

Habitat ad Kuriles *inſulas, ad 6 pollices uſque longus, valvis imbricatis.*

301. LEPAS. *Animal* Triton.

Teſta baſi affixa multivalvis: valvis inæqualibus erectis.

Balanus. 1. L. teſta conica ſulcata, operculis acuminatis. *Fn. ſuec.* 2122.* *Muſ. Lud. Ulr.* 466. *n.* 2.* *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 3022. *O. Fabr. groenl. p.* 423. *n.* 423.
Leeuwenh. ap. 82. *p.* 472. *t.* 465.
Ellis art. angl. 1758. *v.* 2. *t.* 34. *f.* 17.
Liſt. conch. t. 443. *f.* 286.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 4.
Chemn. conch. 8. *t.* 97. *f.* 820.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 97. *f.* 826.
γ) *Bonann. muſ. Kirch* 1. *f.* 35.
Habitat copioſiſſima ad littora Oceani europæi, & maris mediterranei, *cancris aliiſque teſtaceis adhærens, utplurimum alba, ſatis magna, areis extrinſecus* 6, *quarum* 3 *elevatæ, ſtriatæ,* 3 *excavatæ magis glabræ, operculis rugis tranſverſis ſubtiliter crenatis,* 2 *minoribus,* 2 *majoribus acuminatis.*

balanoides. 2. L. teſta conica truncata lævi operculis obtuſis. *Fn. ſuec.* 2123.* *Müll. zool. dan. prodr.* 3023. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 424. *n.* 424.
Petiv. muſ. 82. *n.* 802. Balanus parvus vulgaris.
Liſt. conchyl. t. 444. *f.* 287.
hiſt. anim. t. 5. *f.* 41.
Leeuwenh. arc. 474. *t.* 465. *f.* 1. E. & *f.* 7.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 94. 95.
Archenv. Conch. t. 26 *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 821-825.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 98. *f.* 833.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis, americani, indici *rupibus, non ſupra refluxum altius, ſub fluxu dehiſcens, ſub æſtu clauſus, tentaculis ciliatis exſertis animalcula obvia captura, mytilos edules ſæpe arcte operiens, balano minor, albida, cinerea aut variegata, nunc depreſſo-convexa, nunc ſubcylindrica elongata, animali flavicante granulato.*

Tintinnabulum. 3. L. teſta conica obtuſa rugoſa fixa. *Muſ. Lud. Ult. 466. n. 3.*
Lang. teſtac. 4. Balanus tintinnabuliformis lævis.
Liſt. Con. hyl. t. 443. f. 285.
Rumpf muſ. t. 41. f. A. B.
Gualt. teſt. t. 106. f. E. H. I.
Argenv. Conchyl. t. 26. f. A. B.
Klein oſtr. t. 12. f. 97.
Ellis act. angl. 1758. vol. 2. t. 34. f. 8.
Knorr Vergn. 2. t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1.
Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 828-831.
β) Tulipa alba. *Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 832.*
Habitat in Oceano americano & indico β) *in* ſeptentrionali, *balano affinis, rubro alboque varia, aut cæruleſcens, intus alba, nunc cylindrica, nunc paulo craſſior, & paulisper incurva, areis elevatis perpendiculariter, depreſſis transverſe ſtriatis, operculis ſere æqualibus.*

Diadema. 4. L. teſta ſubrotunda, ſexlobata ſulcata.
Walch Naturf. 8. t. 4. f. A. B. C. Balanus polythalamius.
Liſter Conch. t. 445. f. 288.
Gualt. teſtac. t. 106. f. Q.
Boccon. recher. 294.
Klein oſtr. t. 12. f. 98.
Schoeter Journ. 4. t. f. 4. 5.
Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. f. 5. 6. & p. 7. f. a.
Chemn. Conch. 8. t. 99. f. 843. 844.
Habitat in mari mediterraneo & indico, *ſordide alba, pollices circiter alta, ſurſum anguſtior, apertura ſuperiori infundibuliformi, dimidiam reliquæ teſtæ diametrum æquante, areis exterius 12 triangulis, ... rum 6 excavatæ ſtriis ſubtilibus transverſis exaratis, ſex alteræ elevatæ 4-5-7 prominentiis arcte ſibi accumbentibus, & ſtriis transverſis crenatis exaratis co...*

balænaris. 5. L. teſta ſubconica, lobis ſex elevatis rugoſis quadripartitis, operculo membranaceo bidentato. *Müll. zool. dan. prodr. 3024. O. F br. Fn. groenl. p. 425. n. 425.*
Rumpf muſ. t. 14. f. H.
Petiv. amb. t. 1. f. 11.
Walch Naturg. 10. t. 1. f. 11. 12.
Chemn. Conch. 8 t. 99. f. 845. 846.
Habitat in Balæna boope, *pectoris ſi cis pinniſque adhærens, candore ſuo balænam prodens & ad fugam exeitans, 15 circiter lineas alta, diametro baſeos 19 lineis*

æquali, craſſa lamelloſa, ſurſum lentiſſime anguſtata, ſupra truncata, obtuſiſſima: apertura membrana luteſcente laxa clauſa, areis 12 triangularibus, quarum 6 elevatæ fere æquales, tranſverſim rugoſo-granulatæ, & ſulcis 3 longitudinalibus quadripartitis exaratæ, ſex humiliores, ſtriis tranſverſis ſubtiliſſimis pictæ; an forſan eadem cum diademate?

teſtudinaria. 6. L. teſta plano-convexa, radiis ſex excavatis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 467. *n.* 4.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* K. Verruca teſtudinaria.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 34. 36. 37.
Gualt. teſt. t. 106. *f.* M. N. O. P.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 9.
Planc. Conch. t. 5. *f.* 2. 2.
Klein t. 12. *f.* 99.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 12. 13.
Ginann. adr. 41. *t.* 30. *f.* 175.
Knorr Vergn. 3. *t.* 30. *f.* 3. 4.
B[illegible]k Naturf. 2. *t.* 4. *f.* 9. A. B.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 847. 848.
Schroeter Journ. 4. *p.* 355. 5. *p.* 518. 6. *p.* 305.
Habitat in pelago, ſuper teſtudinibus adhærens, globo in medio diſſecto ſatis ſimilis, alba, ſatis lævis, apertura inferiore hexagona, diametro ſuperiorem ſuperante, operculis 4 trignonis membranæ inſertis.

galeata. 7. L. teſta galeata, apertura laterali. *Mantiſſ. pl.* 2. *p.* 544.
Pall. elench. zooph. p. 158. Lepas Calceolus.
Schroet. Einl. in die Conch. 3. *p.* 318. *n.* 7. *t.* 9. *f.* 20. a. b.
Habitat in Gorgonia verrucoſa & Ventilabro, *cymbiformis, lævis, apertura rhombea.*

palmipes. 8. L. teſta erecta conica, valvulis baſis palmatis. *Mant. pl.* 2. *p.* 544.
Habitat in Oceano, *alba, depreſſiuſcula, piſi majoris magnitudine, lævis, valvulis* 4-6, *baſi ad medium uſque diviſis: digitis* 5-6, *operculo quadrivalvi obliquo.*

Tulipa. 9. L. teſta ſubcubica lævi, operculis acutis tranſverſim ſtriatis. *Müll. zool. dan.* 3026.

---

* *An ad hoc genus referendæ teſtæ, quas Bonanni muſ. Kirch.* 1. *f.* 14. *miſere depingendas curavit?*

Olaſſ. iſl. Reſ. 901. B. a. *t.* 11. *f.* 13.
Aſcan. ic. rar. natur. t. 10.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Mitella. 10. L. teſta compreſſo erecta difformiter ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 467. *n.* 5.*
Lang. teſt. 4. Balanus tulipæformis ſtriatus.
Geſn. aq. 121. Balanus Rondeletii.
Pet. gaz. t. 6. *f.* 10. Balanus chinenſis ſtriatus.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* M.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 33. *f.* 4.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 100.
Seb. muſ. 2. *t.* 61. *f.* 8. 3. *t.* 16. *f.* 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100 *f.* 849. 850.
Habitat in Oceano indico, *coronæ gemmatæ ſimilis, alba, epidermide fordide lutea tecta, multis valvis utplurimum triangularibus inæqualibus acutis conſtans, pedunculo communi nigro, coriaceo ſquamoſo intus cavo inſidentibus.*

Scapellum. 11. L. teſta compreſſa tredecimvalvi læviuſcula, pedunculo ſquamoſo inſidente. *Fn. ſuec.* 2121.*
Gualt. teſt. 106. *f.* C.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 439. *f.* 281?
Klein oſtr. t. 12. *f.* 91?
Müll. zool. dan. 3. *p.* 23. *t.* 94. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *p.* 294. *Vign.* 7. *f.* a. A.
Habitat in Oceano norwegico, *parva, anatifera minor, valvis ſquamæ æmulis, utrinque ſenis, valva longa curvata reliquas complectente, pedunculo breviſſimo rugoſo annulato.*

anſerifera. 12. L. teſta compreſſa quinquevalvi, ſtriata, pedunculo inſidente.
Liſt. Conch. t. 440. *f.* 283.
exerc. anat. t. 19. *f.* 4. 5.
Gualt. teſt. 106. *f.* 2. 3.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 93.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 856.
Habitat in mari americano & atlantico, *anatiferæ æqualis, etiam foſſilis, pedunculo ſubcroceo, valva prima curvata lævi dorſo carinata, reliquarum ſtriis magis evidentibus & diſtantibus, utraque majore, pedunculum verſus magis turgidis.*

turgida, fine cuneato divergente, utraque minore anguſtiore magis acuminata ab anatifera diſcernenda.

anatifera. 13. L. teſta compreſſa quinquevalvi lævi pedunculo inſidente. *Fn. ſuec.* 2. *n.* 2120. *Muſ. Lud. Ulr.* 468. *n.* 6.*
Fn. ſuec. 1. *n.* 1350. Lepas teſta compreſſa baſi membranacea cylindrica.
Aldrov. orn. c. 20. *f.* 548. Concha anatifera.
Bonann. rear. & muſ. Kirch. 2. *f.* 2. Tellina pedata.
Imper. hiſt. nat. 904. Concha pedeta.
Bauh. pin. 513. Arbor ex cujus ligni putredine vermes 1. 2. 3.
Stalp. obſ. 2. *p.* 458. *t.* 15. *Osb. it.* 82. Lepas anatifera cum Tritone.
Barth. cent. 6. *p.* 271.
Worm. muſ. 256.
Marcgr. braſ. 188.
Grew muſ. 148.
Hufn. inſ. 3. *t.* 6.
Sibb. muſ. 170. *n.* 2.
Liſt. Conch. t. 439. *f.* 282.
Gualt. teſtac. t. 106. *f.* A. D.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* E.
zoomorph. t. 7. *f.* I. K.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 89. 90. 92.
Planc. Conch. t. 5. *f.* 4.
Columm. phytob. 110. *t.* 30.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 1. *a.* 2.
Needham micr. t. 7. *f.* 1. 2. *& t.* 6.
Ellis act. angl. 1758. *vol.* 2. *t.* 34. *f.* 6.
Knorr Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 4. 5.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 853 - 855.
de la Faill. act. pariſ. peregr. vol. 9. *p.* 331. Macreuſe.
β) Concha anatifera ſubrotunda Bartholini. *Liſter Conch. t.* 439. *f.* 280.
γ) Tellina cancellifera ſtriis minimis argutiſſime ſignata cinerea. *Gualt. Teſtac. t.* 106. *f.* B.
Habitat in Pelago *fere omni, utplurimum lactea, rarius margaritacea, interdum radio aut radiis binis nigro punctatis notata, pedunculo coriaceo nigro, rarius rubro, valvis tenuiſſime ſtriatis, majore utraque trigona, roſtro convergente, duabus aliis latioribus at duplo minoribus, quinta reliquas complectente anguſta, curvata, dorſo rotundata.*

aurita. 14. L. teſta membranacea, ventricoſa tubo inſidente, ore octovalvi dentato: tubulo gemino aurita.
Ellis act. angl. 1758. *t.* 34. *f.* 1. Lepas nuda comoſa aurita.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 5.
Edw. glean. t. 286. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 857. 858.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *pedunculo longo.*

Pſittacus. 15. L. teſta poſterius adunca ſexvalvi rugoſo. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 179.
Habitat ad littus Chilenſe, *vix pollicem longitudine ſuperans, ſcopulis adhærens, valvis 2 majoribus pſittaci roſtrum æmulantibus, carne alba, tenera, ſapidiſſima.*

minor. 16. L. teſta rubicunda ſexvalvi inæquivalvi, operculo acuminato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 97. *f.* 827.
Habitat in India, *lineis tranſverſis albido-punctatis arcuatis picta.*

Verruca. 17. L. teſta hemiſphærica ſerrata ſexvalvi, valvis quatuor exterioribus operculoque plicatis. *Spengler Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 101. *t.* 5. *f.* 1-3.
Müll. zool. dan. prodr. 3025. Lepas (Stroemia) teſta conico convexa ſerrata ſtriata, operculo elevatili.
Schroeter Journ. 5. *p.* 522. Lepas dentata ſ. ſerrata.
Stroem. act. Havn. 10. *p.* 6. *t.* 3. *f.* 1-9.
Habitat in mari, Iſlandiam alluente, *oſtreæ Iſlandicæ aliiſque affixa, parva.*

anguſta. 18. L. teſta elongata lævi ſexvalvi, apertura anguſta, operculo minimo. *Bonann. recr. et muſ. Kirch.* 1. *f.* 15.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 835.
Habitat rarior - - - valvis in puncto conjunctionis ſulco exaratis, interdum rubro alboque ſtriatis.

poroſa. 19. L. teſta granulato-ſtriata conica tubuloſa, operculo obtuſo.
Schroet. Journ. 4. *t.* 2. *f.* 6. a. b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 836.
β) Balanus major latus. *Klein oſtr. t.* 12. *f.* 96.
Liſt. Conch. t. 242. *f.* 284.
Habitat rarior in India, *recens exterius viridis, poſtea ſupra nigra, infra alba.*

elongata. 20. L. teſta cylindrica nivea pellucida ſexvalvi ſupra fiſſa, operculo obtuſo ſulcato tranſverſim ſtriato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 838.
Schr. der berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 2.
Schroeter Journ. 4. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat rariſſima in Iſlandia, 5 *lineas vix lata, et* 3 *pollices & ultra longa, inſra hinc inde tranſverſe annulata et nodoſa.*

patellaris. 21. L. teſta ſexvalvi, exterius violacea albo miſta ſubtiliter longitudinaliter ſtriata, intus falcata, valvis margine denticulatis.
Spengler Schr. berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 98. *f.* 839.
Habitat rariſſima in Coromandel, *valvarum dentibus ſe invicem excipientibus.*

ſpinoſa. 22. L. teſta conica, areis duodecim triangularibus: ſex depreſſioribus minoribus albidis tranſverſim ſtriatis, ſex purpureis longitudinaliter ſtriatis, ſpiniſque tubuloſis recurvis, armatis.
Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Conch. 8. *t.* 98. *f.* 840. *et t.* 99. *f.* 841.
Schroet. n. Litterat. 1. *t.* 2. *f.* 10.
Habitat in India, *operculis quadrivalvibus acuminatis, undulato-ſtriatis.*

violacea. 23. L. teſta craſſa glabra ſexvalvi alba, radiis violaceis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 99. *f.* 842.
Habitat in India, *intus leviter ſulcata.*

Pollicipes. 24. L. teſta compreſſo erecta multivalvi lævi, pedunculo coriaceo brevi duro ſquamoſo inſidente.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* D.
zoomorph. t. 7. *f.* G.
Knorr. Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 7.
Chemn. Conch. 8. *t.* 100. *f.* 851. 852.
Habitat in mari mediterraneo, *valvis* 4 *majoribus, roſtri avium inſtar verſus invicem inclinatis, & pluribus quam* 20 *minoribus.*

cylindrica. 25. L. cylindrica ſubcurva, orificio ampliſſimo obliquo; operculis cornutis.
Gronov. zooph. t. 19. *f.* 3. 4. Balanus maxillaris.

Ellis act. angl. vol. 50. *f.* 15. Lepas ſeſſilis capenſis ore obliquo cum operculis cornatis.
Habitat ad Africæ *littora ſub* zona torrida.

criſpata. 26. L. teſta ovali truncato conica, areis ſex cæruleſcentibus albo obumbratis, ſex aliis elevatis rubellis ſpinoſis perpendiculariter ſtriatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 534. *n.* 22. *t.* 9. *f.* 21.
Habitat - - - aſſeri affixa, a teredine perforato, pollicem fere alta, operculis obtuſis.

carioſa. 27. L. teſta ſolida alba depreſſa ſulcato carioſa intus inæquali lævi.
Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 24. A. B.
Habitat ad inſulas Kuriles.

Stroemia. 28. L. conico-convexa, valvis quatuor ſerrato-ſtriatis operculo bivalvi. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 21. *t.* 94. *f.* 1-4. *prodr. n.* 3025.
Habitat in mari ſeptentrionali.

302. PHOLAS.

Animal Aſcidia.
Teſta bivalvis divaricata cum minoribus acceſſoriis difformibus.
Cardo recurvatus cartilagine connexus.

Dactylus. 1. Ph. teſta oblonga hinc reticulato-ſtriata. *Fn. ſuec.* 2124.
Müll. zool. dan. prodr. 3031.
Rondel. teſtac. 23. *f.* 2.
Bell. aq. 414.
Liſt. hiſt. Conch. t. 433. *f.* 276.
exerc. anat. t. 19. *f.* 1. 2.
an. angl. app. t. 2. *f.* 3.
Bonann. recr. ment. 2. *f.* 25. 26.
muſ. Kirch. 2. *f.* 23. 24.
Gualt. teſtac. 105. *f.* A. B. C. D.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* H. I.
zoomorph. t. 7. *f.* Q. R.
Ginann. adr. 44. *t.* 31. *f.* 184.
Seb. muſ. 3. *t.* 16. *f.* 6. a. b. c. d.
Reaum. act. Pariſ. 1712. *p.* 163.

Planc. Conch. 33. *n.* 3.
Murray fund. teſt. t. 2. *f.* 3.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 8. *t.* 101. *f.* 859.
Habitat intra Europæ ſcopulos, *ſaxa, ut perhibent, perterebrans, noctu lucens, ad 5 pollices longa, tota, alba, interdum ochroleuca, tenuis, fragilis, antrorſum elongata cuneata, poſterius magis convexa, margine inflexa et repanda, ſtriis ſubſpinoſis antrorſum ſenſim minoribus, tandem evaneſcentibus, cardine cochlear forma ſua mentiente, teſtis acceſſoriis* 4.

coſtata. 2. Ph. teſta ovata, coſtis elevatis ſtriata.
Liſt. Conch. t. 434. *f.* 277.
Bonann. recr. 3. *f.* 351.
muſ. Kirch. 2. *f.* 105.
Gualt. teſt. t. 105. *f.* G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 25. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 101. *f.* 863.
Habitat in mari americano, *alba, 6 fere pollices longa, coſtis obliquis ſquamis elevatis aut ſpinis obtuſis armatis.*

ſtriata. 3. Ph. teſta ovata multifariam ſtriata.
Gualt. teſt. 105. *f.* E.
Chemn. Conch. 8. *t.* 102. *f.* 864-866.
Habitat in Europa *auſtrali et* India, *ad* Barbariæ *quoque littora, ſtriis hinc inde decuſſatis, area margini propinqua glaberrima.*

candida. 4. Ph. teſta oblonga undique ſtriis decuſſatis muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 469. *n.* 7.* & *Müll. zool. dan. prodr.* 3033.
Bonann. muſ. Kircher. 2. *t.* 24.
Liſt. an. angl. 193. *t.* 5. *f.* 39.
app. t. 2. *f.* 4. 6.
Conch. t. 435. *f.* 278.
Gualt. teſtac. t. 105. *f.* E.
Habitat in mari europæo & americano, *tenuiſſima, intus argentea magis glabra, utroque fine rotundato, cardinis dente fiſſo.*

Pholades *intrant & inhabitant rupes marinas calcareas, imo arenarias, intra quas latent phoſphoreæ.* Reaum. *act. pariſ.* 1712. *p.* 126. *His natura in tenebris, remoto lumine, alio fulgore clarere, & quanto magis humorem habeant, ludere in ore mandentium, lucere in manibus, atque etiam in ſolo & veſte decidentibus guttis.* Plin. IX. 61. *An. quam Liſter hiſt. conch. t.* 437, *f.* a. *depingendam curavit, diſtincta ſpecies?*

pusilla. 5. Ph. teſta oblonga rotundata arcuato-ſtriata.
Rumpf muſ. t. 46. f. H.
Petiv. amboin. t. 19. f. 8.
Adanſ. hiſt. Seneg. t. 19. f. 1. 2?
Brown jam. 417. t. 40. f. 11.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. t. 12. f. 6-9.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 4. t. 5. f. 1-5.
Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 867-871. a. b.
Habitat in America & India *(in hac utplurimum major) mediæ magnitudinis, alba, fuſceſcens, navium lignum perterebrans, antrorſum roſtri inſtar hians, ſub vertice globoſa, nodoſo-reticulata.*

criſpata. 6. Ph. teſta ovali hinc obtuſiore criſpato-ſtriata, cardinis dente curvo. *Muſ. Lud. Ulr. 469. n. 8.* Müll. zool. dan. prodr.* 2032.
Fn. ſuec. 2125.* Mya criſpata.
Liſt. hiſt. anim. angl. t. 5. f. 38.
app. t. 2. f. 7.
hiſt. Conch. t. 436 f. 279.
exerc. anat. t. 19. f. 3.
Chemn. Conch. 8. t. 102. f. 872-874.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ultra pollicem longa, teſtis primariis ſulco medio tranſverſo rugoſo bipartitis, teſta tertia parva.*

orientalis. 7. Ph. teſta oblonga margine recto: altera parte glaberrima, altera reticulato-ſtriata.
Liſt. hiſt. Conch. t. 431. f. 274.
Chemn. Conch. 8. t. 101. f. 860.
Walch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15.
Habitat in ſinu Siamenſi & Tranquebariæ *ſatis magna, teſtis tenuioribus, margine tantum antico hiantibus, ſtriis reticulatis intus quoque conſpicuis, teſta ſatis magna & altera dente armata minore cardinem tegente.*

campechienſis. 8. Ph. teſta anguſta alba, tenuiter ſtriata.
Liſt. Conch. t. 432. f. 275.
Habitat in ſinu Campechienſi, *an diſtincta ſpecies?*

cordata. 9. Ph. teſta brevi turgida poſterius ſtriis elevatis tranſverſis ſubtilibus exarata: hiatu cordato. *Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 544. n. 4. t. 9. f. 22-24.*
Habitat - - - corallio affixa, tenuiſſima, fragilis, ſordide alba, teſta anterius præter rugas aliquot arcuatas

lævi, roſtri teſtarum anterioris hiatu teſta minori ovali, convexa, dente munita occluſo.

chiloenſis. 10. Ph. teſta oblonga depreſſiuſcula: ſtriis longitudinalibus diſtantibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 179.
Habitat in ſcopulis archipelagi Chiloenſis, *ad 5 pollices longa, appendicibus minutis aucta.*

Teredula. 11. Ph. teſta oblonga alba: ſutura granulata fuſca longitudinali.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 240. *t.* 6. *f.* 26. A. D.
Habitat ad Belgii *littora, ligni incorrupti ſertulariis obducto, fruſta tenuia perterebrans.*

hians. 12. Ph. teſta bivalvi alba tranſverſe arcuatim ſtriata ſupra connivente, medio convexa, ſubtus cuneiformi: apertura ovali potentiſſima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 364. *t.* 172. *f.* 1678-1681.
Spengl. nov. act. ſoc. dan. 2. *f.* 8-11.
Habitat ad inſulas Americæ *mediæ oppoſitas, lapides calcareos & corallia perterebrans.*

303. MYA.

Animal Aſcidia.

Teſta bivalvis hians utplurimum altera extremitate.

Cardo dente (pleriſque uno) ſolido craſſo patulo vacuo (*nec inſerto teſtæ oppoſitæ.*)

truncata. 1. M. teſta ovata poſterius truncata, cardinis dente antrorſum puncto obtuſiſſimo. *Fn. ſuec.* 2126. *Müll. zool. dan. prodr.* 2959.
O. Fabr. groenl. p. 404. *n.* 406. Mya teſta ſubovata convexa antice truncata, cardinis dente ſolitario antrorſum porrecto obtuſiſſimo.
It. wgoth. 199. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 3. Concha lævis altera tantum parte clauſilis.
Liſt. Conch. t. 428. *f.* 269.
an. angl. t. 5. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* D.
Olaſſ. iſl. Reſ. p. 69. 716. 1009. *t.* 11. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 1. 2.
β) *Liſt. Conch. t.* 429. *f.* 270.

Habitat in Oceano europæo, *ad 2½ pollices longa, ſordide alba, epidermide ex luteo fuſca veſtita, craſſa, convexa, edulis, roſmari, lagopodis, coracis, anatis ſpectabilis cibus, ſtriis tranſverſis irregularibus in rugas abeuntibus exarata, intus glaberrima.*

arenaria. 2. M. teſta ovata poſterius rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali. *Fn. ſuec.* 2127. *Müll. zool. dan. prodr.* 2960.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 405. *n.* 407. Mya ovata compreſſa antice rotundata, cardinis dente antrorſum porrecto rotundato denticuloque laterali poſtico.
It. wgoth. 187. Concha ſubarenacea marina.
Baſt. opuſc. ſubſ. 2. *p.* 69. *t.* 7. *f.* 1 - 3. Mya arenaria.
Liſt. hiſt. Conch. p. 418. *f.* 262.
Argenv. zoom. t. 5. *f.* 10.
Leſſer teſtaceoth. f. 106.
Born. muſ. caeſ. Vindob. teſt. p. 19. *t.* 7. *f.* A.
Chemn. Conch. 6. *p.* 3. *Vign. & t.* 1. *f.* 3. 4.
β) *Liſt. Conch. t.* 419. *f.* 263.
Habitat in Oceano Europæ *ſeptentrionalis ſub arena, quam excavat, foraminibus 2 dignoſcenda, flaveſcens, ex fuſco rubella, aut ſordide alba, 2½ pollices longa, cardinis dente longiore & magis obtuſo, quam in mya truncata, ſtriis tranſverſis in rugas abeuntibus.*

pictorum. 3. M. teſta ovata, cardinis dente primario crenulato: laterali longitudinali, alterius duplicato. *Fn. ſuec.* 2129.
Liſt. Conch. t. 146. *f.* 1. 147. *f.* 2. 3.
anim. angl. t. 2. *f.* 30.
app. t. 1. *f.* 4.
Bonann. recr. 2. *f.* 40. 41.
muſ. Kirch. 2. *f.* 39. 40.
Valent. muſ. t. 14. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 10.
zoomorph. t. 8. *f.* 11.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 6.
Schroet. Fluſconch. t. 2. *f.* 2. *t.* 3. *f.* 2 - 5. *t.* 4. *f.* 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 6.
Beſch. berl. Nat. 1. *p.* 344.
β) Mya maroccana. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 3. *f.* 23. 24.

Myæ ſæpius tenebrant fundum, & in eundem ſe defodiunt vel totae vel pro parte

γ) *Liſt. Conch. t.* 148.
δ) *Argenv. Conch. t.* 29. *f.* 18.
ε) *Schroet. Fluſconch. t.* 3. *f.* 3.
ζ) *Schroet. Fluſconch. t.* 9. *f.* 1.
Habitat β) *in* Barbariæ, ζ) *in* Tranquebariæ, *in* Europæ aquis dulcibus, $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa*, $3\frac{1}{2}$ *lata, epidermide fuſceſcente aut nigricante veſtita, ſub hac flavicans aut vireſcens: radiis viridibus, intus lævis margaritacea, non hians, tenuis.*

margaritifera. 4. M. teſta ovata anterius coarctata, cardinis dente primario conico, natibus decorticatis. *Fn. ſuec.* 2130.*
Müll. zool. dan. prodr. 2961. Mya teſta ovali-oblonga, apertura ſinuata, natibus decorticatis.
Liſt. Conch. t. 149. *f.* 4.
anim. angl. app. 15. *t.* 1. *f.* 1.
Gualt. teſtac. t. 102. *f.* C.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 47.
Mylius ſaxon. ſubt. 2. *p.* 20.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 2.
Schroet. Fluſconch. t. 4. *f.* 1.
Mayer Abh. der boehm. Geſ. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in totius orbis arctici *ad* Bohemiam & Franconiam *uſque cataractis, in* Barbariæ *quoque lacubus, matricem perlarum exhibens & margaritas, in animalis corpore ipſo natas, ſpurias ex perforatione teſtæ genitas, ad* $5\frac{1}{4}$ *pollices lata, &* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, valida, tranſverſe rugoſa, extus atra, vermibus ſæpe corroſa, cardinis dente laterali nullo, primario in alterius teſtæ dentem latum fiſſumque recepto.*

Perna. 5. M. teſta oblonga dilatata, baſi anguſtiore compreſſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 470. *n.* 10?
Argenv. Conch. t. 22. *f.* N?
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 2. 4. 5.
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 738. 739. & *t.* 84. *f.* 748.
Schroet Einl. in Conch. 2. *p.* 608. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 4.
Habitat in freto magellanico & Barbariæ *littore, pernæ figura, lævis cærulea & alba, altero latere hians, cardinis loco fovea profunda tranſverſa, in cujus medio dens acutus in utraque valva, an hujus generis?*

Vulſella. 6. M. teſta linguiformi, cardine terminali depreſſo ſemiorbiculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 471. *n.* 11.* *Muſ. Theſſin. t.* 6. *f.* 3.

Liſt. Conch. t. 1055. *f* 10.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* A.
Valent. muſ. t. 16. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* H.
Knorr Vergn. 5. *t.* 2. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 8-11.
Hermann Naturf. 17. *p.* 126. *t.* 3. *f.* 1-4.
Habitat in mari americano, indico, *rubro, rarior,* ¼ *pollicis* 4-5 *pollices longa, formæ pro ætate variabilis, valvis ſatis planis, ſubtiliter tranſverſim ſtriatis, extrinſecus flaveſcentibus nigricante & flavicante radiatis, hiantibus, dente longo lato, in medio & profundius adhuc ad latera canaliculato; an hujus generis?*

arctica. 7. M. teſta ſtriata: valvis carinis duabus ſpinuloſis, cardine edentulo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2962.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 407. *n.* 408. Mya teſta ſtriata, valvulis carinis duabus ſpinuloſis ſæpe obſoletis, cardine obſolete dentato.
Habitat libera in Oceano ſeptentrionali *inter algas, mytilos & alia marina, fabæ magnitudine,* 1½-7 *lineas longa, pallide flava, intus lactea, forma arcæ, anterius impreſſa planiuſcula, parte anteriore obtuſiſſima, poſteriore breviore acutiuſcula; pars anterior a natibus excurrit angulis* 2 *remotis antrorſum ſubaculeatis.*

edentula. 8. M. teſta ſtriata ovali æquivalvi ample hiante, cardine edentulo.
Pall. it. 2. *p.* 700.
Habitat rarior in arena littorea maris caſpii, *pollicaris, tenuis, ſubantiquata, alba, ſtriis in utraque valva circiter* 33, *in breviore fine diſtantibus, in productiore confertis, cardinis labio craſſiuſculo inflexo.*

radiata. 9. M. teſta aequivalvi pellucida tenuiſſime tranſverſim ſtriata viridi flavicante livido-radiata: valvis altero latere latiſſimis, altero anguſtiſſimis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Liſt. Conch. t.* 152. *f.* 7. Muſculus latior ſubfuſcus cæruleis lineis radiatus.
Habitat in Malabariæ *fluviis, m. pictorum tenuior, fragilior, latior & magis complanata, intus margaritacea, cardinis dente primario crenato.*

oblonga. 10. M. ovato-oblonga, valva altera dente valido lato, valvæ alterius foveæ inſerto, denteque minore inter duos minores alterius valvæ poſito.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat - - - 1½ *pollicem longa*, 3 *pollices lata*, *mactra lutraria magis ventricoſa*, *arenariæ valde affinis*, *an mera varietas?*

anatina. 11. M. teſta globoſa nivea pellucida, cardinis dente primario prominente rotundato.
Adanſ. Seneg. t. 19. *f.* 2. Tugon.
Chemn. Conch. 6. *t.* 2. *f.* 13.
Habitat rarius in Guinea, *frequentius in littore* africano, *præſertim ad oſtium* Nigri, *ſoleni anatino valde affinis*, *teſtarum ſtriis decuſſatis*, *valva utraque altero latere repanda.*

nicobarica. 12. M. teſta æquivalvi nivea ovato-oblonga decuſſatim ſtriata, cardinis dente ſolitario lato perpendiculari cochleariformi.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *valvis altero latere convexis*, *latis margine rotundatis*, *altero magis anguloſis*, *anguſtis*, *planis*, *hiantibus.*

auſtralis. 13. M. teſta ovata compreſſa clauſa, cardinis dentibus duobus lateralibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Habitat in nova Seelandia, *ſordide ochroleuca*, *an hujus generis?*

gaditana. 14. M. teſta rotundata, planiuſcula, tranſverſim ſtriata ochroleuca, intus alba.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 22.
Habitat ad littus Gaditanum.

corrugata. 15. M. teſta rhombea viridi, natibus rugoſis. *Müll. hiſt. verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 214. *n.* 384. *Beſch. der berl. Naturf.* 4. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 7. 8.
Schroet Fluſconch. t. 9. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 22. a. b.
Habitat in fluviis littoris Coromandel, *epidermide remota margaritaceus*, *tenera*, *pellucida*, *ab utraque cardinis parte ſtriis rugoſis notata*, *intus ſtriis radiatis ſubtiliſſimis picta*, 11 - 16 *lineas longa.*

rugoſa. 32. M. teſta ovali rugoſa extrinſecus vireſcente intus marga-
ritacea : cardinis dente primario crenulato; laterali lon-
gitudinali, alterius duplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.*
346. *t.* 170. *f.* 1649.
Habitat in Coromandel *fluviis.*

nodoſa. 23. M. teſta ovali tenera vireſcente : natibus nodulo-
Chemn. Conch. 10. *p.* 347. *t.* 170. *f.* 1650.
Habitat - - - -

norwegi-ca. 24. M. teſta ovali longitudinaliter denſe ſtriata, altero
rotundata, altero truncata, natibus decortica-
Chemn. Conch. 10. *p.* 345. *t.* 170. *f.* 1647. 1648.

ſpuria. 16. M. teſta rhombea viridi, natibus glabris.
Schroet. Einl. in Conch. 2. 617. *n.* 9. *t.* 7. *f.* 5.
Habitat in Tranquebariæ *fluviis, corrugatæ ſimilis, at du-*
plo fere major, & præter vulvæ regionem tota glab-

glycyme-ris. 17. M. teſta utrinque hiante craſſiſſima lamellata oblong-
ovata tranſverſe ſtriato rugoſa, cardinis dente prima-
rio craſſiſſimo.
Liſt. Conch. t. 414. *f.* 258.
Bonann. recr. 2. *f.* 59 ?
muſ. Kirch. 2. *f.* 56 ?
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* A.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 1. *f.* 8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 25.
Habitat in Oceano europæo, mari *præſertim* hiſpanico
mediterraneo, *ad* 5 *pollices longa &* 10 *pollices lata,*
nerea vel ochroleuca, intus cretacea, cardinis dente a-
minore ſerieque plicarum, inter myas & ſolenes ambigua

ſyrmato-phora. 18. M. teſta ovata depreſſa, cardinis margine ad dent-
primarium mucrone ſubulato, altero dilatato. *Grono-*
zooph. t. 18. *f.* 1. 2.
Habitat in Guineæ *fluviis, dentibus marginalibus utrin-*
que parallele duplicatis.

nitida. 19. M. teſta ovali alba lævi, cardinis utriuſque dente obtuſo
Müll. zool. dan prodr. 2963.
Habitat in Norwegia.

membra-nacea. 20. M. teſta ovata membranacea candida, margine ad probo-
cidem protracto reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2964.

Olafs. iſl. reſ. 901. *t.* 11. *f.* 10.
Habitat - - - -

byſſifera. 21. M. teſta rudi oblonga ſtriata convexa, cardine edentulo.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 408. *n.* 409.
It. Wgoth. 198. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat in rupium marinarum Groenlandiæ *fiſſuris, libera byſſo ſe affigens*, 3-17½ *lineas longa.*

304. SOLEN. *Animal* Aſcidia.

Teſta bivalvis oblonga, utroque latere hians.

Cardo Dens ſubulatus reflexus ſæpe duplex, non inſertus teſtæ oppoſitæ, margo lateralis magis obſoletus.

Vagina, 1. S. teſta lineari recta: fine altero marginato, cardinibus unidentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 472. *n.* 12.*
Liſt. Conch. t. 409. *f.* 255. *t.* 418. *f.* 256. *t.* 412. *f.* 1. *t.* 1056. *f.* 5.
Bonann. recr. 2. *f.* 57.
muſ. Kircher. 2. *f.* 56.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 95. *f.* C. D. E.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* K. M. M.
zoom. t. 6. *f.* G. H.
Klein. oſtr. t. 11. *f.* 65.
Leſſer. teſtaceoth. f. 120.
Bytem. app. t. 11. *f.* 52. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *p.* 36. *vign.* 3. *f.* G. H. *t.* 4. *f.* 26-28. *& lit.* a - c.
β) *Liſt. Conch. t.* 412. *f.* 6.
Habitat frequens in mari europæo, americano, indico, 6-7 *pollices latus*, 1 *longus, vireſcens, ſub epidermide triangulo rubello altero tranſverſe ſtriato, altero faſciis arcuatis picto, valvis canalem referentibus.*

Siliqua. 2. S. teſta lineari recta, cardine altero bidentato. *Fn. ſuec.* 2131. *Muſ. Lud. Ulr.* 473. *n.* 13.*

Liſt. Conch. t. 413 ?
an. angl. t. 5. *f.* 37.
Rond. teſt. 93.
Bell. aq. t. 414. *f.* 2.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 6.
Ginan. adr. 2. *p.* 37. *t.* 27. *f.* 170.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 4. *f.* 29. & d.
β) Solen indicus lunulis roſeis pictus. *Schroeter Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 6.
Habitat frequens in Oceano europæo, *ad* 8 *pollices latus*, 1¼ *pollicis longus.*

Enſis. 3. S. teſta lineari ſubarcuata, cardine altero bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 473. *n.* 14.*
Liſt. Conch. t. 411. *f.* 257.
an. angl. app. t. 2. *f.* 9.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* L.
Chemn. Conch. 6. *t.* 4. *f.* 30. & c.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 626. *n.* 7. 3. *t.* 7. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo, anglico, belgico, *rarior, utroque fine rotundatus, præcedentibus ſpeciebus utplurimum minor, dentibus duobus alterius valvæ foveæ triangulari alterius inſertis.*

Legumen. 4. S. teſta lineari-ovali recta, cardinibus mediis bidentatis, alterius bifido.
Adanſ. ſeneg. t. 19. *f.* 3. Molen.
Liſt. Conch. t. 420. *f.* 264.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* A.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 66.
v. Born. muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 32-34.
Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, & atlantico, *præcedentibus brevior, utrinque rotundatus, epidermide flavicante, triangulo ſub hac arcuato ſtriato cæruleſcente, cardine in teſtæ medio poſito.*

Cultellus. 5. S. teſta ovali-oblonga ſubarcuata. *Muſ. Lud. Ulr.* 474. *n.* 15.*
Leſſer teſtaceoth. f. 126.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* F.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* E.

Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 36. 37.
Habitat in Amboinæ & Tranquebariæ *arena littorea, tenuis, fragilis, 8 circiter lineas longa, & 3 ultra 2 pollices lata, ſub epidermide flavicante ſordide alba: maculis ſpadiceis & violaceis varia, utroque fine rotundata, altera valva unidentata, altera bidentata.*

radiatus. 6. S. teſta ovali recta lævi: coſta tranſverſali adnata depreſſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 474. *n.* 16.*
Liſt. Conch. t. 422. *f.* 266.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* P.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 9.
Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 38–40.
Habitat in Oceano indico, *violaceus, radiis 4, rarius 2 albis, tenuis, fragilis, coſta nivea, ſatis valida, totam fere teſtam percurrente, cardine utrinque calloſo & in utraque teſta bidentato.*

ſtrigilatus. 7. S. teſta ovali oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 475. *n.* 17.*
Rondel. teſt. 14. Concha nigra.
Liſt. Conch. t. 416. *f.* 260.
Bonann. recr. 2. *f.* 77.
muſ. Kircher 2. *f.* 76.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* C.
Knorr Verg. 6. *t.* 5. *f.* 4.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 19. *f.* 2.
Murr. fund. teſt. t. 2. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 41. 42.
β) *Liſt. Conch. t.* 421. *f.* 265.
Bonann. recr. 3. *f.* 353.
muſ. Kirch. 2. *f.* 107.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 68.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 19. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 6. *f.* 43. 44.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *roſeus radiis 2 albis, aut β) albus, ſatis robuſtus ventricoſus, cardinis margine prominente, dente tenero retroflexo.*

anatinus. 8. S. teſta ovata membranacea piloſa, cardinis coſta falcata. *Muſ. Lud. Ulr.* 475. *n.* 18.*

Rumpf muſ. t. 75. f. O. Roſtrum anatis.
Argenv. Conch. t. 22. f. R.
v. Born. muſ. caeſ. Vind. teſt. p. 23. vign. f. ſupr. & inf.
Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 46-48.
Habitat rarior in Oceani indici *fundo arenoſo, pellucidus, albus, chartæ inſtar tenuis, altero fine rotundato clauſo, altero roſtri æmulo hiante, utriuſque valvæ dente cardinuli figura auriſcalpii.*

Macha. 9. S. teſta ovali oblonga anterius truncata, cardine altero bidentato.
Molin. hiſt. nat. Chil. p. 178.
Habitat in mari pacifico, Chili *alluente, in fundo arenoſo ſe abſcondens margaritifer, 6-7 pollices longus, fuſcus, cæruleo-varius.*

bullatus. 10. S. teſta ſubrotunda inflata ſubſtriata, anterius crenato-hiante.
Liſt. Conch. t. 342. f. 179.
Rumpf muſ. t. 44. f. N?
Gualt. teſt. t. 85. f. H.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 3?
Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 49. 50
Habitat in mari indico (?) & americano, *ſatis tenuis, ſubpellucidus longitudinaliter ſtriatus, albus, purpureo-maculatus aut nebuloſus, cardinis dente unico, marginalibus remotis compreſſis foveæ oppoſitæ inſertis.*

minutus. 11. S. teſta ovali, valvularum angulis utriſque ſerratis.
Liſt. Conch. t. 426. f. 267?
Spengl. catal. raiſ. t. 6. f. 6-8.
Chemn. Conch. 6. t. 6. f. 51. 52.
Habitat in Oceano Europæ ſeptentrionali *inter zoophyta, ſeminis cucumeris magnitudine, longitudinaliter ſtriatus apice truncatus, carinis a cardine apicem verſus divergentibus, acutis, ſerratis.*

virens. 12. S. teſta ovato-oblonga, umbonibus tumidis.
Habitat in Java, *teſta fragiliſſima, diaphana, alba, extus virente, inæquivalvi, forma myæ pictorum, apice & baſi vix clauſa: utraque valva calloſa, cardine alterius dentibus 2 approximatis ſine oppoſitis.*

diphos. 13. S. teſta ovali recta lævi, nymphis prominentibus. *Mart.* 2. *p.* 544.
Valent. muſ. t. 13. f. 5.

Chemn. Conch. 6. *t.* 7. *f.* 53. 54.
Habitat in Oceano indico, *radiato affinis, epidermide virente, violaceus, radiis pluribus, 2 magis evidentibus,* $2\frac{1}{2}$ *pollices longus, 5 pollices latus, alterius valvæ cardine unidentato, alterius bidentato.*

minimus. 14. S. teſta lineari-ovali recta, cardinibus lateralibus bidentatis: alterius bifido.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 31. a. b.
Habitat in ſinu tranquebarico, *legumini proximus, at longe minor, ſub epidermide flavicante totus niveus, coſta interiori totam teſtam percurrente.*

maximus. 15 S. teſta lineari-ovali recta arcuato-ſtriata, cardinibus lateralibus bidentatis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 5. *f.* 35.
Habitat rariſſimus ad littora Nicobariæ, *teſta tenui, pellucida, ſub epidermide flavicante alba,* 4 *pollices lata,* 1 *pollicem & 5 lineas longa, utrinque hiante, cardinis dentibus ſeſe non excipientibus.*

coarctatus. 16. S. teſta tranſverſe rugoſa, medio coarctata, utrinque rotundata, cardine medio in alterutra valva nunc unidentato nunc bidentato.
Chemn. Conch. 6. *f.* 45.
Schroeter Fluſconch. t. 9. *f.* 17.
Habitat ad inſulas nicobaricas, *teſta ſordide alba, utrinque hiante,* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa* $2\frac{3}{4}$ *lata.*

roſeus. 17. S. teſta roſea æquivalvi, cardinis dente ſubbifido foveæ alterius valvæ inſerto.
Chemn. Conch. 6. *t.* 7. *f.* 55.
Habitat in mari rubro, *tellinæ radiatæ affinis, at teſta utrinque hiante.*

ſanguinolentus. 18. S. teſta ovali glaberrima, cardine calloſo bidentato.
Liſt. Conch. t. 397. *f.* 236.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 4.
Chemn. Conch. t. 7. *f.* 56.
Habitat ad Jamaicam, *natibus extrinſecus & intus roſeis.*

ſtriatus. 19. S. teſta æquivalvi tranſverſim ſtriata, cardinis dente unico.
Chemn. Conch. 6. *t.* 7. *f.* 57. 58.
Habitat ad inſulas nicobaricas, *mediæ magnitudinis, tenuis, roſeus: radiis albis.*

veſpertinus. 20. S. teſta ovali oblonga ſpadiceo-radiata, cardinis ſiniſtræ valvæ dente ſolitario duplici alterius inſerto.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 20. Gatan.
Liſt. Conch. t. 417. *f.* 261.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* 1.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 6. 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 7. *f.* 59. 60. a. b.
Habitat in mari mediterraneo & atlantico, *tellinæ gari ſimilis, at teſta utrinque hiante, neque ad alterum latus flexa, intus cæruleo alboque varia, nunc lævi, nunc ſtriis tranſverſis aſpera.*

occidens. 21. S. teſta tranſverſe ſtriata ad nates glabra albo rubelloque radiata, cardine utroque bidentato: foveola intermedia.
Chemn. Conch. 6. *t.* 7. *f.* 61.
Habitat rariſſima - - - teſta hinc inde albis rubelliſque maculis varia, intus alba, 3 lineas ultra 2 pollices longa, & ultra 4 pollices lata, utrinque hiante, cardine laterali.

criſpus. 22. S. teſta partim lævi, partim ſtriis undatim criſpis aſpera, cardinis dente longiſſimo anguſto.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 38.
Habitat frequens in fluvio Teers Angliæ, *anatino affinis, an diſtincta ſatis hujus generis ſpecies?*

Spengleri. 23. S. teſtæ natibus bipartitis, cardinis dente primario rotundo, acceſſoriis longis anguſtis: altero curvato.
Spengl. catal. raiſ. t. 1. *f.* 8. 9.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa, $2\frac{1}{2}$ *pollices lata, utrinque rotundata.*

305. TELLINA.

Animal Tethys.
Teſta bivalvis, anterius hinc ad alterum latus flexa.
Cardinis dentes (*utplurimum*) tres: laterales plani alterius teſtæ.

* *ovatæ craſſiuſculæ.*

gargadia. 1. T. teſta ſubrotunda compreſſa anterius rugoſa, rima dentata.
Muſ. Lud. Ulr. 476. *n.* 19.*

Rumpf. muſ. t. 43. *f.* N. Remies gargadica.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 55.
Leſſer teſtaceoth. f. 119.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 63. 64. a. b.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta alba, apice & intus flavicante, cardinis dente medio fiſſo.*

Lingua felis. 2. T. teſta ſubovata ſcabra: ſquamulis lunatis quincuncialibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 476. *n.* 20.*
Rumpf. muſ. t. 45. *f.* G.
Gualt. teſt. 76. *f.* B.
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 62.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 65.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta duplo fere latiori; quam longa, vertice radiiſque dilute roſeis picta.*

virgata. 3. T. teſta ovali ſtriis tranſverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus prominulis. *Muſ. Lud. Ulr.* 477. *n.* 21.*
Rumpf. muſ. t. 45. *f.* H. Tellina virgata.
Argenv. Conch. t. 25. *f.* G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 21. *f.* 4. & 4. *t.* 25. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 66-72.
β) *Gualt. teſt. t.* 89. *f.* E.
γ) *Gualt. teſt. t.* 86. *f.* G.
Habitat in Oceano indico & atlantico, *teſta ad* $1\frac{3}{4}$ *pollices longa,* $2\frac{1}{2}$ *lata, alba vel flavicante, radiis utplurimum roſeis picta, cardinis dente medio fiſſo, lateralibus triangularibus, altero ante vulvam, altero pone anum poſito.*

angulata. 4. T. teſta ſubovata ſtriis tranſverſis recurvatis anterius angulata, dentibus lateralibus nullis.
Liſter Conch. t. 388. *f.* 235. *t.* 406. *f.* 252.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 74. 75.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 643. *n.* 4. *t.* 7. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico, *ultra ſeſquipollicem longa,* 2 *pollices lata, virgatæ affinis, at minus oblonga, tota alba, angulo anteriori magis extrorſum ſito, ano ovali, nec ſolis marginibus inflexis diſtincta.*

Gari. 5. T. teſta ovalis ſtriis tranſverſis recurvatis, dentibus lateralibus obſoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 478. *n.* 22.*
Rumpf. muſ. t. 45. *f.* D. Tellina gari.
Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 2.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 92. 93.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 644. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 10. *f.* 94.
Habitat in Oceano indico, *virgatæ facie, & teſta minore magis anguſta, anterius inflexa rugoſiſſima, rugis tranſverſis in medio teſtæ per ſtrias perpendiculares decuſſatis, nymphis exterius prominentibus, nunc cinerea radiis fuſcis, nunc alba radiis cæruleis, nunc cæruleſcens albo-maculata radiis rubris, nunc albo-rubella radiis rubris, β) ex cinereo alba, radiis rubro variis, & ex cinereo albidis.*

fragilis. 6. T. teſta ovata alba gibba: ſtriis tranſverſis recurvatis, natibus flaveſcentibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 84.
Habitat in Oceano europæo, mari caſpio, *teſta magnitudine extimi pollicis, ſotu tenui, ſtriis tranſverſis per alias decuſſatis, cardinis in altera valva dente unico fiſſo, in altera duobus, in utraque lateralibus nullis.*

rugoſa. 7. T. teſta ovata: rugis tranſverſis undulatis, cardinis dentibus lateralibus duobus, primario in ſiniſtra valva unico fiſſo, in altero duobus.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 8. *f.* 62.
Habitat minus frequens in mari indico & americano, *teſta pauliſper latiori quam longa intus glabra, alba, aut flavicante, angulatæ affinis.*

inflata. 8. T. teſta rotundata craſſa tota nivea gibba: ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 76.
Habitat rarior - - -

multangula. 9. T. teſta ovata ſubventricoſa inæquivalvi decuſſatim ſtriata anterius ſinuata, cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario fiſſo, in altera duobus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 77.
Habitat ad Tranquebariæ *litus, teſta ſatis magna ex cineraſcente alba: rima ampla.*

Tellinarum *teſtæ anterius inflexæ, ut altera teſta plicam convexam, altera vero cavam oſtendat, in ſuborbiculatis autem plica vix manifeſta, ſed ſtriæ in eodem loco divergentes genus produnt.*

papyracea. 10. T. teſta tenui ovata ventricoſa tranſverſim ſtriata, anterius plicato-rugaſa, cardinis dentibus lateralibus nullis, primariis duobus.
Chemn. Conch. 6. t. 9. f. 78.
Habitat rarior ad Guineam, *teſta* 3 *lineas longa, & 6 ultra pollicem lata, fragili, medio excavata, intus lævi, alba.*

gibboſa. 11. T. teſta ſubtrigona ventricoſa ſubtiliter tranſverſim ſtriata, cardinis dente laterali valido.
Gualt. teſt. t. 77. f. Q.
Habitat - - - teſta ex viridi albicante utrinque inflexa: altero latere breviori, cardinis dente primario unico.

inæquilatera. 12. T. teſta æquivalvi ſubrotunda alba: ſtriis verſus marginem nonnullis tranſverſis.
Gualt. teſt. t. 88. f. C.
Habitat - - -

Knorrii. 13. T. teſta ſplendide rubra margine violacea.
Knorr Vergn. 5. t. 21. f. 5.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ultra 2 pollices lata.*

candidiſſima. 14. T. teſta alba.
Knorr Vergn. 6. t. 38. f. 4.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $2\frac{1}{4}$ *pollicis lata; an diſtincta ſpecies?*

Bornii. 15. T. teſta tranſverſim ſtriata, altero latere flexa rubeſcente: radiis rubris.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. f. 5.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, & 2 lata.*

puſilla. 16. T. teſta ovata ventricoſa, tenui tranſverſe ſtriata, cardine in altera valva edentulo, in altera dente primario duplici.
Schroet. Fluſconch. p. 194. t. 4. f. 7. a. b.
Habitat in Europæ *fluviis, teſta minima ſordide alba, intus nivea, tenera.*

** *ovatæ compreſſæ.*

albida. 17. T. teſta ovali lævi, nymphis prominentibus. *Muſ. Lud. Ulr. 479. n. 23.* *
Habitat in Oceano europæo, *teſta ovi magnitudine, ex rubeſcente alba, obſolete tranſverſim ſtriato, intus candida.*

nymphis albis, cardine utrinque ſutura diſtincto, ſtriis minimis tranſverſis rubris notata: dentibus in utraque valva 3.

foliacea. 18. T. teſta ovali, pube ſcabra, rima ſerrata. *Muſ. Lud. Ulr.* 479. *n.* 24.*
Rumpf. muſ. t. 45. *f.* K.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* E.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 64.
Knorr Vergn. 5. *t.* 29. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 95.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta tenera, pellucida, aurea,* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, 3 pollices lata, cardinis dente primario fiſſo, laterali elongato.*

planata. 19. T. teſta ovata compreſſa tranſverſim ſubſtriata lævi: marginibus acutis, pube ſubtomentoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 480. *n.* 24.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* G?
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 28?
Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 100.
Habitat in Oceano europæo, mari mediterraneo, *teſta maxime plana, pellucida, incarnata, minus flexa, quam in congeneribus: margine acutiſſimo.*

lævigata. 20. T. teſta ovata lævigata: dentibus lateralibus marginatis, pube ſtriato-ſcabra, nymphis inflexis. *Muſ. Lud. Ulr.* 480. *n.* 26. *
Rumpf. muſ. t. 45. *f.* I? Tellina lævis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 111.
Schroet. Eml. in Conch. 2. *p.* 649. *t.* 7. *f.* 10.
β) *Liſt. Conch. t.* 387. *f.* 234?
Habitat in Oceano europæo & indico, *teſta alba: radiis rubellis, intus rubella, flavicante aut alba.*

radiata. 21. T. teſta oblonga longitudinaliter ſubtiliſſime ſubſtriata nitida, ſutura anali canaliculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 481. *n.* 27.* *Fn. ſuec.* 2132.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2968.
Liſt. Conch. t. 393. *f.* 240.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* I.
Argenv. Conch. 22. *f.* A.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 60.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 8.
— *Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 1-4 *t.* 2. *f.* 4. & 4. *t.* 2. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 22.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 102.

β) Tellina inæquilatera maxima rugoſa candida intus argentea. *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* P?

γ) Tellina inæquilatera aliquantulum rugoſa prope marginem fuſca, in medio faſcia ſubalbida cincta, ad cardinem purpuraſcens. *Gualt. teſt. t.* 89. *f.* A?

δ) Tellina flava. *Knorr Vergn.* 4. *t.* 2. *f.* 2.

ε) *v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t.* 2. *f.* 10?

Habitat in Oceano europæo & americano *frequens, teſta utplurimum alba, radiis rubris picta.*

roſtrata. 22. T. teſta oblonga anterius angulato-roſtrata: angulis ſubdentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 481. *n.* 28.*

Liſt. Conch. t. 382. *f.* 225. *t.* 395. *f.* 242?

Rumpf. muſ. t. 45. *f.* L.

Gualt. teſt. t. 86. *f.* D? *t.* 88. *f.* T.

Argenv. Conch. t. 22. *f.* O.

Klein oſtr. t. 11. *f.* 63.

Knorr Vergn. 4. *t.* 2. *f.* 3. 5.

v. Born muſ. caeſ. Vind. t. 2. *f.* 12.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 96. & *t.* 11. *f.* 104.

Habitat rarior in Oceano indico, *teſta nunc alba, radiis interdum roſeis picta, nunc rubra, radiis interdum albis, nunc flava.*

inæquivalvis. 23. T. teſta oblongo-roſtrata, valva altera plana.

Gronov. zooph. t. 18. *f.* 3.

Brünniche Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 313. *t.* 7. *f.* 25-28.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 106. a. b. c. d.

Habitat in mari mediterraneo & norwegico, *teſta lactea, lævi, pellucida, pollicis tranſverſi longitudine, ſutura dorſali recta in roſtrum obtuſum patulum excurrente, valvula altera leviter convexa, cardinis dentibus 2 primariis, lateralibus nullis.*

trifaſciata. 24. T. teſta ovata læviuſcula ſanguineo-triradiata, pube rugoſa. *Fn. ſuec.* 2133. *Müll. zool. dan. prodr.* 2969.

Liſt. an. engl. app. 32. *f.* 8.

Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 114. a. b.

β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 115. 116.

Habitat minus frequens in Oceano europæo, *teſta unguis magnitudine, alba aut pallida: radiis 3 ſanguineis (β. violaceis, interdum 6) a cardine ortis, anterius magis obtuſa, vulva ovata.*

incarnata. 25. T. teſta ovata anterius productiore compreſſo planiuſcula, natibus ſubmucronatis. *Fn. ſuec.* 2134.*
Liſt. an. angl. 32. *t.* 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* M.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 13.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 110.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 12. *f.* 117.
γ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 251.
δ) *Liſt. Conch. t.* 405. *f.* 250.
Habitat in Oceano europæo, mari mediterraneo, *teſta extimi pollicis magnitudine, planatæ ſimillima, ſed roſea, radio non alterove pallido, β) margine albo, vertice roſeo; γ) tota rubra, natibus acutiuſculis; δ) intus rubra.*

donacina. 26. T. teſta ovata compreſſo-planiuſcula læviuſcula, anterius obtuſiſſima.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* N?
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 219?
Habitat in mari mediterraneo, *incarnatæ ſimillima, ſed teſta minore purpuraſcente: radiis plurimis rubris, regione vulvæ obtuſiſſima, &, ut in donace, truncata.*

truncata. 27. T. teſta ovali compreſſa ſubſtriata: parte antica truncata ſuturaque diſtincta.
Habitat in Java, *incarnatæ ſimilis, at teſta violacea, magis fragili, anterius fere truncata, cardinis dentibus omnibus emarginatis.*

trilatera. 28. T. teſta plana anterius truncata flava: vertice albo, cardinis dente primario & laterali ſolitariis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 85.
Habitat - - - teſta triangulo inæquilatero ſimili, 1 *pollicem & 7 lineas longa, 2 pollices 2 lineas lata.*

oblonga. 29. T. teſta oblonga fragili flavicante, cardinis dente primario in altera valva ſolitario, in altera duplici.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 87.
Habitat in Oceano europæo, *mediæ magnitudinis, altero latere rotundata.*

Spengleri. 30. T. teſta alba tranſverſim ſtriata utrinque bifariam uncinata: valva altera extrorſum, altera introrſum arcuatim flexa.
Spengl. Beſch. Bel. Naturf. 1. *p.* 387. *t.* 9. *f.* 1-3.
Catal. raiſ. t. 4. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 88-90.

β) *Liſt. Conch. t.* 398. *f.* 237.

Habitat ad inſulas nicobaricas, *teſta craſſa* 11 *lineas longa*, & 2 *pollices cum* 8 *lineis lata alba*, *vertice roſeo*; β) *uncinis caret.*

ferventis. 31. T. teſta oblongo-ovata compreſſa albo rubelloque radiata ſubtiliter tranſverſim ſtriata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Liſt. Conch. t. 394. *f.* 241.

Chemn. Conch. 6. *t.* 10. *f.* 91.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta pollicem longa*, & 2 *lata.*

operculatas. 32. T. teſta purpurea albido faſciata decuſſatim ſtriata altero fine productiore, valva altera convexa, altera plana.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 97.

Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 1?

β) Tellina operculata ochroleuca. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 11. *f.* 98.

Habitat in India? *rarior*, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa*, $2\frac{3}{4}$ *pollicis lata*, *dentibus cardinis lateralibus nullis*, *primario alterius valvæ ſolitario*, *alterius duplici*, *ſtriis tranſverſis ſubtilioribus*; β) *ſtriis tranſverſis craſſioribus*, *cardinis dente laterali*, *primario fiſſo*, *ſiniſtræ valvæ ſolitario*, *dextræ duplici*; *an ad inæquivalvem forſan referenda?*

hyalina. 33. T. teſta ovali inæquivalvi plana pellucida ſubtiliſſima decuſſatim ſtriata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 99.

β) Tellina excavata Spengleri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 6. *n.* 14.

Habitat ad Guineæ *littora*, β) *in* India, *teſta nivea*, *tenui*, 6 *lineas ultra pollicem longa*, 9 *lineas ultra* 2 *pollices lata*, *margine acutiſſimo*, *cardinis dente primario in ſiniſtra valva ſolitario*, *in dextra duplici.*

vitrea. 34. T. teſta flavicante tenuiſſima perpendiculariter ſtriata anterius roſtrata, cardinis dentibus lateralibus nullis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 101.

Habitat in mari ſeptentrionali & balthico, *teſta fragilliſſima poſterius rotundata*, *cardinis dente in valva ſiniſtra primario ſolitario*, *in dextra* 2 *minimis.*

lanceolata. 35. T. teſta ovali tenuiſſima pellucida albida tranſverſim ſtriata anterius acuminata, cardinis dentibus lateralibus in altera valva nullis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 11. *f.* 102.
Habitat rariſſima in India, *teſta* 10 *lineas longa, pollicem cum* 8 *lineis lata, rubello obumbrata, cardinis dente primario ſimplicii ſubfiſſo.*

apelina. 36. T. teſta ovali pellucida lucis reflexione & refractione variante coſta in utraque valva alba a cardine ad marginem exteriorem procedente.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 107.
β) Tellina papyracea alba Splengeri. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 8. *n.* 18.
Habitat in ſinu nicobarico, *teſta tenui.*

coccinea. 37. T. teſta ovali pellucida coccinea ſubtiliter tranſverſim ſtriata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 109.
Habitat in mari mediterraneo, *callo prope cardinem teſtæ, inſtar ſolenis inſtructa.*

calcarea. 38. T. teſta ovali tenui alba, cardinis dente primario in altera valva fiſſo, alterius foveæ inſerto.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 136.
Habitat frequentiſſima in mari iſlandiam *circumfluente, teſta tenui.*

virginica. 39. T. teſta ſubtiliter tranſverſim ſtriata anterius roſtrata.
Liſt. Conch. t. 159. *f.* 15.
Habitat in Virginiæ fluviis, *teſta minima rotundata.*

alata. 40. T. teſta viridi ſubtriquetra: margine dilatato.
Liſt. Conch. t. 160. *f.* 16.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 36.
Habitat - - - - teſta 2 *fere pollices lata,* 1¼ *longa, an hujus tribus & generis?*

pectinata. 41. T. rotundata plana tenui ſubfuſca longitudinaliter ſtriata.
Liſt. Conch. t. 300. *f.* 137.
Habitat - - - -

anguſta. 42. T. teſta planiuſcula rubra albo-radiata altero fine acuminata, altero rotundata.
Liſt. Conch. t. 383. *f.* 26.

Habitat - - - teſta mediæ magnitudinis latitudine longitudinem duplo ſuperante.

variegata. 43. T. teſta ovali utroque fine rotundata variegata, radio ad verticem albido.
Liſt. Conch. t. 384. *f.* 27.
β) Tellina lata albida ex rubro radiata. *Liſt. Conch. t.* 385. *f.* 232.
γ) Tellina parva albida, ex purpura maculata ſive radiata. *Liſt. Conch. t.* 389. *f.* 228.
Habitat - - - -

madagaſcarienſis. 44. T. teſta ovali altero fine ſubacuminata - - - -
Liſt. Conch. t. 386. *f.* 233.
Habitat in Madaſcar, *teſta* 2¼ *pollices longa*, 3½ *lata.*

purpuraſcens. 45. T. teſta utriuque purpuraſcente.
Liſt. Conch. t. 391. *f.* 230.
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* L?
γ) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* M?
Habitat - - - teſta ſeſquipollicem longa, aut paulo latiori.

aſpera. 46. T. teſta altero fine acuminata intus luteſcente, exterius radiata ex ſtriis tranſverſis aſpera.
Habitat - - - teſta 1¼ *pollicis longa*, 3 *pollices lata.*

triangularis. 47. T. teſta ſubcuneata albida tranſverſe ſtriata.
Liſt. Conch. t. 401. *f.* 244.
β) Tellina triangularis admodum craſſa fere levior. *Liſt. Conch. t.* 401. *f.* 245.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, 1½ *lata.*

lata. 48. T. teſta inæquilatera; altero fine ſubacuminata.
Liſt. Conch. t. 407. *f.* 253.
Habitat in Oceano Norwegico, *teſta* 1¼ *pollicis longa*; 1¾ *lata.*

jamaicenſis. 49. T. teſta craſſa roſtro extus purpuraſcente.
Liſt. Conch. t. 408. *f.* 254.
Habitat in Jamaica, *teſta pollicem longa, ſeſquipollicem lata.*

rhomboides. 50. T. teſta exterius alba, ſtriis tranſverſis aſpera intus cæruleſcente.
Liſt. an. Angl. p. 171. *t.* 4. *f.* 20.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 48.
muſ. Kirch. 2. *f.* 47.

Habitat ad fluvium Angliæ Tees, *teſta* 2 *pollices lata, & ultra pollicem longa.*

vinacea. 51. T. teſta ſpadiceo-vinacea: radio albo.
Bonann. recr. 2. *f.* 42.
muſ. Kirch. 2. *f.* 41.
Habitat in mari britannico *&* balthico, *teſta pollicem longa, & ultra* $1\frac{1}{2}$ *lata.*

zonata. 52. T. teſta roſea: faſcia candida.
Bonann. recr. 2. *f.* 44.
muſ. Kirch. 2. *f.* 43.
Habitat in littore latino, *teſta interdum lactea, umbonis macula balauſtina, vix propria ſpecies.*

albicans. 53. T. teſta albida: faſcia candida, intus flava.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* H?
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* M?
Habitat - - - β) cardine purpuraſcente.

rufeſcens. 54. T. teſta rufeſcente luteo maculata, decuſſatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* C.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata.*

depreſſa. 55. T. teſta inæquilatera depreſſa minutiſſime ſtriata.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* H. I. L.
Habitat - - - teſta nunc candida, nunc purpuraſcente, nunc ſubroſea.

faſciata. 56. T. teſta inæquilatera ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, candido & ſubalbido alternatim faſciata.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* B.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, & $1\frac{1}{2}$ *fere lata, altero fine ſubacuminata.*

ſtriata. 57. T. teſta inæquilatera utrinque rotundata ex roſeo alba pellucida.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* C.
Habitat - - - teſta 2 *pollices lata,* $1\frac{1}{4}$ *longa.*

roſea. 58. T. teſta roſea: coſtis tenuibus a cardine ad marginem decurrentibus.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat - - - teſta pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ *lata.*

punicea. 59. T. teſta ovali plana æquilatera punicea denſiſſime tranſverſim ſtriata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 2. f. 8.
Habitat - - - teſta pollicem longa, pollicem & 8 lineas lata.

complanata. 60. T. teſta obovata complanata obſolete ſtriata rubella: margine aucto, rima hiante ſubtomentoſa. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. f. 9.*
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata.*

Fabula. 61. T. teſta ovata compreſſa inflexa anterius ſubroſtrata: valva altera lævi, altera oblique ſubſtriata: ſtriis reflexis. *Gronov. zooph. t. 18. f. 9.*
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, americano; *teſta alba, magnitudine ſeminis lupini albi.*

Adanſoni. 62. T. teſta albida: cardine violaceo.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 9. Poron.
Habitat frequens in antris ſcopulorum aqua marina repletis ad littus Africæ *occidentalis, diametri 2 linearum.*

cancellata. 63. T. teſta tenui ſordide alba: ſulcis nemoroſis tenuiſſimis longitudinalibus rugas tranſverſas decuſſantibus.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 10. Pirel.
Habitat in mari Atlantico, *teſta opaca, pollicem lata pauloque breviori.*

ſtrigoſa. 64. T. teſta albicante faſciata, glabra ad marginem rugoſa, cardinis dentibus in valva dextra duobus, in ſiniſtra tribus.
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 19. Vagal.
Habitat ad littus Africæ occidentale, *teſta duplo ſæpiſſime latiori, quam longa, faſciis juniorum flavicantibus, adultiorum ex griſeo violaceis.*

*** *ſuborbiculatæ.*

balauſtina. 65. T. teſta dilatato-orbiculata: valvula altera dentibus lateralibus.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta albida: radiis obſoletis rufis, magnitudine ſeminis lupini albi.*

Remies. 66. T. teſta ſuborbiculata compreſſa rugoſa. *Muſ. Lud. Ulr. 482. n. 29.**
Rumpf. muſ. t. 42. f. I. Remies.
Liſt. Conch. t. 266. f. 102.

Murr. fund. teſtac. t. 2. f. 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. f. 11.
Chemn. Conch. 6. t. 12. *f.* 112. 113.
Habitat in Oceano indico & americano, *teſta interdum 3 pollices longa & $3\frac{1}{2}$ lata alba, in americanis flavedine intermiſta, rugis minus evidentibus.*

reticulata. 67. T. teſta lentiformi compreſſa reticulata.
Habitat in India, *teſta alba, intus flavicante 2 pollices longa, & $1\frac{1}{4}$ pollices lata, ſtriis tranſverſis criſpis, & ſubtiliſſimis elevatis longitudinalibus exarata; ano cordato impreſſe, breviſſimo; cardinis dentibus primariis 2 ſubtilibus, laterali utrinque unico.*

ſcobinata. 68. T. teſta lenticulari ſcabra: ſquamis lunatis quincuncialibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 482. *n.* 30.*
Rumpf. muſ. t. 43 *f.* E.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* E.
Knorr Vergn. 6. *t.* 37. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 122-124.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta alba, maculis ferrugineis varia, $2\frac{1}{2}$ pollices longa, $2\frac{1}{4}$ lata: ani foſſula oblonga, labiis non canaliculatis.*

lactea. 69. T. teſta lentiformi gibba alba pellucida lævi.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* D.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 125.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſemine lupini albi paulo majore, obſolete tranſverſim ſtriata; cardine edentulo.*

carnaria. 70. T. teſta ſuborbiculata lævi utrinque incarnata oblique ſtriata: ſtriis hinc reflexis.
Liſt. Conch. t. 339. *f.* 176.
an. angl. t. 4. *f.* 25.
v. Born muſ. caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 14.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 126.
β) *Gualt. teſt. t.* 77. *f.* I.
Habitat copioſiſſima in Angliæ ſinubus, & inſularum Oceani americani littore, *ſeminis lupini albi magnitudine.*

bimaculata. 71. T. teſta triangulo ſubrotunda latiore lævi albida: intus maculis duabus ſanguineis ſubrotundis. *Fn. ſuec.* 2135.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 127.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 13. *f.* 132. a. b.

Habitat rarior in Oceano europæo & americano, *teſta vix extimi pollicis magnitudine, extus alba, rarius flavicante, præter ſtrias aliquot obſoletas lævi, flexura parum manifeſta.*

balthica. 72. T. teſta ſubrotunda lævi extrinſecus incarnata. *Fn. ſuec.* 2136.* *it. oel.* 43. *Müll. zool. dan. prodr.* 2970.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 128.
Habitat in mari balthico, *teſta fabam minorem vix unquam ſuperante, tenuiſſima, pellucida, fragili, intus alba, a triangulo rotundata.*

piſiformis. 73. T. teſta ſubgloboſa lævi intus incarnata oblique ſubſtriata: ſtriis anterius angulo acuto reflexis. *Fn. ſuec.* 2137.
Habitat ad Oceani europæi oſtia fluviorum, *teſta piſi magnitudine, alba, fundo purpureo, rarius tota alba; ſtriis oculo nudo vix conſpicuis, cardinis dente primario ſimplici, lateralibus prominulis.*

divaricata. 74. T. teſta ſubgloboſa alba bifariam oblique ſtriata.
Liſt. Conch. t. 301. *f.* 142.
Bonann. recr. 3. *f.* 349.
muſ. Kirch. 2. *f.* 104.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 28.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 129. 130.
Habitat in mari mediterraneo & americano, *teſta piſi magnitudine ad pollicis longitudinem ſubcompreſſa, rarius cæruleſcente aut cinerea, intus alba, ſtriis tenuiſſimis undulatis divergentibus exarata; margine crenato, flexura nulla, cardinis dente primario duplici, lateralibus nullis; an hujus generis?* Logie.

digitaria. 75. T. teſta ſubgloboſa pallida, cincta ſtriis obliquis uniformibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 12. *f.* 120. 121.
Habitat in mari mediterraneo, americano & *rariſſime* indico, *teſta piſi magnitudine, in indica majore, intus utplurimum glabra, nonnunquam ex rufo aurantia, maculis interdum undulatis rufis picta, ſtriis eleganter obliquis ad marginem exteriorem ſenſim, inſtar ſtriarum in apice digitorum, deſinentibus, unde apparet ſpiraliter ſtriata.*

cornea. 76. T. teſta globoſa glabra cornei coloris: ſulco tranſverſali.
Fn. ſuec. 2138.

Müll. verm. terr. & fluv. 2. *p.* 202. *n.* 387. *zool. dan.* *prodr.* 2965. Tellina (rivalis) teſta globoſa gibba glabra, umbone obtuſo.
Liſt. Conch. t. 159. *f.* 14.
anim. angl. t. 2. *f.* 31. *app.* 22. *t.* 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* B. C. C. C.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 9.
zoomorph. t. 8. *f.* 10.
Schroet. Fluſconch. t. 4. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 133. a. b.
Habitat vulgaris in Europæ amnibus & foſſis, *teſta pellucida nitida, oculis armatis, ſubtiliſſime transverſe ſtriata, intus alba ſubcæruleſcente, extus alba, pallida, ex cæruleo cinerea, cærulea albo miſta, arcubus transverſis nigris, uno evidentiori, piſi ſæpius magnitudine, non raro quadruplo majore, cardinis dentibus lateralibus elongatis obſoletis utrinque cum foſſulis excipientibus, mediis vix ullis.*

lacuſtris. 77. T. teſta rhumbea planiuſcula glabra, umbone acuto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2966. *verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 204. *n.* 388.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 135.
Habitat in Europæ lacubus & paludibus, *vivipara, teſta ad 6 lineas longa 4 lata, ſubfuſca, valvarum dorſo cinereo, margine albido, intus alba, juniore tota alba diaphana, tenuiore & fragiliore, quam corneæ, cardinis dentibus mediis nullis, lateralibus obſoletis 6.*

amnica. 78. T. teſta ſubcordiformi tranſverſim ſulcata, umbone obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2967. *verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 205. *n.* 389.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 134.
Habitat in Europæ amnibus & foſſis, *teſta cornea minus globoſa, 1-5 lineas diametro æquante, intus glabra ſubcærulea, exterius alba, fuſca, aut lutea, coſta interdum nigricante ſimplici aut duplici, junioribus tota candida pellucida, cardinis dentibus mediis in utraque valva 2, laterali utrinque* 1.

fluminalis. 79. T. teſta triangulari gibba tranſverſim ſtriata. *Müll. verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 205. *n.* 390.
Habitat in Aſiæ fluvio Euphrat, *teſta craſſa, dura, opaca, cardinem verſus antrorſum lutiori, exterius viridi, ſtriis imbricatis aperturæ parallelis, exarata, intus cyanea, cardi-*

cardinis dentibus mediis ſex, lateralibus utrinque elongatis & cum ſulcis excipientibus crenulatis.

fluminea. 80. T. teſta triangulari gibba tranſverſim coſtata. *Müll. verm. terr. & fluv. 2. p. 206. n. 391.*

Habitat in Sinæ arena fluviatili, *teſta 6-8 lineas longa & lata, opaca, antrorſum & retrorſum fere æquali, exterius viridi, intus ſemicirculo nigro notata, albida, cardine teſtam fluminalis referente.*

fluviatilis. 81. T. teſta triangulari tranſverſim rugoſa. *Müll. verm. terr. & fluv. 2. p. 206. n. 392.*

Habitat in fluvio, emporium Sinenſe Canton *præterlabente, cum fluminali & fluminea ad Venerem accedens, cardine his etiam ſimilis, at teſta latiore & tenuiore, 8 lineas longa, 9 lata, ex fuſco virente varioloſa diſtincta.*

iberica. 82. T. teſta globoſa lævi nitida, margine dentata.
Bonann. recr. 2. f. 33.
muſ. Kirch. 2. f. 32.

Habitat copioſa in littore Iberico, *teſta parva, pulla, interdum ex luteo fuſca, atro intermiſta.*

adriatica. 83. T. teſta ſubgloboſa extrinſecus alba intus margaritacea margine denticulata.
Bonann. recr. 2. f. 34.
muſ. Kirch. 2. f. 33.

Habitat in adriatici littoris *arena, teſta parva.*

ſinuoſa. 84. T. teſta ſubgloboſa æquivalvi æquilatera: ſtriis tranſverſis rarioribus.
Gualt. teſt. t. 77. f. D. E.

Habitat - - - - teſta mediæ magnitudinis albida, aut rubella.

purpurata. 86. T. teſta æquilatera lævi tota lucidiſſime purpurea.
Gualt. teſt. t. 77. f. L.

Habitat - - - - teſta pollicem longa, ſeſquipollicem lata.

Tellinarum *ſpecies multæ imperfectius juſto ab auctoribus deſcriptæ, difficillime definiendæ; multæ certe videntur meræ varietates; an hujus generis eſt concha* ab Argenvillio *zoomorph. t. 8. f. 9. delineata? an diſtincta ſpecies atra, quam* Ill. Pallas *in mari glaciali reperit?*

candida. 87. T. teſta ſuborbiculata ſubtiliter tranſverſim ſtriata candida.
Gualt. teſt. t. 77. f. O.
β) *Gualt. teſt. t. 77. f.* P.
Habitat - - - teſta β) *minore lævi.*

gallica. 88. T. teſta trigona pectinata.
Argenv. Conch. t. 27 f. 11.
Habitat frequens in Galliæ *fluvio* Marne, *mediæ magnitudinis, cardinis dente ſolitario.*

ſenegalenſis. 89. T. teſta trigono-globoſa, craſſa, dura, lævi, ſulcis ttanſverſis exarata.
Adanſ. Seneg. t. 17. *f.* 14. Toſar.
Habitat in Africa, *teſta alba, incarnata, aut lini florum colore tincta, interdum rubella albo radiata.*

anguloſa. 90. T. teſta ovali planiuſcula tranſverſim ſtriata antrorſum inflexo-angulata; cardinis dente primario bifido lateralibus remotis.
Chemn. Conch. 10. *p.* 349. *t.* 170. *f.* 1654. 1655.
Habitat ad inſulas Americæ *mediæ obverſas.*

polygona. 91. T. teſta alba tranſverſim ſtriata orbiculari antrorſum angulato: cardinis dentibus lateralibus nullis; primario exporrecto duplicato, alterius duobus. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 348. *t.* 170. *f.* 1651-1653.
Habitat in Oceano indico.

306. CARDIUM.

Animal Tethys.
Teſta bivalvis ſubæquilatera, æquivalvis (*plerumque*) convexa, longitudinaliter coſtata ſtriata aut ſulcata, margine dentata.
Cardo dentibus mediis binis alternatis: altero utplurimum incurvo; lateralibus remotis inſertis.

coſtatum. 1. C. teſta gibba æquivalvi: coſtis elevatis carinatis concavis membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 483. *n.* 31.*

Argenv. Conch. t. 26. *f.* A. Concha exotica.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 2. Kaman.
Columu. purp. 26. *t.* 27.
Major teſtac. t. 10.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 6.
Liſt. Conch. 1. *t.* 327. *f.* 164.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* D.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 151.
Habitat in Oceano africano, *teſta (integrâ rariſſima) ad 3 pollices longa, 3¾ lata, & ultra 3 pollices alta, alba: ſulcis latis fuſcis.*

Cardiſſa. 2. C. teſta cordata: valvis compreſſis dentato-carinatis, natibus approximatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 484. *n.* 32. *
Rumpf muſ. t. 42. *f.* E. Cardiſſa.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* I. Cor veneris.
zoomorph. t. 12. *f.* K.
Column. aq. 16.
Liſt. Conch. t. 318. *f.* 155. *t.* 319. *f.* 156.
Bonann. recr. 2. *f.* 49.
muſ. Kirch. 2. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* B. C. D.
Klein oſtrac. t. 10. *f.* 39.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 3. & 4. 6. *t.* 11. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 2. *f.* 15-18.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 143-146.
β) *Liſt. Conch. t.* 320. *f.* 157.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad 2½ pollices longa, & ultra 2 pollices lata, cordi humano ſimillima, coſtis obliquis, vulvaque cordata conſpicua, ſanguineis guttis interdum varia, nunc utrinque plana, nunc altero latere concava.*

roſeum. 3. C. teſta cordata anterius lineis, poſterius ſtriis paulo latioribus conjunctione cordis figuram æmulantibus exarata, hinc convexa, illinc concava.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* D.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 147.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *cardiſſæ affine, teſta ex albido & roſeo varia: vulva cordata.*

retuſum. 4. C. teſta cordata: valvis ſtriatis crenulatis ſubcarinatis, ano lunato cordiformi intruſo.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 1. 2.

Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 139-142.
Habitat in India, Arabia, Ægypto, *inter hemicardium & fragum medium, teſta interdum ultra* 2 *pollices longa, &* 2 *fere pollices lata, craſſa lactea, anterius convexa, poſterius anguſtata, plana, quaſi truncata: margine plicato-dentato.*

Hemicardium. 5. C. teſta ſubquadrilatera: valvulis carinatis, natibus diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 484. *n.* 33. *
Rumpf muſ. t. 44. *f.* H.
Petiv. aq. amb. t. 17. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 159-161.
Habitat rariſſimum in Oceano indico, *cardiſſæ affine, teſta extrinſecus ochroleuca, intus nivea, coſtarum paucioribus glabris, reliquis nudulоſis: ſulcis intermediis rugoſis excavato-punctatis.*

Lithocardium. 50. C. teſta cordata ſubtrilatera, valvis tranſverſe ſulcatis: anterius longitudinaliter ſtriata. *Mant.* 2. *p.* 544.
Habitat - - - hactenus modo foſſile inventum, hemicardio affine, valvis anterius carinatis: carinis crenulatis, natibus approximatis, vulva ovata, monte veneris planiuſculo longitudinaliter crenulato ſtriato cum carinula altiore.

lineatum. 51. C. teſta cordata carinata, anterius oblique truncata, tenui, glaberrima nivea, aureo ſtriata. margine denticulata. *Kaemm. lab. Rudolſt. p.* 210. *n.* 2. *t.* 12 *f.* 4.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

medium. 6. C. teſta ſubcordata ſubangulata: valvis angulatis ſulcatis lævibus *Muſ. Lud. Ulr.* 485. *n.* 34.

Cardiorum *cardines dentibus lateralibus remotis inſtruuntur, ſcorbiculo oppoſitæ valvæ inſertis, dum teſta clauditur, multæ ſpecies adhuc ignotæ, aut obſcuræ; an huc ſpectant conchæ à* Valentyn *Abh. t.* 16. *f.* 27. *ab* Argenville *conch. t.* 24. *f.* B. *t.* 29. *f.* 20. b. *& zoom. t.* 6. *f.* U. *depictæ? incola ocreæ figura, qui apertura duplici laterali tentaculis cincta conſpicuum pedem falciformem, inter ſe domumque movet, teſtæ valvas tertia ſui parte aperiendo protrudit, intertitio membrana flavo fuſcoque undulata clauſo.*

Antiquata *teſta nobis, quæ longitudinaliter ſulcata, ſed tranſverſis appoſitionibus annotinis intercepta, pectinata, quæ longitudinalis ſulcata, vel ſtriata at anterius ſtriis, vel ſulcis ad angulum acutum divergentibus, longitudinalis teſta a natibus ad marginem, tranſverſulis a natibus ad nates, ava margine prallelo*

Liſt. Conch. t. 316. f. 153.
Bonann. recr. 2. f. 94.
muſ. Kirch. 2. f. 91.
Gualt. teſtac. t. 83. f. B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 5. 6. *t.* 20. *f.* 5.
Spengler. ſelt. Conck. t. 1. *f.* k.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 162–164.
ε) Cardium donaciforme. *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *t.* 7. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 165.?
Habitat in Oceano americano, *teſta teſtæ hemicardii ſatis ſimili, at maculis ſpadiceis aut fuſcis varia, coſtis pluribus cum intermediis ſulcis lævibus; valvis altero latere, quaſi truncatis medio tamen prominentibus, cardinis dente primario unico.*

aculeatum. 7. C. teſta ſubcordata: ſulcis convexis linea exaratis: exterius aculeato ciliatis.
Muſ. Lud. Ulr. 485. *n.* 35. * Cardium muricatum.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* B. Cor bovis.
Liſt. Conch. t. 321. *f.* 158.
Bonann. recr. 2. *f.* 96. 97.
muſ. Kirch. 2. *f.* 95. 97. 98.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 1.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 9.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 155–157.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 5.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 8.
δ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 3. *f.* 5.
ε) *Bonann. recr.* 2. *Fn.* 93. *muſ. Kirch.* 2. *f.* 94.
Habitat in mari mediterraneo, *echinato proxime affine, teſta tamen longe majore, magis convexa, altero latere quaſi truncata, marginem verſus tamen elevata, ex fuſco flava: faſciis interdum obſcurioribus picta, cardinis dentibus in utraque valva* 2, *lateralibus in altera valva* 2, *in altera* 3.

echinatum. 8. C. teſta ſubcordata ſulcata: coſtis carnitatis aculeatis.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 46. *t.* 13. *f.* 1. 2. *t.* 14. *f.* 1-4. *rar.* 1. *p.* 28.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 1122. *n.* 79. *Fn. ſuec.* 2139.* *Muſ. Lud. Ulr.* 486. *n.* 36. * *Müll. zool dan. prodr.* 2971. *Brit. zool.* 4. *n.* 38.
Fabr. Fn. groenl. p. 409. *n.* 410. Cardium teſta ſubcordata: ſulcis exaratis linea ciliari, aculeis inflexis plurimis.

Rondel. teſt. 22. *Worm. muſ. p.* 253. *Aldrov. teſt. l.* 3. *c.* 45. Concha echinata.
Geſn. muſch. p. 43. Concha echinata prima.
Liſt. Conch. t. 324. *f.* 161.
an. angl. t. 5. *f.* 33.
Bonann. recr. 2. *f.* 90.
muſ. Kirch. 2. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* B.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 40.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 3.
Coſta brit. Conch. p. 167. *t.* 14. *f.* 2.
Murr. teſtac. t. 2. *f.* 19.
Lesk. Naturg. 1. *t.* 10. *f.* 8.
Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 158.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 13.
γ) *Bonann. recr.* 2. *f.* 72.
muſ. Kirch. 2. *f.* 71.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta ſpadicea: faſciis* 5 *albis, intus alba, ſulcis profundis* 20, *verſus cardinem rugoſis, coſtarum aculeis à medio verſus marginem increſcentibus verſus cardinem nullis.*

ciliare. 9. C. teſta ſubcordata: ſulcis elevatis triquetris; extimis aculeato-ciliatis.
Liſt. Conch. t. 325. *f.* 162.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 171. 172.
Habitat ad littus Africæ occidentale, *coſtato affine, teſta teſtis echinati & aculeati minore, tenuiore, fragiliore & magis pellucida, nivea, ſulcis tranſverſis rugoſis, coſtis trigonis aculeatis.*

ciliatum. 10. C. teſta ſubcordata: ſulcis elevatis ſubtriquetris ciliatis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 410. *n.* 411.
Habitat ſat copioſum in fundo maris ſeptentrionalis *arenoſo vel argilloſo, echinato affine, teſta craſſa obliquata, convexa,* 19 *lineas lata,* 18 *longa, ſub epidermide cinerea vel griſea albida, intus alba glabra, ſulcis* 32-38, *undulatim ſtriatis, coſtis ad carinas ciliatis, mediis convexiuſculis lateralibus triquetris.*

tuberculatum. 11. C. teſta ſubcordata: ſulcis obtuſis nodoſis tranſverſim ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 486. *n.* 37. *.

Liſt. Conch. t. 329. *f.* 166.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 100.
Rumpf. muſ. t. 48. *f.* 11.
Gualt. teſt. 71. *f.* M.
Argenv. zoom. t. 6. *f.* C. D.
Bytem. app. t. 11. *f.* 39. a?
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 7.
Knorr Vergn. 5. *t.* 30. *f.* 2. & 6. *t.* 8. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 23. 24.
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 173.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 2.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 6.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 86. *f.* 14.
ε) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 29. *f.* 4.
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 4. *f.* 5.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta varie picta, utplurimum fuſca faſciis obſcurioribus, aut alba: faſciis fuſcis, valde convexa tranſverſe rugoſa: coſtis* 20–23 *convexis interdum planiuſculis, hinc inde nodoſis, altero latere majoribus.*

Iſocardia. 12. C. teſta cordata: ſulcis ſquamis fornicatis imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 487. *n.* 38.*
Liſt. Conch. t. 323. *f.* 160.
Bonann. recr. 2. *f.* 95.
muſ. Kirch. 2. *f.* 93.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 9.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* M.
Olear. gott. t. 29. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 56.
v. Born. muſ. Cæſ. Vindob. teſt. p. 39. *vign.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 17. *f.* 174–176.

Habitat in mari americano, *teſta* 2½ *pollices longa,* 2¼ *lata, ex cinereo alba, hinc inde rubro maculata aut nebuloſa, intus alba, medio purpurea, cardinis dente primario in altera valva unico.*

Fragum. 13. C. teſta ſubcordata ſubangulata: ſulcis notatis lunulis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 488. *n.* 39.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* G. Fragum album.
Liſt. Conch. t. 315. *f.* 152.
Bonann. recr. 3. *f.* 374.
muſ. Kirch. 2. *f.* 110.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 21.

Gualt. teſt. t. 83. f. E.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3 f. 3. 4.
Schroet. Journ. Naturg. 3. t. 2. f. 6.
Chemn. Conch. 6. t. 16. f. 166. 167.
β) *Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 5.*
γ) *Gualt teſt. t. 71. f. N.*
Habitat in India, *medio affine, at teſta magis trigona, alba, ſquamis ſulphureis, intus nivea, coſtis planiuſculis, an mera unedinis varietas?*

unedo 14. C. teſta ſubcordata: ſulcis lunatis coloratis *Muſ. Lud. Ulr. 488. n. 40.*
Argenv. Conch. t. 23. f. N. Fragum.
Liſt. Conch. t. 315. 151.
Bonann. recr. 3. f. 375.
muſ. Kirch. 2. f. 109.
Rumpf muſ. t. 44. f. F.
Petiv. amb. aq. t. 17. f. 4.
Valent. abb. t. 16. f. 23.
Gualt. teſt. t. 83. f. A.
Seb. muſ. 3. t. 86. f. 12.
Knorr Vergn. 2. t. 29. f. 2.
Regenſ. Conch. 1. t. 3. f. 25.
Chemn. Conch. 6. t. 16. f. 168. 169.
β) *Knorr Vergn. 2. t. 29. f. 3?*
Habitat rarior in India *frago valde affine, at teſta duplo majore, ſulcorum ſquamis rubris rarioribus, vulvæque labio altero alteri incumbente diſtinctum.*

muricatum. 15. C. teſta ſubcordata ſulcata lateribus muricata. *Muſ. Lud. Ulr. 489. n. 41.**
Liſt. Conch. t. 322. f. 159. & t. 326. f. 163.
Knorr Vergn. 4. t. 14. f. 5.
Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 177. 178.
Habitat in Oceano americano, *præſertim ad ſinum* Campechienſem, *teſta margine ſerrata, cinerea, alba aut flavicante ſpadiceo mixta aut maculata, cardine intus virgis 2 rubris.*

magnum. 16. C. teſta oblonga: ſulcis angulatis latere ſerratis. *Muſ. Lud. Ulr. 489. n. 42.**
Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 191.
β) *Liſt. Conch. t. 331. f. 168.*
Bonann. recr. 2. f. 92.
muſ. Kirch. 2. f. 90.

v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. f. 6. 7.
Chemn. Conch. t. 17. f. 176.
γ) *Gualt. teſt. t. 71. f.* H.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 3. f. 10.
Chemn. Conch. 6. t. 17. f. 180.
δ) Basket Cockle. *Martyn univ. conchol.* 2. *t.* 80.
Habitat in India, β) *in* Jamaica *& inſulis* Antillis, *teſta margine ſerrata, ſulcis* 19, 27, 30 *tranſverſe rugoſis aſpera, flaveſcente, intus alba, β) ochroleuca maculis ſpadiceis varia, γ) cinerea maculis nigricantibus conſperſa.*

flavum. 17. C. teſta ſubovata ſulcata: latere anteriore ſcabro, poſteriore dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 490. *n.* 43.
Bonann. recr. 2. f. 72.
muſ. Kirch. 2. f. 79.
Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 7. f 11. a. b.
β) *Knorr Vergn. 6. t. 3. f.* 5.
γ) *Gualt. teſt. t. 71. f.* G.
δ) *Bonann. recr. 2. f.* 89.
muſ. Kirch. 2. f. 87.
ε) *Rumpf muſ. t. 44. f.* E.
Petiv. amb. aq. t. 8. f. 3.
Habitat in India, *teſta dorſo & poſterius ut plurimum flava, interdum maculata, ceterum, intus quoque, alba; coſtis circiter* 27 *convexis, quarum* 5-6 *anterius ſpinis acutis,* 12-13 *poſterius tuberculis planis ſcabræ, reliquæ læves.*

lævigatum. 18. C. teſta obovata: ſtriis obſoletis longitudinalibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 490. *n.* 44.*
Liſt. Conch. t. 249. f. 83.
Gualt. teſt. t. 82. f. A.
Knorr Vergn. 2. t. 20. f. 4. 5. t. 10. f. 7. & 6. t. 6. f. 1.
Chemn. Conch. 6. t. 18. f. 189.
β) *Kaemmer Conch. Rudolſt. p.* 210. *t.* 12. *f.* 4?
γ?) Eggeockle. *Mart. univ. conch.* 2. *t.* 79.
Habitat in mari atlantico, *&* americano, *flavo affine, teſta glabra, margine intus ſerrata, ultra* 2 *pollices longa,* $1\frac{3}{4}$ *lata, ſulphurea, aurantia, rubra, variegata, alba, alba flavo, aut rubro miſta, aut faſciis tranſverſis flavis picta; β) nivea anterius rubella, intus a cardine deorſum maculis duabus purpureis oblongis, exterius lineis aureis picta, tenui utrinque glabra.*

ſerratum. 19. C. teſta obovata lævi: ſtriis obſoletis, margine interiore ſerrato. *Muſ. Lud. Ulr.* 491. *n.* 45.*

Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 185. 186.

Habitat in mari mediterraneo & indico, *lævigato minor, teſta flava minus convexa, & obſoletius ſtriata, margine exteriore crenulato, natibus regularibus.*

edule. 20. C. teſta antiquata: ſulcis viginti ſex obſolete recurvato imbricatis. *Fn. ſucc.* 2141. *It. oel.* 42. *Müll. zool. dan. prodr.* 2972.

Baſt. op. ſubſ. 2. *p.* 72. *t.* 8. *f.* 3. 4.

Liſt. Conch. t. 333. *f.* 170. & *t.* 334. *f.* 171.

an. angl. t. 5. *f.* 34.

Gualt. teſt. t. 71. *f.* F.

Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 2. 4.

Chemn. Conch. 6. *p.* 141. *Vign.* 4. *f.* C. & *t.* 19. *f.* 194.

Habitat frequentiſſimum in Oceano europæo, mari balthico, caſpio, mediterraneo, *teſta non admodum convexa ſordide alba, rarius cærulea, aut flava, ſulcis ad ſ… tranſverſe ſtriatis rugoſiſque; incola eſculentus.*

iſlandicum. 21. C. teſta ſulcata: coſtis ad triginta ſex triquetris lævibus.

Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 195.

Habitat in Iſlandia & Grœnlandia, *eduli perquam affinis, at ſulcis teſtæ pluribus & profundioribus, ſtriis tranſverſis, præter marginem exteriorem, nullis diſtinctum, teſta ſordida nigricante, nonnunquam faſciata.*

groenlandicum. 22. C. teſta antiqua glabra tenui murina: lineis angulatis ferrugineis picta, margine glabra: ſtriis longitudinalibus obſoletis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 198.

Habitat in Groenlandia & Iſlandia, *teſta ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa & ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices lata, faſciis interdum fuſceſcentibus picta; an mera edulis varietas?*

ruſticum. 23. C. teſta antiquata: ſulcis viginti remotis; interſtitiis rugoſis.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 77. 78.

Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 197.

Habitat in maribus europæis, *præcipue* mediterraneo, *etiam* caſpio, *eduli affine, at teſta anterius valvulis clauſis carinata, ano evidente, ſed anguſto, ſulcis profundioribus, coſtis paucioribus magis convexis diſtinctum, teſta nunc ferruginea faſciis lividis, nunc alba, anterius fuſca intus cæruleſcente, nunc albis faſciis ferrugineis flavicantibus aut cæruleſcentibus.*

glaucum. 52. C. teſta ſubantiquata anterius glauca : ſulcis viginti poſterius retrorſum imbricatis, natibus violaceis. *Poiret voyag. en barbar.* 2. *p.* 13.
Habitat ad Barbariæ littora, *ad* 10 *lineas altum*, 11$\frac{1}{3}$ *latum*, & 8 *profundum.*

pectinatum. 24. C. teſta ſubcordata pectinata. *Muſ. Lud. Ulr.* 492. *n.* 47.*
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 18.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtæ albæ ſtriis diſtantibus ſurſum ſcabris, cavitate ſub umbone flava, ano ovato impreſſo : marginibus prominulis.*

virgineum. 25. C. teſta triangulo rotundata æquilatera : rugis tranſverſis membranaceo recurvatis, cardinibus cæruleis.
β) *Chemn Conch.* 6. *t.* 18. *f.* 181.
Gronov. zooph. t. 18. *f.* 5.
Habitat in mari mediterraneo, *β) in* indico & americano, *cardinis dentibus lateralibus ad mactras accedens, teſta pulchella, faſciata, epidermide glauca obtecta, intus, alba, β) teſta tenui fragili longitudinaliter ſtriata, anterius & ad vulvam purpurea, ad umbonem rubra.*

trilaterum. 26. C. teſta triangulari gibba ſtriata.
Habitat in mari caſpio, *an diſtincta ſpecies*?

Auricula. 27. C. teſta cordata ſubrhombea : coſtis utrinque viginti quatuor; ſulcis ſubtiliſſime crenulatis, natibus diſtantibus.
Forsk. Fn. arab. p. 12[illegible]. *n.* 52.
Regenf. Connh. 2. (*ined*) *t.* 9.
Habitat in Arabia & Ægypto, *teſta, alba pellucida* 2$\frac{1}{4}$ *pollicem longa*, 1$\frac{3}{4}$ *lata, dorſi margine revoluto dentato.*

triſte. 28. C. teſta ovata lævi; rima anoque ſtriatis. *Syſt. nat.* X. I. *p.* 680. *n.* 74. *Muſ. Lud. Ulr. p.* 491. *n.* 46.
Habitat - - - - *teſta lævi exolete cinerea, albo radiata, natibus reflexis.*

monſtroſum. 29. C. teſta gibba altero latere impreſſa ochroleuca, altero convexa cordata albida flavo maculata, valvis dentato carinatis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 14. *f.* 149. 150.
Habitat rariſſimum ad inſulas Nicobaricas.

Lima. 30. C. teſtæ gibbæ coſtis acculeatis : anterioribus tuberculis membranaceis recurvatis ad latera crenatis, ſulcis intermediis granulatis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 15. *f.* 153. 154.

β) *Chemn. Conch.* 6. *p.* 161.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 13. a. b. Cardium coronatum.

Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ochroleuca: margine anteriore incarnato, umbone rubello; in β) coſtis magis rotundatis, non aculeatis, ſed granulatis.*

ringens. 31. C. teſta rotunda ventricoſa alba: marginis dentibus profundis: anterioris roſeis.

Liſt. Conch. t. 330. *f.* 167.

Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 1.

Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 3. & 6. *t.* 3. *f.* 4.

Chemn. Conch. 6. *t.* 16. *f.* 170.

Habitat ad Africæ *littus, & in* mari americano.

papyraceum. 32. C. teſta pellucida cinerea: ſtriis longitudinalibus tenuibus.

Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 184.

Habitat in India, *teſta fragillima, intus alba & purpuraſcenti maculata.*

æolicum. 33. C. teſta craſſa: ſtriis anterioribus longitudinalibus, poſterioribus tranſverſis.

Liſt. Conch. t. 314. *f.* 150.

Bonann. recr. 2. *f.* 91.

muſ. Kirch. 2. *f.* 89.

Argenv. Conch. t. 21. *f.* A.

Knorr Vergn. 5. *t.* 26. *f.* 1. 2. *t.* 27. *f.* 3.

Chemn. Conch. 6. *t.* 18. *f.* 187. 188.

Habitat ad Guineæ & *inſularum* Antillarum *littora, teſta valde convexa, ex albo & rubello varia.*

oblongum. 34. C. teſta flavicante oblonga turgida coſtata anterius glabra cordata margine crenata.

Chemn. Conch. 6. *t.* 19. *f.* 190.

v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. *f.* 8.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta ad* 3 *pollices longa & 2½ fere lata; coſtis* 30.

craſſum. 35. C. teſta ſubfuſca oblongiuſcula craſſa antiquata: marginis dentibus profundioribus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 7. *f.* 12.

β) *Liſt. Conch. t.* 332. *f.* 169.

Habitat in mari mediterraneo & ſeptentrionali, *oblongo affine, at teſta multo majore, minus anguſta, craſſiori, coſtis planioribus circiter* 23 *diſtinctum.*

latum. 36. C. teſta lata inæquilatera intus alba: coſtis magnis planis ſpinuloſis.
Chemn. Conch. 6. t. 19. f. 192. 193.
Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 3. f. 9.
Habitat rarius Tranquebariæ *& ad inſulas* Nicobaricas, *teſta 2 pollices longa, $2\frac{1}{2}$ lata, nunc vertice alba, medio flavicante, margine flava, nunc vertice fuſco-varia, ceterum flavicante: faſciis nonnullis fuſcis.*

exiguum. 37. C. teſta oblongiuſcula inæqualiter coſtata ſubfuſca.
Liſt. Conch. t. 317. f. 154.
Habitat - - - minutum, an diſtincta ſpecies?

maculatum. 38. C. teſta maculata confertim undulato-rugoſa: coſtis latis ſulcis anguſtiſſimis intus dilute rubella.
Liſt. Conch. t. 328. f. 165.
Habitat in ſinu Campechienſi, *teſta 3 fere pollices longa, $3\frac{3}{4}$ lata.*

flexuoſum. 39. C. teſta rotundata fuſca: coſtis flexuoſis, ſulcis rugoſis.
Liſt. Conch. t. 343. f. 180.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ pollices longa, & fere æque lata.

fluviatile. 40. C. teſta planiuſcula craſſa alba: coſta planioribus.
Liſt. an. angl. p. 187. t. 5. f. 32.
Habitat rariſſimum ad oſtium fluvii Angliæ Tees.

gaditanum. 41. C. teſta rotundata flavicante albo, rubro viridi fuſcoque varia decuſſatim ſtriata.
Bonann. recr. 2. f. 63.
muſ. Kirch. 2. f. 62.
Habitat in mari Gaditano, *utrum hujus generis, an arcæ?*

braſilienſe. 42. C. teſta rotundata: coſtis latis planis minutiſſime crenatis.
Bonann. recr. 3. f. 395.
muſ. Kirch. 2. f. 117.
Habitat frequens ad Braſiliæ *littora.*

amboinenſe. 43. C. teſta oblongiuſcula alba nigricante-maculata: coſtis valde convexis.
Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 129.
Habitat ad Amboinæ *littora, teſta $1\frac{3}{4}$ pollices longa: coſtis circiter 12.*

ſquamo- 44. C. teſta cordata æquilatera ex albo fulvida intus purpu-
ſum. raſcente, coſtis imbricatim ſquamoſis.
Gualt. teſt. t. 71. f. N.
Habitat - - - frago affine, at dentibus ad margine teſtæ anteriorem nullis.

cancella- 45. C. teſta ſubrubra tenui rotundata decuſſatim ſtriata.
tum. *Gualt. teſt. t. 75. f. B.*
Habitat - - - exiguum.

rubigino- 46. C. teſta rubella inæquilatera: coſtis convexis tranſ-
ſum. verſim ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 83. f. D.
Habitat - - -

albidum. 47. C. teſta inæquilatera coſtata ſubalbida intus purpu-
Gualt. teſt. t. 83. f. H.
Habitat - - - puſillum.

vireſcens. 48. C. teſta inæquilatera oblonga: coſtis ſubtilibus; ſup-
duplicatis.
Gualt. teſt. t. 84. f. A.
Habitat - - - teſta fragili pellucida, ex albido viri- cente, maculis roſeis interdum varia, intus argent-

faſciatum. 49. C. teſta rotundata albida: faſcia fuſca, coſtis acuti-
Knorr Vergn. 6. t. 8. f. 3.
Habitat - - - cardine exterius fuſco & cinereo.

307. MACTRA. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis, inæquilater- æquivalvis.

Cardo dente medio complica- cum adjecta foveola, latera- libus remotis inſertis.

Spengle- 1. M. teſta lævi: vulva plana, rima lunula hiante.
ri. *Chemn. Conch. 6. t. 20. f. 199-201.*
Spengl. catal. t. 3. f. 1-3.
Schroet. Litter. 1. f. 4-6.
Habitat ad Caput Bonæ Spei, *teſta manus fere magnitudini- ſubhiante, pallida, ſubdiaphana, ſubtriangulari, 2½ pol-*

lices longa, 3½ lata, latere anteriori ſubcarinata a limbis diſtincta, poſteriori planiuſcula ſtriata, vulva ad nates incurvas lunata, acuta, tota hiante in foſſulam cardinis, cujus dentes laterales trianguli. L. Spengler.

plicataria. 2. M. teſta tranſverſe rugoſa plicata diaphana, vulva planiuſcula, ano compreſſo oblongo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 20. *f.* 202-204.
Habitat in Oceano indico, *teſta ovi latitudine*, 1-1¼ *pollices longa*, 1½-2½ *pollices lata, alba, papyri inſtar tenui, vulva anoque lævibus lanceolatis, illa planiuſcula, carina ab umbonibus diſtincta, hoc magis impreſſo, magis ovato, natibus incurvis recurvatis, cardinis dentibus lateralibus ex membranis* 2 *parallelis.*

papyracea. 3. M. teſta pellucidiſſima alba convexa anterius ſubhiante ſubtiliter ſtriata & coſtata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 231.
Habitat rariſſima ad inſulas Nicobaricas, *plicatariæ affinis, at teſta magis convexa & inæquilatera, ad tellinas accedens, ſed cardine mactræ.*

ſtriatula. 4. M. teſta lævi diaphana: umbonibus ſubſtriatis, vulva lævi impreſſa carina circumſcripta.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 21. *f.* 205. 206.
Habitat in mari mediterraneo, *& ad* littus Coromandel, *teſta alba, ad* 2½ *pollices longa, &* 3 *lata, ſubtrigona, ſatis convexa, anterius ſubhiante: valva lanceolata, umbonibus ſtriatis.*

ſtriata. 5. M. teſta craſſa triangulari ſtriis validis lævibus confertis arcuatis exarata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 222.
Habitat - - - - teſta alba, intus & ad umbones glabra.

rotundata. 6. M. teſta obtuſe trigona albida, umbone lacteo-faſciato, natibus vulva & margine interiore atque anteriore ſubviolaceis.
Liſt. Conch. t. 263. *f.* 99.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 8. *f.* 1.
β) *Liſt. Conch. t.* 264 *f.* 100?
Habitat - - - glabratæ affinis, at teſta 1¼ *pollicis lon-*

*ga & 1¾ pollicis lata, anterius anguſtiori ſtriis ſubti-
lioribus exarata: margine tamen glaberrimo.*

glabrata. 7. M. teſta lævi diaphana ſtriata, umbonibus læviſſimis
vulva anoque ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* A.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 216. 217.
Habitat in Oceano africano & indico, *teſta alba,
1½ pollicem longa, & 2 pollices lata, natibus læviſſi-
mis; limbo ſtriato, vulva nulla carina diſtincta.*

nitida 8. M. teſta nivea nitente craſſa diaphana lævi, vulva carina
diſtincta anoque convexiuſculis ſtriatis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 8. *f.* 2. 3. *p.* 88.
*Habitat - - - glabratæ affinis, at teſtæ natibus retro-
verſis magis diſtantibus, rimaque triangulari diſtincta,
teſta triangulari.*

corallina. 9. M. teſta lævi ſubdiaphana alba: faſciis lacteis.
Bonann. recr. 2. *f.* 53.
muſ. Kirch. 2. *f.* 52.
Rondel. teſt. 1. *p.* 32. *t.* 33.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 80.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* B.
Planc. Conch. t. 3. *f.* 4?
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 218. 219.
Habitat in mari mediterraneo, & *ad* Guineæ *littora,
teſta 2 pollices lata, 1½ longa, triangulari, ano vulva-
que obtuſis, natibus non antiquis, rima triangulari.*

lactea. 10. M. teſta tenui turgida pellucida alba anterius ſubtiliſ-
ſime ſtriata: faſciis lacteis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 22. *f.* 220.
Habitat rarior in Oceano indico, *corrallinæ affinis ſ
æqualis, at teſta tenuiore, magis convexa, anterius
planiuſcula: margine obtuſo.*

ſtultorum. 11. M. teſta ſubdiaphana lævi obſolete radiata intus purpu-
raſcente, vulva gibba.
Syſt. nat. X. *p.* 681. *n.* 8. Cardium ſtultorum.
Adanſ. ſencg. t. 17. *f.* 16. Liſor.
Liſt. Conch. t. 251. *f.* 85.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 1.
Murr. fund. teſtac. t. 2. *f.* 10. *v. Born*

v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 50. *vign.*
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 224-227.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico & americano, *teſta valde convexa, ceterum ſatis trigona, fuſca, teſtacea, cinerea, (ut plurimum obſolete) radiata.*

grandis. 12. M. teſta ſubdiaphana lævi cervina pallide radiata: umbone & cardine extra medium poſitis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 228.
Habitat rariſſima - - - m. ſtultorum affinis, at teſta majore $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $3\frac{1}{4}$ *lata, angulo extremo ſubhiante, latere anteriore productiori.*

ſolida. 13. M. teſta opaca læviuſcula ſubantiquata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2973.
Fn. ſuec. 2140. Cardium ſolidum.
Liſt. Conch. t. 253. *f.* 87. 88.
an. angl. t. 4. *f.* 24.
Bonann. recr. 2. *f.* 51. 52.
muſ. Kirch. 2. *f.* 50. 51.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 42.
Rondel. teſt. 1. *c.* 7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 23. *f.* 229. 230.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 170. *f.* 1656.
Habitat frequentiſſima in Oceano europæo, *teſta craſſa, alba, flaveſcente, cinerea aut fuſca, ſubantiquata, non raro cingulis lacteis aut faſciis cæruleis aliiſve picta, cardinis dentibus lateralibus minus, quam in congeneribus, elongatis, faveola majore, & dente intermedio minore.*

lutraria. 14. M. teſta ovali oblonga lævi, dentibus lateralibus nullis.
Mya lutraria. *Fn. ſuec.* 2128. *Muſ. Lud. Ulr.* 470. *n.* 9.
Liſt. Conch. t. 415. *f.* 259.
an. angl. p. 170. *t.* 4. *f.* 19.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 19.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* A. 2?
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 240. 241.
Habitat ad oſtia fluviorum Oceani europæi, *teſta utrinque hiante,* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $4\frac{1}{4}$ *lata, robuſta, ſordide alba, antiquata, natibus convergentibus*

Cygnus. 15. M. teſta nivea craſſa trilatera ſubtiliter tranſverſim ſtriata, anterius planiuſcula ſubtiliter rugoſa, ano lato impreſſo cordato tenuiter ſtriato.
Chemn. Conch. 6. t. 21. f. 207.
Habitat rariſſima ad Tranquebariæ *littora, teſta pollicem longa, & ultra pollicem lata.*

maculata. 16. M. teſta obtuſe trigona lævi tenui pellucide ſpadiceo maculata, intus alba tenuiſſime ſtriata, ano cordato impreſſo.
Chemn. Conch. 6. t. 21. f. 208.
Habitat rariſſima in Oceano indico, *teſta circiter* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, &* $1\frac{1}{4}$ *lata.*

turgida. 17. M. teſta inflata obſolete ſtriata ochroleuca intus alba; natibus diſtantibus purpuraſcentibus, cardinis dente ſupernumerario triangulari duplici.
Chemn. Conch. 6. t. 21. 210. 211.
Habitat ad Tranquebariæ *littus, teſta ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata tenui, ſubpellucida, anterius & poſterius ſubtiliter ſtriata & rugoſa.*

violacea. 18. M. teſta tenui obſolete radiata ſubtiliter tranſverſim ſtriata, vulva anoque albidis, cardinis dente ſupernumerario duplici triangulari.
Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 213. 214.
Knorr Vergn. 6. t. 5. f. 2?
Habitat ad Tranquebariæ *littus, teſta 2 fere pollices longa, 3 lata, tenera, fragili, hinc inde hiante, vulvæ oblongæ margine elevato rugoſo.*

cuneata. 19. M. teſta cuneata cærulea ſubtiliter tranſverſim ſtriata, margine intus crenulato.
Chemn. Conch. 6. t. 22. f. 215.
Habitat - - - violaceæ proxime affinis, at teſta minore pollicem lata, vix pollicem longa, rarius nivea.

glauca. 20. M. teſta ovata ſordide alba glauco radiata ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata anterius rugoſa.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 3. f. 11. 12.
Chemn. Conch. 6. t. 23. f. 232. 233.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa,* $3\frac{1}{2}$ *lata: natibus retrorſum verſis; rima intermedia anguſta.*

pellucida. 21. M. teſta ovata tenui pellucida alba inæqualiter tranſverſim ſtriata.

Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 234.
Habitat ad Guineæ *littus, teſta fragili,* 1¼ *pollicem longa,* 2 *lata, antrorſum productiore & pauliſper hiante.*

fragilis. 22. M. teſta ovata tenui lævi pellucida planiuſcula, vulva tranſverſim ſtriata rugoſaque.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 235.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *pellucidæ affinis, teſta anterius hiante ſubplicata: margine acuto antrorſum ſubangulato poſterius rotundato.*

rugoſa. 23. M. teſta ovata ſordide alba, ſtriis elevatis longitudinalibus tranſverſas magis elevatas decuſſantibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 236.
Habitat in Oceano europæo, *teſta* 2¼ *pollicis longa,* 2¼ *lata, craſſa, intus magis alba.*

nicobarica. 24. M. teſta ovata tenui pellucida anterius lævi, poſterius cancellatim ſtriata.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 237.
Habitat ad inſulas Nicobaricas.

complanata. 25. M. teſta ovata tenui arcuatim plicata: plicis tranſverſim ſtriatis, dentibus lateralibus nullis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 24. *f.* 238.
Habitat in Oceano indico; *teſta alba aut cæruleſcente pollicem longa,* 2¼ *lata.*

Liſteri. 26. M. teſta tenerrima ſubrotunda albida: foveola dentis cardinis triangularis ampla pyriformi.
Liſt. an. angl. t. 4. *f.* 23.
Habitat ad oſtium fluvii Angliæ Tees, *teſta* 1½ *pollicem longa,* 2 *lata.*

piperata. 27. M. teſta ovata compreſſa tranſverſe ſtriata: dentibus minimis; foveola magna obliquata. *Poiret voyage en Barbar.* 2. *p.* 15.
Bellon. aq. p. 404. Piperata chama latinis.
Aldrov. exang. p. 421. Chama piperata Bellonii.
Planc. Conch. p. 32. Tellina vilior.
Adanſ. Conch. p. 232. *t.* 17. *f.* 18. Calcinella.
Chemn. Conch. 6. *t.* 3. *f.* 21. Mya hiſpanica.
Petiv. gazoph. t. 9. *f.* 3.
Habitat in mari mediterraneo, 21 *circiter lineas lata,* 17 *alta,* 7 *profunda.*

308. DONAX. *Animal* Tethys.
Teſta bivalvis: margine (ſæpe) crenulato; antico obtuſiſſimo.
Cardo dentibus duobus; marginalique ſolitario (rarius duplici, triplci, aut nullo) ſubremoto ſub ano.

Scortum. 1. D. teſta triangulo - cordata, vulva plana. *Muſ. Lud. Ulr.* 493. *n.* 48.*
Liſt. Conch. t. 377. *f.* 220.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 7 ?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 4. *f.* 1. 2..
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 242 - 247.
Habitat in Oceano indico, *teſta cinerea hinc inde violaceo miſta, intus præter umbonem violaceum nivea, cardinis dente marginali altero ſub valva poſito, in alterutra valva duplici: foveola intermedia.*

pubeſcens. 2. D. teſta anterius ſpinis ciliata.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* F ?
Chemn. Conch. t. 25. *f.* 248.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſtæ colore interno cardiniſque ſtructura ſcorto ſimilis, at teſta extrinſecus cinerea aut cinereo albida argute decuſſatim ſtriata, anterius plana: laterum angulo carinata, valva hiante ovata: nymphis nudis ano ovato - oblonga.*

rugoſa. 3. D. teſta anterius rugoſa gibba: marginibus crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 50.*
Adanſon Seneg. t. 18. *f.* 1. Paman.
Liſt. Conch. t. 375. *f.* 216.
Bonann. rècr. 2. *f.* 37. 38.
muſ. Kirch. 2. *f.* 36. 37.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* L.
Klein oſtrac. t. 11. *f.* 61.
Seba muſ. 3. *t.* 86. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 25. *f.* 250-252. & *p.* 242. *Vign.*
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 9.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *varietas rariſſima major in* indico, *teſta utplurimum* ¾ *pollicis longa*, 1¼ *lata*, *vario colore conſpicua*, *frequenter faſciata*, *intus violacea & alba*, *dente marginali nullo.*

Trunculus. 4. D. teſta anterius lævi intus violacea: marginibus crenatis. *Fn. ſuec* 2142. *Muſ. Lud. Ulr.* 494. *n.* 51. *Müll. zool. dan. prodr.* 2974.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 2. Gafet.
Liſt. Conch. t. 376. *f.* 217.
an. angl. t. 5. *f.* 35.
Bonann. recr. 2. *f.* 47.
muſ. Kirch. 2. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* O.
Bytem. app. t. 11. *f.* 39. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 7.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 253. 254.
Habitat frequens in maribus europæis, *etiam* atlantico & europæo, *teſtæ colore externo vario*, *ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis.*

ſtriata. 5. D. teſta anterius obtuſiſſima: undique ſtriata: margine denticulato, vulva ovata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 8.
Habitat in europæ auſtralis Oceano, *teſta alba*, & *tota*, *exceptis natibus*, *gibba*, *magis*, *quam in congeneribus.*

denticulata. 6. D. teſta anterius obtuſiſſima: labiis tranſverſe rugoſis margine denticulato, nymphis dentiformibus.
Adanſ. Seneg. t. 18. *f.* 3. Naſar.
Liſt Conch. t. 376. *f.* 218. 219.
Gualt. teſt. t. 89. *f.* D.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 26. *f.* 256. 257.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta cuneiformi*, *lævi*, *longitudinaliter punctato-ſtriata*, *alba albida*, *aut cærulescente*, (λ. *ſtraminea*, *vulvæ centro cæruleo*, *intus violacea*) *radiis faſciiſve cæruleſcentibus interdum picta*, *intus albicante*, *vulva ſubrotunda minima*, *dente cardinis marginali. altero ſub vulva.*

cuneata. 7. D. teſta cuneiformi: marginibus integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 495. *n. p.* 52.

Liſt. Conch. t. 392. f. 231?
Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 52. vign.
Chemn Conch. 6. t. 26. f. 260.
β) *Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 7.*
γ) *Chemn. Conch. 6. t. 26 f. 267?*
Habitat in Tranquebariæ *littore, teſta alba interdum cæruleo radiata (β flava aut rufa margine violacea) complanata, pollicem longa, & $1\frac{1}{4}$ lata, anterius tranſverſim rugoſa: lineis perpendicularibus rugas decuſſantibus, ceterum ſubtiliter decuſſatim ſtriata, intus violacea & alba.*

Faba. 8. D. teſta gibba ſubtiliter tranſverſim ſtriata, flavicante maculata: umbonis apice & faſcia ad marginem externum integerrimum cæruleſcente, hac radio albo intercepta.

Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 266.
Habitat - - - ſcriptæ affinis, at teſta craſſiore, natibus verſus vulvam flexis, rima nulla, labiis clauſis diſtincta.

ſcripta. 9. D. teſta ovata compreſſa lævi, ſcripta lineis purpureis undatis: rima acuta, marginibus crenulatis. *Muſ. Lud. Ulr. 495. n. 53.* *
Adanſ. Seneg. t. 17. f. 31. Sunet.
Liſt. Conch. t. 379. f. 222. & t. 380. f. 223.
Bonann. recr. 2. f. 43.
muſ. Kirch. 2. f. 42.
Rumpf muſ. t. 43. f. L. M.
Petiv. amb. aq. t. 2. f. 7. & t. 18. f. 5.
Gualt. teſt. t. 88. f. Q.
Klein oſtr. t. 11. f. 59.
Knorr Vergn. 6. t. 7. f. 4. 5.
Murr. fund. teſt. t. 2. f. 5.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 261-265.
β) *Liſt. Conch. t. 381. f. 224.*
Habitat frequens ad littora Malabariæ & inſularum Xylanearum, *teſtæ lineis angulatis, rubellis, cæruleſcentibus aut fuſcis pictæ cardine ad veneres propius accedens.*

* *An diſtincta hujus generis ſpecies eſt, quam* Argenville *zoomorph. t. 5. f. M. depingendam curavit? Ad hoc genus referas quoque teſtas a* Chemizio. *Conch. 10. t. 172. 1668. 1669. depictas.*

muricata. 10. D. teſta ovata: ſtriis muricatis, margine denticulato. *Muſ. Lud. Ulr. 496. n. 54.**
Habitat in Oceano indico, *teſta gibba rufeſcente: rimæ hiante antrorſum utrinque dente compreſſo terminata, ano nullo.*

Irus. 11. D. teſta ovali rugis membranaceis erectis ſtriatis cincta.
Gualt. teſt. t. 95. f. A.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 268-270.
Habitat in mari mediterraneo, *cardine veneribus propior, teſta phaſeoli magnitudine alba, anterius obtuſiſſima rugoſa: rugis arcuatis, reflexo-erectis fere criſpis; exterioribus ſenſim anterioribus majoribus.*

lævigata. 12. D. teſta anterius obtuſa ad latera obſolete ſtriata, ex viridi flavicante intus & ad nates violacea, margine integerrimo, cardinis dente marginali nullo.
Chemn. Conch. 6. t. 25. f. 249.
Habitat rarior ad Tranquebar, *teſta 6 lineas ultra pollicem longa, & 3 ultra 2 pollices lata, vulvæ anique labiis ſubincumbentibus.*

ſpinoſa. 13. D. teſta nivea intus cæruleſcente poſterius lævi perpendiculariter ſtriata, anterius truncata tenerrime cancellata, angulis ſubſpinoſis.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 258.
Habitat rariſſima ad Tranquebariæ *littus, natibus glabris, cardine rugoſam referens.*

incarnata. 14. D. teſta incarnata anterius truncata reticulatim ſtriata rugoſaque, poſterius cuneata ſtriis tenerrimis perpendicularibus exarata.
Chemn. Conch. 6. t. 26. f. 259.
Habitat Tranquebariæ, *teſta interdum faſciis tranſverſis flavicantibus hinc inde picta.*

argentea. 15. D. teſta ovali lævi oleaginea intus argentea: marginis dentibus prope cardinem elatioribus acutis.
Gualt. teſt. t. 88. f. R.
Habitat - - -

bicolor. 16. D. teſta ovata ſtriis elevatis, pauciores tranſverſas decuſſantibus exarata rufa: radio in altero latere albo.
Gualt. teſt. t. 88. f. S.
Habitat - - -

radiata. 17. D. teſta ſtriis confertis arcuatis tranſverſis extrinſecus, perpendicularibus intus, rugis anterius inæquali fuſca hyalino maculata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 104. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat Tranquebariæ, *teſta pollicem fere lata, & ultra ½ longa, anterius minus obtuſa radiis 2 albis picta, poſterius rotundata: limbo albo, intus nivea luteo & cærulescente maculata, cardinis dente medio in altera valva unico obtuſo, marginali in utroque duplici, margine integerrimo.*

ſtraminea. 18. D. teſta ſtriis tenerrimis perpendicularibus anterius coſtas tranſverſas decuſſantibus exarata ſtraminea: faſciis tranſverſis obſcurioribus: margine ſpadiceo poſterius integerrimo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 105. *t.* 8. *f.* 4. a. b.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa & ¾ lata intus incarnata, antrorſum violacea: parte anteriori limbo lato ſubconvexo diſtincta, natibus rubellis, cardinis dentibus marginalibus in utraque valva 2.

candida. 19. D. teſta tota candida ſtriis teneris rarioribus arcuatis tranſverſis antrorſum obliquis, cardinis dentibus mediis tribus obliquis, margine integerrimo.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 106. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat Tranquebariæ, *teſta ¾ fere pollicis longa, & paulo latiore, tenui, fragili, inter ovatam & cuneatam quaſi media, anterius medio elevatiori, ſtriis marginem verſus in rugas abeuntibus.*

309 VENUS. *Animal* Tethys.

Teſta bivalvis; labiis margine antico incumbentibus.

Cardo dentibus tribus: omnibus approximatis; lateralibus apice divergentibus.

Vulva & *Anus* diſtincta.

* *Pubentes.*

Dione. 1. V. teſta ſubcordata tranſverſe ſulcata, pube ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 497. *n.* 55.*
Liſt. Conch. t. 307. *f.* 140.

Bonann. muſ. Kirch. 2. f. 121.
Rumpf muſ. t. 48. f. 4.
Olear. muſ. 29. f. 4.
Pet. gaz. t. 31. f. 9.
Lochner muſ. Beſler. t. 21. f. 11.
Gualt. teſt. t. 76. f. D.
Leſſer teſtaceoth. f. 134.
Argenv. Conch. t. 21. f. 1.
Murray fund. teſtac. t. 2. f. 11. 16. 17.
Knorr Vergn. 1. t. 4. f. 3. 4.
delic. nat ſel. t. B. V. f. 9.

v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 57. vign. f. a.
Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 271-273.
Schroet. Litterat. 1. f. 1. 2.
Habitat rarior & pretioſa in Oceano americano.

Venerem filiam Dionis ſ. e concha maris natam finxere poëtæ; hujus typus præcipue determinabit concharum partium metaphoricam denominationem.

TESTA *bivalvis, æquivalvis, ſemicordata, rotundata, ſubincarnata, poſterius & anterius magis gibba umbonibus undique exaratis* ſtriis *tranſverſis, diſtantibus, parallelis, marginatis, ſubrecurvatis æqualibus: exterioribus obtuoſiribus, poſterius alternis altioribus acutioribuſque & abbreviatis minoribus.* INTUS *lævis, alba, ſub umbonibus fornicata.* CARDO ſiniſtræ *tridentatus: dentibus approximatis ſcrobiculo diſtinctis; denticulo intermedio compreſſo, anguſtiore: lateralibus divergentibus craſſiuſculis obtuſis.* Dextræ *cardo denticulis duobus approximatis compreſſis inter ſcrobiculos duos.* MARGO *ambitus obtuſiſſimus integerrimus.* NATES *recurvatæ, obtuſiuſculæ, apice glabræ.* ANUS *impreſſus, ovatus, lævis, incarnatus. Anterius* Pubes *ciliaris, utrinque, e natibus ad ſummum montis veneris, cingens vulvam ſpinis e ſtriis alternis tertiiſve teſtæ ortis, ſubulatis, depreſſis, adſcendentibus, antrorſum arcuatis, ſubtus canaliculatis, ſuperioribus ſenſim longioribus, longiſſimis longitudine ipſius rimæ.* VULVÆ *regio incarnata, oblique ſtriata ſurſum a rima ad pubem.* Labia *læviora, incarnata, incluſa faſcia pallida, armata, a natibus ad medium rimæ aculeis utrinque quinque breviſſimis; margo vulvæ ſupra rimam connivet ſulco longitudinali, intra quem ſiniſtræ margo gibboſior ſe inſinuat.* Rima *lanceolata, hians labris prominulis, clauſa* hymene. NYMPHÆ *cartilagineæ, retractiores, longitudine rimæ.*

Paphia. 2. V. teſta ſubcordata: rugis incraſſatis, pube rugis a-
nuatis, labris complicatis.
Liſt. Conch. t. 279. f. 116.
Bonann. recr. 2. f. 75.
muſ. Kirch. 2. f. 72.
Rumpf muſ. t. 48. f. 5.
Valent. Abh. t. 16. f. 29?
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. f. 1.
Gualt. teſt. t. 85. f. A.
Argenv. Conch. t. 21. f. B.
Knorr Vergn. 2. t. 28. f. 2. & 6. t. 5. f. 6. & t. 6. f. 3.
Regenſ. Conch. 1. t. 7. f. 11.
Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 274-276.
β) *Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 277.*
γ) *Knorr Vergn. 6. t. 5. f. 6.*
Habitat ad inſulas Americæ *oppoſitas, teſta alba: ma-
ſtriis, nebulis, anterius lineis angulatis ſubfuſcis f-
ultra 2 pollices longa, 1¾ lata, ano fuſco, coſtis tr-
verſis latis convexis.*

Marica. 3. V. teſta ſubcordata decuſſatim ſtriata, pube lamel-
*Muſ. Lud. Ulr. 497. n. 56.**
Liſt. Conch. t. 280. f. 118?
Argenv. zoom. t. 12. f. C.
Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 282-286.
Habitat rariſſima in Oceano americano, *teſta alba,
terius radiis maculis veniſque ex fuſco rubelli p-
margine crenulato.*

Dyſera. 4. V. teſta ſubcordata: ſulcis tranſverſis remotis re-
margine crenulato. *Muſ. Lud. Ulr. 498. n. 57.**
Liſt. Conch. t. 277. f. 114. t. 278. f. 115. t. 285. f. 2-
Bonann. recr. 3. f. 348?
muſ. Kirch. 2. f. 103.
Gualt. teſt. t. 88. f. D.
Klein oſtrac. t. 10. f. 48. 49.
Knorr Vergn. 4. t. 24. f. 3? 6. t. 10. f. 2? 2 t. 28.
Gronov. zooph. t. 18. f. 8.
Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. f. 9?
*Chemn. Conch. 6. t. 27. f. 279? 280? 281? & t. 2-
287-294.*
β) *Liſt. Conch. t. 280. f. 117?*
Habitat in Oceano americano, *rarior & ſpecioſior in in-
teſta colore & pictura varia coſtis tenuibus ſæpius
inæquali.*

Bajana. 5. V. teſta fragili glabra: ſtriis tranſverſis rarioribus.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 124. 125.
Habitat in Braſiliæ *littore, teſta ochroleuca nigro-varia.*

excavata. 83. V. teſta lentiformi tranſverſim ſtriata: ano profunde impreſſo cordato, vulva lata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 167. *n.* 34. *t.* 8. *f.* 10.
Habitat - - - ſinuatæ ſimilis, at ſtriis teſtæ acutis ſubtilioribus, anterius & poſterius in rugas abeuntibus, colore ex fuſco luteo aut ex albo cinereo, pube ſquamoſo-ſpinoſa diſtincta.

** *impuberes.*
† *ſubcordatæ.*

verrucoſa. 6. V. teſtæ ſulcis membranaceis ſtriatis antrorſum inprimis verrucoſis, margine crenulato.
Adanſ. Seneg. t. 16. *f.* 1. Cloniſſe.
Liſt. Conch. t. 284. *f.* 122.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* 60.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 299. a. 299. b. 300.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* Angliæ, Antillarum*que littora, paphiæ affinis, teſta craſſa, 2 pollices longa & æque lata flavicante, maculis radiiſque paucis fuſcis varia.*

Lapicida. 148. V. teſta alba, antrorſum longitudinaliter, poſterius tranſverſim ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 356. *t.* 172. *f.* 1664. 1665.
Habitat ad inſulas Americæ *mediæ obverſas, corallia lapideſque calcareos rodere perhibita.*

divergens. 147. V. teſta alba: ſtriis ſubtiliſſimis divergentibus denſiſſimis.
Chemn. Conch. 10. *p.* 357. *t.* 172. *f.* 1666. 1667.
Habitat ad inſulas Americæ *mediæ obverſas.*

Caſina. 7. V. teſtæ ſulcis tranſverſis recurvis acutis, margine poſteriori crenulato: pone anum canaliculato.
Liſt. Conch. t. 286. *f.* 123.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 301? 302?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 115. *t.* 8. *f.* 6.
Habitat rara in Oceano europæo, *frequentius foſſilis, teſta alba maculis ſtriis, vibicibus ſubfuſcis varia, ano fuſco, umbonibus rubellis.*

cancella- 8. V. teſtæ ſtriis tranſverſis membranaceis remotis, ano
ta. dato. *Muſ. Lud. Ulr.* 506. *n.* 71.
Knorr Vergn. 6. *t.* 39. *f.* 4.
Chemn. Conch. 6. *t.* 13. *f.* 137. 138. *t.* 29. *f.* 304-3
Habitat rara in Oceano indico, *teſta ultra pollicem lo*
& ultra 1-½ *lata cinerea: radiis nonnullis exoletis fuſ*
intus rubra aut ſubfuſca, ſtriis interdum quoque longi
dinalibus exarata, margine crenulato.

Gallina. 9. V. teſta radiata: ſtriis tranſverſis obtuſis, cardinis de
poſteriore minimo, margine crenulato. *Fn. ſuec.* 21
Müll. zool. dan. prodr. 2975.
Liſt. Conch. t. 281. *f.* 119. *t.* 282. *f.* 120. *t.* 295. *f.* 13
Klein. oſtr. t. 10. *f.* 54.
Bytem. app. t. 11. *f.* 39. C?
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 2-5.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 57. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 308-310.
β) *Liſt. Conch. t.* 295. *f.* 132?
Habitat in Oceano americano & maribus europæis, *te*
craſſa, planiuſcula, pollicem longa & 1¼ *lata, glaberr*
colore varia, radiis utplurimum 3 *ſubfuſcis aut rubell*
intermediis interdum lineis angulatis, ano cordato fuſ
vulva lineis maculiſque fuſcis varia.

guineen- 10. V. teſta cinerea intus nivea: ſtriis tranſverſis acutis: v
ſis. væ margine albo labiiſque ſubtiliter ſtriatis roſ
margine integerrimo.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 311.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 8.
β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 34. *f.* 312.
Habitat in Africæ *littore* occidentali, *gallinæ affinis t*
hinc inde dilute rubello miſta: ſtriis elevatis validis
ramoſis, ano cordato.

Petulca. 11. V. teſta ſubſulcata: margine crenulato, rima ſubo
hiante, nymphis acutis.
Habitat in Oceano Europæ auſtralioris, *teſta avell*
magnitudine albo fuſcoque nebuloſa: ano oblongo.

flexuoſa. 12. V. teſtæ ſulcis tranſverſis obtuſis, vulvæ labiis angulo ele
vato diſtinctis.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* A? O?
Gualt. teſt. t. 83. *f.* I.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 10.

Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 333. 334.
Habitat in Oceano americano & indico, *teſta pollicem longa, & 1¼ lata, albida rufo-punctata, aut radiata, aut cineraſcente maculis ſtriiſque ſubfuſcis, (rarius nivea vulva anoque nigris, cardine cæruleo,) ſtriis tranſverſis vix crenatis vulvam verſus bifidis, vulva retuſa, ruſa, oblique ſtriata: angulis lateralibus elevatis & gibbis, margine vix manifeſte crenulato.* Solander.

Erycina. 13. V. teſta tranſverſim parallele ſulcata: ſulcis obtuſiſſimis, vulva glabra, ano ovato.
Liſt. Conch. t. 268. *f.* 104.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 337-339.
Habitat in India, *Chionæ affinis, teſta craſſa planiuſcula, 2¼ pollicis longa & 2¾ lata & majore, incarnata; radiis pluribus fuſcis & marginem verſus faſcia aurantia picta, ano aurantio, vulvæ rima anguſta longa hiante, cardinis dentibus mediis* 4. J. Th. Fagraeus.

mercenaria. 14. V. teſta ſolida tranſverſe ſubſtriata lævi: margine crenulato, intus violacea, ano ovato. *Fn. ſuec.* 2144. *Müll. zool. dan. prodr.* 2976.
Liſt. Conch. t. 271. *f.* 107.
Spengl. Schr. der berl. Naturf. 6. *p.* 307. *t.* 6. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 171. *f.* 1659. 1660.
Habitat in Europæ & Americæ Oceano ſeptentrionali (*in* Sueciæ *montibus foſſilis,*) *teſta ultra* 3 *pollices longa, & perinde fere lata, ovata, anterius anguſtata, ſub epidermide fuſca ſtraminea ſubtus & antrorſum radiis violaceis picta, ſtriis ſemicircularibus elevatis tranſverſis fuſciſque longitudinalibus ſubaſpera: ano cordato impreſſo longitudinaliter ſtriato, vulva glabra: Penſylvaniæ incolis olim inſtar numi.*

iſlandica. 15. V. teſta tranſverſim ſtriata rudi, nymphis hiantibus ano nullo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 95. *t.* 28. *f.* 1-5. *prodr.* 2977. *rar.* 1. *p.* 58. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 411. *n.* 412.
Brit. zool. 4. *p.* 80. *t.* 53. *f.* 47.
Liſt. Conch. t. 272. *f.* 108.
anim. angl. p. 173. *t.* 4. *f.* 22.
Petiv. muſ. n. 832.
Gualt. teſt. t. 58 *f.* B.
Coſta britt. Conch. p. 183. *t.* 14. *f.* 5.
Olafs. iſl. R. 1. §. 98 *t.* 11. *f.* 8. §. 239. 577. 901. *f.* 2.

Stroem. ſondm. 1. *p.* 201. *n.* 9.
Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 11.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32 *f.* 341.
β) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 3.
γ) *Chemn. Conch. t.* 32. *f.* 342.
Adanſ. Seneg. t. 16. *f.* 7. Pitar.
Habitat in Oceano Europæ ſeptentrionali, β) *in mari* caſp
γ) *in* africano, *teſta* 3½ *pollices longa, & 4 fere* la
craſſa epidermide tenui ſplendente tranſverſim ſtri
junioribus flava, adultioribus fuſca obtecta, alba f
rubellis tranſverſis picta, intus tota alba: margine
integerrimo, vulva longa anguſta clauſa; animal ſ
dis eſculentum piſciumque eſca fulvum ſubquadrato
pallio pallido, apertura utraque tentaculis cincta.

Chione. 16. V. teſta tranſverſe ſubrugoſa lævi, cardinis dente p
teriori lanceolato. *Muſ. Lud. Ulr.* 500. *n.* 58.*
Liſt. Conch. t. 269. *f.* 105.
Bonann. recr. 2. *f.* 64. 65.
muſ. Kirch. f. 63. 64.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* C.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 17.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 343.
β) *Rumpf muſ. t.* 42. *f.* G.
Pet. aq. amb. t. 18. *f.* 20.
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 340.
γ) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 33. *f.* 344.
Haditat in mari britannico, mediterraneo, atlantico,
ad Sinæ & Japoniæ *littora*, γ) *in* India *teſta* 2½ *poll*
longa, & 3¼ lata ſubfuſca aut cervina radiis utplurim
obſcurioribus picta: margine integerrimo; γ) teſta
berrima nivea: lineis angularibus obſcure rubellis.

maculata. 17. V. teſta lævi: maculis exoletis ſparſis. *Muſ. Lud. U*
500. *n.* 59.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 15. Jouret.
Liſt. Conch. t. 270. *f.* 106.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* I.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* H.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 5. & 5. *t.* 20. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 16.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 345.

Habitat frequens in Oceano americano, *Chionæ affinis, at teſta minore* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, alba, ſubfuſca, aut ex fuſco viridi, maculis fuſcis aut ſpadiceis, interdum radiis 2 interruptis varia, cardinis dente poſteriori brevi, craſſo, obtuſo.*

Meretrix. 18. V. teſta glabra: vulva fuſca gibba; nymphis hiantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 501. *n.* 60.*
Gualt. teſt. t. 76. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 6. *f.* 3.
Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 7.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 347-352.
β) Venus paradoxa. *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 4. *f.* 12. 13.

Habitat rarior in Oceano indico, *præſertim ad oſtia fluviorum, ſat ſpectabilis, teſta craſſa, convexa, glaberrima, nunc alba, nunc fuſca radiis nunc picta, nunc nullis intus alba: margine anteriore cærulcſcente, ano non diſtincto, margine teſtæ integerrimo.*

læta. 19. V. tumida glaberrima albo-radiata: labris ſubviolaceis.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* V.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 2. & 6. *t.* 10. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 127. *t.* 8. *f.* 7.

Habitat in mari mediterraneo & indico, *teſtæ pene* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* $1\frac{1}{2}$ *lata, nitente, flavicante, radiis nunc albis, nunc cæruleſcentibus nunc ſubfuſcis, vulva oblonga infra acuminata, impreſſa, glabra, albo cæruleoque varia, ano ſubcordato impr[e]ſſo albo.*

caſtrenſis. 20. V. teſta triangulo-rotundata gibba glaberrima characteribus angularibus inſcripta. *Muſ. Lud. Ulr.* 501. *n.* 61.*
Liſt. Conch. t. 257. *f.* 92. 93. *t.* 258. *f.* 94. *t.* 259. *f.* 95. *t.* 262. *f.* 98. *t.* 287. *f.* 123. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 376. 378.
muſ. Kirch. 2. *f.* 126. 311. 312.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* K.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 16.
Petiv. amb. aq. t. 5. *f.* 2.
Gualt. teſtac. t. 82. *f.* G. H.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* M.
Leſſer teſtaceoth. f. 108. 109.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 5. 2. *t.* 20. *f.* 2. 3. *t.* 4. *f.* 4. & 6. *t.* 6. *f.* 5. 6.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. 4. *t.* 4. *f.* 41.
Chemn. Conch. 6. *t.* 35. *f.* 367-381.
Habitat in Oceano indico & mari rubro, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *poll… cem longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata, ſtriis tranſverſis arcuatis ſubtiliſ… mis exarata alba lineis fuſcis, ſpadiceis, luteis, tria… gula formantibus picta: margine integerrimo.*

Phyrne. 21. V. teſta lævi anterius poſteriuſque tranſverſe ſtriata… ano obcordato; venis violaceis.
Habitat in Oceano *magis* auſtrali.

Meroë. 22. V. teſta ovata compreſſa tranſverſe ſtriata: ſutura po… terius hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 502. *n.* 62.*
Liſt. Conch. t. 378. *f.* 221.
Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* B.
Knorr Vergn. 6. *t.* 7. *f.* 2. 4. 6. 5. 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 43. *f.* 450-454.
Habitat in Oceano americano & indico, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollic… longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, aut alba lineis maculiſque angular… cæruleſcentibus, fuſcis vel roſeis aut violacea, aut fuſ… alternis cæruleis & flammeis picta, intus alba, ſtriis tra… verſis exarata, natibus diſtantibus, vulva exciſa, ma… gine denticulato.*

minuta. 23. V. teſta ſubovata tranſverſim ſtriata ſubpellucida, ny… phis clauſis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 412. *n.* 413.
Habitat frequens in ulvis foliaceis maris Iſlandiam alluen… *iſlandicæ affinis, teſta* 1-2 *lineas lata,* $\frac{1}{4}$-$1\frac{1}{2}$ *lineas lon… tenera, fragili, oblonga exterius ex fuſco violacea: lim… albicante, intus alba, ſtriis longitudinalibus null…*

defloratа. 24. V. teſta ovali longitudinaliter rugoſa anterius violace… nymphis atris.
Liſt. Conch. t. 245. *f.* 273.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 17?
Knorr Vergn. 2. *t.* 20. *f.* 5. & 5. *t.* 11. *f.* 2. & *t.* 21. *f.* …
Chemn. Conch. 6. *t.* 9. *f.* 79-82.
β) Tellina arenoſa. *Chemn. Conch.* 6. *t.* 9. *f.* 83.
Rumpf muſ. t. 45. *f.* C.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 85. *f.* G.
Habitat in mari atlantico & americano, β) *in* indico, *te… ſolida ad* 2 *pollices longa, &* 3 *lata, magis longitudi… libus (in* β) *medio bifidis) ſtrias tranſverſas tenera…*

cuſſantibus inæquali, intus violacea (β. albida) exterius alba, cinerea, flavicante, rubella, vel cærulescente, aut radiis cæruleſcentibus rubelliſve picta, cardinis dentibus in altera valva 2, in altera 1 fiſſo.

fimbriata. 25. V. teſta ovali gibba longitudinaliter ſtriata tranſverſe ſulcata: margine crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 502. *n.* 63*.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* G. Chama ſcobinata.
Liſt. Conch. t. 355. *t.* 172. & *t.* 1056. *f.* 1!
Rumpf muſ. t. 43. *f.* F.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* C.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 52.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *p.* 3. *vign.* 8. & *t.* 43. *f.* 448. 449.
β) *Rumpf muſ. t.* 43. *f.* G. Tygers tong.
Petiv. amb. ab. t. 18. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſolida, 2 pollices longa, 3 lata, alba (β. ſordide rubella margine nigricante, ſtriis longitudinalibus nullis) rima oblonga hiante, ano impreſſo, cardinis dentibus 2 mediis, & 2 lateralibus.*

reticulata. 26. V. teſtæ ſtriis elevatis decuſſatis, ano cordato margine integro. *Muſ. Lud. Ulr.* 503. *n.* 64*.
Liſt. Conch. t. 836. *f.* 173.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 10. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 382-384.
β) *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* A.
Habitat in India, *fimbriatæ affinis, at teſta magis cordata, ut 2 pollices longa, 2½ lata ſit, minus gibba, alba ſubfuſco aut rubello nebuloſo, interdum radiata aut maculata, ſtriis tenerioribus, tranſverſis magis arcuatis, ano cordato gibbo, cardinis dentibus 3; β) nunc fuſco, nunc rubro maculata.*

ſquamoſa. 27. V. teſta reticulato-ſtriata retrorſum ſquamoſa.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* M.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 83. *f.* G.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 335.
Habitat in India, *flexuoſæ affinis, teſta flavicante aut ferruginea, vulva ſubglabra impreſſa oblongo-ovata venis lineiſque cæruleis varia, ano fuſco, intus albo, margine crenato.*

Puerpera. 28. V. teſta ſubrutonda: ſtriis membranaceis decuſſatis, labiis flexuoſis. *Mant.* 2. *p.* 540.
Gualt. teſtac. t. 76. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* F.
Knorr Vergn. 6. *t.* 10. *f.* 1.
Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 388. 389.
γ) *Liſt. Conch. t.* 141. *f.* 178.
Habitat rarior in India, *reticulatæ affinis, at teſta magis rudi, ſolida, convexaque, ano plano vix impreſſo, exterius maculis, lineis, vibicibus fuſcis varia, antrorſum fuſca, intus cærulea.*

tripla. 29. V. teſta ſubtriangulari lævi, anterius & poſterius retuſa. *Mant.* 2. *p.* 545.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 108. *f.* 4. Tivel.
Liſt. Conch. t. 252. *f.* 86.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* Q.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 330-332.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 6. *f.* 4.
Habitat in Africæ *littore* occidentali, β) *in* mari mediterraneo, *teſta circiter pollicem longa*, 1¼ *lata, ſtriis tranſverſis tenerrimis exarata rubella, ex fuſco luteo alba, aut cinerea: radiis interdum* 2 *fuſcis*, β) *ex fuſco lutea, labiis cœruleſcentibus, ani ſtriis magis obſoletis quam vulvæ.*

plicata. 30. V. teſtæ ſtriis tranſverſis membranaceis arcuatis, ano rubello cordato: labiis obliquis.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* k.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 21.
Chemn. Conch. 6. *t.* 28. *f.* 295-297.
Habitat rara & pretioſa in mari indico, β) *in* mediterraneo, *teſta dilute incarnata: umbone albido, vulva ſaturatius rubra, glabra, profunda; rima ampla oblonga hiante.*

rugoſa. 31. teſtæ gibbæ ſtriis tranſverſis membranaceis arcuatis, ano cordato, margine crenulato. *Mant.* 2. *p.* 545.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 303.
Habitat rarior in India, *teſta craſſa ultra* 2 *pollices longa & lata, ex cinereo alba, maculis oblongis ſpadiceis varia: vulva oblonga ſubimpreſſa, in ſiniſtra valva glabra fuſco alboque varia: rima oblonga ampla hiante.*

Caliſte. 32. V. teſtæ ſtriis tranſverſis acutis antrorſum membranaceis, vulva breviore, ano inconſpicuo.
Schoet. Einl. in Conch. 3. *p.* 156. *t.* 8. *f.* 8. 9.
Habitat in mari rubro, *guineenſi affinis, teſtæ anterius exterius cærulescente intus ſaturatius tincta, poſterius utplurimum ſordide alba.*

granulata. 33. V. teſta rotundata decuſſatim ſtriata anterius & margine crenulato violacea.
Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 4. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 313.
Habitat in Oceano americano, *maricæ affinis, at vulva glabra nunc livida nunc albo & cæruleſcente varia, teſta ipſa alba maſculis lineiſque angularibus lividis aut nigris varia, ano cordato impreſſo nigricante aut cæruleſcente.*

imbricata. 34. V. teſtæ coſtis perpendicularibus imbricatis tranſverſim ſtriatis, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 497. *f.* 52.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 314. 315.
Habitat in Campania Gallorum *foſſilis, cardine venerem, reliquo habitu cardium referens.*

divaricata. 35. V. teſtæ ſtriis tranſverſis teneris longitudinales marginem verſus divergentes decuſſantibus, ano ovato, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 310. *f.* 146.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 316.
Habitat - - - teſta alba, lineis, venis maculiſque fuſcis varia, vulva oblonga hiante, venoſa, ex atro ſubfuſca, cardinis dentibus 4.

contraria. 36. V. teſta oblonga planiuſcula: ſtriis tranſverſis poſterius contrariis, margine crenato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 30. *f.* 317-319.
Habitat ad Guineæ *littora, cardio æolico affinis, teſta verſicolore, vulvæ anique margine interiori nigro maculato.*

Gallus. 37. V. teſta oblongo-ovata radiata: ſtriis tranſverſis confertis craſſis, vulva lata ovata, ano cordato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 324. 325.
Habitat ad Malabariæ *littus, teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa & ultra* 2 *lata, in junioribus cinerea, in adultioribus flavicante: radiis* 4 *obſcurioribus.*

flammea. 38. V. teſta tranſverſim ſtriata dorſo glabra: vulva latiſſima anoque cordato fuſco-lineatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 12.
β) Gallus radiatus. *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 200. *n.* 146.
Habitat in mari rubro, *gallo aſſinis, at teſta umbonem cærulescentem verſus magis gibba alba vibicibus, lineis maculiſque cinereis varia, in β) radiis 3 ſubfuſcis picta.*

Corbicula. 39. V. teſta triangulari lævi utrinque truncata flavicante-radiata, vulva anoque cordatis, margine integerrimo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15. *f.* 2. & 6. *t.* 10. *f.* 5.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 326.
Habitat rara in mari atlantico & americano, *vulva ſub-ſpadicea rima ampla hiante.*

herma-phrodita. 40. V. teſta triangulari glaberrima olivacea obſcure faſciata intus alba vel cærulescente, vulva cordata, ano ovato.
Martin. 1. *Manigf.* 1. *p.* 402. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 6. *t.* 31. *f.* 327-329.
Habitat rariſſima in Guineæ *fluviis, teſta craſſa rudi, na-tibus convergentibus, cardinis dentibus crenatis.*

coaxaxs. 41. V. teſta viridi intus alba: ſtriis tranſverſis inæqua-libus membranaceis, margine acuto.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* H?
Chemn. Conch. 6. *t.* 32. *f.* 236.
Habitat in Zeylonæ fluviis, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa & 3 lata: rima oblonga hiante, 2 ex cardinis dentibus fiſſis.*

caſta. 42. V. teſta gibba nivea anterius convexa intuſque ſub-violacea; vulva ſubrotunda, ano ovato violaceo-um-broſa, margine integerrima.
Chemn. Conch. 6. *t.* 33. *f.* 346.
Habitat in India, *rima ampla, oblonga, hiante, cardinis dente anteriori in utraque valva crenulato.*

affinis. 43. V. teſta tenui glabra convexa alba fuſco varia: ano elongato; labiis obliquis tumidis, cardinis dentibus quatuor.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* M.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 2.
Chemn. Conch. t. 33. *f.* 353. 354.
Habitat in inſula S. Mauritii, *lætæ affinis teſta radiis, maculis, lineis angularibus fuſcis picta, fragili, vulva excavatæ rima oblonga hiante.*

opima. 44. V. teſta craſſa convexa : vulva ovata, ano cordato-ovato, cardinis dentibus tantum tribus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 355-357.
Habitat in India, *teſta nunc pallida obſcurius radiata, nunc alba cæruleſcente maculata & nebuloſa, nunc griſea maculis nebuliſque obſcurioribus varia.*

triradiata. 45. V. teſta convexa griſea : radiis tribus ex nigricante cæruleſcentibus, anoque elongato, labiis tumidis.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 358.
Habitat ad Tranquebariæ littus.

nebuloſa. 46. V. teſta ochroleuca cinereo & cæruleſcenti maculata: vulvæ ovalis labiis anoque ovato cæruleſcentibus.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 359-361.
Habitat ad Tranquebariæ littus, *teſta utplurimum* 4 *ex albo & cinereo variis picta.*

contemta. 47. V. teſta craſſa trigona æquilatera glabra : natibus convergentibus, cardinis dente primario crenulato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 362. 363.
Habitat ad Malabariæ *littus, teſta minuta natibus nunc albis, nunc rubellis, nunc obſcurioribus, interdum littera ſanguinea M notatis.*

japonica. 48. V. teſta oblongo-ovata inæquilatera ad latera confertim tranſverſe ſtriata, ano oblongo-ovato.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 134?
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 364.
Habitat - - - teſta fulveſcente aut lactea characteribus purpureis triangularibus & angulatis inſcripta : an hujus familiæ?

ſtriata. 49. V. teſta ventricoſa anterius anguloſa : ſtriis tranſverſis craſſibus lævibus ſubarcuatis, ano ovato.
Chemn. Conch. 6. *t.* 34. *f.* 365. 366.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta ex cinereo alba intus ſub umbonibus flavicante, rima oblonga hiante, vulva glabra oblongo-ovali.*

crenata. 50. V. teſta trigona : ſtriis tranſverſis confertis elevatis; ſulcis intermediis & magine crenulatis, ano rugoſo fuſco cordato.
Bonann. recr. 2. *f.* 377.
muſ. Kirch. 2. *f.* 113.

Chemn. Conch. 6. *t.* 36. *f.* 385.

β) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 36. *f.* 386.

Habitat rara in India, *teſta ex cinereo alba, radiis, nubibus maculiſque fuſcis varia, vulvæ ovatæ labiis plicatis.*

Textile. 51. V. teſta ovali glaberrima inæquilatera; vulva anoque oblongis; lineis dilute ſpadiceis aut cæruleſcentibus pictis, margine integerrimo.

Liſt. Conch. t. 400. *f.* 439.

Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 4.

Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 442. 443.

Habitat ad Malabariæ *litus & in* mari rubro, *teſta ad* 1½ *pollicem longa, &* 2¼ *lata flavicante aut dilutius incarnata cæruleſcentibus aut ſubfuſcis picta, vulvæ labiis rotundatis.*

corrugata. 52. V. teſta ovata exalbida: ſtriis tranſverſis anterius craſſis validis, poſterius tenerrimis medio undulatis.

Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 444.

Habitat in mari mediterraneo, *rima oblonga ampla hiante.*

monſtroſa. 53. V. teſta ovata albida decuſſatim ſtriata, cardinis in ſiniſtra valva dentibus modo duobus.

Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 445. 446. a. b.

Habitat rariſſima ad inſulas Nicobaricas, *valva dextra ſiniſtram ſuperante tam ad cardinem, quam anterius poſteriuſque prominentiis inæquali.*

ponderoſa. 54. V. teſta ſolida inæquilatera anterius poſteriuſque rugoſa cinerea: margine crenulato, cardinis dentibus duobus.

Chemn. Naturf. 19. *t.* 8. *f.* a-d. & *Conch.* 7. *t.* 69. *f.* A. D.

Habitat in Oceano auſtrali, *vulva oblongo-ovata, natibus verſus anum ovatum impreſſum verſis.*

ſubviridis. 55. V. teſta ſubviridi glabra ſolida: natibus prominentibus, margine integerrimo.

Liſt. Conch. t. 158. *f.* 13.

Habitat in - - - fluviis.

roſtrata. 56. V. teſta ovata: ſtriis perpendicularibus ſquamoſis tranſverſas decuſſantibus.

Liſt. Conch. t. 346. *f.* 183.

Klein oſtrac. t. 10. *f.* 51.

β) *Liſt. Conch. t.* 348. *f.* 186.

Habitat - - - teſta β) *fuſco-maculata.*

fuſca. 57. V. teſta fuſca: ſtriis ſubtiliſſimis perpendicularibus.
Liſt. Conch. t. 423. f. 371.
Habitat - - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, &* $2\frac{1}{4}$ *lata, an diſtincta hujus generis ſpecies?*

luſitanica. 58. V. teſta oblonga tranſverſim ſubtiliter ſtriata, margine crenato.
Bonann. recr. 2. f. 45.
muſ. Kirch. 2. f. 44.
Habitat in mari luſitanico.

punctulata. 59. V. teſta ovata alba, lineis badiis punctiſque ſubflavis varia.
Bonann. recr. 2. f. 46.
muſ. Kirch. 2. f. 45.
Habitat in mari Drepanitano.

faſciata. 60. V. teſta tereti lævi radiis badiis & ſubflavis picta altera parte cyanea altera livida.
Bonann. recr. 2. f. 66.
muſ. Kirch. 2. f. 65.
Habitat - - - -

carnea. 61. V. teſta oliva inæquilatera ſubrugoſa carnea: radiis tribus.
Bonann. recr. 3. f. 382.
muſ. Kirch. 2. f. 115.
Habitat - - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa,* $2\frac{1}{2}$ *lata centrum verſus in roſæ vel purpuræ colorem vergente.*

virgata. 62. V. teſta intus violacea, extus chalybea: radiis luteis.
Rumpf muſ. t. 42. f. 1.
Petiv. amb. aq. t. 18. f. 16.
Habitat in Oceano indico, *coaxanti affinis at teſta tenuiori.*

verſicolor. 63. V. teſta ovali oblique ſtriata albida: radiis albis, fulvidis cæruleſcentibus rubriſque.
Gualt. teſt. t. 86. f. B. C.
Habitat - - - - teſta inæquilatera profunde ſulcata.

variegata. 64. V. teſta ovata inæquilatera ſubtiliſſime ſtriata cæruleſcenti-punctata; radiis ſubfuſcis & nigricantibus.
Gualt. teſt. t. 89. f. H.
Habitat - - - - - - teſtis lineis nonnullis tranſverſis albis inſignita.

amethyſtina. 65. V. teſta ovata violacea perpendiculariter ſtriata.
Argenv. Conch. t. 21. f. D.

Habitat — — — teſta ultra 1¼ *pollicis longa &* 2¼ *lata, an hujus generis?*

calipyga. 66. V. teſta poſterius ovata tranſverſe inæqualiter ſtriata lineis angularibus picta.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 5. *f.* 1.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 62.
muſ. Kirch. 2. *f.* 61.
Habitat ad Ulyſſiponenſe *littus, teſta flavicante, lineis fuſcis picta: umbone niveo.*

Senegalenſis. 67. V. teſta ovata ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata alba aut carnea fuſco varia.
Adanſ. Seneg. t. 17. *f.* 11. Lunot.
Habitat in Senegalia, *minuta, teſta ſeſquipollicem lata & duplo breviori.*

Matadoa. 68. V. teſta triangulari alba aut flava: ſulcis tranſverſis parallelis circiter quadraginta.
Adanſ. ſeneg. t. 18. *f.* 5. Matadon.
Habitat rariſſima in Senegalia, *triplæ affinis, teſta ſeſquipollicem longa.*

ſuccincta. 86. V. teſta cordata ſulcis tranſverſis remotis excavatis: margine crenulato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat — — — teſtæ magnitudine extimi digiti, ſulcis 14 ano ovato impreſſo, vulvæ rima exciſa.

compreſſa. 87. V. teſta ſubcordata compreſſiſſima tranſverſe ſulcata. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat — — — teſtæ margine integerrimo, vulva anoque linearibus ſubexciſis.

auſtralis. 88. V. teſta cordata nitida alba, characteribus fuſceſcentibus notata: margine integro. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 355. *t.* 171. *f.* 1662.
β) *Mart. univ. Conchol. t.* 40?
Habitat in Oceano auſtrali.

gigantea. 89. V. teſta ovata livida: radiis numeroſiſſimis interruptis cæruleſcentibus, ano impreſſo ovato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 354. *t.* 171. *f.* 1661.
Favann. Conch. t. 49. *f.* 91.
Habitat ad Zeylonæ, Floridæ *littora.*

†† *orbiculatæ.*

tigerina. 69. V. teſta lentiformi : ſtriis crenatis decuſſatis, ano impreſſo ovato. *Muſ. Lud. Ulr.* 503. *n.* 65.*
Adanſ. ſeneg. t. 16. *f.* 3. Codock.
Liſt. Conch. t. 337. *f.* 174.
Bonann. recr. 2. *f.* 69.
muſ. Kirch. 2. *f.* 70.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* H.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 77. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* E.
Bytem. app. t. 11. *f.* 44.
Knorr Vergn. 4. *t.* 2. *f.* 1. & *t.* 3. *f.* 2. & 6. *t.* 37. *f.* 2.
Chemn. Conch. 6. 37. *f.* 390. 391.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 3. *f.* 2 ?
γ) Venus orbicularis. *Syſt nat.* X. 1. *p.* 688. *n.* 118.
Habitat in Oceano americano & indico, *ſatis magna; teſta interdum tota alba, interdum anterius & poſterius rubella intuſque rubra : umbone flavo, ſtriis perpendicularibus evidentioribus, margine intus glabro exterius crenato, vulva lineari, ano anguſto, cardinis dentibus mediis* 2.

proſtrata. 70. V. teſta orbiculata tranſverſe ſtriata, labiis ſcabro-membranaceis. *Muſ. Lud. Ulr.* 504. *n.* 66.*
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 6.
Chemn. Conch. 6. *t.* 29. *f.* 298.
Habitat ad littus Coromandel, *teſta complanata nigra; cinerea aut ſubfuſca,* 2 *pollices longa, & paulo minus lata, natibus reflexis, vulva ſubpubente, rima oblonga, patula, ano cordato.*

penſylvanica. 71. V. teſta lentiformi glabro-rugoſa alba : anterius utrinque ſulco longitudinali. *Muſ. Lud. Ulr.* 504. *n.* 67.*
Liſt. Conch. t. 305. *f.* 138.
Argenv. Conch. t. 21. *f.* N.
Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 4.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 8.
Schroet. Journ. 31. *t.* 2. *f.* 8.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 394-396.
β) Venus ſulco longitudinali utrinque altero ad anum.
Liſt. Conch. t. 265. *f.* 101 ? *t.* 298. *f.* 135.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39 *f.* 408. 409.
γ) Venus fragilis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 313. *n.* 314?

Habitat in Oceano americano, *teſta ad 2 pollices longa, alba, ſolida, rima lineari, ano exili rugoſo cordato, margine integerrimo.*

ſpuria. 72. V. teſta alba ſubglabra: ſulco anterius longitudinali cardiniſque dentibus lateralibus nullis.
Liſt. Conch. t. 296. *f.* 133.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 399.
Habitat in mari Iſlandiam inſulamque Ferroe *alluenti, penſylvanicæ affinis, at rima ampliori, rimaque oblonga.*

incruſtata. 73. V. teſta lentiformi glaberrima læviſſima punctis excavata. *Muſ. Lud. Ulr.* 505. *n.* 68.*
Habitat in Oceano indico, *teſta intus cruſta craſſa albida obducta, an forſan eadem cum tigerina, forſan ætate & arte deformata?*

punctata. 74. V. teſta lentiformi longitudinaliter ſulcata intus punctata. *Muſ. Lud. Ulr.* 505. *n.* 69.*
Rumpf muſ. t. 43. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* D.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 397. 398.
Habitat rara in India, *teſta ſolida-antiquata ultra 2 pollices longa, & 2½ lata alba hinc inde rubella miſta, intus cruſta craſſa ochroleuca interdum lævi obducta, ceterum rubra, margine integerrimo.*

exoleta. 75. V. teſta lentiformi tranſverſim ſtriata pallida obſolete radiata, ano cordato. *Fn. ſuec.* 2145. *Muſ. Lud. Ulr.* 506. *n.* 70.* *Müll. zool. dan. prod.* 2978.
Adanſ. Seneg. t. 16. *f.* 4. Cotan.
Liſt. Conch. t. 292. *f.* 128. & *t.* 297. *f.* 134.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 9.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 402. 404.
β) Venus Lupinus. *Syſt. nat.* X. I. *p.* 689. *n.* 123.
γ) Venus teſta æquilatera *Chemn. Conch.* 7. *t.* 38. *f.* 406. *Liſt. Conch. t.* 293. *f.* 129.

An diſtinctæ ſpecies, & ſi, cui familiæ adſcribendæ Venus teſta ovata læta tenera a Mullero *zool. dan. prodr.* 2979. & Venus teſta ovata minus convexa craſſa, *n.* 2980. *notatæ?* a Liſtero *Conch. t.* 274. *f.* 110, *depicta?* Bytemeſter *app. t.* 11. *f.* 39. e. *delineata?*

Habitat in Norwegiæ Angliæque *littore*, γ) *teſta magis æquilatera flavicante aut ex cinereo alba ad* inſulas Antillas, *proſtratæ affinis, at teſta magis convexa labiis non ſcabris diſtincta, 2 fere pollices longa & perinde lata, intus cruſta craſſa albida obducta, ano ferrugineo.*

tumidula. 90. V. teſta gibba: ſulcis tranſverſis remotis obſoletiuſculis. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat - - - - teſtæ margine integerrimo, vulvæ rima ſimplici, ano impreſſo rhombeo-excavato.

ſinenſis. 91. V. teſta longitudinaliter ſtriata: arcubus tranſverſis albis violaceiſque, margine intus crenato.
Chemn. Conch. 10. *p.* 356. *t.* 171. *f.* 1663.
Habitat in mari Sinam *alluente.*

ſinuata. 76. V. teſta lentiformi tranſverſim ſtriata alba: rima oblonga attepla hiante, cardinis dentibus quatuor.
Liſt. Conch. t. 924. *f.* 130.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 400. 401.
β) *Liſt. Conch. t.* 290. *f.* 126.
γ) *Liſt. Conch. t.* 289. *f.* 125.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* N?
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat rarior ad inſulas Nicobaricas, *exoletæ affinis, at teſta minus orbiculari, magis convexa, ſtriis magis elevatis diſtincta.*

borealis. 77. V. teſta lentiformi: ſtriis tranſverſis membranaceis erectis remotiſſimis.
Liſt. an. angl. p. 174. *t.* 4. *f.* 123.
Gualt. teſt. t. 75. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 39. *f.* 412. 414.
Habitat in Oceano europæo ſeptentrionali, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, & paulo latiori ſub epidermide ſpadicea alba, angulata, ad rimam longam & anguſtam recta & quaſi truncata, ſtriis inæqualibus, & ſi cum exoleta compares, remotioribus, ano oblongo-ovato cardinis dente in altera valva* 1. *in altera* 2.

pectinata. 78. V. teſta ſublentiformi: ſulcis longitudinalibus rugoſis, pube antrorſum ramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 507. *n.* 72.*
Liſt. Conch. t. 312. *f.* 148. *t.* 313. *f.* 149.
Rumpf muſ. t. 42. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 14.

Gualt. teſt. t. 72. f. E. F. & t. 75. f. A.
Argenv. Conch. t. 21. f. P.
Knorr Vergn. 6. t. 3. f. 3.
Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 415-419.
Habitat in Oceano indico & americano, *teſta ultra 1½ pollicem longa & 2 fere lata nunc magis nunc minus convexa, nunc alba: ano maculiſque quibuſdam anterioribus fuſcis, nunc per totam ſuperficiem fuſco maculata, nunc anterius maculis vibicibuſque ex atro fuſcis notata: ano cordato, margine inæqualiter crenato.*

ſcripta. 79. V. teſta lentiformi compreſſa ſtriata: poſterius angulo recto angulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 507. *n.* 73.*
Rumpf muſ. t. 43. f. C. Chama litterata rotunda.
Argenv. Conch. t. 24. f. M. Chama optica.
Pet. amb. aq. t. 18. f. 3.
Gualt. teſt. t. 77. f. C.
Knorr Vergn. 5. t. 15. f. 3.
Chemn. Conch. 7. t. 40. f. 420-426.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. f. 7.*
Chemn. Conch. 7. t. 39. f. 410. 411.
Habitat rariſſima in Oceano indico, β) *in mari rubro, teſta utrinque truncata, poſterius quidem magis, intus alba: macula fuſca, extrinſecus varia: margine integerrimo, vulva anoque ſpadiceo-maculatis.*

edentula. 80. V. teſta ſubgloboſo-lenticulari rugoſa edentula: ano ovato. *Muſ. Lud. Ulr.* 508. *n.* 74.*
Liſt. Conch. t. 260. f. 96.
Gualt. teſt. t. 88. f. B.
Chemn. Conch. 7. t. 40. f. 427-429.
Habitat in Oceano americano, *teſta diaphana exalbida, recenti rubella, intus præter marginem utrinque integerrimum aurea; ano ovato-acuto, valde excavato, rima anguſta, natibus anum verſus verſis.*

cincta. 81. V. teſta valde convexa annulis cincta: ſulcis intermediis crenatis ano cordato, margine crenulato.
Chemn. Conch. 6. t. 36. f. 387.
Habitat - - - teſta minuta alba maculis & nebulis ferrugineis varia, intus ſub umbone maculis aliquot purpureis.

concentrica. 82. V. teſta alba ſuborbiculari compreſſa: ſtriis concentricis, margine integerrimo, ano cordato.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 5. Doſin.
Liſt. Conch. t. 261. *f.* 91. *t.* 288. *f.* 124. & *t.* 291. *f.* 127.
Gualt. teſt. t. 76. *f.* F.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 37. *f.* 392. 393.
Habitat in mari atlantico, americano, *teſta ſatis magna: rima hiante, cardinis dentibus* 4 *obliquis approximatis.*

juvenilis. 84. V. teſta lentiformi: ſtriis tranſverſis confertis circularibus anterius & poſterius in rugas terminatis, ano cordato, magine integerrimo.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 405.
Habitat in India *teſta alba: maculis ſpadiceis, faſciis radiiſque albis variis, rima oblonga, ampla, hiante, ſinuata.*

Hiſtrio. 85. V. teſta lentiformi: ſtriis tranſverſis acutis arcuatis, margine integro, ano cordato, ferrugineo.
Chemn. Conch. 7. *t.* 38. *f.* 407.
Habitat rarior in India, *teſta maculis radiiſque ſpadiceis varia, vulva elongata, lata, ſinuata, maculis albis ſpadiceiſque varia.*

globoſa. 86. V. teſta globoſo hyalina: ſtriis tranſverſis ſubtiliſſimis, margine integerrimo, cardinis dentibus duobus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 40. *f.* 430. 431.
Habitat rariſſima in mari rubro, *teſta ultra pollicem longa, & pene* 1¼ *lata, ano vulvaque vix impreſſis.*

Pectunculus. 87. V. teſta orbiculari æquilatera tranſverſim rugoſa ruſo variegata.
Liſt. Conch. t. 254. *f.* 89. *t.* 255. *f.* 90. & *t.* 256. *f.* 91.
Habitat in Japonia.

albida. 88. V. teſta orbiculari ſubcompreſſa æquilatera alba: ſtriis tranſverſis ſubtilibus.
Liſt. Conch. t. 273. *f.* 109.
β) *Liſt. Conch. t.* 274. *f.* 110.
Habitat in Jamaica.

campechienſis. 89. V. teſta orbiculari inæquilatera: ſtriis tranſverſis confertis acutis.

An huic generi inſerenda teſta, a Chemnizio *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1670. 1671. *depicta?*

Liſt. Conch. t. 283. *f.* 121.
Habitat in ſinu Campechienſi, *teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa.*

craſſa. 90. V. teſta orbiculari ſolida compreſſa : ſtriis tranſverſis ſubtilibus, radiis rubris.
Liſt. Conch. t. 299. *f.* 136.
Habitat - - - -

pupuraſcens. 91. V. teſta orbiculari ſubtiliter tranſverſim ſtriata purpuraſcente radiata.
Liſt. Conch. t. 303. *f.* 144.
β) *Liſt. Conch. t.* 304. *f.* 145.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 57.
Habitat - - - -

rubra. 92. V. teſta orbiculari inæquilatera ſpadicea obſcurius radiata : ſtriis tranſverſis confertis craſſis.
Liſt. Conch. t. 306. *f.* 139.
Habitat in Jamaica.

puſilla. 93. V. teſta orbiculari æquilatera albida perpendiculariter ſtriata.
Liſt. Conch. t. 311. *f.* 547.
Habitat - - - - an forſan cardii ſpecies?

violacea. 94. V. teſta intus violacea : ſtriis perpendicularibus ſquamoſis, margine denticulato.
Liſt. Conch. t. 338. *f.* 175.
Habitat - - - - - teſta mediæ magnitudinis, longior quam lata.

ſpadicea. 95. V. teſta ſpadicea : ſtriis perpendicularibus verſus marginem ſquamoſis.
Liſt. Conch. t. 340. *f.* 177.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa, & pene* $2\frac{1}{2}$ *lata.*

cancellata. 96. V. teſta ſubrufa cancellata.
Liſt. Conch. t. 344. *f.* 181.
Habitat - - - - exilis.

bengalenſis. 97. V. teſta orbiculari ſubæquilatera : ſtriis craſſis perpendicularibus, natibus anum verſus verſis.
Liſt. Conch. t. 345. *f.* 182.
Habitat in Bengala, *ſatis magna.*

aurea. 98. V. teſta ſuborbiculari aurea inæquilatera ſuborbiculari : ſtriis tranſverſis ſubtilibus confertis.

Liſt. Conch. t. 404. *f.* 249.
Habitat - - - - -

obſcura. 99. V. teſta fuſca: ſtriis perpendicularibus tenuiſſimis.
Liſt. Conch. t. 423. *f.* 271.
Habitat - - - - *teſta* $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa*, $2\frac{1}{4}$ *lata.*

purpurata. 100. V. teſta orbiculari ſubæquilatera perpendiculariter rugoſa: radiis purpureis.
Liſt. Conch. t. 424. *f.* 272.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{2}$ *policem fere longa*, & $1\frac{3}{4}$ *lata.*

Nux. 101. V. teſta lentiformi teſtacea rugoſa, ano cordato.
Bonann. recr. 2. *f.* 39.
muſ. Kirch. 2. *f.* 38.
Habitat in mari Jonico.

rugata. 102. V. teſta orbiculari teſtacea ſubæquilatera: rugis tranſverſis diſtantibus.
Bonann. recr. 2. *f.* 54.
muſ. Kirch. 2. *f.* 52.
Habitat - - - -

gibbula. 103. V. teſta lentiformi tranſverſim ſtriata, antrorſum truncata.
Bonann. recr. 2. *f.* 55.
muſ. Kirch. 2. *f.* 53.
Habitat - - - -

ſtellata. 104. V. teſta orbiculari lævi aurea: ſtella ad umbonem candida.
Bonann. recr. 2. *f.* 62.
Habitat in Ulyſſiponenſi *littore.*

italica. 105. V. teſta orbiculari lutea: ſtriis tranſverſis elevatis diſtanſtibus.
Bonann. recr. 2. *f.* 75.
muſ. Kirch. 2. *f.* 75.
Habitat in mari mediterraneo, Italiam *alluente.*

braſiliana. 106. V. teſta lentiformi fuſco lutea: ſtriis tranſverſis tenerioribus diſtantibus, ano cordato vulvaque latis cærulefcentibus.
Bonann. recr. 3. *f.* 345.
muſ. Kirch. 2. *f.* 102.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 380.
muſ. Kirch. 2. *f.* 114.
Habitat frequens in Braſiliæ *littore, natibus anum verſus inflexis.*

pellucida. 107. V. teſta orbiculari pellucida lævi : vulva dilute aurea ſpadiceo maculata, ano cordato viridi rubroque venoſo.
Bonann. recr. 3. f. 397.
muſ. Kirch. 2. f. 118.
Habitat in Braſiliæ *oris.*

holoſericea. 108. V. teſta orbiculari ſolida candida : ſtriis extrinſecus undulatis aureis, faciaque verſus marginem lata flava lineis tranſverſis fuſcis varia.
Bonann. recr. 3. f. 398.
muſ. Kirch. 2. f. 119.
Habitat - - - - pellucida major, pictura opus holoſericeum puncto franceſe Italis dictum ſimulans.

macaſſarica. 109. V. teſta orbiculari ventricoſa craſſa ſubfuſca albo radiata : ſtriis annularibus.
Leers catal. p. 129. n. 1240. Eykenhouts doublet.
Rumpf muſ. t. 43. f. K.
Petiv. amb. aq. t. 18. f. 13.
Habitat in Macaſſar.

aurantia. 110. V. teſta ſuborbiculari aurantia.
Valent. Abh. t. 15. f. 20.
Habitat - - - - teſta 2 fere pollices longa, & 2¼ lata; an hujus familiæ?

fulva. 111. V. teſta lentiformi fulva : ſtriis circularibus ſubtiliſſimis.
Gualt. teſt. t. 75. f. E.
Habitat - - - -

albicans. 112. V. teſta orbiculari tranſverſim ſtriata albida lineis angularibus characteribus maculisque fuſcis varia.
Gualt. teſt. t. 75. f. G.
Habitat - - - - caſtrenſi affinis.

candida. 113. V. teſta orbiculari alba reticulatim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 75. f. L.
Habitat - - - -

undulata. 114. V. teſta ſuborbiculari tranſverſim ſtriata exalbida lineis undulatis punctiſque rubellis varia.
Gualt. teſt. t. 75. f. O.
β) *Gualt. teſt. t. 75. f.* P.
γ) *Gualt. teſt. t. 75. f.* R.
δ) *Gualt. teſt. t. 76. f.* A.
Habitat - - - -

115. V.

lineata. 115. V. teſta orbiculata æquilatera alba: ſtriis tranſverſis ſubtilibus, marginem verſus craſſioribus.
Gualt. teſt. t. 77. f. B.
Habitat - - - -

lævis. 116. V. teſta lævi ſubæquilatera albida.
Gronov. zooph. 3. p. 260. n. 1090.
Gualt. teſt. t. 77. f. F.
β) *Gualt. teſt. t. 77. f.* G.
Habitat. - - - an diſtincta ſpecies?

cornea. 117. V. teſta orbiculari lævi inæquilatera livido-cornea: linea tranſverſa alba.
Gualt. teſt. t. 82. f. B.
Habitat - - -

guttata. 118. V. teſta orbiculata fulvida ad marginem albo guttata.
Gualt. teſt. t. 82. f. F.
Habitat - - -

rufeſcens. 119. V. teſta inæquilatera rufeſcente lævi: lineis nonnullis tranſverſis.
Gualt. teſt. t. 85. f. D.
Habitat - - -

virens. 120. V. teſta lentiformi cancellatim ſtriata radiata margine crenulata virente obſcurius maculata.
Argenv. zoomorph. t. 5. f. B. Palourde.
Habitat - - -

maculoſa. 121. V. teſta alba maculato-radiata arcuatim ſtriata: macula media griſea magna ſurſum attenuata.
Argenv. zoormorph. t. 12. f. G.
Habitat - - -

coſtata. 122. V. teſta tota incarnata: coſtis longitudinalibus rugas tranſverſas remotiores decuſſantibus.
Knorr Vergn. 4. t. 3. f. 3.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* $1\frac{1}{2}$ *lata.*

W auaria. 123. V. teſta tenui convexiuſcula ſubtiliter tranſverſim ſtriata intus nivea, extrinſecus littera W punctis multis adſperſis inſignita, natibus inflexis.
Regenſ. Conch. 1. t. 7. f. 12.
Habitat - - - ſcriptæ affinis.

tumens. 124. V. teſta tumida ſolida nivea lævi, marginem verſus rugis aliquot tranſverſis exarata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 7. Pitas.
Habitat ad Africæ *littus* occidentale, *teſta epidermide ſordide alba veſtita,* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ultra 2 lata, cardinis dentibus 4 in utraque valva.*

diaphana. 125. V. teſta tenui orbiculari pellucida læviſſima nivea: cardinis in utraque valva dentibus duobus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 8. Felan.
Habitat in Africæ *littore* occidentali, *diametri ſeſquipollicaris.*

dura. 126. V. teſta ſuborbiculari compreſſa dura tranſverſim ſulcata rubella fuſco radiata intus violacea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 12. Pegon.
Habitat ad Africæ *littus* occidentale; *teſta 2 fere pollices longa nitente.*

nivea. 127. V. teſta alba pellucida ſubhiante: ſulcis viginti diſtantibus marginem verſus in rugas abeuntibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 17. Fatan.
Habitat ad Africæ *littus* occidentale, *teſta 6 fere pollices lata,* $4\frac{1}{2}$ *longa, an hujus generis?*

eburnea. 128. V. teſta orbiculari compreſſa nivea: ſulcis longitudinalibus rotundatis ſtrias tranſverſas decuſſantibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 3. Jajon.
Habitat ad Africæ *littus* occidentale, *teſtæ diametro 9 linearum, ſulcis circiter 26-30, cardinis dentibus breviſſimis.*

lucida. 129. V. teſta lucida dilute fulva intus & extrinſecus ſulcis longitudinalibus ſubtiliſſimis exarata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 4. Movin.
Habitat ad Africæ *littus* occidentale, *teſta 16 circiter lineas longa vix anguſtiore.*

diſcors. 130. V. teſta orbiculari convexiuſcula ſtriis longitudinalibus: mediis perpendicularibus, exterioribus obliquis divergentibus tranſverſas decuſſantibus: ſulcis inter mediis & margine interno crenatis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 199. *t.* 8. *f.* 11.
Habitat - - - - *teſta inæquilatera albida aut ochroleuca, ſtriis non raro undulatis, aut radiis, interdum maculis nebuliſque nonnullis fuſcis varia, intus alba, ano cordato*

oblongo; vulva anguſta oblonga fuſca: labiis cancellatis albis nigro lineatis.

aculeata. 131. V. teſta orbiculari ſubæquilatera: coſtis acutis elevatis tuberculatis, margine denticulato crenato, cardinis dentibus mediis duobus.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 200. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat - - - teſta rarius unicolore rubra perſici florum æmula, frequentius alba fuſco ſtriata, vulva minuta, ſulcis profundis.

††† *ovales, ſupra rimam* ſubangulatæ.

litterata. 132. V. teſta ovata anterius ſubangulata: ſtriis tranſverſis ſubundulatis. *Fn. ſuec.* 2146. *Muſ. Lud. Ulr.* 508. *n.* 75.*
Argenv. Conch. t. 21. *f.* A. Chama litterata.
Rumpf muſ. t. 43. *f.* B. Chama litterata oblonga.
Liſt. Conch. t. 402. *f.* 246.
Bonann. recr. 2. *f.* 67.
muſ. Kirch. 2. *f.* 66. 120.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 2.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 6. *t.* 14. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* E? F.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 39.
Chemn. Conch. 7. *t.* 41. *f.* 432-434.
β) Venus litterata nebuloſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 435.
Valent. Abh. t. 14. *f.* 10. 11. 12. 14.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 1.
γ) Venus litterata punctata. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 41. *f.* 436 437.
Valent. Abh. t. 15. *f.* 19.
δ) Venus litterata conſperſa. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 438.
ε) Venus litterata radiata. *Chemn. Conch.* 7. *t.* 42. *f.* 439.
ζ) Venus litterata maculoſa. *Martin. allg. Naturg.* 1. *p.* 267. *t.* 12. *f.* 4.
η) *Valent. Abh. t.* 14. *f.* 7-9. & *t.* 15. *f.* 17. 18.
θ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 40?
Habitat rarior in India, *teſta ad* 2 *pollices longa*, 3 *lata, characteribus lineiſque fuſcis picta, vulva longa anguſta profunda: rima longiuſcula lata, natibus minutis.*

geographica. 133. V. teſta inæquilatera tenui ſubtiliter decuſſatim ſtriata, alba, fuſco reticulata.
Gualt. teſt. t. 86. *f.* H.
Chemn. Conch. 7. *t.* 42. *f.* 440.
Habitat in mari mediterraneo.

rotundata. 134. V. teſta ovata anterius ſubangulata : ſtriis tranſverſis, cardinis dente intermedio bifido. *Muſ. Lud. Ulr. 509. n. 76.**
Argenv. zoom. t. 12. f. D.
Olear. gotl. t. 29. f. 4.
Knorr Vergn. 2. t. 18. f. 4.
Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 441.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta 1½ pollicem longa, & 3 lata, ſubfuſca aut maculoſa flava radiis ex maculis fuſcis luteiſque compoſitis picta, ano ex ovato lanceolato.*

decuſſata. 135. V. teſta ovata anterius angulata decuſſatim ſtriata. *Muſ. Lud. Uir. 509. n. 77.**
Gualt. teſt. t. 85. f. E. I. L.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. f. 2. 3.
Chemn. Conch. 7. t. 43. f. 455. 456.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *teſta ad 1½ pollices longa & 2 lata, ſolida, convexa, colore varia, radiata, maculata, aut virgata, intus alba flavo miſta, ano minimo retuſo, vulva longa anguſta margine interno utplurimum cærulea; cardinis dentium intermedio rarius 2 fiſſis.*

virginea. 136. V. teſta ſubovata anterius ſubangulata : ſtriis tranſverſis inæquilineatis, vulva tumida.
Chemn. Conch. 7. t. 42. f. 447. t. 43. f. 457. 458. & a. b. c.
Habitat frequens in mari adriatico *aliiſque, decuſſatæ ſimilis, at teſta minore, ſtriis perpendicularibus nullis diſtincta, rubella, interdum radiata, maculis cinereis aut lineis angularibus fuſcis varia, intus alba aut flavicante, ad latera interdum aut marginem cærulea, nunc magis nunc minus ovata, ſtriis tranſverſis nunc magis nunc minus conſpicuis: Incola edulis.*

virginica. 137. V. teſta ovata tranſverſim rugoſa : cardinis dentibus duobus.
Liſt. Conch. t. 390. f. 229.
Habitat in Virginia, *teſta pollicem longa, & 1½ lata.*

cruentata. 138. V. teſta ovata inæquilatera tranſverſim ſtriata rubro maculata.
Liſt. Conch. t. 396. f. 243.
Klein oſtr. t. 10. f. 50.
β) *Liſt. Conch. t. 403. f. 247.*
Habitat. - - - teſta ſtriis exaſperata.

luteſcens. 139. V. teſta ovata tranſverſim ſtriata exterius radiata marginem verſus characteribus lineis maculiſque varia intus luteſcente.

Liſt. Conch. t. 404. *f.* 248.

Habitat - - -

ſanguinolenta. 140. V. teſta ovali lævi flaveſcente: maculis punctiſque rubris

Bonann. recr. 2. *f.* 68.

muſ. Kirch. 2. *f.* 67.

Habitat ad Neapolitanum *littus*, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa*, $1\frac{1}{4}$ *lata.*

argentea. 141. V. teſta oblongiuſcula lævi argentea: lineis nigris in faſcias coadunatis.

Bonann. recr. 2. *f.* 85.

muſ. Kirch. 2. *f.* 85.

Habitat in Gaditano *littore*, *an hujus generis.*

donacina. 142. V. teſta oblongiuſcula complanata anterius tranſverſim ſulcata, margine interno crenulato, vulva anoque lineari excavatis.

Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 7.

Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa*, $1\frac{1}{4}$ *lata*, *nunc unicolore*, *nunc maculis*, *lineis angulatis aliterve varia*, *vulvæ rima minuta vix hiante*, *cardinis dentibus modo* 2.

afra. 143. V. teſta ſulcata: umbone acuminato; ano excavato rugoſo cordato.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 6. Gordet.

Habitat in Africæ *littore* occidentali, *teſta pollicem lata*, *ſulcis ſubtilioribus ultra* 130. *exarata.*

dealbata. 144. V. teſta oblonga tenui complanata vivo animali cæruleſcente, mortuo nivea.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 17. *f.* 18. Calcinelle.

Habitat ad Africæ *littus* occidentale, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem lata*, *dimidio anguſtiori*; *an hujus familiæ!*

lithophaga. 145. V. teſta ovata reticulata utrinque hiante: cardinis dentibus binis; alternis bifidis. *Retzius act. Taurin.* 1786. 1787. *add. p.* 11-14. *f.* 1. 2.

Habitat Liburni *ad* rupes littoreas, *intra lapidem calcareum poroſum flavicantem.*

310. SPONDYLUS. *Animal* Tethys.

Teſta inæquivalvis, rigida.
Cardo dentibus 2 recurvis cum foveola intermedia.

Gædaropus. 1. Sp. teſta ſubaurita ſpinoſa. *Muſ. Lud Ulr.* 510. *n.* 78.
Boccon. obſerv. 1674. *t.* 304. Concha hiſtricina.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 6. Gouron.
Liſt. Conch. t. 206. *f.* 40.
Bonann. recr. & muſ. Kirch 2. *f.* 21.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* E.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* B.
zoomorph. t. 12. *f.* A.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 23. & *t.* 9. *f.* 37.
Seb. muſ. 3. *t.* 89. *f.* 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 48.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 14.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 76. *vign.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 44. *f.* 459.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 20. 22.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* E.
Chemn. Conch. 7. *p.* 63. *vign.* 9. *f.* a. b.
γ) *Chemn. Conch.* 7. *p.* 63. *vign.* 9. *f.* c.
δ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 44. *f.* 460.
ε) *Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* E. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 44. *f.* 461. 462.
ζ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 463.
η) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 464.
θ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 8.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 1. & 6. *t.* 9. *f.* 1.

Spondyli *tota teſtæ ſtructura ad oſtreas accedunt, ſed dentibus cardinis differunt, ſpinis vulvarum chemis propiores, ſcopulis utplurimum adhærentes, teſta altera convexa, altera planiore.*

Chemn. Conch. 7. *t.* 45. *f.* 465.
ι) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 466.
κ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 468.
λ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 45. *f.* 469.
μ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 45. *f.* 470.
ν) *Rumpf muſ. t.* 48. *f.* 2.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 10. 11. & *t.* 89. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 46. *f.* 472.
ξ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 474.
ο) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 47. *f.* 476.
π) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 477. 478.
ρ) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 2. *f.* 18.
Knorr Vergn. 6. *t.* 12. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* E. F.
Schroet Einl. in Conch. 3. *p.* 213. *t.* 8. *f.* 14. 15.
σ) *Liſt. Conch. t.* 207. *f.* 41.
τ) *Liſt. Conch. t.* 208. *f.* 42.
υ) *Liſt. Conch. t.* 209. *f.* 43.
φ) *Valent. Abb. t.* 16. *f.* 24.
χ) *Gualt. teſt. t.* 99. *f.* E. b.
ψ) *Gualt. teſt. t.* 100. *f.* A.
ω) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* I.
αα) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 2.
ββ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 3.
γγ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 5.
δδ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 6.
εε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 7.
ζζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 88. *f.* 9.
ηη) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 1.
θθ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 2.
ιι) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 3.
κκ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 89. *f.* 4.
λλ) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 7. Satal.
μμ) *Schroet. Einl. in Conch.* 3. *p.* 224. *n.* 42. *t.* 8. *f.* 16.
νν) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 984.
ξξ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 985. 986.
οο) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 987.
ππ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 115. *f.* 988 - 990.
ρρ) *Chemn. Conch.* 6. *t.* 116. *f.* 991.

Habitat in mari mediterraneo, δ) & κ) *in* mari *rubro*, ε) *in* ſinenſi, β) γ) ζ) η) λ) μ) ν) ξ) ο) π) *in Oceano* indico, ϑ) & ι) *in* americano, *teſtæ colore nunc ſimplici purpureo, aurantio, albo, perſici florum æmulo, nunc ſtriis, maculis, punctis, faſciis, ſpinarum colore diverſo vario, magnitudine, craſſitie in immenſum varians.*

regius. 2. Sp. teſta inaurita ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 511. *n.* 79.*
Argenv. Conch. t. 20. *f.* G.
Chemn. Conch. 7. *t.* 46. *f.* 471.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 6. *f.* 2.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 13. *f.* 1.
δ) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* I.?
ε) *Argenv. Conch. t.* 20. *f.* M.
Habitat rariſſimus in India, γ) *prope* Maltam, *teſta majore ſubgloboſa, intus alba, exterius purpuraſcente, kermeſina, ignea, aurantia, rarius alba, ſpinis utplurimum longioribus, ad 2 pollices longis, interdum cylindricis, margine crenato.*

plicatus. 3. Sp. teſta inaurita mutica plicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 511. *n.* 80.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 2. Garin.
Liſt. Conch. t. 210. *f.* 44. & *t.* 1059. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* E. & *t.* 104. *f.* F?
Schroet. Litterat. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 47. *f.* 479–482.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 9. *f.* 30.
Habitat in Oceano indico & americano; mari *rubro*, mediterraneo, β) *in* Guinea, *teſta alba lineis veniſque nunc flavicantibus & rubellis, nunc ſubfuſcis & violaceis varia, β) aurantia.*

citreus. 4. Sp. teſta oblonga plicata ſpinoſa.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* K.
Habitat – – – *teſta imbricata, 2 circiter pollices longa, $1\frac{3}{4}$ lata, citrea, aut rubra margine interno aurantio*

311. CHAMA. *Animal* Tethys.
Teſta bivalvis, groſſior.
Cardo callo gibbo, oblique inſerto foſſulæ obliquæ.
Vulva clauſa abſque nymphis.

Cor. 1. Ch. teſta ſubrotunda lævi: natibus recurvatis, rima hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 516. *n.* 88.*
Liſt. Conch. t. 275. *f.* 111.
Bonann. recr. 2. *f.* 88.
muſ. Kirch. 2. *f.* 92.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 86. *f.* 1.
Ginann. adriat. t. 2. *t.* 19. *f.* 129.
Knorr Vergn. 6. *t.* 8. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 48. *f.* 483.

Habitat in mari adriatico *verſus* Dalmatiam, *etiam* caſpico, *teſta grandi intus alba, exterius ſub epidermide nigricante ex albo & ſubfuſco varia, craſſa, ſubrotunda, tranſverſim rugoſa clauſa, margine integerrimo, valvis figura cor turgidum referentibus, natibus rubellis, magnis, inſtar cornu arietis contortis, ani regione retuſa, in medio pauliſper elevata; vulva ovato-oblonga: nymphis nudis ligamento coriaceo obtectis.*

Gigas. 2. Ch. teſta plicata fornicato-ſquamoſa: ano hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 512. *n.* 81.*
Rumpf muſ. t. 42. *f.* A. B. Chama ſquamata.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* E. Imbricata.
Liſt. Conch. t. 351. *f.* 189. *t.* 352. *f.* 189. b. *t.* 353. *f.* 190. *t.* 354. *f.* 191.
Bonann. recr. 2. *f.* 83. 84.
muſ. Kirch. 2. *f.* 82. 83.
Petiv. amb. aq. t. 5. *f.* 13. & *t.* 7. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 92. *f.* A-G. & *t.* 93. *f.* B.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 53.
Lochner muſ. Beſler. t. 20.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 6.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 3. & 6. *t.* 36. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 48.

Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 12. 20.
Chemn. Conch. 7. *t.* 49. *f.* 492-496.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 49. *f.* 497.
Habitat in Oceano indico, *teſta lucida alba, extrinſe*
interdum roſea, aut ex flavo rubro alboque varia,
minimum $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, &* 1$\frac{1}{4}$ *lata, ſed ſæpius omn*
concharum maxima, ut 532 *libras pondere æquet,*
mali inhabitante tam grandi, ut 120 *hominibus cibo*
ſervire queat, tamque robuſto, ut navium funes diſſ
dere, hominumque manus reſecare vivum valeat; teſt
coſtis, ſulcis, ſquamis magnitudine variis, ani hia
ovali: ambitu tumido crenato, teſtæ margine dentat
cardine præter callum ſub vulva dente armato.

Hippopus. 3. Ch. teſta plicata muricata; ano retuſo clauſo dent
Muſ. Lud. Ulr. 513. *n.* 82.*
Rumpf muſ. t. 42. *f.* C. Chama aſpera obtuſa.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* H. Folium braſſicæ.
Liſt. Conch. t. 349. *f.* 187. *t.* 350. *f.* 188.
Bonann. recr. 2. *f.* 81. 82.
muſ. Kirch. 2. *f.* 80. 81.
Petiv. amb. aq. t. 18. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 93. *f.* A.
Leſſer teſtaceoth. f. 124.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 49.
Knorr Vergn. 1. *t.* 22. *f.* 1. 2. & 6. *t.* 9. *f.* 3.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 79. *vign.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 498. 499.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* 5 *pollices longa,*
lata, alba, extrinſecus maculis rubris & purpureis
ria, interdum flavicante, ventricoſa, cardinis
flavis, in altera valva 2.

antiquata. 4. Ch. teſta ſubcordata: ſulcis longitudinalibus ſtriiſque
transverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 514. *n.* 84.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 16. *f.* 2. Ajar.
Bonann. recr. 2. *f.* 98.
muſ. Kirch. 2. *f.* 96.
Valent. Abh. t. 16. *f.* 30.
Gualt. teſt. t. 71. *f.* I. L.
Knorr Vergn. 2. *t.* 20. *f.* 3. & *t.* 14. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 48. *f.* 488-491.
Habitat in mari atlantico, americano, indico, *teſta*
quilatera, maculis fuſcis, rarius ferrugineis variis,

19-22 *utplurimum tranſverſim ſtriatis, margine dentato, natibus anum verſus inflexis, vulvæ rima profunda clauſa.*

trapezia 5. Ch. teſta trapezia gibba: ſulcis longitudinalibus crenulatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2981.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 236. *n.* 5. *t.* 8. *f.* 17.

Habitat in mari norwegico, *teſta parva, piſi magnitudine alba, extrinſecus antrorſum fuſca albo miſta, inſtar arcæ noæ gibboſa margine crenulata: ſtriis circiter* 20 *nodulis obtuſis inæqualibus, natibus parum recurvatis, ano ovato-cordato, vulva oblonga, diſtincta, plana, extus crenata.*

ſemiorbiculata. 6. Ch. teſta ſuborbiculata compreſſa rudi decuſſatim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 514. *n.* 85.*
β) *Linné Lehrb. Thierr.* 2. *t.* 37. *f.* k?
Habitat - - - *teſta longitudinaliter ſtriata, ſquamis annotinis imbricata, ani lobo albido, margine poſteriori crenato.*

calyculata. 7. Ch. teſta oblonga: ſulcis imbricatis, anterius retuſa.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 8. Jeſon.
Liſt. Conch. t. 347. *f.* 184. *n.* 185.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* F.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 500. 501.
β) *Liſt. Conch. t.* 248. *f.* 186.
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 2. *f.* 127.
Habitat in mari atlantico, americano & indico, *interdum foſſilis, teſta ultra* ½ *pollicem longa,* 1½ *lata, alba, juniore fuſca, cardinis dentibus* 2, *margine exteriori ſerrato, interiore lævi.*

cordata. 8. Ch. teſta cordata tranſverſim ſtriata, hinc elongata compreſſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 515. *n.* 86.*
reniformis. β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 23. *f.* 7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 502. 503.
Habitat - - - β) *in* mari rubro & indico, *teſta ferruginea* β) *ſpadicea, ſulcis inferne, non verſus marginem exteriorem, tranſverſis, diſtinctis, obtuſis: angulo inter rimam & marginem exteriorem elongato obſcuriore.*

ſatiata. 9. Ch. teſta ſubrotunda: ſulcis dentatis punctis interſtinctis, ano retuſo.

Habitat - - - teſta alba extrinſecus rufeſcente: ſulci elevatis longitudinaliter dentatis, alternis brevioribu margine crenulato, ano cordato.

oblonga. 10. Ch. teſta oblonga anterius angulata: dentatis anteri ribus acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 515. *n.* 87.*
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 504. *f.* 505.
Habitat rarior ad Guineæ *littora, mytilo modiolo ſtru tura affinis, teſta ſubdiaphana alba ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, intus citrea, margine integerrimo, cardi dentibus 3 mediis, & laterali oblongo acuto, foveo inter binos dentes alterius valvæ interdum inſerto.*

Lazarus. 11. Ch. teſta imbricata lamellis laceris, nate oblique ſu ſpirali. *Muſ. Lud. Ulr.* 513. *n.* 83.*
Argenv. Conch. t. 20. *f.* F. Placenta foliacea.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* C. *t.* 48. *f.* 3.
Valent. Abb. t. 13. *f.* 4. *t.* 16. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 12. *t.* 89. *f.* 6. 9. 11.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 5. *f.* 12-14.
Chemn. Conch. 7. *t.* 51. *f.* 507-509.
Habitat in India, *ſcopulis adhærens, teſta flava, alba natibus rubris intus glabra: valva ſuperiore minore & planiore, in inferioris cardine callo obtu craſſo, lato, ad alterutrum latus crenato: fove obliqua adjacente.*

gryphoides. 12. Ch. teſta orbiculata muricata: valvula altera planio altera nate productiore ſubſpirali.
Rondel. teſt. 1. *c.* 25. Concha rugata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. Jataron.
Liſt. Conch. t. 212. *f.* 47. *t.* 213. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* C. D. E. F.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 86.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 51. *f.* 510-513.
Geſn. aq. 316.
Aldr. exſang. 458.
Sloan. jam. t. 241. *f.* 4-7.
β) *Gualt. teſt. t.* 101. *f.* L.
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 6. *f.* 1.
δ) *Kaemmerer Cabin. Rudolſt. p.* 234. *vign. f.* 1. 2.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 255. *t.* 8. *f.* 19.

ε) *Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 992.*
ζ) *Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 993.*
Habitat in mari mediterraneo, americano, indico, *fixa teſtæ proportione & cardine Lazaro affinis, teſta alba, flava, rubra, ſanguinea, albo rubroque varia, ſquamis nunc magis foliaceis, nunc fornicatis & muricatis.*

bicornis. 13. Ch. teſta valvulis conicis: natibus corniformibus obliquis tubuloſis valvula longioribus.
Column. purp. c. 19. p. 43.
Major teſtac. t. 2.
Liſt. Conch. t. 214. f. 49.
Gualt. teſt. t. 101. f. G.
Klein oſtr. t. 12. f. 87. 88.
Chemn. Naturf. 20. t. 1. f. 1-5.
Conch. 7. t. 52. f. 516.-520.
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 245. t. 8. f. 18.
Habitat rara in Oceano indico & americano, *etiam* mediterraneo *gryphoidi affinis, teſta utrinque flava, rubra aut alba, imbricatim lamellata, rarius rugoſa.*

Arcinella. 14. Ch. teſta ſulcata muricata excavato-punctata, cardinis callo ſeſſili.
Liſt. Conch. t. 355. f. 192.
Bonann. recr. 3. f. 336.
muſ. Kirch. 2. f. 101.
Olear. muſ. t. 29. f. 3.
Leſſer teſtaceoth. f. 98.
Knorr Vergn. 6. t. 14. f. 1. & t. 36. f. 1. 2.
Chemn. Conch. 7. t. 52. f. 522. 523.
Habitat rarior in Oceano americano, *teſta 2 pollices late, & pene æque longa, alba, ſpinis rarius roſeis, intus flavicante, margine crenata; ano cordato, impreſſo, verrucoſo, rugoſo magno ad alterum latus appendice ſæpius aucto.*

Moltkiana. 15. Ch. teſta obtuſe triangula æquilatera plicata, vulva elevata plicis ſtriiſque obliquis inæquali.
Chemn. Conch. 7. t. 48. f. 484-487.
Habitat - - - Ch. cordi affinis, nucis avellanæ oblongæ magnitudine, teſta lactea, opaca; natibus pauliſper diſtantibus, cardinis dente ſub natibus anguſto rotundato

Chamæ plurimæ fixæ adhærent aliis corporibus, valva ſuperiore ſæpius planiore.

ſcrobi profundæ appoſito, qui dens alterius valvæ inſeritur, alteraque antrorſum foveola longa profunda inter binos dentes intermedia, & paulo magis retrorſum alio adhuc rotundato & dilatato dente.

concamerata. 16. Ch. teſtæ rugis tranſverſis, ſtrias latas longitudinales decuſſantibus; utriuſque valvæ medio intus camera aucto.
Walch. Naturf. 12. *p.* 53. *t.* 1. *f.* 5-7.
Chemn. Conch. 7. *t.* 50. *f.* 506. a-d.
Habitat rariſſima in Oceano americano, *teſta parva, albida.*

macerophylla. 17. Ch. teſta rotundata ſeriatim lamellata: margine interno crenulato.
Seb. muſ. 3. *t.* 88. *f.* 8.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 2. & 5. *t.* 24. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 514. 515.
β) Seb. muſ. 3. *t.* 89. *f.* 12?
Habitat in Oceano americano, *gryphoidi perquam affinis, teſta nunc flava, nunc rubra nunc albo rubroque varia, intus nunc alba, nunc rubra, β) elegantiſſime variegata; valva utraque convexa, lamellis marginem verſus increſcentibus; an varietas Lazari?*

foliacea.[1] 18. Ch. teſta alba: ſtriis tranſverſis foliaceis ſerratis, interſtitiis crenatis, natibus recurvatis.
Liſt. Conch. t. 215-217. *f.* 51-53.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 81.
Chemn. Conch. 7. *t.* 52. *f.* 521.
β) Liſt. Conch. t. 215. *f.* 50.
Habitat in mari mediterraneo & americano, *foſſilis quoque in* Campania Galliæ, *teſta nunc ſubrotunda nunc oblonga.*

arata. 19. Ch. teſta rotundata alba, fuſco undulata: coſtis trigonis perpendicularibus rugoſis, margine inæquali.
Bonann. recr. 2. *f.* 86.
muſ. Kirch. 2. *f.* 84.
Habitat rara in Syracuſano *littore, utrum hujus generis an ad cardia referenda.*

fuſca. 20. Ch. teſta rugoſa oblonga anguſta fuſca: valvæ inferioris nate protenſa rotundata ſubincurva.
Gualt. teſt. t. 101. *f.* 1.
Habitat - - - -

citrea. 21. Ch. teſta ſubrotunda ventricoſa inæquivalvi muricata: ſpinis ſparſis inæqualibus ſquamoſis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 44.
Habitat in Oceano americano, *teſta citrea, cardine ad chamas accedente.*

Thaca. 22. Ch. teſta ſubrotunda longitudinaliter ſtriata, ano retuſo.
Molin. hiſt. nat. Chil. p. 178.
Habitat ad littus Chilenſe *in arena ſe occultans, teſta alba violacea & flava intus eleganter purpuraſcente diametri* 4 *pollicum, verme incola ſapidiſſimo.*

rugoſa. 23. Ch. teſta ſuborbiculata: ſulcis profundiſſimis, rugis ſubimbricatis, margine dupliciter plicato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat - - - teſta magnitudine extimi digiti, gibba, craſſa, ſulcis 30, *margine interiore obtuſo plicato, exteriore unguibus eminentibus concavis e ruga eductis, cardine ſulcis* 2-3 *obliquis verſus vulvam declinatis.*

gryphica. 24. Ch. teſta obliqua lacuna laterali, rugoſa, cardinis collo dentato. *Mant.* 2. *p.* 546.
Habitat in Barbaria, *Anomiæ Gryphi facie, teſta ponderoſiſſima, craſſiſſima, pugni magnitudine, natibus oblique verſus anum* incurvatis longitudinaliter *concavum, vulva longitudinaliter canaliculata, verſus nates obliqua.*

corallio-phaga. 25. Ch. teſta cylindrica alba diaphana decuſſatim ſtriata: ſtriis tranſverſis arcuatis imbricatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 359. *t.* 172. *f.* 1673. 1674.

312. ARCA. *Animal.* Tethys?
Teſta bivalvis æquivalvis.
Cardo dentibus numeroſis acutis alternis inſertis.

* *margine integerrimo.*
† *natibus recurvatis.*

tortuoſa. 1. A. teſta parallelepipeda ſtriata: valvula oblique carinata.
Muſ. Lud. Ulr. 517. *n.* 861.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* k. Oſtreum tortuoſum.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 122. 123.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 9.

Gualt. teſt. t. 95. f. B.
Argenv. Conch. t. 19. f. I.
Klein oſt. t. 8. f. 16.
Leſſer teſtaceoth. f. 137.
Knorr Vergn. 1. f. 23. f. 3.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 14.
Chemn. Conch. 7. t. 53. f. 524. 525.
Habitat rara & pretioſa in Oceano indico, *teſta alba, inter- dum ſubfuſco-maculata aut nebuloſa triplo latiore qua- longa, extrinſecus varia directione & intus ſtriata, va- vis diſſimilibus, margine intus, in junioribus utrinque crenato.*

✝✝ *natibus inflexis.*

Noæ. 2. A. teſta oblonga ſtriata apice emarginata, natibus remo- tiſſimis, margine hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 517. *n.* 90.
Rondel. aq. 2. *p.* 27. Concha rhomboides.
Liſt. Conch. t. 368. *f.* 208. & *t.* 369. *f.* 209. Muſcul- Matthioli.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* P. Arca Noæ.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 9. Muſſole.
Bonann. recr. 2. *f.* 32. Concha rhomboides.
muſ. Kirch. 2. *f.* 31.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* G. H. I?
Argenv. Conch. t. 23. *f.* G.
Leſſer teſtaceoth. f. 138.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 2.
Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 73.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 529–531. a. b. & *t.* 54. *f.* 53- 533.
β) *Argenv. Canc. t.*29. *f.* 20. A.
Habitat in mari mediterraneo, rubro, atlantico, american- indico, *teſta alba, rarius unicolore. frequentius ſubfuſ- luteo aut fuſco maculato nebuloſa, ſtriata, unduloſa, ven- ſa, rhomboidea, margine extimo crenato, interno integ-*

barbata. 3. A. teſta oblonga ſtriis barbata: natibus approximatis margine clauſo. *Fn. ſuec.* 1147. *Muſ. Lud. Ulr.* 51- *n.* 91.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2982.
Rondel. teſt. 14. Chama aſpera.
Liſt. Conch. t. 231. *f.* 65. *Bon-*

Bonann. recr. 2. f. 79.
muſ. Kircher. 2. f. 78.
Gualt. teſt. t. 91. f. F.
Argenv. Conch. t. 72. f. M.
Knorr Vergn. 2. t. 2. f. 7.
Murray teſtaceol. t. 2. f. 22.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 8.
Chemn. Conch. 7. t. 54. f. 535.
β) Arca tortuoſa. *Müll. zool. dan. prodr. 2983.*
γ) *Gualt. teſt. t. 90. f. B.*
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. t. 6. f. 12.
Chemn. Conch. 7. t. 54. f. 534.
δ) *Seb. muſ. 3. t. 88. f. 13.*
Chemn. Conch. 7. t. 54. f. 536. f. 537.
Muſ. Teſſin. t. 6. f. 1.
ε) *Rumpf muſ. t. 44. f. L.* Pecten ſaxatilis?

Habitat in mari mediterraneo, rubro, indico, β) *in norwegico*, γ) *etiam in* americano, *teſta ſub fibris ſubſpadicea, interdum albo mixta, decuſſatim ſtriata: fibris in ſectionis angulo nodoloſis.*

Modiolus. 4. A. teſta oblonga ſtriata anterius angulata.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta mytili modioli figura, fabæ majoris magnitudine, exterius flaveſcente, intus alba aut ſubviolacea: cardine elongato, valvis anterius profundius ſtriatis, poſterioribus natibus vix vel parum longioribus.* Zoega.

Pella. 5. A. teſta ovata pellucida ſubſtriata: vulva prominente diſtincta, cardine ciliari.
Chemn. Conch. 7. t. 55. f. 546.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta alba, nitidiſſima, magnitudine ſeminis helianthi annui, ſubtrigona: ſtriis ſubtiliſſimis transverſis ſemilunatis, natibus mediis vulva transverſe ſtriata, cardinis dentibus ſub vulva præſertim, ſubulatis, acutiſſimis, margine intus & extrinſecus edentulo.* Logie.

Ovata. 6. A. teſta ovata decuſſatim ſtriata nivea epidermide pulla obtecta: margine hiante.
Chemn. Conch. 7. t. 54. f. 538.

Habitat in mari rubro, *teſta magna, ano excavato undulatim ſulcato & ſtriato; an hujus familiæ?*

pellucida. 7. A. teſta pellucida fragili anterius poſteriuſque rotundata obſolete ſtriata: cardinis dentibus acutiſſimis.
Spengl. Catal. t. 1. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 541. a. b.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta tenui ſtraminea, rarius fuſca intus fuceſcente.*

roſtrata. 8. A. teſta convexiuſcula tranſverſim ſtriata poſterius rotundata anterius in roſtrum acutum producta.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 17. 18.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 550. 551. a. b.
Habitat in mari Baltico & Norwegico, *tellinæ roſtratæ affinis, teſta epidermide vireſcente tecta, ad ½ pollicem longa, &* 1¼ *lata, natibus minutis, antrorſum flexis.*

ſtriata. 9. A. teſta lentiformi copioſiſſime decuſſatim ſtriata lateribus intus rubella, ano triangulari, cardine arcuato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58.
Habitat in mari rubro, *teſta pollicem lata & paulo longiori.*

pulchella. 10. A. teſta ſubrotunda biradiata: ſtriis tranſverſis arcuatis.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* 1.
Habitat - - - an hujus generis & ordinis?

afra. 12. A. teſta exalbida epidermide albicante tecta ſubtiliſſime decuſſatim ſulcata oblique truncata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 8. Jabet.
Habitat ad Africæ *littus occidentale, teſta 4-5 lineas longa, & 3 lata, ſulcis longitudinalibus 40-50, tranſverſis 20, natibus approximatis, margine clauſo.*

foſſilis. 12. A. teſta craſſa ſubrotunda longitudinaliter ſtriata tranſverſim coſtata: coſtis undulatim ſtriatis.
Schroet. neue Litterat. 2. *f.* 3. 4.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta in Ducatu Limburgenſi, *teſta 3 pollices longa,* 3¼ *lata.*

cancellata. 13. A. teſta cancellatim ſtriata barbata, margine medio hiante.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 294. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in Oceano americano, *teſta ſub epidermide muſcoſa utrinque ſubfuſca, exterius albo miſta, utrinque 4 pilorum faſciculis fimbriatis hiata, natibus ſubrecurvis, ano lanceolato.*

minuta. 14. A. teſta compreſſiuſcula tranſverſim ſtriata: fine remotiore attenuato; oppoſito rotundato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 414. *n.* 415. *Müll. zool. dan. prodr.* 2985.
Chemn. Conch. 10. *t.* 170. *f.* 1657. 1658.
Habitat rariſſima in maris Groenlandiam *alluentis profundis, teſtæ figura ad myas accedens, teſta ochroleuca glabra, clauſa,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa,* 4 *lata, natibus conniventibus, albis, acutis, non ſtriatis.*

** *margine crenato.*
† *natibus recurvatis.*

lactea. 15. A. teſta ſubrhomboidea obſolete decuſſatim ſtriata diaphana.
Liſt. Conch. t. 235. *f.* 69.
Bonann. recr. 2. *f.* 34.
muſ. Kirch. 2. *f.* 33.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 547.
nodulosa. β) Arca teſta oblonga nodulis ſtriata, natibus incurvis remotis, margine integerrimo clauſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2984.
Habitat in omni mari europæo, *fabæ equinæ magnitudine; natibus approximatis.*

antiquata. 16. A. teſta oblique cordata multiſulcata: ſulcis muticis. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 91.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 7. Anadara.
Liſt. Conch. t. 230. *f.* 64. & *t.* 236. *f.* 70.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 73. 74.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* 1.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* B. C.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 73.
Gronov. zooph. t. 18. *f.* 13.
Knorr Vergn. 1. *t.* 24. *f.* 3. 4.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 15.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 548. 549.
Habitat in Oceano indico, americano, mari mediterraneo; *teſta ſatis magna alba, epidermide piloſa obtecta, vulvæ regione quaſi angulo compreſſo prominente.*

ſenilis. 17. A. teſta oblique cordata octoſulcata lævi, margine plicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 518. *n.* 92.*

* *An huic generi accenſendæ, & cuinam ejus tribus & familiæ conchæ ab* Argenville *Conch. t.* 29. *f.* 17. a. & a Knorr *Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 4. *delineatæ?*

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 5. Fagan.
Liſt. Conch. t. 238. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* k.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 554-556.
Habitat in Oceano americano, *& ad* Africæ *littus occidentale, teſta craſſa ultra* 3 *pollices longa* & 4 *lata alba, epidermide nigra, aut (in junioribus) fuſca thalaſſino miſta obducta, anterius hiante.*

granoſa. 18. A. teſta ſubcordata: ſulcis muricatis. *Muſ. Ud. Ulr.* 519. *n.* 63.*
Columm. purp. 11. *p.* 29. 30.
Major teſt. t. 10. *f.* 3.
Liſt. Conch. t. 241. 78. & *f.* 242. *f.* 79.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* k.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 7.
Gualt. teſt. 87. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* C.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 45. 46.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 2.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 10.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 557.
Habitat in Oceano indico & americano, *teſta alba, ad* 1½ *pollicem longa, &* 1¾ *lata, fere æquilatera, coſtis circiter* 20 *validis ſpinoſo tuberculatis.*

Corbicula. 19. A. teſta ovata compreſſiuſcula: ſtriis perpendicularibus confertim nodulofis, natibus obtuſis approximatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 558.
β) *Liſt. Conch. t.* 234. *f.* 68.
Klein oſtr. t. 10. *f.* 43. 44.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 559.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *granoſæ affinis, teſta vix circiter lineas longa & pollicem lata,* β) *ſubgloboſa intus capillariter ſtriata.*

decuſſata. 20. A. teſta lenticulari decuſſatim ſubſtriata, rima clauſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 94.*
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 22.
Knorr Vergn. 5. *t.* 30. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57.
Habitat in Oceano americano, *teſta maculis fuſcis ſparſis varia, ſtriis tranſverſis nudo oculo vix conſpicuis, cardine leviter arcuato.*

æquilatera. 21. A. teſta lenticulari ſubæquilatera extrinſecus intuſque perpendiculariter ſtriata alba: maculis ſpadiceis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 562.
Habitat rarior in Oceano americano, *decuſſatæ affinis, et teſta tenuiore, natibus approximatis.*

pallens. 22. A. teſta lenticulari ſubobliqua decuſſatim ſtriata, rima anguſtiſſima. *Muſ. Lud. Ulr.* 519. *n.* 95.*
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 270. *t.* 9. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico & americano, *teſta æquilatera intus alba, exterius pallide interdum hinc inde obſcurius maculata & nebuloſa, ſtriis ſubtilibus, tranſverſis ſubtiliſſimis conſertiſſimis, natibus mediis conniventibus, cardine arcuato.*

Cucullus. 23. A. teſta ventricoſa decuſſatim ſtriata: vulva cordata; valvis intus coſta curvata violaceo-faſciata auctis, altera prominente, natibus remotis.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 15. 16.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 526-528.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta ultra 2 pollices longa, & ultra 3 lata, extrinſecus cinnamomea; utrum hujus, an ſequentis familiæ?*

magellanica. 24. A. teſta utrinque rotundata decuſſatim ſtriata ſpadicea: margine externo in medio inflexo repando, natibus approximatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 53. *f.* 539.
Habitat in freto magellanico.

reticulata. 25. A. teſta ſubrhomboidea decuſſatim ſtriata alba: natibus approximatis, vulva cordata.
Liſt. Conch. t. 233. *f.* 67.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 9.
Chemn. Conch. 7. *t.* 54. *f.* 540.
Habitat - - - arcæ Noæ affinis; utrum hujus, an ſequentis familiæ?

candida. 26. A. teſta pellucida rhomboidali anterius producta poſterius truncata decuſſatim ſtriata: natibus remotis, margine poſterius hiante; hiatu ovato ciliato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 542.
β) *Chemn. Conch.* 1. *t.* 55. *f.* 544.
Habitat in Oceano americano & *ad* Africæ littus occiden-

le, *teſta alba, quaſi granulata, epidermide villoſa ex atro ſubfuſca obducta.*

indica. 27. A. teſta inæquivalvi ovata: ſtriis planis longitudinalibus ſulciſque profundis, vulva cordata.
Liſt. Conch. t. 232. *f.* 66.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 13.
Chemn. Conch. 7. *t.* 55. *f.* 543.
β) *Mart. Beſch. Berl. Naturf.* 3, *t.* 6. *f.* 11.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 552.
Habitat in Oceano indico, *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, & 1¼ lata, alba, epidermide fuſca villoſa tecta.*

jamaicenſis. 28. A. teſta anterius truncata poſterius rotundata: coſtis perpendicularibus crenatis vel noduloſis.
Liſt. Conch. t. 229. *f.* 64.
Habitat ad Jamaicam, *utrum hujus, an ſequentis familiæ?*

campechienſis. 29. A. teſta ovata: ſtriis perpendicularibus latis crenatis aut ſquamoſis, cardine arcuata.
Liſt. Conch. t. 237. *f.* 71.
β) *Liſt. Conch. t.* 243. *f.* 74?
Habitat in ſinu Campechienſi, β) *apud* Börbados.

lata. 30. A. teſta latiuſcula cancellata anterius truncata: vulva cordata.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* C.
Habitat - - - teſta ventricoſa vix pollicem lata & dimidio breviore; utrum hujus, an ſequentis familiæ?

ſenegalenſis. 31. A. teſta ovata longitudinaliter ſulcata tranſverſim ſubrugoſa alba.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 6. Robet.
Habitat ad Africæ *littus occidentale, teſta* 8 *lineas longa, &* 10 *lata interdum ſubrubella, intus quoque ſulcata.*

†† *natibus inflexis.*

undata. 32. A. teſta lenticulari inaurita læviuſcula: margine plicato.
Bonann. recr. 2. *f.* 60. 61.
muſ. Kirch. 2. *f.* 58. 60.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* G.
Knorr Vergn. 6. *t.* 14. *f.* 4.
Martini Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 560.

Habitat in Oceano americano, *pectunculo affinis, teſta ad 2 pollices longa, & perinde lata æquivalvi, ſubtiliſſime & confertim tranſverſe ſtriata, fuſco maculata, intus alba, interdum quoque fuſco maculata, natibus approximatis, cardine arcuato.*

Pectunculus. 33. teſta lenticulari ſubaurita ſulcata: ſulcis ſubimbricatis, margine plicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 520. *n.* 96.*
Liſt. Conch. t. 239. *f.* 73.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 129.
Gualt. teſt. t. 72. *f.* H.
Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 4.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 568. 569.
Habitat rarior in Oceano americano & mari rubro, *teſta planiuſcula, ad 1½ pollicem longa, vix latiori, alba maculis ſparſis fuſcis interdum teſſellatis varia, intus fuſca, albo nonnunquam intermiſto, ſtriis 16-20, cardine arcuato.*

pectinata. 34. A. teſta lenticulari inaurita longitudinaliter ſtriata: ſtriis lævibus.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 570. *n.* 1. 2. & *f.* 571.
β) *Liſt. Conch. t.* 239. *f.* 81.
Klein oſtrac. t. 10. *f.* 41.
Habitat in Oceano americano, *pectunculo affinis, at teſta minore magis convexa, fuſca, ſpadicea, aut lutea punctata, maculata, nebuloſa, aut undulata, intus ſubfuſca aut alba.*

Glycymeris. 35. A. teſta ſuborbiculata gibba ſubſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 521. *n.* 97.
Liſt. Conch. t. 247. *f.* 82. Chama glycymeris.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 18. *f.* 10. Vovan.
Bellon. aq. 408.
Rondel. teſt. 31.
Gualt. teſt. t. 82 *f.* C. D.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 4. & 6. *t.* 14. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 564.
Habitat in mari mediterraneo, ad Africæ littus occidentale, *in* Oceano americano: *piloſa minor, magis lævis & plana, ſtriis tranſverſis oculo nudo vix conſpicuis, cardine arcuato, ſuperficie nunc cinerea, nunc ſpadicea, nunc rubra, nunc flava, nunc maculata, nunc nebuloſa, nunc undulata, nunc lineis angulatis notata.*

pilosa. 36. A. teſta ſuborbiculata æquilatera piloſa.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* A. Ponderoſa ſerico indumento.
Bonann. recr. 2. *f.* 80. Nux piloſa.
muſ. Kirch. 2. *f.* 79.
Liſt. Conch. t. 240. *f.* 77.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 6. & 6. *t.* 12. *f.* 4.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 565. 566.
β) *Bonann. recr.* 2. *f.* 78.
muſ. Kirch. 2. *f.* 77.
γ) *Liſt. Conch. t.* 246. *f.* 80?
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 1. a. b.
δ) *Bonann. muſ. Kirch.* 2. *f.* 131?
Habitat in mari mediterraneo, *in* Oceano aſiatico & americano, *teſta* 2½ *pollices longa* & 2¼ *lata fuſca, intus alba, interdum fuſco maculata, epidermide villoſa tecta, ſtriis perpendicularibus obliquis, intus quoque conſpicuis rugas tranſverſas decuſſantibus.*

nummaria. 37. A. teſta ſubrotunda lævi ſubaurita tranſverſim ſtriata.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta unguis magnitudine nitido glabra rufo undulata: ſtriis ſubtiliſſimis.*

Nucleus. 38. A. teſta oblique ovata læviuſcula: cardine triangulari.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* R.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 574. a. b.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *hinc inde etiam in* Europa *foſſilis, teſta avellanæ magnitudine, ſub epidermide olivacea alba intus argentea, ſubtrigona, ſtriis perpendicularibus ſubtiliſſimis, tranſverſis arcuatis paucis, ano ſubcordato.*

rhomboidea. 39. A. teſta tota alba rhomboideo cordata coſtata: coſtis anterioribus & dorſalibus noduloſis, natibus remotis.
Liſt. Conch. t. 244. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 87. *f.* A.
Knorr. Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 56. *f.* 553. a. b.
Habitat in Oceano indico & americano, *vulva cordata, ano rhomboidali.*

marmorata. 40. A. teſta æquilatera tenui planiuſcula ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, natibus approximatis, cardine arcuato.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 563.

Habitat in Oceano americano, *teſta alba, characteribus maculiſque flavicantibus varia.*

anguloſa. 41. A. teſta ventricoſa longitudinaliter ſtriata & lineata altero latere angulata, natibus approximatis, cardine arcuato. *Liſt. Conch. t.* 245. *f.* 76.
Chemn. Conch. 7. *t.* 57. *f.* 567.
Habitat ad littus Africæ occidentale *& in* Oceano americano, *teſta fuſca, aliter atque aliter maculata.*

Scapha. 42. A. teſta oblonga maxime depreſſa ſtriata: natibus vix prominulis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 7.
Habitat ad inſulam Zeylon.

313. OSTREA. *Animal* Tethys.
Teſta bivalvis (plurimis) inæquivalvis, ſubaurita.
Cardo edentulus foſſula cava ovata, ſulciſque (in plurimis) lateralibus tranſverſis.
Vulva anuſve nullus.

* *valvis auriculatis radiatis*, Pectines.
† *æquilateres, auriculis æqualibus.*

maxima. 1. O. teſtæ radiis rotundatis longitudinaliter ſtriatis. *Fn. ſuec.* 2148. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 98. *Müll. zool. dan. prodr.* 2989.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 29. Pecten maximus.
Conch. t. 263. *f.* 1. *& t.* 167. *f.* 4.
Bonann. recr. 2. *f.* 8.
muſ. Kirch. 2. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 98. *f.* A. B. *t.* 99. *f.* A.
Knorr Vergn. 1. *t.* 14. *f.* 1. 2. *&* 2. *t.* 14. *f.* 1. *& t.* 17. *f.* 1. 3?
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 19. *& t.* 7. *f.* 3.
Bytem. app. t. 12. *f.* 50.
Chemn. Conch. 7. *t.* 60. *f.* 585 – 587.
β) *Liſt. Conch. t.* 168. a.
γ) *Knorr del. nat. ſel. t.* B. II. *f.* 2?
Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 2?

Habitat in omni fere mari europæo, *teſta 5 circiter pollic. longa, 5½ lata, auriculis magnis decuſſatim ſtriatis, cardinis foſſula ampla profunda, valva inferiore convexa alba, ſæpius faſciis maculiſve rubris varia, ſuperiore plana rubra, radiis circiter* 14.

jacobæa. 2. O. teſtæ radiis quatuordecim angulatis longitudinaliter ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 522. *n.* 99.*

Liſt. Conch. t. 165. *f.* 2. *t.* 166. *f.* 3.

Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 3. 4.

Gualt. teſt. t. 99. *f.* B.

Leſſer teſtaceoth. f. 139.

Knorr Vergn. 2. *t.* 22. *f.* 3. 5. *t.* 28. *f.* 4. & 6. *t.* 38. *f.* 1.

Chemn. Conch. 7. *t.* 60. *f.* 588. 589.

Habitat frequens in mari mediterraneo, *maximæ affinis, teſtæ ſulcis tranſverſim ſtriatis, valvæ ſuperioris planæ radiis rotundatis, non longitudinaliter, ſed tranſverſim ſtriatis, auriculis læviſſimis.*

Ziczac. 3. O. teſtæ radiis octodecim explanatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 5.. *n.* 100.*

Liſt. Conch. t. 168. *f.* 5.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 53.

Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 3. & *t.* 20. *f.* 1.

Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 590 - 592.

Habitat in Oceano americano, *teſta nunc unicolore, nunc variegata, auriculis ſubtiliter rugoſis, valvæ inferioris convexæ radiis* 18 - 20 & *ultra ſubtiliſſime tranſverſim ſtriatis, intus ſtriis perpendicularibus duplo pluribus, in valva ſuperiore plana lineis angularibus picta radiorum numero duplo majore.*

ſtriatula. 4. O. teſtæ radiis ſedecim obliteratis tranſverſe membranaceo ſtriatis, margine integerrimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 5.. *n.* 101.*

Habitat in Oceano indico, *mediæ magnitudinis, teſta purpureo alboque varia intus flaveſcente: radiorum interſtitiis albis, valva inferiore vix magis convexa quam ſuperior.*

Oſtreæ *multæ ad cardinem interius ſulcis tranſverſis numeroſis parallelis in utraque valva oppoſitis gaudent, probe diſtinguendæ ab arcis polyleptoginglymis, quarum dentes numeroſi a terna..m intrant alterius ſinus.* Pectines *exſiliunt ex aqua, aquam in dimidiam ulnæ longitudinem exſpuere valent, vaſculoque aperto minus profundo retenti circumjacentia guttulis aquæ inquinant, aquæ immiſſi demerſi mox valvas aperiunt, eaſdemque ſæpius rapide et cum ſonitu claudunt.*

minuta. 5. O. teſtæ radiis viginti convexis. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 102. *

Habitat in Oceano indico, avellanæ magnitudine, teſta inferiore alba valde convexa, ſuperiore alba fuſco nebuloſa planiore plicata.

Pleuronectes. 6. O. teſta æquivalvi: radiis duodecim duplicatis, extus lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 524. *n.* 103.*

Rumpf muſ. t. 45. *f.* A. B. Amuſium.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* G. Umbella ſ. Solea.
Bonann. recr. 3. *f.* 354.
muſ. Kirch. 2. *f.* 108.
Petiv. amb. aq. t. 17 *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* B.
Klein. oſtr. t. 9. *f.* 30.
Leſſer teſtaceoth. f. 89.
Knorr Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 595.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 21. *f.* 6.

Habitat in Oceano indico, *teſta nunc rubella, nunc carnea, nunc hepatica, in* β) *aurantia rubro radiata, intus argentea, ad* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa, utrinque hiante.*

Laurentii. 7. O. valva ſuperiore ſubconvexa lævi: lineis perpendicularibus tenerrimis ſtrias ſubtiliſſimas tranſverſas concentricas ſecantibus, inferioris radiis viginti quatuor, intus ſtriis quadraginta octo.

Chemn. Conch. 7. *t.* 61. *f.* 593.

Habitat rariſſima ad Americæ auſtralis *littore, teſta* 2 *pollices* 8 *lineas longa, & perinde lata, valva ſuperiore ſpadicea radiis albis maculiſque albidis varia, inferiore alba flavicante obumbrata: radiis paulo obſcurioribus.*

japonica. 8. O. teſta æquivalvi convexiuſcula flavo marginata: valvæ ſuperioris lineis obſoletis faſcias tranſverſas concentricas decuſſantibus: ſtriis intus elevatis quadraginta octo.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 596.

Habitat rarior ad Guineæ & Japoniæ *littora, pleuronecti affinis, at teſta craſſiore, auriculis ſubtiliter rugoſis, & infra nodo auctis, valva inferiore ochroleuca glaberrima, teſta ad* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa & lata.*

magellanica. 9. O. teſta ſubæquivalvi glabra: ſtriis oblongis confertis.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 597.

Habitat in freto magellanico; *pleuronecti affinis, teſta lateritia non radiata intus glaberrima, valva ſuperiore*

magis convexa, inferiore magis plana, quam in affi-nibus, auriculis tranſverſim ſtriatis.

hybrida. 10. O. teſtæ radiis novem aut decem: interſtitiis longitudinaliter ſtriatis, margine intus repando.
Liſt. Conch: t. 173. *f.* 10.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 31.
Chemn. Conch. 7. *t.* 63. *f.* 601. 602.
Habitat in mari norwegico, *teſta tenui: valva inferiore alba, ſuperiore ſanguinea, venis lineiſque angularibus picta.*

Radula. 11. O. teſta ſubæquivalvi: radiis duodecim convexis; ſtriis decuſſatis crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 105.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* A. Radula.
Liſt. Conch. t. 174. *f.* 11? *t.* 175. *f.* 12.
Pet. amb. aq. t. 17. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* D.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 63. *f.* 599. 600.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta oblonga* 3¼ *pollices longa,* 3¾ *lata, alba, vel albo fuſcoque varia, ſursum complanata, ut tamen valva inferior magis convexa ſit, auriculis rugoſis ſtriis obliquis axaratis.*

imbricata. 12. O. teſta ſubæquivalvi planiuſcula radiis novem inæqualibus imbricatim ſquamoſis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 69. *f.* G.
Habitat in mari rubro, *radulæ affinis, teſta albida purpureo maculata ad marginem pauliſper crenata, radiis alternatim majoribus.*

ſubrotunda. 13. O. teſta ſubrotunda: radiis octo convexis ſpadiceis, auriculis ſubrotundis albis: limbo luteo.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 4.
Habitat - - - - teſta excolore, 1¾ *pollicis longa,* 2 *lata.*

Plica. 14. O. teſta ſubæquivalvi: radiis ſex convexis læviuſculis, decuſſatim ſtriata. *Muſ. Lud Ulr.* 526. *n.* 106.*
Rumpf muſ. t. 44. *f.* O. Pallium maculatum.
Liſt. Conch. t. 171. *f.* 8.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 9. 10.
Petiv. amb. aq. t. 2. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* C. C.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* C.

Chemn. Conch. 7. *t.* 62. *f.* 598. a. b.
β) *Gualt. teſt. t.* 73. *f.* E?
Habitat rara in India, *teſta alba, aut alba fuſco maculata, aut rubra albo maculata* $1\frac{1}{4}$ *pollicis circiter longa*, 1 *lata, ſtriis tranſverſis rarioribus margine repando.*

crenata. 15. O. teſta ſubrotunda: radiis convexis; exterioribus ſecundum longitudinem ſubtiliter ſtriatis, margine profunde crenato.
Liſt. Conch. t. 170. *f.* 7.
Habitat — — — auriculis tranſverſe ſtriatis.

ſinuoſa. 16. O. teſta ovata creberrime & ſubtiliſſime ſtriata: margine intus crenato.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 31.
Conch. t. 172. *f.* 9.
Habitat in mari britannico, *teſta crocea variegata.*

ſquamoſa. 17. O. teſta oblonga: radiis ſquamoſis; interſtitiis latioribus perpendiculariter ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 184. *f.* 21.
Habitat — — — teſta lineis angulatis maculiſque varia: auriculis perpendiculariter rugoſis.

dubia. 18. O. teſta ſubrotunda: radiis octodecim imbricato ſquamoſis.
Liſt. Conch. t. 192. *f.* 29.
Habitat — — — teſta ultra $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, auriculis tranſverſim ſtriatis.*

elegans. 19. O. teſtæ radiis vinginti lævibus: interſtitiis tranſverſim ſtriatis, margine repando.
Liſt. an. angl. t. 5. *f.* 30.
Habitat ad Britanniæ magnæ *littora, teſta* 2 *circiter pollices longa pauliſper latiore, rubente albo maculata, auriculis tranſverſim ſtriatis.*

verſicolor. 20. O. teſta complanata: radiis octodecim lævibus; interſtitiis cancellatis.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 6.
Habitat — — — teſta lutea, alba, thalaſſina, nigricante aut ſanguinea: auriculis tranſverſim ſtriatis.

ſolea. 21. O. teſta ſubrotunda: radiis quinque.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 16.
Habitat — — — mediæ magnitudinis, teſta roſea radiis albis, aut viridi, ſubflavo lurido & porraceo miſta, radiis lividis.

fuſca. 22. O. teſta fuſca : radiis planis verſus cardinem evaneſcen-
tibus.
Bonann. recr. 2. *f.* 87.
muſ. Kirch. 2. *f.* 86.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 35.
Habitat in mari indico, *teſta intus candida ; valva infe-
riore convexa, ſuperiore plana.*

tenuis. 23. O. teſta tenui plana purpurea : ſtriis minutiſſimis perpen-
dicularibus circulares decuſſantibus, intus elevatis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* C.
Habitat - - - mediæ magnitudinis.

lutea. 24. O. teſta tenui lutea : radiis craſſis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* D.
β) *Regenſ. Conch.* I. *t.* 7. *f.* 4. 5?
Habitat - - - mediæ magnitudinis.

muricata. 25. O. teſta ſubrotunda ex albo crocea : radiis convexis ſub-
tiliſſime & acutiſſime muricatis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* I.
Habitat - - - teſta 2½ *pollices longa.*

conſperſa. 26. O. teſta ſubrotunda ſpadicea albo nigroque punctata:
radiis craſſis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* O.
Habitat - - - teſta puſilla.

nodulosa. 27. O. teſta ſubrotunda fuſca : lineis tranſverſis punctiſque
nigris, radiis convexis nodoſis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* P.
Habitat - - - mediæ magnitudinis.

radiata. 28. O. teſta tenui albido roſea albo virgata : radiis convexis.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* Q.
Habitat - - - noduloſa paulo major.

punctata. 28. O. teſta oblonga lutea albo maculata : natibus albo fuſco-
que variis, radiis crenatis.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* G.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa : auriculis cancellatis.

aculeata. 30. O. teſta tenui roſeo albidoque varia ſubrotunda : radiis
craſſis ſquamoſo-aculeatis.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* H.
Habitat - - - punctatæ magnitudine.

plana. 31. O. teſta complanata tenui candida : cardine croceo, radiis
rotundis latis.

Gualt. teſt. t. 74. *f.* I.
Habitat - - - -

puſilla. 32. O. teſta oblonga rubra minutiſſime ſtriata.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* AA.
Habitat - - -

flaveſcens. 33. O. teſta utrinque convexiuſcula intus flavicante: radiis convexis.
Regenſ. Conch. I. *t.* I. *f.* 8.
Habitat - - - *teſta exigua.*

Flabellum. 34. O. teſta ſubrotunda ruberrima: cardine maculiſque nonnullis albis, radiis lævibus.
Regenſ. Conch. I. *t.* 9. *f.* 33.
Habitat - - - *mediæ magnitudinis.*

ſpondylodes. 35. O. teſta glabra rubra.
Regenſ. Conch. I. *t.* 9. *f.* 34.
Habitat - - - *ſpondylo affinis, at auriculis æqualibus.*

violacea. 36. O. teſta utrinque planiuſcula exterius fuſca intus violacea.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 52.
Habitat in mari mediterraneo, *diametri pollicaris.*

aurantia. 37. O. teſta ſubrotunda plicata ſubtiliter ſecundum longitudinem ſtriata: faſcia verſus cardinem ſemicirculari alba.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 56.
Habitat - - -

vittata. 38. O. teſta intus purpurea, extrinſecus faſciis fuſcis rubriſque alternis varia: radiis convexis.
Regenſ. Conch. I. *t.* II. *f.* 59.
Habitat - - - *inter minores.*

miniata. 39. O. teſta alba maculis rubris confluentibus varia: radiis aſperis, valvæ convexioris lamellis tranſverſis criſpis.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* I.
Habitat - - - *teſta* I *pollicem* 6 *lineas longa, &* I. *p.* 4. *l. lata.*

inflata. 70. O. teſta utrinque convexa clauſa oblonga pellucida; radiis 32.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 649. b.
Habitat rariſſima - - - *teſta ochroleuca tenui duplo longiori quam lata.*

†† *auriculis inæqualibus : altera ſæpius in-*
ciliato ſpinoſa.

Pallium. 40. O. teſta æquivalvi : radiis duodecim convexis, ſtriatis, ſcabra ſquamis imbricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 526. *n.* 10.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* B. Pecten ſecundus.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* I. Pallium ducale.
Liſt. Conch. t. 187. *f.* 25?
Valent. Abh. t. 16. *f.* 26.
Petiv. amb. aq. t. 17. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 8-12.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 59.
Knorr Vergn. 2. *t.* 5. *t.* 21. *f.* 2. & *t.* 27. *f.* 2.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 607.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 87. *f.* 17?
γ) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat in India, *teſta ſolida, rubro, albo fuſcoque vari-*
auriculis ſtriatis, crenatis aut ſquamoſis : altera la-
giore, margine teſtæ denticulato.

ſanguino-lenta. 41. O. teſta æquivalvi : radiis novem craſſis obtuſis : in-terſtitiis longitudinaliter ſtriatis nodoſis & aculeatis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 64. *f.* 608.
Habitat in mari rubro, *pallio affinis, teſta alba ſanguine-*
maculata : margine plicato crenato ; limbo purpu-
raſcente, auricularum ſtriis tranſverſis noduloſis.

maculoſa. 42. O. teſta æquivalvi lutea ſpadiceo maculata : radiis duo-decim craſſis, planiuſculis, auriculis albis lateritio variis, coſtis tranſverſis ſquamoſis.
Knorr Vergn. 2. *t.* 19. *f.* 5.
Habitat - - -

nodoſa. 43. O. teſtæ radiis novem nodoſo-veſicularibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 527. *n.* 108.*
Rondel. teſt. 25. Concha corallina.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* F. Pecten corallinus.
Liſt. Conch. t. 186. *f.* 24.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 138.
Rumpf muſ. t. 48. *f.* 7. 8.
Gualt. teſt. t. 99. *f.* C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 1-5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 38.

Knorr delic. t. B. II. f. 5.
Vergn. 1. t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5.
Spengler Beſch. berl. Naturf. Fr. 2. t. 13. f. 1. 2.
Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 609-611.
β) *Knorr Vergn. 2. t. 21. f. 5?*
γ) *Knorr Vergn. 3. t. 24. f. 1. & t. 25. f. 1?*
Habitat in Oceano africano & americano, *teſta nunc rubra, nunc kermeſina, nunc rubro alboque, nunc ſpadiceo alboque varia flavedine intermiſta, teſta ſuperiore magis convexa, quam inferiore: auricula intus & ſubtus ſpinoſa.*

Pes felis. 44. O. teſta radiis novem ſtriatis ſcabris: auricula altera minuta. *Muſ. Lud. Ulr. 527. n. 109.**
Bonann. recr. 2. f. 7.
muſ. Kirch. 2. f. 8.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. f. 2.
Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 612. & t. 65. f. 613.
Habitat ad Africæ *littora, teſta parva, tenui, pellucida, utplurimum ſubincarnata maculata & venoſa, intus glabra, alba, radiis ſubundulatis, marginis plicis crenatis, auricularum ſtriis tranſverſis nodoſis.*

pellucens. 45. O. teſta ſubæquivalvi: radiis novem, lævi: fornice ſquamis cochleari-hemiſphæricis. *Muſ. Lud. Ulr. 528. n. 110.**
β) *Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 625-627?*
Habitat in mari africano, *teſta ovata minuta, pellucida, glabra, alba: valva ſuperiore rubro maculata.*

obliterata. 46. O. teſta extus lævi: radiis viginti quatuor duplicatis. *Muſ. Lud. Ulr. 525. n. 104.**
Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 622-624.
Habitat rara in Oceano indico, *pleuronecti affinis, at teſta minore, ſubtiliſſime decuſſatim ſtriata, teſta inferiore dilute rubente, ad cardinem ſubflaveſcente, ſuperiore obſcure rubra, aut ſubſpadicea.*

ſanguinea. 47. O. teſta æquivalvi: radiis viginti duobus ſcabris, ſemiaurita. *Muſ. Lud. Ulr. 528. n. 111.**
Liſt. Conch. t. 185. f. 22.
Gualt. teſt. t. 74. f. M?
Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 628.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta ſubrotunda planiuſcula ſanguinea, ſpadicea, aut*

kermeſina, ad 2 pollices longa, & 1¼ lata, radiorum interſtitiis perpendiculariter ſtriatis.

varia. 48. O. teſta æquivalvi: radiis triginta ſcabris compreſſis echinatis, uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 529. *n.* 112.*
Liſt. Conch. t. 178. *f.* 15.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* G. N. & *t.* 74. *f.* R.
Argenv. Conch. t. 24. *f.* H.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 3. 5. *t.* 11. *f.* 3. & *t.* 12. *f.* 5. 6. *t.* 16. *f.* 2.
Chemn. Conch. 7. *t.* 66. *f.* 633. 634.
Habitat in mari mediterraneo, *ſanguineæ affinis, at teſta colore magis varia, magis convexa, utrinque aculeata, margine magis crenata, radiis pluribus magis convexis: interſtitiis profundioribus non ſtriatis, auricula altera minima duplici aculeorum ordine armata, altera rugoſo plicata, ſubtus 5-7 aculeis armata.*

Puſio. 49. O. teſta æquivalvi: radiis quadraginta filiformibus uniaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 529. *n.* 113.*
Liſt. Conch. t. 181. *f.* 18. & *t.* 189. *f.* 23.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 15.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 2. & 5. *t.* 13. *f.* 2. & *t.* 28. *f.* 3.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 635. 636.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta avellanæ utplurimum magnitudine, interdum duplo majore, paulo longiore, quam lata, nunc hyalina maculis rubentibus, nunc crocea rubrave maculis albis varia, auricula altera vix conſpicua, altera infra crenam acute ſpinoſa.*

glabra. 50. O. teſta æquivalvi: radiis decem lævibus planiuſculis, internis ſtriis elevatis duplicatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 330. *n.* 114.*
Bonann. muſ. Kirch. & recr. 2. *f.* 11-13.
Gualt. teſt. t. 73. *f.* H. & *t.* 74. *f.* A-D. F. Z.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 29.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 16.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 10. *t.* 3. *f.* 30. 31. *t.* 8. *f.* 15? *t.* 9. *f.* 28. & *t.* 11. *f.* 60.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 5. 2. *t.* 10. *f.* 2. & *t.* 18. *f.* 5. 6. 5. *t.* 9. *f.* 2. & *t.* 10. *f.* 5. 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 4.
Chemn. Conch. 7. *t.* 67. *f.* 638-645.

Habitat in ſinu adriatico, mari mediterraneo, & *ad* Guineam, *teſta ſubrotunda 2 pollices longa & lata, rubra, flava, vel fuſca, rarius unicolore, quam maculata aut nebuloſa, interdum alba: valva ſuperiore fuſco maculata, ſulcis nonnunquam lineatis, auriculis æqualibus, margine repando.*

opercula. 51. O. teſta radiis viginti ſubrotunda decuſſatim ſtriato-ſcabra, operculo convexiore. *Muſ. Lud. Ulr. n.* 530. *n.* 115.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2997.
Liſt. Conch. t. 190. *f.* 27. & *t.* 191. *f.* 28.
Seba muſ. 3. *t.* 87. *f.* 15.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 2? 3?
Chemn. Conch. 6. *t.* 67. *f.* 646.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 317. *t.* 9. *f.* 3.
n. Litterat. 3. *p.* 304.
β) Pecten (vigintiſulcatus) teſta æquivalvi intus & extus ſulcata fulva, maculis raris rufis, interſtitiis rugoſis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2996?
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 28. *f.* 4?
Habitat in mari adriatico & ſeptentrionali, *teſta hiante utplurimum variegata, in* γ) *auroræ in modum tincta, ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa, &* $2\frac{1}{2}$ *lata, radiis acutis, interdum rotundatis, margine repando, intus dentato, auriculis decuſſatim ſtriato-rugoſis, longiore emarginata, & ſub inciſura ſpinoſa.*

gibba. 52. O. teſta æquivalvi: radiis viginti glabris, gibba. *Muſ. Lud. Ulr.* 531. *n.* 116.*
Gualt. teſt. t. 73. *f.* F.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 11. *t.* 2. *f.* 16. 17. *t.* 5. *f.* 51. & *t.* 11. *f.* 51.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 2. 2. *t.* 5. *f.* 4. & *t.* 17. *f.* 2. & 5. *t.* 13. *f.* 9.
Brown jam. t. 40. *f.* 10.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 619. 620.
β) *Liſt. Conch. t.* 182. *f.* 19.
Habitat in mari atlantico & americano, *teſta utrinque convexa rubra, rarius unicolore, quam albo maculata, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſime crenatis notata, margine crenato, auriculis æqualibus.*

ſulcata. 53. O. teſta alba carneo-maculata: radiis glabris, fornicis 32, operculis 28.

v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. f. 5. 6.
Chemn. Conch. 7. t. 63. f. 603. 604.
Habitat ad Malabariæ *littus, teſta circiter* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa & paulo latiore, margine plicato crenato, fornicis auricula emarginata ſpinoſa, operculo complanato.*

hiſtrionica. 54. O. teſta tenui complanata pellucida ſubtiliter tranſverſim rugoſa: radiis undecim.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. f. 14.
Knorr Vergn. 4. t. 12. f. 3.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 97. vign. f. 6. & t. 6? f. 3.
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 614.
Habitat - - - teſta albo-rubro-& nigro maculata, radiis undatis, auriculis ſubæqualibus.

Islandica. 55. O. teſta orbiculari: circulis purpureis, radiis centum. *Müll. zool. dan. prodr. 2990.*
Fabr. Fn. groenl. p. 415. n. 416. Pecten teſta ſuborbiculari aurita: radiis plano-convexis ſulcatis numeroſiſſimis alternis minoribus integris, interne crocea.
It. wgoth. t. 5. f. 7.
Liſt. Conch. t. 1057. f. 4.
Gualt. teſt. t. 73. f. R.
Seb. muſ. 3. t. 87. f. 7.
Knorr delic. t. B. II. f. 3. 4.
Vergn. 1. t. 4. f. 1. & t. 5. f. 2. & 5. t. 15. f. 1.
Spengler Schr. berl. naturf. Geſ. 1. t. 5. f. 5.
Chemn. Conch. 7. t. 65. f. 615. 616.
Habitat in mari ſeptentrionali *varietate innumera, teſta ad* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa &* $3\frac{1}{4}$ *lata, vix hiante, rarius exalbida, quam vivaciſſima rubedine aut flavedine tincta faſciiſque tranſverſis ſemilunaribus ornata, operculo utplurimum elegantiore, radiis 50-100 ſquamis acutis imbricatis aſperis, margine crenato, auriculis ſtriis tranſverſis ſquamoſis notatis, majore emarginata ſpinoſa. Vermis incola edulis.*

striradiata. 56. O. teſta ſub æquivalvi glabra immaculata: ſtriis minutiſſimis. *Müll. zool. dan. 2. t. 60. f. 1. 2. rar. 2. p. 57. prodr. 2991.*
Habitat paſſim in variis Norwegiæ ſinuum *fucis, teſta rubra maculis parvis albis varia, intus rubente, radiis in operculo tribus: incolæ ovario flavicante.*

fuſi-ci. 57. O. teſta ſubæquivalvi ſtriata maculata marginem verſus ſcabra.
Müll. zool. dan. 2. *t.* 60. *f.* 3-5. *rar.* 2. *p.* 58. *prodr.* 2994. Pecten ſtriatus.
Habitat in fuco ſaccharino, *teſta rufa albidis candidiſve maculis varia, intus rubra glaberrima: maculis pellucentibus operculi radiis exſoletis, incolæ ovario ſplendide rubro.*

tigerina. 58. O. teſta ſubæquivalvi ſtriata glabra rubra: maculis albidis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 60. *f.* 6-8. *rar.* 2. *p.* 59. *prodr.* 2993.
Habitat in Oceani ſeptentrionalis fucis, *rarior, fornice profundius ſulcata, maculiſque magnis undulatis confluentibus pallide luteis varia, operculo guttato, incolæ ovario albo.*

ſeptemradiata. 59. O. teſta ſubæquivalvi ſtriata glabra: radiis convexis ſeptem. *Müll. zool. dan. prodr.* 2992.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

arata. 60. O. teſta ſubæquivalvi intus & exterius ſulcata rubea, hinc ſcabra, illinc glabra. *Müll. zool. dan. prodr.* 2995.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

ſenatoria. 61. O. teſta utrinque convexa: radiis 22 rotundatis tranſverſe rugoſis; interſtitiis longitudinaliter granulatim ſtriatis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 36?
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 617.
Habitat in Oceano indico, *teſta 2 pollices 9 lineas longa, & pene perinde lata, extrinſecus violaceo alboque varia, intus violacea, ad ambitum obſcure badia.*

citrina. 62. O. teſta aurantia: radiis 22 rotundatis, margine plicato, fornice planiore.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 1.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 618.
Habitat in india, *radiis nonnullis ſquamoſis ſulciſque quibuſdam granulato-lineatis.*

turgida. 63. O. teſta æquabiliter convexa: radiis 20 glabris; interſtitiis confertim tranſverſe rugoſis, margine plicato-dentato.
Liſt. Conch. t. 169. *f.* 6.
Chemn. Conch. 7. *t.* 65. *f.* 621. a. b.
Habitat rarior in Oceano indico & americano, *auriculis minimis, fornice alba, operculo ex flavicante, fuſco, albo*

& cinereo varia, forſan ad tertiam pectinum familiam relegandа.

ſulphurea. 64. O. teſta complanata tenui pellucida ſtriata: radiis plurimis fornicato-imbricatis, margine plicato-crenato.
Seb. muſ. 3. t. 97. f. 13. 18.
Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 629.
β) Pecten aurantius. *Seb. muſ. 3. t. 87. f. 14.*
Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 630. 631.
Habitat in mari rubro, *teſta ſulphurea fragili 2 circiter pollices longa, & paulo anguſtiore, fornicis radiis æqualibus, operculi alternatim minoribus; β) teſta aurantia, interdum ſanguinea; cardine aurantio, faſciaque ſemilunari alba, aut albo & dilute ſpadiceo varia, limbo ſanguineo.*

porphyrea. 65. O. teſta convexa purpurea intus alba aut ſanguinea: radiis 25 craſſis rotundatis ſquamoſis.
Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 632.
Habitat in mari rubro, *teſta 2 pollices & 3 lineas longa, æque lata, maculis nonnullis albis varia.*

vitrea. 66. O. teſta hyalina margine acuta: radiis tenuiſſimis ſquamularum arcubus concentricis.
Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 637. a.
β) *Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 637. b. c.*
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *inter fucos & zoophyta, lentis utplurimum magnitudine, teſta levi fragili alba, β) albo rubroque varia, auricula altera emarginata ſpinoſa.*

tranquebaria. 67. O. teſtæ radiis viginti rotundatis: interſtitiis ſubtiliter rugoſis, margine repando.
Liſt. Conch t. 179. f. 16.
Gualt. teſt. t. 73. f. L. M.
Knorr Vergn. 2. t. 4. f. 2. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 2.
Chemn. Conch. 6. t. 67. f. 647. 648.
Habitat copioſiſſima ad Tranquebar, *teſta nunc unicolore, ſæpius aurantia, nunc maculis undulatis fuſcis rubris, rubellis, cinereiſve varia, operculo magis convexa.*

ſauciata. 68. O. teſta alba purpureo maculata: radiis plurimis inæqualibus, margine crenato.
Chemn. Conch. 7. t. 69. f. H.
Habitat in mari rubro.

crenulata. 69. O. teſta oblonga: radiis ſtriiſque undulatis, faſciis transverſis interruptis, margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 175. f. 12. a.
Habitat - - - exigua.

innominata. 70. O teſta ſubrotunda maculata: ſulcis profundis ſubtiliter tranſverſim ſtriatis, margine crenato.
Liſt. Conch. t. 175. f. 12. b.
Habitat - - - crenulata paulo major, auricula altera vix conſpicua.

ſubruſa. 71. O. teſta ſubrotunda ſubruſa: radiis viginti quatuor, auriculis decuſſatim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 180. *f.* 17.
Habitat - - - mediæ magnitudinis.

ſquamata. 72. O. teſta ſubrotunda: radiis craſſis parallele ſquamoſis ad latera aculeatis.
Liſt. Conch. t. 183. *f.* 20.
Habitat - - - teſta convexa maculata.

anonyma. 73. O. teſta oblongiuſcula: radiis anguſtis ſquamoſis, interſtitiis latioribus perpendiculariter ſtriatis, auriculis perpendiculariter rugoſis.
Liſt. Conch. t. 184. *f.* 21.
Habitat - - - teſta lineis angularibus maculiſque varia.

decemradiata. 74. O. teſta complanata: radiis decem lævibus explanatis inæqualibus, auriculis tranſverſim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 188. *f.* 26.
Habitat - - -

tenuis. 75. O. teſta tenui: radiis depreſſis ſquamoſis, auriculis brevibus.
Rumpf muſ. t. 44. *f.* C.
β) *Regenſ. Conch. t.* 10. *f.* 45.
Habitat in India, *teſta nunc badia, nunc cinerea nigro maculata,* (*etiam in* mari ſeptentrionali) *nunc alba, nunc miniata, nunc citrina.*

Valentini. 76. O. teſtæ radiis viginti, faſciis tranſverſis ſemilunaribus.
Valent. Abh. t. 13. *f.* 2.
Habitat in India, *maximæ affinis, teſta rubra, at auriculis inæqualibus.*

media. 77. O. teſta oblongiuſcula: radiis confertis.
Gualt. teſt. t. 74. f. N. O.
Habitat - - - teſta mediæ magnitudinis ex rubro croceo vel ex piceo nigricante.

crocea. 78. O. teſta crocea: radiis ſquamoſo-muricatis alternatim minoribus.
Gualt. teſt. t. 74. f. P.
Habitat - - - parva.

florida. 79. O. teſta ſubrotunda alba: maculis roſeis.
Gualt. teſt. t. 74. f. Q.
Habitat - - - teſta parva radiata, an diſtincta ſpecies?

ochroleuca. 80. O. teſta oblongiuſcula ochroleuca: radiis altera parte lævibus, altera granulatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. S.
Habitat - - - puſilla.

muſtelina. 81. O. teſta muſtelina: maculis faſciiſque flavis, radiis lævibus, auriculis tranſverſim ſtriatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. T.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa & perinde lata.*

flammea. 82. O. teſta crocea oblongiuſcula ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata.
Gualt. teſt. t. 74. f. V.
Habitat - - - exilis.

incarnata. 83. O. teſta oblongiuſcula incarnata: faſciis rubris interruptis, radiis explanatis.
Gualt. teſt. t. 74. f. X.
Habitat - - - parva.

guttata. 84. O. teſta ſubrotunda flaveſcente rubro punctata: radiis ad cardinem inæqualiter convergentibus.
Gualt. teſt. t. 74. f. B. B.
Habitat - - - parva.

depreſſa. 85. O. teſta ochroleuca: radiis explanatis bifidis.
Gualt. teſt. t. 74. f. DD.
Habitat - - - teſta pollicem longa, & paulo latiore.

Cuinam familiæ adſcribendæ, ſi quidem diſtinctæ ſint, ſpecies ab Argenville Conch. t. 24. f. A. *& t. 29. f.* 19. a. *& zoomorph. t. 6. f.* A. *delineatæ?*

regia. 86 O. teſta ſubrotunda ruberrima : radiis rotundatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 87. *f.* 6.
Habitat - - - pallio affinis, at auricula fornicis profunde emarginata.

palliata. 87. O. teſta æquivalvi : radiis numeroſis lævibus.
Knorr Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat - - - pallio affinis, at teſta minus ſcabra, rarius radiata, ſtraminea : faſciis purpureis undulatis.

ſeminuda. 88. O. teſta aurantia oblonga ad medium uſque ſquamoſo-muricata : radiis viginti duobus.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{4}$ *lata, auriculis ſubtiliter ſquamoſis.*

modeſta. 89. O. teſta ſubrotunda cana : maculis ſubfuſcis rubellis & cæruleſcentibus, radiorum interſtitiis latis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 55.
Habitat - - - faſciis ad cardinem 2 filiformibus.

principalis. 90. O. teſta purpurea margine fuſca : radiis ſquamoſis a medio ad cardinem lævibus.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 63.
Habitat - - - pallio affinis.

verſicolor. 91. O. teſta variegata : radiis pectinatis lævibus.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 64.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, variæ affinis.*

††† *valvis altero latere magis gibbis.*

flavicans. 92. O. teſta ſubæquivalvi : radiis octo ſtriatis, margine altero rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 531. *n.* 117.*
Habitat in Oceano *magis* auſtrali, *teſta quaſi obliqua, alba fuſco rubroque varia, intus alba : radiis flavis, auricula altera breviſſima.*

faſciata. 93. O. teſta æquivalvi : radiis viginti ſcabris ; interſtitiis ſtriatis ; auriculis æqualibus exoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 532. *n.* 118.*
Liſt. Conch. t. 177. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* E E. *t.* 88. *f.* F F. G.
Habitat in mari atlantico & americano, *teſta alba pellucida; utrinque hiante intus ſubtiliter ſtriata : margine crenato.*

fragilis. 94. O. teſta æquivalvi: radiis viginti quinque, margine integerrimo, auriculis acutis.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 650.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *faſciatæ affinis, at teſta planiore: radiis pluribus, fragili, tenui,* $1\frac{1}{4}$ *pollices longa, & dimidio anguſtiori diſtincta.*

Lima. 95. O. teſta æquivalvi: radiis viginti duobus imbricatis: ſquamis altero margine rotundato, auriculis obliteratis.
Muſ. Lud. Ulr. 532. *n.* 119.*
Argenv. Conch. t. 24. *f.* E. Lima.
Bonann. recr. 2. *f.* 71.
muſ. Kirch. 2. *f.* 69.
Rumpf muſ. 44. *f.* D.
Petiv. amb. aq. t. 8. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 88. *f.* F.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 35.
Knorr Vergn. 6. *t.* 34. *f.* 3.
Chemn. Conch. 6. *t.* 68. *f.* 651.
β) *Gualt. teſt. t.* 88. *f.* E?
Habitat in mari mediterraneo, rubro, indico, *teſta alba ad 3 pollices longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata ſatis plana, radiorum numero incerto: ſquamis elatis, acutis, auriculis rugoſis.*

glacialis. 96. O. teſta æquivalvi: radiis quinquaginta imbricatis interruptis, auriculis æqualibus; altera inæqualiter plicata.
Liſt. Conch. t. 176. *f.* 13.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 32. 33.
Knorr Vergn. 6. *t.* 38. *f.* 5.
Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 652.
β) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 68. *f.* 653.
Habitat in Oceano americano, *limæ affinis teſta nivea 3 pollices longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, at radiis longe pluribus margine crenato, β) integerrimo.*

hians. 97. O. teſta exalbida tenui undique hiante obliqua: radiis exoletis undulatis ſtriiſque tranſverſis rotundatis ſemilunaribus.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 332. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Norwegia, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, ultra pollicis lata, auriculis exiguis acutis, margine crenato, intus integerrimo.*

excavata. 98. O. teſta ſolida alba: ſtriis longitudinalibus undulatis, anuliſque paucioribus tranſverſis, intus lævi, uniaurita, margine integerrimo.

Chemn. Conch. 7. *t.* 68. *f.* 654.
Habitat rariſſima ad Norwegiæ *littora, teſta* 5 *pollices longa*, 3¼ *lata.*

* * *rudes, vulgo* Oſtreæ *dictæ.*

Malleus. 99. O. teſta æquivalvi triloba: lobis tranſverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 121.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* H. Oſtreum diviſum.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* A. Malleus brachiatus.
Liſt. Conch. t. 219. *f.* 54.
Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 120.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* D. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 4. 5. & *t.* 93. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 655. 656.
Habitat rara & pretioſa in Oceani indici & auſtralis abyſſo, *teſta nigra, rarius glutinis ſcriniariorum more tincta, hiante, cruciata,* 6 *circiter pollices longa,* 3¾ *lata valvis lamellatis.*

Valſella. 100. O teſta ſubpellucida anguſta elongata fragili lamellata altero fine rotundata lamellata intus læviſſima lucida.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 657.
β) *Martini allgem. Naturg.* 4. *t.* 147. *f.* 2.
Habitat in mari rubro, *teſta fragili violacea, ſpadicea aut ferruginea ad cardinem hiante,* 3½ *pollices longa,* 1 *lata, extrinſecus aſpera, fine rotundato tenuiore.*

anatina. 101. O. teſta pellucida lamellata lateraliter incurva.
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 70. *f.* 658. & *t.* 71. *f.* 659.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta tenui fragili, ex albo & violaceo varia, anati ſedenti aliquantum ſimili, pollicem lata, primo* 1½ *pollicem perpendiculari, tum incurva, & denuo* 1½ *pollicem longa.*

diluviana. 102. O. teſta extus plicata: margine dentibus erectis acutangulis.
Habitat - - - *in* Sueciæ *montibus calcareis, foſſilis, magnitudine edulis & ultra, margine introrſum ad angulum cum teſta ipſa rectum erecto; dentibus quaſi ſerra exſectis exterius quaſi ex lamellis imbriactis compoſitis, margine plano ſæpe tranſverſim ſtriato: Valvis*

pectinatim plicatis ; acutis : Vix videtur diſtin
hujus generis ſpecies.

Folium. 103. O. teſta ovata lateribus obtuſe plicata paraſitica. *M.*
Lud. Ulr. 534. *n.* 122.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* A. Oſtreum Cratium.
Petiv. amb. aq. t. 10. *f.* 1.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* F.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 22.
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* H.
Chemn. Conch. 8. *t.* 71. *f.* 662-666.
β) *Schroet. n. Litterat.* 2. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat in Oceano indico, *gorgoniis non raro adhærent*
teſta ſtraminea, ſpadicea, violacea, intus argent
cardinis loco foſſula trigona, valva ſuperiore
circiter medio turgida, utrinque rugoſa & tranſ
coſtata, inferiore minore planiore medio canalicul

orbicularis. 104. O. teſta orbiculata plana: margine integro cren
Gualt. teſt. t. 104. *f.* G.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 680.?
Habitat - - - - teſta alba, magnitudine extimi artic
pollicis, margine obtuſiſſimo.

edulis 105. O. teſta ſemiorbiculata: membranis imbricatis undulat
valva altera plana integerrima. *Fn. ſuec.* 2149. *M.*
Lud. Ulr. 534. *n.* 123.* *Müll. zool dan. prodr.* 29
Geſn. aq. 2. *p.* 37. Oſtrea.
Bonann. recr. 2. *p.* 108. *f.* 70. Oſtrea.
muſ. Kirch. 2. *f.* 68.
Aldr. exſang. 482. Oſtrea Rondeletii marina. Oſtreu
Liſt. anim. angl. p. 176. *t.* 4. *f.* 26. 27.
vulgare maximum.
Conch. t. 202. *f.* 36. & *t.* 203. *f.* 37.
Rondel. aq. 2. *p.* 37.
Gualt. teſt. t. 102. *f,* A. B.
Ginann. adr. 2. *t.* 18. *f.* 127.
Baſter. op. ſubſ. 2. *p.* 62. *t.* 8. *f.* 1. 2. 8. 9.
Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* A.
Knorr Vergn. 3. *t.* 24. *f.* 2. & *t.* 25. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 682.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 3. Vetan.
Liſt. Conch. t. 193. *f.* 30. & *t.* 194. *f.* 31. Oſtrea majo
ſulcata, inæqualiter utrinque ad cardinem denticulata.

Klein oſtr. t. 8. f. 21.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 6. f. 9. 10.
Chemn. Conch. 8. t. 73. f. 672. 673.
γ) *Martini allgem. Naturg. 4. t. 148. f. 3. 4.*
δ) *Cemn. Conch. 8. t. 71. f. 660?*
ε) *Chemn. Conch. 8. t. 71. f. 661?*
ζ) *Chemn. Conch. 9. t. 116. f. 994-996.*

Habitat in Oceano europæo & indico, β) *etiam ad* Caput Bonæ Spei, *ſcopulis affixa, aut in fundo hærens teſta intus alba glabra, interdum matris perlarum ad inſtar nitente, colore ceterum, forma & magnitudine plurimum variante, ad* $3\frac{1}{2}$ *pollicees longa, &* 4 *lata; incola vermis eſculenta* γ) *præſertim ſapidiſſima.*

ſemiaurita. 106. O. teſta ovalis ſemiaurita lævi baſi obliqua. *Muſ. Lud. Ulr.* 535. *n.* 134.*
Gualt. teſt. t. 84. f. H.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 365. *t.* 9. *f.* 6.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, &* $1\frac{1}{4}$ *lata, ſordide olivacea, lineis undulatis albis nonnunquam varia tenuiſſima, valva utraque convexa in roſtrum terminata, cardinis foſſulis* 5 *rotundis.*

fornicata. 107. O. teſta rudi oblonga lineari: cardinibus divergentibus interne fornicatis. *Forsk. fn. arab. p.* 124. *n.* 61.
Chemn. Conch. 8. *t.* 71. *f.* 667. a. b.

Habitat in mari rubro, *teſta tota ſpadicea fragili membranacea, digiti longitudine, ad cardinem in roſtrum elongatum acutangulum terminata.*

ſinenſis. 108. O. teſta rudi lamellata inæquali intus glabra: valva inferiore majore excavata in roſtrum terminata: plicis decem obtuſis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 668.

Habitat ad Sinæ littora, *teſta pulla, intus ad cardinem exalbida,* 4 *pollices longa,* 3 & 10 *lineas lata.*

ſpondyloidea. 109. O. teſta æquivalvi pellucida complanata ovali roſtrata glabra: valva ſuperiore ſtriis granulatis perpendicularibus undulatis, margine acutiſſimo.
Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 669. 670.

Habitat in India, *teſta* 2 *lineas ultra* 3 *pollices longa &* 5. *l. ultra* 2 *p. lata alba; maculis rarioribus ſpadiceis.*

Forskahlii. 110. O. teſta plicata in roſtrum elongatum incurvatum cavum terminata : coſtis intermediis, rugoſo ſpinoſo imbricat... valva altera plana.

Chemn. Conch. 8. *t.* 72. *f.* 671. a. b. c.

Habitat in mari rubro, *teſta pollicem lata, & 2 cum 3 li... neis longa, valva planiore exalbida altera ſubviolac...*

plicatula. 111. O. teſta longitudinaliter plicata : plicis rugoſis, val... inferiore paulo minore & planiore.

Gualt. teſt. t. 104. *f.* A.

Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 674.

Habitat in mari americano & mediterraneo, *forma & ma... nitudine varia, teſta utplurimum cinerea, violaceo intu... miſto, interdum alba rubro aut cæruleſcente ſtriata.*

roſtrata. 112. O. teſta oblonga ruguſa : valva ſuperiore lamellata margine denticulata, altera excavata longitudinaliter ſulcata, roſtro prominente.

Gualt. teſt. t. 102. *f.* D.

Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 676.

Habitat in mari mediterraneo, *valva ſuperiore ex viridi ſſ... vicante, altera violaceo alboque varia, intus cretac...*

virginica. 113. O. teſta ſubæquivalvi craſſa rudi lamelloſa : valvæ alte... rius roſtro prominente.

Liſt. Conch. t. 200. *f.* 34.

Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 677.

β) *Liſt. Conch. t.* 201. 35.

Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 678.

Habitat in Oceano americano & indico, *teſta ad 9 pollic... longa, & 4 lata, exalbida, aut ochracea, intus nitid... alba.*

Cornucopiæ. 114. O. valva ſuperiore plana, inferiore excavata ſtrati... ſquamis, rugis pliciſque inæquali in roſtrum elongatum terminato.

v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 11. 12.

Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 679.

Habitat in Oceano indico & africano.

paraſitica. 115. O. teſta tenui : valva inferiore convexa craſſiori; altera plana.

Rumpf muſ. t. 46. *f.* O.

Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* XI.

Klein oſtr. t. 8. *f.* 17.

Chemn. Conch. 8. *t.* 74. *f.* 681.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 14. *f.* 1. Gaſar.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 997.
Habitat in mari indico & atlantico, *arborum littoralium præſertim mangiferæ radicibus affixa, forma & magnitudine varians, ut teſta interdum palmam virilem æquet.*

exalbida. 116. O. teſta tenui: valva ſuperiore longiore magiſque convexa.
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 3. 4.
Habitat in mari adriatico, *aliis teſtaceis nunc gregatim nunc ſolitarie affixa, teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem uſque longa, ceterum magnitudinis formæque variæ, utplurimum exalbida, rarius flava aut violacea.*

criſtata. 117. O. teſta rugoſa imbricatim lamellata: margine obtuſe plicato dentato, apice altero producto. *v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt.* 1. *p.* 98. *t.* 7. *f.* 3.
Habitat - - - teſta pollicem & 10 lineas lata, alba: maculis ſparſis nigris, cardinis dente medio lato conico.

ſenegalenſis. 118. O. teſta æquivalvi ſubrotunda lævi complanata.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 202. *t.* 14. *f.* 5. Rojel.
Habitat ad Africæ littus occidentale, *ſaxis adhærens, teſta diametri bipollicaris ſpadicea, intus exalbida.*

ſtellata. 119. O. teſta tenui depreſſa rudi inæquali: valva ſuperiore coſtata, coſtis ſparſim ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 377. *n.* 199. *t.* 9. *f.* 7. a. b.
Habitat ad Guineam, *cardine aliis corporibus affixa, teſta nunc ſubrotunda nunc oblonga, tenuiſſima, alba, radiis, virgis maculiſque rubris aut cæruleſcentibus.*

ovalis. 120. O. teſta ovali tenuiſſima in roſtrum breve acutum laterale canaliculatum producta: ſtriis obſoletis perpendicularibus inæqualibus.
Schroet. Einl. in Conch. 8. *p.* 378. *n.* 120. *t.* 9. *f.* 8.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa, fragili exalbida, intus argentea alba nitente, valva inferiore ſuperiorem longitudine & latitudine ſuperante.

papyracea. 121. O. teſta ſubrotunda nivea tenuiſſima pellucida: valva ſuperiore in roſtrum breve acutum terminata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 378.
Habitat intrinſecus in lepadis tintinnabuli *teſta firmiſſime adhærens.*

annulata. 122. O. teſta æquivalvi orbiculari alba: ſemicirculis concentricis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2987.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an diſtincta a reliquis ſpecies?*

retuſa. 123. O. teſta æquivalvi oblonga alba glabra ſtriata: umbone a cardine remoto. *Müll. zool. dan. prodr.* 2988.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

**** cardinis linea perpendiculariter ſulcata.*

Perna. 124. O. teſta æquivalvi obovata inæquali: hinc rotundiore.
Liſt. Conch. t. 199. *f.* 33. & *t.* 228. *f.* 63.
Klein. oſtr. t. 8. *f.* 19. 20.
Seb. muſ. 3. *t.* 90.
Martini Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 20. 21.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 579. 580.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 351. *t.* 9. *f.* 5.
Habitat rara in Oceano indico & americano, *teſta ad ... pollices longa, figura pernæ, alba, interdum ferruginea, lamellata, ad cardinem lævi, roſtro brevi recto, aperto.*

Iſognomum. 125. O. teſta æquivalvi: lobo laterali majore. *Muſ. Lud. Ulr.* 533. *n.* 120.*
Rumpf muſ. t. 47. *f.* I.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 11.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 15.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 6.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 584.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 91. *f.* 7.
γ) *Gualt. teſt. t.* 97. *f.* A.
Valent. Abb. t. 13. *f.* 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 8.
Knorr Vergn. 4. *t.* 10. *f.* 1. 2. & 6. *t.* 13. *f.* 1.
Mart. Beſch. Berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 19.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 582.
δ) *Chemn. Conch.* 7. *t.* 59. *f.* 583.
Habitat rarior & pretioſa in Oceano indico, γ) *quoque in* auſtrali, *teſta interdum ultra* 5, γ) *ad* $7\frac{1}{2}$ *pollices longa, & in medio* $1\frac{1}{4}$ *lata, nigra violaceo intermiſto, intus margaritacea, lamellata, roſtro aperto.*

Ephippium. 126. O. teſta æquivalvi orbiculata compreſſa membranacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 525. *n.* 135.*
Liſt. Conch. t. 227. *f.* 62.

Klein oſtrac. t. 18. *f.* 18.
Seb. muſ. 3. *t.* 90. *ſer. ſac. fig.* 1. & *ult.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 1.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 22.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 576. 577.
Habitat rariſſima in Oceano indico *& ad* Caput Bonæ Spei, *teſta nigricante, ferruginea aut purpuraſcente intus margaritacea, 5 pollices aliquando longa, & 5½ lata, hiante, ſubrotunda, lamellata: margine acutiſſimo.*

picta. 127. O. teſta æquivalvi tenui pellucida ad cardinem acuminata, altero fine dilatata: margine acutiſſimo.
Mart. Beſch. berl. Naturf. 3. *t.* 7. *f.* 23. 24.
Chemn. Conch. 7. *t.* 58. *f.* 575.
Habitat in mari rubro, *teſta nonnullas lineas ultra pollicem lata, duoſque longa ex fuſco luteſcente: radiis dilutioribus undulatis.*

Legumen. 128. O. teſta complanata cana tenui pellucida lamellata: cardinis linea obliqua; ſulcorum interſtitiis nigris.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59. *f.* 578.
Habitat rara ad inſulas Nicobaricas, *teſta 4 lineas lata, & 2 ultra pollicem longa, macula ad umbonem livida.*

alata. 129. O. teſta complanata fragili pellucida marginem verſus dilatata, cardinis linea obliqua in roſtrum parvum terminata.
Chemn. Conch. 7. *t.* 59 *f.* 581.
Habitat rara in Oceano americano.

mytiloides. 130. O. teſta ſubæquivalvi ovata ventricoſa recta. *Hermann Schr. berl. Naturf.* 2. *n.* 11. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.
Habitat - - - - foſſilis in Alſatia *prope* Gundershofen.

torta. 131. O. teſta æquivalvi intorta. *Hermann Schr. berl. Naturf.* 2. *p.* 276.
Habitat - - - foſſilis in Alſatia *prope* Gundershofen.

Pes lutræ. 132. O. teſta æquivalvi lauri cuneata: plici ſenis obtuſis
Mant. 2. *p.* 547.
Gualt. teſt. t. 74. *f.* C C.
Liſt. Conch. t. 171.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* A.
Habitat teſta ex purpuraſcente alboque varia longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriata; an hujus [illegible] *bus? an hujus etiam quadridentata, a* Schroetero *Einl. in Conch.* 3. *Vorr. p.* XVI. *memorata?*

314. ANOMIA. *Animal* Corpus Ligula *emarginata ciliata: ciliis valvæ ſuperiori affixis:* Brachiis 2 *linearibus corpore longioribus conniventibus porrectis, valvæ alternis utrinque ciliatis: ciliis affixis valvæ utrique.*

Teſta inæquivalvis: valva altera planiuſcula, altera baſi magis gibba: harum altera baſi ſæpe perforata.

Cardo cicatricula lineari prominente introrſum dente laterali; valvæ vero planioris in ipſo margine.

Radii duo oſſei pro baſi animalis.

Craniolaris. 1. A. teſta orbiculata: valva gibboſiore conico convexa, planiore baſi foveolis tribus.
Retz. Schr. berl. Naturf. 2. *t.* 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 687. a. b.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 76. *f.* 688. α. β.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *& ad inſulas* Philippinenſes, (*frequentius foſſilis*, nummulus Bratenburgenſis,) *teſta albida, vix pollicem longa, & ſ lata, valva inferiore ſolidiore, intus tuberculis 3 lævibus inæquali.*

pectinata. 2. A. teſta oblonga ramoſo-ſulcata: gibboſiore poſterius foveolis duobus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 689. 690.
Habitat in mari mediterraneo, (*frequentius foſſilis*) *teſta exalbida, pollicem circiter longa, &* $\frac{3}{4}$ *lata, valva planiore perforata, altera ſtriis longitudinalibus aſperis ſquamoſis, hinc inde bifidis inæquali.*

Ephippium. 3. A. teſta ſuborbiculata rugoſo-plicata planiore perforata.
Liſt. Conch. t. 204. *f.* 38.
Bonann. recr. 2. *f.* 56.

Bonann. muſ. Kirch. 2. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 97. *f.* B.
Ginann. adr. 2. *t.* 27. *f.* 172.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 692. 693.
Habitat in Oceano indico & americano, *teſta utplurimum alba, interdum rubella,* 2 *pollices longa,* $2\frac{1}{4}$ *lata, tenera ſublamellata.*

Cepa. 4. A. teſta obovata inæquali violacea: ſuperiore convexa, inferiore perforata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 9. *f.* 5.
Murray teſtaceol. t. 2. *f.* 13.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 694. 695.
β?) Anomia violacea. *Dict. encyclop. p.* 71. *n.* 4.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, americano, *teſta figuræ variæ, nucis juglandis utplurimum magnitudine, valva inferiore alba, ſuperiore ex rubeſcente cæruleſcente.*

electrica. 5. A. teſta ſubrotunda flava lævi, altera convexo gibboſa.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* L. Oſtreum electricum.
Liſt. Conch. t. 205. *f.* 39?
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 8.
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 6.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 691.
Habitat ad Africæ littus *ſeptentrionale & occidentale, cepæ affinis, at colore, teſta minore, tenera, chartæ inſtar tenui, valva inferiore planiore, foramine ovali pertuſa, & minuto in cardinis regione umbone diſtincta.*

Squamula. 6. A. teſta orbiculata integerrima plana: margine altero gibba lævi. *Fn. ſuec.* 2151. *Müll. zool. dan. prodr.* 2998.
It. wgoth. 170. Patella.
Chemn. Conch. 8. *t.* 76. *f.* 696.
Habitat frequentiſſima in Oceano Europæ ſeptentrionali, *aliis marinis adhærens, minuta, valva planiori teneriori utplurimum perforata.*

In duo genera divulſit anomias inter foſſilia frequentiores O. Fr. Mullerus, *eas ſcilicet, quarum animal branchiis gaudet cincinnatis, & in quarum teſta valva ſuperior deorſum perforata, & cardo in altera dentibus uncinatis armatus, terebratulas, eas autem, quarum animal branchiis gaudet ſimplicibus, & in quarum teſta cardo edentulus eſt, & valva inferior perforata, anomias nuncupando.*

patellifor- 7. A. teſta ovata convexa ſubdiaphana ſtriata: vertice
mis. poſteriori recurvo lævi. *Fn. ſuec.* 2152.* *Müll. zool.*
dan. prodr. 2999.
Habitat in mari norwegico, *rarior, patellæ luteæ affinis,*
teſta albida tenera fragilis, ſtriis longitudinalibus ſub-
tiliſſimas tranſverſas decuſſantibus, roſtro obſoleto,
valva inferiore plana, lævi, baſi perforata.

Scobina- 8. A. teſta ſubrotunda lævi intus ſcabra, nate perforata.
ta. *Gualt. teſt. t.* 96. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 704?
Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. *t.* 2. *f.* 4.
Einl in Conch. 3. *p.* 389. *t.* 9. *f.* 9.
Habitat in Pelago, *teſta tenui pellucida, alba, tenerrime*
ſtriata, intus argentea: margine externo glabro acuto.

aurita. 9. A. teſta obovata ſtriata ſubaurita: nate perforata.
Gualt. teſt. t. 96. *f.* B.
Habitat in mari norwegico, *capiti ſerpentis affinis, ſed*
dorſo teſtæ penitus æquabili diſtincta.

retuſa. 10. A. teſta obovata ſtriata retuſa: convalle longitudinali
nate perforata. *Fn. ſuec.* 2153. *Müll. zool. dan. prodr.*
3000.
Habitat in Pelago norwegico, *alcyoniis adhærens. Pen-*
nant.

Gryphus. 11. A. teſta oblonga lævi: altera valva plica laterali oblo-
leta; nate incurvata altera brevi planiuſcula.
Muſ. Teſſin. p. 92. *t.* 5. *f.* 9.
Olear. muſ. 67. *t.* 33. *f.* 3.
Rumpf muſ. t. 59. *f.* B.
Liſt. an. angl. p. 238. *t.* 8. *f.* 45.
Columnn. aq. p. 54. *t.* 52.
Bonann. recr. 2. *f.* 31.
Habitat - - - *hactenus modo foſſilis reperta, teſta la-*
mellata, rugoſa, magnitudinis formæque variæ.

Pecten. 12. A. teſta ſemiorbiculata depreſſa multiſtriata: valva
altera plana.
Liſt. anim. angl. p. 243. *t.* 6. *f.* 49.
Habitat - - - *hactenus modo foſſilis inventa, & rarius*
quidem, in Anglia, *teſta in regione cardinis linea*
tranſverſa notata.

ſtriatula. 13. A. teſta ſubrotundo-dilatata utrinque gibba ſtriata:
valvis æqualibus.

Habitat - - - - - hactenus modo inter foſſilia detecta, teſta rotundata, ſed duplo latiori, quam longa, poſterius magis gibboſa, anterius margine tenui.

truncata. 14. A. teſta ſuborbiculata obſolete ſtriata: cardine truncato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3001.
Liſt. Conch. t. 462. *f.* 23.
an. angl. t. 9. *f.* 50.
Andreæ Br. a. d. Schw. t. 1. *f.* d-g.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 6. *f.* 14.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 701. *α. β.*
Schroet. Journ. für Liebh. Steinr. 3. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in maris Norwegici coralliis, *ſtriatulæ affinis, at cardine recto exciſo diſtincta, teſta exalbida, latiori quam longa, ſubtiliſſime decuſſatim rugoſa convexa, intus granulata.*

reticularis. 15. A. teſta cordata decuſſatim ſtriata: valva breviore magis gibboſa.
Muſ. Teſſ. p. 88. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat - - - - - hactenus modo foſſilis, teſtæ lateribus prominulis compreſſis, natis planioris valva parum prominente.

plicatella. 16. A. teſta dilatato-lunata plicata: ſulcis longitudinaliter ſtriatis, media latiore.
Habitat - - - - hactenus tantummodo foſſilis præcipue in Helvetia, *teſtæ lateribus ſubmucronatis, plicis longitudinalibus, natum ſuperiore admodum prominente.*

criſpa. 17. A. teſta dilatato-triangulari plicata: ſulcis rugoſis, media latiore.
Muſ. Teſſ. t. 5. *f.* 7.
Liſt. anim. angl. t. 9. *f.* 56.
Habitat - - - - hactenus modo foſſilis reperta in Anglia, Helvetia, Eifalia, *teſtæ fere lunatæ ſulcis* 5-6 *rugis arcuatis tranſverſis, lateribus ſubmucronatis, natum ſuperiore prominente.*

lacunoſa. 18. A. teſta ſubrotunda multiſulcata: valvis apice plicatis, altera breviore lacunoſa, apice quadridentata.
Muſ. Teſſin. t. 5. *f.* 6.
Columm. de purp. c. 15. *p.* 35. Concha altera anomia ſtriata trilobos.
Liſt. an. angl. p. 249. *t.* 9. *f.* 57.
Grew. muſ. t. 19. *f.* 6.

Klein oſtr. t. 11. *f.* 57.
Habitat - - - - modo foſſilis.

pubeſcens. 19. A. teſta obovata ſulcata : vulva altera nate ad cardi-nem dehiſcente apertura.
Müll. zool. dan. prodr. 3007 ? Terebratula teſta tomen-toſa ſubquinquangulari longitudinaliter ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 397. *t.* 9. *f.* 10. a. b.
Habitat in Oceani Norwegici zoophytis, *teſta alba parva, magnitudine vix ſeminis cucumeris, ſubæquivalvi, pilis breviſſimis erectis diſtantibus, an forſan a ſpongiæ ſpecie adhærente? hirta, non retuſa, nec plicata, cardiis inſtar longitudinaliter ſulcata : Valva alterius natis poſterius prominens alteram valvam verſus foramen offert.* Zoega.

farcta. 20. A. teſta ſubrotunda multiſulcata : valvis convexis apice octodentatis.
Habitat - - - - hactenus modo inter foſſilia deprehenſa in Helvetia, Weſtphalia, *teſta nonnunquam fere gib-boſa.*

Caput ſerpentis. 21. A. teſta obovata ſtriata tomentoſa : valva altera nate longiori perforata. *Fn. ſuec.* 2154.
Gründler Naturſ. 2. *t.* 3. *f.* 1-6.
Andreæ Br. a. d. Schweiz t. 1. *f.* c.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 6. *f.* 13.
Schroet. Abh. Naturg. 2. *t.* 5. *f.* 8. a. b. & *f.* 9. a. b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 712.
Habitat in maris norwegici abyſſo *madreporæ prolifera utplurimum adhærens, teſta alba, longitudinaliter & parumper tranſverſe ſtriata, anterius compreſſa, fra-gili, margine crenulato, cardine utrinque ad latus prominente in utraque valva dente armato; valva ſu-periore poſterius prominente & utrinque longiore, ante-rius declinata, medio ſulco exarata, apice perforata ligamento aſſixa coralliis aliiſve zoophytis; valva infe-riore rotundata, anterius retuſa.*

Terebratula. 22. A. teſta obovata lævi convexa : valva altera triplicata, altera biplicata. *Fn. ſuec.* 2155.
Column. purp. c. 12. *f.* 1. *p.* 32.
Liſt. anim. angl. p. 240. *t.* 8. *f.* 46?
Klein oſtr. t. 11. *f.* 74.
Habitat - - - - - hactenus modo ſed copioſiſſime foſſilis reperta, nate alterius valvæ prominente pertuſa.

angulata. 23. A. teſta baſi laterum compreſſe anterius plicata : medio tridentato.
Muſ. Teſſ. p. 96. p. 5. f. 4.
Habitat - - - - hactenus modo foſſilis, teſtæ ceterum lævis antrorſum plicis numero variis.

Hyſterita. 24. A. teſta dilatata lævi convexa ſtriata ſubtriloba anterius depreſſa : margine acuto.
Muſ. Teſſin. p. 90. t. 5. f. 1-3.
Wolf. Haſſ. ſubterr. t. 3. f. 3-5.
Worm. muſ. t. 83.
Habitat - - - - - hactenus tantummodo inter foſſilia reperta in Haſſia, & vicinis Moguntini electoratus *terris, magnitudine & quodammodo etiam figura varians, teſta lævi, rarius, & tunc quidem ſubtiliſſime, ſtriata, valva altera breviore medio quam maxime convexa, ad latera depreſſa, altera longiore plana vulvæ faciem referente in roſtrum longiuſculum terminata.*

biloba. 25. A. teſta biloba æquali ſtriata.
Habitat - - - - modo foſſilis. Pennant.

Placenta. 26. A. teſta orbiculata plana pellucida : cardinum callis linearibus binis teſtæ interne adnatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 536. *n.* 126.*
Liſt. Conch. t. 225. f. 60. & t. 226. f. 61.
Seb. muſ. 3. t. 90. fig. var.
Knorr Vergn. 2. t. 24. f. 1.
Chemn. Conch. 8. t. 79. f. 716.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta 5 pollices longa lataque, & adhuc majore, alba, intus nitente argentea, tenera, pellucida, tenui, fragili, ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus rugas tranſverſas arcuatas decuſſantibus, valva ſuperiore penitus complanata.*

Sella. 27. A teſta ſubquadrangula convexa arctiſſime clauſa ænea margine repanda.
Bonann. Kirch. 2. f. 135?
Seb. muſ. 3. t. 90. fig. med.
Knorr Vergn. 4. t. 18. f. 2. & 5. t. 29. f. 1.
Chemn. Conch. 8. t. 79. f. 714.
β) Sella minor, altera valva alba.
Rumpf muſ. t. 47. f. B.
Petiv. amb. aq. t. 20. f. 3.
Gualt. teſt. t. 104. f. B.

Seb. muſ. 3. t. 90. f. plur.
Habitat in Oceano indico, *placentæ proxime affinis, teſta lamellata intus nitente nonnunquam ultra 7 pollices longa lataque, radiis nonnullis dilute ſpadiceis, ſtriiſque innumeris longitudinalibus, ad marginem iridis coloribus ludente, cardinis callis 2 ad umbonem convergentibus.*

ſpinoſa. 29. A. teſta ſpinis longitudine teſtæ.
Habitat - - - - hactenus modo foſſilis reperta in Angliæ Solander.

aculeata. 30. A. teſta ſubrotunda aculeata: vertice lævi poſterius recurvo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3005.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 702.
Habitat in maris Norwegici fucis & zoophytis, *valva inferiori plana, lævi ad verticem perforata.*

muricata. 31. A. teſta hyalina ventricoſa: vertice dextrorſum flexo, valva ſuperiore longitudinaliter ſtriata: ſtriis in ſquamas ſpinaſque cavas deſinentibus.
Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* A. B.
β) Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* C. D.
Habitat ad Guineam, *teſta nivea, in β) majore minuſque convexa, valva inferiore plana tenuiſſima; foraminis ambitu elevato; dente laterali.*

ſquama. 32. A. teſta oblonga margine rotundata: valva altera plana, tenera lævi; apicis foramine amplo ovato, altera convexiuſcula longitudinaliter ſtriata.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 697.
Habitat in mari Norwegico, *ſquamula major, teſta fragili, valva plana aliis corporibus adhærente.*

punctata. 33. A. teſta orbiculata hyalina tenui punctata: valva planiore apice perforata: punctis exterius impreſſis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 698.
Habitat ad inſulam Feroe, *teſta exigua fragili, punctis in valva convexa extrinſecus elevatis.*

undulata. 34. A. teſtæ margine crenato, valva planiore tenuiſſima lævi: foramine ovali amplo pertuſa, convexæ ſtriis transverſis arcuatis longitudinales undulatas decuſſantibus.
Müll. zool. dan. prodr. 3003? Anomia teſta ſubovata pellucida, ſupra ſtriis tranſverſis undulatis.
Chemn. Conch. 8. *t.* 77. *f.* 699.

Habitat in mari ſeptentrionali & mediterraneo, *teſta interdum rubella.*

capenſis. 35. A. teſta longitudinaliter ſtriata ſubtruncata margine rotundato crenata; valvæ planioris coſta infra biſpinoſa.

Chemn. Conch. 8. *t.* 77. 703. a. b. c.

Habitat ad Caput Bonæ Spei, *teſta nunc rubella, nunc alba.*

detruncata. 36. A. teſta truncata orbiculata longitudinaliter ſtriata: valva planiore coſtis intus tribus, altera intus longitudinaliter ſtriata ſepto medio bipartita.

Gualt. teſt. t. 96. *f.* C.

Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 705. a. b. c. d.

Habitat in mari mediterraneo, *coralliis adhærens, teſta parva: vertice perforato.*

ſanguinolenta. 37. A. teſta cornea lævi utrinque convexa: valva ſuperiore emarginata ad latera radiata; dorſo elevato ſanguineo, apiceque prominente perforato.

Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 706.

Habitat in India, *teſta pellucida.*

vitrea. 38. A. teſta ovata ventricoſa hyalina tenuiſſima: cardinis præter dentes laterales in valva inferiore radiis duobus oſſeis, valvæ ſuperioris apice prominente perforato.

Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* E.

Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 4.

Walch Naturf. 3. *t.* 3. *f.* 5.

Andr. Br. v. d. Schw. t. 2. *f.* a. b.

Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 116. *vign.*

Spengl. catal. raiſ. t. 4. *f.* 1. 2.

Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 1.

Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 707-709.

Habitat rarior in mari mediterraneo, *teſta intus nitente,* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, & ultra pollicem lata.*

Cranium. 39. A. teſta lævi ventricoſa tranſverſim ſubtiliter ſtriata.

Müll. zool. dan. prodr. 3006. Terebratula Cranium.

Schroet. Journ. 3. *t.* 2. *f.* 2.

Habitat in mari Norwegico, *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis lata, & paulo longiori, planiore & breviore, quam in vitrea tenuiſſima. ſub epidermide ſordide fuſceſcente nivea pellucida, ſtriis. ſubtiliſſimis tranſverſis in valva longiore apice perforata alias ſubtiliſſimas undulatas confertas decuſſantibus.*

dorſata. 40. A. teſta cordata ſolida annulis rugiſque arcuatis tranſ- verſis ſtriis ſulciſque longitudinalibus inæquali, valv convexæ apice perforato dorſoque elevato.
Günther Naturf. 3. *t.* 3. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 710. 711.
Habitat in freto magellanico, *frequentius foſſilis, teſta cinerea: margine repando cinereo.*

pſittacea. 41. A. teſta cornea ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata: valv breviore gibba, longioris complanatæ apice incurvato perforato; foramine triangulari.
Liſt. Conch. t. 211. *f.* 46.
Argenv. Conch. t. 23. *f.* O.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 84. 85.
Spengl. cat. raiſ. t. 4. *f.* 8.
Chemn. Conch. 8. *t.* 78. *f.* 713. a. b. c.
Habitat rariſſima in mari Groenlandiam *alluente, teſta ſatis magna pellucida: margine acuto lævi angulato.*

tridentata. 42. A. teſta flaveſcente pellucida tenui ſubtiliſſime tranſ- verſim ſtriata tricuſpide: cuſpidibus tubuloſis, valv connatis.
Forsk. Fn. arab. p. 124. *n.* 63.
Chemn. Conch. 8. *p.* 65. *vign.* 13. *f.* a. b. c. d. F. G.
Habitat rarior in mari mediterraneo, *plicis in latere ampliore ſulciſque quatuor longitudinalibus, vertice obtuſo ſemiorbiculato.*

ſpondylodes. 43. A. teſta ovali antiquata: roſtro obtuſo canaliculato.
Liſt. Conch. t. 211. *f.* 45.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 82. 83.
Habitat - - - -

ventricoſa. 44. A. teſta ſubovata ſolida: roſtro canaliculato.
Schroet. Journ. 2. *t.* 2. *f.* 3.
Habitat - - - - - *madreporæ proliferæ adhærens, vitreæ affinis, teſta ſordide ochroleuca, apicis foraminis amplo, altero latere longiore.*

gryphoides. 45. A teſta ovali lævi ſolida opaca: valvæ majoris roſtro rectiuſculo obtuſo truncato.

An diſtinctæ hujus generis ſpecies, quas Bonanni recr. 2. *f.* 50. *& muſ. Kirch.* 2. *f.* 40. *& ea, quam Martini Berlin. Samml.* 3. *t.* 5. *f.* 12. *delineandam dedere? Nonne huc referenda etiam propago* peridiolithorum, *in Eiſfalia potiſſimum obviorum?*

Schroet. Journ. 4. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - - grypho aſſinis, teſta exalbida.

flexuoſa. 46. A. teſta tenuiſſima lamellata: medio ſellæ inſtar excavato, valva ſuperiore plana, inferiore verticem verſus convexa: foramine orbiculari infra verticem perforata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 418. *t.* 9. *f.* 11.
Habitat in mari norwegico, *madreporæ proliferæ adhærens, teſta quaſi inſumata, valvæ inferioris parte convexa argentea.*

rugoſa. 47. A. teſta obovata: valva ſuperiore plurimam partem convexa confertim ſubtiliſſime rugoſa, inferioris tenuiſſime lævis foramine reniformi.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 12.
Habitat in mari norwegico, *madreporæ proliferæ aſſixa, teſta exalbida: margine acutiſſimo.*

cylindrica. 48. A. teſta tenuiſſima cylindrica extrorſum anguſtata: valva ſuperiore gibba, inferiori excavata.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 419. *t.* 9. *f.* 13.
Habitat in mari norwegico, *echini cidaridis aculeis adhærens.*

Nucleus. 49. A. teſta glabra ovali longitudinaliter ſulcata.
Müll. zool. dan. prodr. 3008. Terebratula Nucleus.
Habitat in mari norwegico.

avenacea. 50. A. teſta pyriformi verſus cardines protracta ſubcompreſſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 3004.
Habitat in Oceano ſeptentrionali.

ſandalium. 51. A. teſta turbinata dorſo plana cavitate ſtriata, operculo plano hemiſphærico. *Mart.* 2. *p.* 547.
Habitat - - - - inter foſſilia modo, potiſſimum Eiſaliæ reperta, madreporæ turbinatæ quodammodo figura teſta ſolida craſſa, magnitudine extimi pollicis, operculo concentrice ſtriato.

315. **MYTILUS.** *Animal* Aſcidia ?
Teſta bivalvis, rudis, ſæpius affixa byſſo, utplurimum craſſiori.
Cardo (in plurimis) edentulus, diſtinctus, (paucis exceptis) linea ſubulata excavata longitudinali.

* Paraſitici, *unguibus affixis.*

Criſta galli. 1. M. teſta plicata ſpinoſa: labro utroque ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 537. *n.* 128.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* D. Oſtreum plicatum minus.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* D. Auris porci ſ. Criſta galli.
Petiv. aq. amb. t. 20. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 104. *f.* E.
Knorr del t. B. IV. *f.* 8.
Vergn. 4. *t.* 10. *f.* 3-5. 5. *t.* 16. *f.* 1. & *t.* 17. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 683. 684.
β) *Gualt. teſt. t.* 104. *f.* D.
Chemn. Conch. 8. *t.* 73. *f.* 675.
γ) *Davil. catal. ſyſtem.* 1. *p.* 288. *t.* 19. *f.* 10?
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 998.
Habitat gregaria in Oceani indici, β) maris rubri, *p... tiſſimum gorgoniis, teſta ex purpurea ſubviolacea, dilu... cinnamomea, vel badia punctis elevatis aſpera ... glabra mellea, ſubæquivalvi, clauſa, plicis ... 5-8-10 obliquis vel rectis, ſoveola ad cardinem ... gona.*

Hyotis. 2. M. teſta plicata imbricata ſquamis compreſſis patul... labro utroque lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 548. *n.* 129.
Gualt. teſt. t. 103. *f.* A.
Argenv. zoomorph. t. 12. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 685.
Habitat rarior in pelagi gorgoniis, *teſta rugoſa for... ex vireſcente lutea, lamellata, plicis huc illuc cur... tis, nucleis cavis canaliculatis obſeſſis.*

Frons. 3. M. teſta plicata læviuſcula: labro altero ſcabro. *Muſ. Lud. Ulr.* 537. *n.* 127.*
Argenv. Conch. t. 19. *f.* D. Cratium ſ. Folium.

Liſt. Conch. t. 197. *f.* 32. *t.* 198. *f.* 32. a?
Gualt. teſt. t. 104. *f.* C.
Knorr Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 121. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 8. *t.* 75. *f.* 686.
Habitat in Oceani americani gorgoniis, *teſta rubella, cærulеſcente, fuſca, utplurimum ovali, margine utrinque plicato, denticulato, valva inferiore glabra medio canaliculata, ſuperiore ad marginem punctis elevatis ſcabra: coſta media elevata.*

** Plani *ſ. compreſſi ut plani appareant & ſubauriti.*

margaritiferus. 4. M. teſta compreſſo plana ſuborbiculata baſi tranſverſa imbricata tunicis dentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 538. *n.* 130.*
Imper. hiſt. nat. 905. Concha margaritifera.
Rumpf muſ. t. 47. *f.* F. Matrix perlarum.
Argenv. Conch. t. 20. *f.* A. Gallina guttata.
Liſt. Conch. t. 221. *f.* 56. *t.* 223. *f.* 57. & *t.* 224. *f.* 58.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 1.
Petiv. amb. aq. t. 20. *f.* 4. 7.
Gualt. teſt. t. 84. *f.* E. F. G.
Knorr Vergn. 2. *t.* 25. *f.* 1-3. & 4. *t.* 18. *f.* 1.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 121. *vign. f.* a.
Chemn. Conch. 8. *t.* 8. *f.* 717-721. a. b.
Habitat in Oceano indico & americano, *teſta ſolida, ad 8 pollices longa & adhuc latiori, intus margaritacea (hinc matrix perlarum potiſſimum) exterius nunc unicolore, præſertim ſmaragdina, nunc ſpadicea, aut perſici florum ad inſtar tincta radiis albis, vel albida radiis viridibus: juniorum teſta altera altero latere aurita, uti pecten, cardine rectiſſimo, longitudine totius teſtæ; ex ligamento cardinis androdamas, ex verme incola teſtaque læſa uniones.*

Unguis. 5. M. teſta ſubrotunda longitudinaliter ſtriata pellucida ſubaurita. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 131.*
Habitat in mari mediterraneo, *teſta tenerrima hyalina, ſubtiliſſime perpendiculariter ſtriata, magnitudine unguis humani; nonne ad oſtreas pertinet?*

*** *ventricoſiuſculi.*

lithophagus. 6. M. teſta cylindrica utrinque extremitatibus rotundatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 539. *n.* 132.*
Rondel. aq. 2. *p.* 49. Pholas.

Rumpf muſ. t. 46. *f.* F. Pholas.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* K. Dactylus.
zoomorph. t. 7. *f.* 5.
Jonſt. exſang. t. 15. *f.* 18. 19.
Liſt. Conch. t. 427. *t.* 268. & *t.* 437. *f. alt.*
Bonann. recr. 2. *f.* 27-29 ?
muſ. Kirch. 2. *f.* 27. 28 ?
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 90. *f.* D.
Leſſer teſtaceoth. f. 132.
v. Born muſ. Caeſ. Vindod. teſt. t. 7. *f.* 4.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 729. 730.

β) Mytilus cinnamomeus *Chemn. Conch.* 8. *t.* 82. *f.* 7..
Habitat in mari mediterraneo, indico, americano, *in* ..
ralliis teſtaceis, ſaxis ſæpe duriſſimis foveas pro ..
taculo excavans læviſſimas, teſta nonnunquam ..
cem lata & ultra 3 *longa, maris mediterranei fragi*..
indici coriacea, ſtriis tranſverſis arcuatis exara..
nigra, badia aut vireſcente, intus opalino-cæru..
cente, albido-argentea, aut margaritacea.

rugoſus. 7. M. teſta rhomboideo-ovali rugoſa obtuſa antiqu..
Müll. zool. dan. prodr. 3011.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 429. *t.* 9. *f.* 14. a. b.
Habitat in Norwegiæ lacuſtribus *ad* oſtia maris, ..
magnitudine vix ultimi articuli minimi digiti, ov..
utroque tamen fine obtuſiſſima, colore triſti cano, in..
dimidiato cæruleo & albo; ſtriis ſubtiliſſimis longi..
dinalibus rugas tranſverſas confertas decuſſantibus.

bilocularis. 8. M. teſta cærulea ſtriata: umbonibus fornicatis, diſſe..
pimento albo. *Muſ. Lud. Ulr.* 540. *n.* 133.*
Spengl. catal. raiſ. t. 6. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 736. α. β. *f.* 737. ..
Habitat rarus ad inſulas Nicobaricas, *teſta ovata* ..
rius plana medioque excavata & foramine ovali hian..
poſterius convexa, epidermide viridi tecta.

exuſtus. 9. M. teſta ſtriata: ventre angulato, margine crenat..
Muſ. Lud. Ulr. 540. *n.* 134.*
Liſt. Conch. t. 365. *f.* 205.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 754.

* Mytili *paraſitici potiori jure oſtreis accenſendi, quibuſcum cardinis quoque fin*..
conveniunt; an ad hanc mytilorum tribum etiam ſpectant tanquam d..
ſpecies conchæ ab Argenvill. *conch. t.* 20. *f.* C. & *altera f.* H. & *a* ..
Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 2. *delineatæ?*

Habitat in Oceano americano & mari rubro, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, ferruginea, albida flavicante, aut fuſca, intus cæruleſcente, dentibus ad latera cardinis* 4-5.

barbatus. 10. M. teſta læviuſcula ferruginea exterius apice barbata. *Fn. ſuec.* 2157. *Müll. zool. dan. prodr.* 3012.
Ginann. adr. 2. *p.* 36. *t.* 27. *f.* 169. Muſculus obſcurus piloſus.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* H. 2?
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 749.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *lithophytis adhærens, teſta ad* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, ſub epidermide ferruginea ex rubello cærulea aut albida.*

edulis. 11. M. teſta læviuſcula violacea: valvis anterius ſubcarinatis poſterius retuſis, natibus acuminatis. *Fn. ſuec.* 2156. *Muſ. Lud. Ulr.* 541. *n.* 135.* *It. oel.* 43. *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 3013. *Brünn ſpol. mar. adr. p.* 108. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 417. *n.* 417.
Geſn. aq. 277. Mytulus.
Bell. aq. 397. Mytulus.
Mery act. par. 1711. *t.* 3. *f.* 4. 5.
Rondel. aq. 2. *p.* 46.
Aldrov. exſang. p. 512.
Liſt. Conch. t. 362. *f.* 200.
anim. angl. t. 4. *f.* 28.
Bonann. recr. 2. *f.* 30.
muſ. Kirch. 2. *f.* 29.
Ginann. adr. 2. *p.* 36. *t.* 23. *f.* 168.
Boſt. op. ſubſ. 3. *p.* 101. *t.* 11. *f.* 9-11.
Heyda anat. mytal. 1683-8.
Argenv. zoomorph. t. 5. *f.* D. E. F.
Knorr Vergn. 1. *t.* 4. *f.* 5. 6. 4. t. 15. *f.* 1. & 5. *t.* 25. *f.* 1.
Regenſ. 1. *t.* 7. *f.* 8. *t.* 11. *f.* 58. & *t.* 12. *f.* 71. 72.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 750. 751. 755.
β) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 201.
γ) *Liſt. Conch. t.* 362. *f.* 202.
δ) *Liſt. Conch. t.* 363. *f.* 204.
ε) *Gualt. teſt. t.* 7. *f.* A?
Habitat in mari caſpio, balthico, mediterraneo, oceano, europæo & indico, *intra tropicos utplurimum maximus, intra arcticum minimus, teſta ſubtrigona ſub epidermide ſubfuſca aut vireſcente nitidiſſime violacea,*

Huc referendi quoque lithophago affines, truncatus, cordatus, curviroſtrus & donacinus, a Schroetero Einl. in Conch. 3. *Vorr. p.* XV. XVI. *memorati.*

rarius fuſca, flavicante, aut radiata, ad $3\frac{1}{2}$ pollic… longa, pinnæ more byſſo exſerendo inſtructa; incol… plebeiis edulis, concoctu difficillimus, etiam cepis ad… tis, certis anni temporibus, an ab aſteria ophiur… comeſto? venenatus.

angulatus. 12. M. teſta lævi ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 54… n. 136.*
Liſt. Conch. t. 360. *f.* 199. & *t.* 364. *f.* 203?
Gualt. teſt. t. 91. *f.* E.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 47.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 756.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 747.
Habitat in mari mediterraneo & *ad* Caput Bonæ Spei, β) *ad* novam Seelandiam, *eduli affinis, ſed teſta major… ultra* 5 *pollices longa, &* $2\frac{1}{2}$ *lata, viridi, cærul… cente, aut virore intermiſto nigra, annulata natib… diſtantibus acutis, cardinis apice dentibus* 6 *ſ… crenis ad* 100 *notato, valvis valde convexis pecor… ungulas referentibus.*

bidens. 13. M. teſta ſtriata ſubcurvata: margine poſteriori inflexo, cardine terminali bidentato.
Liſt. Conch. t. 356. *f.* 193. *t.* 358. *f.* 196. &? *t.* 3… *f.* 206.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 24.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 3. 5. *t.* 13. *f.* 6? & 6. *t.* 4. *f.* …
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 742. 743.
Habitat in mari mediterraneo, æthiopico, atlantic… freto, magellanico, *angulato affinis, pollicis tra… verſi magnitudine, at teſta longitudinaliter ſtria… epidermide cinerea, fuſca, cærulea aut nigra pulch… rime tincta.*

Modiolus. 14. M. teſta lævi: margine anteriori carinato, natib… gibbis, cardine ſublaterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 542. *n.* 13… *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 53. *f.* 1-5. *rar.* 2. *p.* 3-6. *prodr.* 3014.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* C. Muſculus papuanus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 1. Lulat.
Liſt. Conch. t. 356. *f.* 195. & *t.* 359. *f.* 198.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* B. C? E?
Petiv. amb. aq. t. 19. *f,* 2? 10. 12?
Gualt. teſt. t. 91. *f.* H. I.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 25. &? *t.* 11. *f.* 67.
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 3.
Chem…

Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 757-760.
β) *Liſt. Conch. t.* 356. *f.* 194.
Klein oſtr. t. 12. *f.* 78. 79.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 5.
Habitat in mari mediterraneo, oceano ſeptentrionali, indico, americano, *fucis, teſtaceis, zoophytis adhærens; teſta ad ½ pedem longa, & 2¼ pollicem lata, ſub epidermide nigra, cinerea aut fulva, cæruleſcente aut admiſta candore cærulea, aut alba vel flavicante radiis rubris, aut dimidiato ſpadicea & alba, umbonibus tumidis oblongis, natibus retrorſum prominentibus, vulvæ regione recurvato ſtriata, parte poſteriore ultra nates protuberante, cardine ante nates cartilagineo, incola ipſo rubro & aurantio eduli.*

cygneus. 15. M. teſta ovata anterius compreſſiuſcula fragiliſſima, cardine laterali.
Müll. verm. terr. & fluviat. 2. *p.* 208. *n.* 394. *zool. dan. prodr.* 3010. Mytilus teſta ovata antice convexa natibus integris.
Liſt. Conch. t. 156. *f.* 11.
an. angl. app. p. 146. *t.* 2. *f.* 29.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* F.
Argenv. Conch. 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 5. 6. 7. 11.
zoomorph. t. 8. *f.* 12.
Schroet. Fluſconch. t. 3. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 85. *f.* 762.
β) Mytilus (radiatus) teſta ovali antice compreſſiuſcula poſtice radiata. *Müll. hiſt. verm. terr. & fluv.* 2. *p.* 209. *n.* 395.
Liſt. Conch. t. 155. *f.* 10.
Ginann. adriat. 2. *p.* 51. *t.* 3. *f.* 15.
γ) *Liſt. Conch. t.* 150 *f.* 5?
Habitat frequens in Europæ lacubus & *ad* fluviorum oſtia, *teſta a* 12 *lineis ad* 6 *pollices lata, & a* 20 *lineis ad* 3½ *pollices longa hiante ſub epidermide tranſverſim rugoſa ſæpe nitida, anterius interdum ochroleuca: radiis viridibus, intus alba opaca natibus minutis retroverſis, conniventibus.*

anatinus. 16. M. teſta ovali compreſſiuſcula fragiliſſima margine membranaceo, natibus decorticatis. *Fn. ſuec.* 2158.
Müll. hiſt. verm. ter. & fluv. 2. *p.* 207. *n.* 393. *zool. dan. prodr.* 3009. Mytilus teſta ovali antice compreſſa, natibus decorticatis.

Liſt. Conch. t. 153. *f.* 8.
Klein oſtr. t. 9. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 7. *f.* E.
Argenv. Conch. 1. *t.* 24. *n.* 10. *f.* 1. 2.
zoomorph. t. 8. *f.* 8. 11.
Rondel. piſc. p. 214.
Geſn. aq. p. 281.
Petiv. gazoph. t. 93. *f.* 8. 9.
Schroet. Fluſconch. t. 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 86. *f.* 763.
β) *Liſt. Conch. t.* 154. *f.* 9.
γ) *Liſt. Conch. t.* 151. *f.* 9?
Habitat in Europæ aquis dulcibus, *frequentius in ſtagnantibus, a mya pictorum fragilitate & cardine diſtinctiſſimus, mytilo cygneo ſimilior, an vere diſtinctus? anatum cibus, teſta tenerrima pellucida,* 8-30 *lineas lata,* 1- 54 *longa, utrinque rotundata, virideſcente nitida, ſtriis apertura parallelis ſubtiliſſimis ſtrigiſque paucis nigricantibus notata, intus glabra, nitida, alba, cærulea vel cæruleſcente, luteoque varia, & iridis coloribus micante.*

viridis. 17. M. teſta lævi ovata membranacea pellucida, cardine terminali. *Muſ. Lud. Ulr.* 542. *n.* 138.*
Habitat in Oceano meridionali, *teſta viridi, tenerrima, ungue minori.*

ruber. 18. M. teſta rugoſa: valvis obliquis anterius dilatatis, margine cardinali apicem æquante. *Muſ. Lud. Ulr.* 543. *n.* 139.*
Habitat in Oceano magis auſtrali, *teſta rubra, minuta, convexa: cardinis dente breviſſimo compreſſo.*

albus. 19. M. teſta tranſverſim ſtriata, natibus gibbis, cardine laterali. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.* 177.
Habitat frequens ad littus Chilenſe, *teſta* 6 *circiter pollices longa, & ad* 3½ *lata ſub cærulea epidermide nivea cæruleo tincta, verme incola albo ſapidiſſimo.*

ater. 20. M. teſta ſulcata poſterius ſquamoſa. *Molin. hiſt. natur. Chil. p.* 177.
Habitat ad littus Chilenſe, *albo minor, teſta pinnæ more aſpera, obſcure cærulea, incola nigro non eduli.*

diſcors. 21. M. teſta ovali cornea ſubdiaphana anterius longitudinaliter poſterius tranſverſaliter ſtriata. *Müll. zool. dan. prodr.* 3014. *O. Fabr. Fn. groenl.* 418.

Hermann Naturf. 17. *t.* 3. *f.* 5-8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 121. *vign.*
Chemn. Naturf. 10. *t.* 1. *f.* 8.
Conch. 8. *t.* 86. *f.* 764-768.
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 444. *t.* 9. *f.* 15.
Habitat in Oceano ſeptentrionali & auſtrali, *ſcopulis byſſi interventu affixa, anatum cibus, teſta* $2\frac{1}{2}$-22 *lineas longa,* $1\frac{3}{4}$-$13\frac{1}{2}$ *lata, cornea, plurimam partem fuſca, viredine potiſſimum ad marginem intermiſta; intus cæruleſcente cum rubore aut ex viridi albicante, in 3 quaſi areas diviſa, quarum media ſtrias vix conſpicuas tranſverſas aut nullas habet; incolæ non edulis, pes albus, labia fulva, branchiæ & aperturæ anteriores brunneæ, dorſum fuſcum.*

Hirundo. 22. M. teſta lævi: valvis bilobis; lobo cardinali longiore tenuioreque. *Muſ. Lud. Ulr.* 543. *n.* 140.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 6. Chanon.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* G. Avicula.
Argenv. Conch. t. 19. *f.* B. Avicula ſ. Hirundo.
Liſt. Conch. t. 220. *f.* 55. & *t.* 224. *f.* 59.
Bonann. recr. 2. *f.* 58.
muſ. Kirch. 2. *f.* 57.
Petiv. aq. amb. t. 19. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 94. *f.* B.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 13. & *t.* 9. *f.* 38.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 7.
Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 5. & 5. *t.* 10. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 81. *f.* 722-725.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 726.
γ) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 81. *f.* 727.
δ) *Gualt. teſt. t.* 94. *f.* A?
Knorr Vergn. 6. *t.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 81. *f.* 728.
ε) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 15. *f.* 7. Eſſan.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 171. *f.* 1672.
Habitat in Oceano indico, americano, atlantico, mediterraneo, *teſta magnitudine, craſſitie, forma, colore, pictura varia, ſubtiliſſime & confertim tranſverſe rugoſa, intus margaritacea, baſi contracta.*

Pholadis. 23. M. teſta oblonga anterius obtuſiore rudi tranſverſaliter rugoſa. *Mant.* 2. *p.* 548. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 22. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 11. *t.* 87. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 8. *t.* 82. *f.* 735.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *in coralliis & ſaxis pholadis more habitaculum ſibi excavans, teſta magnitudine fabæ ½ pollicem longa, 1¼ lata, vix utroque fine clauſili, inconſpicua, cardine edentulo, aut denticulo obſoleto.*

ſtriatulus. 24. M. teſta ſubtiliſſime ſtriata: cardine terminali unidentato.
Mant. 2. p. 548.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. f. 5?
Chemn. Conch. 8. t. 83. f. 744. a? b?
Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 449. t. 9. f. 16.
Habitat in Oceano ſeptentrionali & indico, *teſta 1¼ pollicem longa, & ½ lata, formæ ſemilunatæ, qua potiſſimum ab exuſto diſcrepat, anterius dilatata, ſubdiaphana ſpadicea: margine extrorſum ſubtiliſſime crenato.*

vulgaris. 25. M. teſta altero latere planiuſcula inflexa: natibus incurvis convergentibus, cardine unidentato.
Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 732.
Habitat frequens in Oceano americano, *teſta intus dilute margaritacea: epidermide fuſca.*

plicatus. 26. M. teſta rhombea inæquilatera tenuiſſima tranſverſim ſtriata rugoſaque, natibus incurvis poſterioribus.
Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 733.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta hyalina, fragiliſſima intus dilute argentea, altero latere rotundata, altero dilatata, anguloſa.*

niveus. 27. M. teſta ovata ſubdiaphana ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata: margine acuto, cardine bidentato.
Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 734.
Habitat rariſſimus ad inſulas Nicobaricas, *teſta nivea, intus glaberrima.*

afer. 28. M. teſta ſubtrigona anterius dilatata poſterius planiuſcula hiante: natibus acuminatis retrorſum verſis, margine acutiſſimo.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 6. 7.
Knorr Vergn. 4. t. 15. f. 5?
Chemn. Conch. 8. t. 83. f. 739-741.
Habitat in maris mediterranei auſtralioribus, *& ad Africæ* littus, *teſta ad 4 pollices longa, & 2 lata, intus ochroleuca iridis coloribus varia, exterius ſtraminea, aut ex virente & flavicante miſta lineiſque angularibus rubellis picta; an myæ Pernæ varietas?*

ſmaragdinus. 29. M. teſta ſubtrigona planiuſcula: cardine in altera valva bidentato, in altera unidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 83. *f.* 745.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 84. *f.* 746.
Habitat ad Tranquebariæ littora, *teſta viridi intus ſubmargaritacea, β) ad* Guineam *habitans, teſta fuſca, margine, interdum quoque maculis diſci viridibus.*

verſicolor. 30. M, teſta ſubtrigona planiuſcula: cardine unidentato, margine glabro acutiſſimo.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* Q.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 748.
Habitat in Guineæ *littore, afro affinis, teſta ad* 3 *pollices longa & ultra* 2 *lata, ſub epidermide fuſca, ſtriis tranſverſis confertis faſciiſque* 2 *obſcure viridibus, utriſque arcuatis notata ex violaceo, albo & ſpadiceo varia; an ad myam pernam referendus?*

coralliophagus. 31. M. teſta medio carinata margine crenata: umbone obtuſo.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 752.
Habitat in Oceano indico & americano, *coralliſero, ſcopulos pholadis inſtar perforans, teſta* $\frac{1}{4}$ *pollicis circiter longa.*

lineatus. 32. M. teſta trigona extrorſum dilatata: lineis angulatis decuſſantibus & confluentibus, cardine bidentato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 84. *f.* 753.
Habitat – – – *teſta minuta ex flavo ſordide vireſcente, intus dilute argentea.*

Faba. 33. M. teſta ovali rufa ſtriata: margine crenulato. *Müll. zool. dan prodr.* 3015. *O. Fabr. Fn. groenl.* 419.
Chemn. Conch 8. *t.* 85. *f.* 761.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis ſcopulis, byſſo æneo ſe affigens, anatis hiemalis & hiſtrionicæ cibus, teſta inflata ſemipellucida, lævigata, ſub epidermide rufa alba, intus glaberrima, margaritacea.*

fluviatilis. 34. D. teſta tenui ſubcuneata intus rubeſcente: natibus recurvis magnis.
Liſt: Conch. t. 157. *f.* 12.
Habitat in Europæ aquis dulcibus, *anatino affinis, an vera diſtincta hujus generis ſpecies?*

fuſcus. 35. M. teſta oblonga anguſta ſubtiliter tranſverſim ſtriata, altero latere emarginata, altero rotundata: natibus prominulis curvis.

Liſt. Conch. t. 359. *f.* 197.
Habitat. - - - teſta minuta, fuſca.

mamma-rius. 36. M. teſta lata brevi retrorſum rotundata: natibus mammarum inſtar protuberantibus.
Liſt. Conch. t. 361. *f.* 199. b.
Klein oſtr. p. 129. *t.* 9. *f.* 27.
Habitat - - -

perſicus. 37. M. teſta lata ſub cortice aſpero rugoſo luteo intus lactea.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 2. *f.* 17.
Habitat in mari Perſico, *teſta duplo latiori, quam longa.*

pictus. 38. M. teſta lata læviſſima flammea vel roſea albo faſciata; natibus obtuſis.
Bonann. recr. 2. *f.* 35.
muſ. Kirch. 2. *f.* 34.
Habitat in mari Luſitanico, *teſta triplo latiore, quam longa.*

undatus. 39. M. teſta lata utrinque rotundata vinoſa: ſtriis undulatis vireſcentibus & cæruleſcentibus, margine ſerrato.
Bonann. recr. 2. *f.* 36.
muſ. Kirch. 2. *f.* 35.
Habitat in mari Luſitanico, *teſta, quam picti, longiore.*

faſciatus. 40. M. teſta pellucida nitente cæruleſcente: faſcia vinoſa & carnea.
Bonann. recr. 3. *f.* 352.
muſ. Kirch. 2. *f.* 106.
Habitat in mari Braſiliam *alluente, teſta ſemipalmam lata, at dimidio breviore.*

purpure-us. 41. M. teſta poſterius rotundata dilutius incarnata intus purpurea: margine denticulato.
Bonann. recr. 3. *f.* 384.
muſ. Kirch. 2. *f.* 116.
Habitat frequens in Braſiliæ *littore.*

ſaxatilis. 42. M. teſta auriformi exterius rugoſa granulata: margine barbato, externo dilatato rotundato.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* D.
Habitat ad Amboinam, *ſcopulis præſertim durioribus affixus, anatum ſuumque cibus, articulo digiti latior, ſed brevior.*

argenteus. 43. M. teſta tranſverſim ſtriata utrinque rotundata fuſca intus argentea, natibus rotundatis.
Gualt. teſt. t. 7. f. D.
Habitat - - -

fulgidus. 44. M. teſta anguſtata nitente aurorea ad latera violaceo-maculata: natibus rotundatis dilatatis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* D.
Habitat in freto magellanico, *teſta matris perlarum inſtar nitida.*

azureus. 45. M. teſta gibba azurea ſubtus flavicanti ſtriata: natibus obtuſis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* H.
Habitat - - - teſta pollicem circiter lata, 1¼ longa: margine inferiori anguſtato.

murinus. 46. M. teſta murina violaceo maculata margine lato rotundato roſea: natibus acuminatis rectis.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* K.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 32.
Habitat ad Guineam.

teſtaceus. 47. M. teſta elongata anguſtata ſub epidermide teſtacea nitente ex argenteo, cæruleo, rubello, flavo, fuſcoque varia.
Knorr Vergn. 4. *t.* 15. *f.* 4.
Habitat - - - modiolo affinis, at teſta majore & pulchriore.

virgatus. 48. M. teſta extrorſum dilatata ex viridi flava: virgis roſeis, natibus obtuſis curvis.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 2.
Habitat - - - rubro affinis.

cordatus. 49. M. teſta oblonga tenuiſſima alba obſolete ſtriata poſterius hiante: hiatu cordato.
Spengl. Beſch. berl. naturf. Geſ. 2. *t.* 9. A. *f.* 3-5.
Catal. raiſ. t. 5. *f.* 13-17. *coll. f.* 12.
Martini Beſch. berl. naturf. Geſ. 2. *t.* 12. *f.* 1.
β) Heart muſcæ. *Mart. univ. Conch.* 2. *t.* 77.

An diſtinctæ a reliquis ſpecies, quas Liſterus Conch. *t.* 1055. *f.* 9. & *t.* 357. *f.* 195. b. & *ex eo Klein oſtr. t.* 12. *f.* 76. 77. *ſiſtit? an a* Müllero *zool. dan. prodr.* 3016. memoratus mytilus teſta ovata, oblonga planiuſcula?

Habitat in Oceano *potiſſimum* indico, β) auſtrali, *corallis & teſtaceis adhærens, nonnunquam inhærens, cardine omnino mytili; an diſtinctum genus?*

ſtagnalis. 50. M. teſta ovali planiuſcula tranſverſim coſtata.
Schroet. Fluſconch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Schwanſee, *ſtagno* ducatus Iſenacenſis, *cygneo & anatino affinis, at teſta longe majore ad* 8 *pollices lata,* 4 *longa, minuſque convexa, vireſcente radiis obſcurius viridibus picta & marginem verſus ex luteo fuſca diſtinctus.*

zellenſis. 51. M. teſta ovali convexa poſterius rotundata anterius elongata & obtuſe acuminata, natibus exoletis.
Schroet. Fluſconch. t. 2. *f.* 1.
Habitat in foſſa, mœnia urbis Cellenſis *circumdante, cygneo affinis, at teſta majore,* 7 *pollices lata,* 3 *longa, ex vireſcente flava.*

roſeus. 52. M. teſta ſuborbiculata: ſulcis 15 triangularibus criſtatis & dentibus triangularibus alternis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 14. *f.* 4. Bajet.
Habitat ad Africæ littus occidentale, *teſta roſea intus alba ad marginem purpurea,* 3 *pollices lata, & paulo breviore; an hujus generis & tribus?*

puniceus. 54. M. teſta gibba acuminata: ſulcis quindecim, margine dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 2. Aber.
Habitat ad Africæ littus occidentale, *teſta* 14 *lineas longa & dimidio anguſtiori, ſub epidermide fulva violacea aut punicea, interdum fuſco viridique intermiſto; cardinis dentibus* 4 *minimis.*

niger. 54. M. teſta complanata tenui ſubtiliſſime ſulcata ſub epidermide nigra nitidiſſime lactea.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 3. Dotel.
Habitat ad Africæ *mediæ littus occidentale, teſta tenerrima ſeſquipollicem longa ſulcis circiter* 100 *exaratæ, cardinis dente* 1-2 *minimis.*

lævigatus. 55. M. teſta complanata lævi ſub epidermide craſſa fulva roſea: margine integerrimo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 4. Fonet.
Habitat in Africæ littore occidentali, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollicem longa & dimidio anguſtiore intus margaritacea, epidermidi interdum virore intermiſto, cardinis dentibus* 2-3.

dubius. 56. M. teſta tranſverſim rugoſa, utrinque obtuſa fulva intus margaritacea: natibus exoletis, cardine edentulo. *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 17. *f.* 21. Mutal.
Habitat in Africæ mediæ aquis dulcibus, *teſta ad* 5 *pollices lata*, 2 *longa*, *an hujus generis?*

polymorphus. 57. M. teſta quinqueloculari: valvis carinatis latere incumbente planiuſculis, natibus acutis deorſum inflexis. *Pall. it.* 1. *app. n.* 85.
Habitat in mari *nuclei pruni magnitudine*, *quadruplo major in* aquis dulcibus Ruſſiæ, *glomeratim penicillis radiatis lapidibus & teſtaceis adhærens*, *teſta ſubfuſca*, *loculorum diſſepimentis breviſſimis.*

Canaliculus. 58. M. teſta læviuſcula brunnea intus verſicolore, ſcrobiculo cardinis canaliculato. *Martyn. univerſ. conchol.* 2. *t.* 78.
Habitat ad novam Seelandiam.

316. PINNA.

Animal Limax.
Teſta ſubbivalvis fragilis erecta hians, emittens barbam byſſinam.
Cardo edentulus coalitis in unam valvis.

rudis. 1. P. teſta ſulcata: ſquamis fornicatis per ſeries digeſtis. *Muſ. Lud. Ulr.* 544. *n.* 41.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 15. *f.* 5. Apan.
Liſt. Conch. t. 373. *f.* 214
Ginann. adr. 2. *t.* 25. *f.* 166.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* C.
Chemn. Conch. 8. *t.* 88. *f.* 773.
β) *Rumpf muſ. t.* 46. *f.* 11. Pinna lata.
Pet. amb. aq. t. 19. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 81. *f.* A.
Chemn. Conch. 8. *t.* 88. *f.* 774.
Habitat rarior in Oceano americano & atlantico, β) *in* indico & mari rubro, *teſta* 12-16 *pollices longa*, $4\frac{1}{4}$-8 *lata*, *rubra ſulcis* 6-8 *exarata*, β) *nigra ſulcis vix conſpicuis.*

pectinata. 2. P. teſta dimidia longitudinaliter ſtriata: latere altero tranſverſe ſubrugoſo. *Gualt. teſt. t.* 79. *f.* A.

Argenv. zoomorph. t. 5. f. N?
Chemn. Conch. 8. *t.* 87. *f.* 770.
β) *Chemn. Conch.* 8. *t.* 87. *f.* 771.
Habitat in Oceano indico, *teſta triangulari cornea, 3 pollices longa, & 4 lata, β) minore, tenuiore, ra-riore, 4 pollices & 5 lineas longa, 2 p. & 5 lineas lata.*

nobilis. 3. P. teſta ſtriata: ſquamis caniculato-tubuloſis ſubimbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 544. *n.* 142.
Bonann. recr. 2. *f.* 24.
muſ. Kirch. 2. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 3.
Knorr del. t. B. V. *f.* 3.
Vergn. 2. *t.* 26. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 89. *f.* 775. 776.
β) *Liſt. Conch. t.* 372. *f.* 213?
Chemn. Conch. 8. *t.* 89. *f.* 777.
γ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 92. *f.* 785.
δ) *Argenv. Conch. t.* 22. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 86. *f.* 769.
Habitat in mari mediterraneo, adriatico, americano, *teſta ſubfuſca, margine externo rotundata, 7½ pollices longa, & 3¼ lata, ſquamis extrorſum majoribus ad 1½ pollicem longis, rectis: valvarum parte dimidia coſtata, altera tranſverſim rugoſa: rugis partem latiorem verſus ſtrias decuſſantibus. Tendo græcis in deliciis.*

muricata. 4. P. teſta ſtriata: ſquamis concavis ovatis acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 545. *n.* 143.*
Haſſelq. it. 447. *n.* 137. Concha Pinna.
Liſt. Conch. t. 370. *f.* 210. Pinna tenuis ſtriata muricata.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* M. Pinna lata altera.
Pet. amb. aq. t. 19. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 92. *ſer.* 1. *f. prim. & ult.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 781.

Byſſus, quam pinnæ largiter præbent, ſerici inſtar operibus textilibus in Italia meridionali inſervit, ſerico adhuc potior, eo quod tinctura non egeat pinnæ ipſæ erectæ in ſinubus potiſſimum tranquillis maris paulo calidioris utplurimum gregatim habitant, neque a ſepia vexatæ, neque a cancro adverſus hoſtem defenſæ, caro vermis incolæ multis delicioſa.

Habitat in Oceano indico, teſta tenui, pellucida, cornea, ultra 5 pollices longa, & 3 fere lata: ſtriis alternis echinatis.

rotundata. 5. P. teſta ſquamis obſoletis: margine rotundata. *Muſ. Lud. Ulr.* 545. *n.* 144.*
Gualt. teſt. t. 80. *f.* A. B.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 1.
Chemn. Conch. 8. *t.* 93. *f.* 79.
Habitat in maris mediterranei *ſinubus tranquillis, teſta oblonga, albida, non raro ultra 2 pedes longa: rugis perpendicularibus undulatis, parallelis, ſquamis in latiori parte ſubtiliſſimis concavis, acutis, rarioribus.*

ſquamoſa. 6. P. teſta ſquamis ſubtiliſſimis undulatis rugiſque flexuoſis latis: infra acuminata nuda.
Liſt. Conch. t. 374. *f.* 215.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 22. *f.* B.
Chemn. Conch. 8. *t.* 92. *f.* 784.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta 13 fere pollices longa & 6½ lata, infra albida, ſupra ſuſpadicea, margine externo angulato.*

carnea. 7. P. teſta tenui carnea nuda longitudinaliter ſulcata: margine externo ſubrotundato.
Knorr Vergn. 2. *t.* 23. *f.* 1.
Habitat - - - maculis interdum albis varia.

ſaccata. 8. P. teſta lævi ſaccata erectiuſcula ſubfaſtigiata. *Muſ. Lud. Ulr.* 546. *n.* 145.*
Rumpf muſ. t. 46. *f.* N. Pinna alba.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 370. *f.* 211? & *t.* 371. *f.* 212?
Gualt. teſt. t. 79. *f.* F.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 779?
Schroet. Einl. in Conch. 3. *p.* 481. *t.* 9. *f.* 17.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo & indico, *teſta tenui inferius albida, ſuperne rubella, 5¼ pollices longa, 2¾ lata, ſuperius plana margine rotundata, inferius gibba, ſquamis nuda, ſtriis 10. extrorſum lateſcentibus longitudinalibus.*

digitiformis. 9. P. teſta lævi tubuloſa digitiformi incurva margine ſummo membranacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 546. *n.* 146.*

Habitat in Oceano indico, *teſta planiuſcula, oblonga pellucida.*

lobata. 10. P. teſta nuda lobata. *Muſ. Lud. Ulr.* 547. *n.* 147.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſtraminea, ſtriis purpureis picta, membranacea, dum valvæ explicantur, obcordata: lobis lateralibus rotundatis latioribus, a cardine ad lobos nervus; a nervo lineæ laterales ductæ.*

vitrea. 11. P. teſta hyalina longitudinaliter ſubundulatim ſtriata: ſtriis rarius ſquamatis ſtrias ad marginem transverſim decuſſantibus.
Gualt. teſt. t. 78. *f.* C. & *t.* 79. *f.* E.
Chemn. Conch. 8. *t.* 87. *f.* 772.
Habitat rariſſima in Oceano indico.

incurva. 12. P. teſta anguſtata elongata nuda-carinata: rugis tranſverſis undulatis.
Bonann. recr. 2. *f.* 23.
muſ. Kirch. 2. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 46. *f.* I. K.
Petiv. amb. aq. t. 19. *f.* 4. 5.
Klein oſtr. t. 11. *f.* 71.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90. *f.* 778.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſpectabili, dilute cornea, ad cardinem curvata, ſtriis paucis longitudinalibus notata.*

bicolor. 13. P. teſta, tenui ad marginem lateralem inflexa flavicante radiis ex atro ſubfuſcis, ſtriis paucis longitudinalibus.
Chemn. Conch. 8. *t.* 90 *f.* 780.
Habitat rarior in mari rubro, *teſta cornea elongata, ſtriis ad marginem curvatum nonnullis tranſverſis arcuatis, margine ſupremo rotundato.*

exuſta. 14. P. teſta planiuſcula cornea nigricante radiata maculata & nebuloſa: ſtriis multis lævibus, paucioribus ſpinoſis: ſquamis canaliculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 91. *f.* 2.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 782.
Habitat rarior in Oceano indico auſtrali.

Vexillum. 15. P. teſta truncata extrorſum: dilatata nuda cornea hinc inde nigro nebuloſa anterius longitudinaliter ſtriata, poſterius tranſverſim rugoſa.
v. *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 7. *f.* 8.
Chemn. Conch. 8. *t.* 91. *f.* 783.

Habitat rariſſima in India, *teſta quaſi alata, margine laterali curvo.*

papyracea. 16. P. teſta tenuiſſima cornea fragili longitudinaliter coſtata: margine extremo ſubrotundato.
Chemn. Conch. 8. *t.* 93. *f.* 786.
Habitat in Oceano indico, *dorſo coſtarum rarius ſquamato, in teſtæ medio macula ex violaceo ſubfuſca, & ad marginem lateralem rugis nonnullis tranſverſis.*

ſanguinea. 17. P. teſta planiuſcula ſubincurva ſanguinea: ſtriis perpendicularibus raris lævibus.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* B.
Habitat – – – *teſta* 3 *pollices longa; an diſtincta ſpecies?*

bullata. 18. P. teſta rectiſſima tenui perpendiculariter ſtriata: rugis ad marginem inferiorem tranſverſis ſpinoſis.
Gualt. teſt. t. 79. *f.* C.
Habitat – – – *an diſtincta a reliquis ſpecies?*

317. ARGONAUTA. *Animal* Sepia, *aut* Clio. *Teſta* univalvis ſpiralis involuta membranacea unilocularis.

Argo. 1. A. carina utrinque ſubdentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 548. *n.* 148.*
Bellon. aq. t. 380. Nautilus.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 1. *f.* 13. Nautilus ſ. Naupilius.
Rumpf muſ. t. 18. *f.* 1. 4. A. B. Nautilus tenuis.
Gualt. teſt. t. 11. *f.* A. B. & *t.* 12. *f.* A. B. C. Cymbium.
Olear. muſ. p. 66. *t.* 32. *f.* 4. Nautilus.
Teſſin epiſt. 1. *n.* 28. Cymbium.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 3. Nautilus ſulcatus.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* A. B. C. Nautilus papyraceus, *zoomorph. t.* 2. *f.* 2. 3.
Liſt. Conch. t. 554. 555.
Lochn. muſ. Beſler. t. 19.
Muſ. Gottwald t. 40. *f.* 272 – 274.
Leſſer teſtaceoth. t. 1. *n.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 4 - 12.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 29.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 8.

Knorr del. t. B. I. *f.* 3. 4.
Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 1. 2. 4. *t.* 99. *f.* 1. & 6. *t.* 31.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 156.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 157.
δ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 17. *f.* 158. 159.
ε) *Martin. Conch.* 1. *t.* 18. *f.* 160.
ζ) *Martin. Conch.* 1. *vign.* 8. *f.* 2.
Habitat in Pelago, mari indico, mediterraneo, *teſta ...* *interdum flaveſcente ſtriis coſtiſve lævibus vel nodo...* *non raro bifurcis, carina utplurimum fuſceſcente: ...* *navigat emiſſa, aqua exonerata ſentina ſupinus in ſu...* *aquarum, membranam miræ tenuitatis extendit; ...* *chia duo retorquens, cæteris ſubremigans, velifica...* *demum hauſta ſe mergens aqua.* Plinius IX. 29.

vitreus. 2. A. carina medio dentata.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* B.
Martin. Conch. 1. *p.* 239. *t.* 18. *f.* 163.
Habitat - - - rariſſimus teſta conica tranſverſim coſtata, *carina convexa, apertura ovali.*

Cymbium. 3. A. carina rugoſa mutica.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* D.
Mart. Conch. 1. *t.* 18 *f.* 161.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta vix minimæ arenulæ* *magnitudine, depreſſa, tenera, rugoſa: rugis ſtri...* *ſubtiles longitudinales decuſſantibus.*

Cornu. 4. A. carina annulis quatuor lævibus elevatis.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 458. *t.* 13. *f.* 3-5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 137. *f.* 1271 - 1273.
Favann. Conch. t. 5. *f.* 1.
Habitat ad Caput Bonæ ſpei, *teſta lineam alta, 5 lin...* *tenera, pellucida, ſtriis flexuoſis notata, ſpiræ an...* *fractibus omnibus exterius conſpicuis disjunctis, aper...* *tura parallelogramma.*

arctica. 5. A. perforata, carina integra. *O. Fabr. Fn. groenl.* p. 386. *n.* 384.
Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 38. Clio helicina.
Habitat frequens, vere potiſſimum & auctumno, in ſu... *perficie* maris Groenlandiam *alluentis, teſta fragiliſſima,* *diametri* $3\frac{1}{2}$ *linearum alba, ſubtiliter ſulcata, umbilico* *perforato.*

318. NAUTILUS. *Animal* (*Rumpf muſ. t.* 17. *f.* B.) *Teſta* univalvis iſthmis perforatis concamerata, polythalamia.

* *ſpirales rotundati.*

† *anfractibus contiguis.*

Pompilius. 1. N. teſtæ apertura cordata, anfractibus obtuſis lævibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 549. *n.* 149.*
Rondel. aq. p. 97. Cochlea margaritifera.
Bellon. aq. t. 382. Nautilus alter.
Rumpf muſ. t. 17. *f.* A. C. Nautilus major craſſus.
Jonſt. aq. t. 10. *f.* 1. 2. 7.
Liſt. Conch. t. 550. *f.* 1. 3. *t.* 551.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 1. *f.* 1. 2.
Gualt. teſt. t. 17. A. *f.* A. B. *t.* 17. B. & 18.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* E. F.
Pet. amb. aq. t. 3. *f.* 7.
gazoph. t. 99. *f.* D.
Breyn. polyth. 14.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 1-3.
Beſl. gazoph. t. 22. *f. prim. & ult.*
Lochner muſ. Beſler. t. 19. *f.* 5. 6.
Muſ. Guttwald. t. 40. *f.* 271. aa. b. *t.* 41. *f.* 276.
Leſſer teſtaceoth. t. 2. *f.* 11.
Chemn. Beytr. 2. *Teſtaceoth. tit.*
Knorr delic. t. B. *f.* 1. 2. & *t.* B. I. *f.* 1. 2.
Vergn. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. & *t.* 2. *f.* 3. & 4. *t.* 22. *f.* 1. 2?
Martin. Conch. 1. *p.* 226. *vign.* 10. *t.* 18. *f.* 164-167.
β) *Liſt. Conch. t.* 552. *f.* 4.
Knorr del. nat. ſel. t. B. 3. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 7. *f.* D. 3.
cata. raiſ. t. 2.
Chemn. Conch. 10. *t.* 137. *f.* 1274. 1275.
Habitat in indico & africano Oceano, *teſta ſæpius grandi, ſolida, ſub cortice albo, maculis virgatis fuſcis ſtriis flexuoſis ſpectabili matris perlarum inſtar nitente, hinc ſæpius decorticata & pulchra pictura elaborata, ad pocula aquæ potatorum orientalium præparatur.*

Calcar. 2. N. teſtæ apertura lineari, anfractuum geniculis elevatis

Planc. Conch. 12. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* B. C.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* c. d.
Martin. Conch. 1. *t.* 19. *f.* 168. 169.
Habitat in mari adriatico, *minutus; an vere diſtinctus a reliquis ſpecies.*

criſpus. 3. N. teſtæ apertura ſemicordata anfractuum geniculis crenatis.

Planc. Conch. 10. *t.* 1. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* A. D.
Ginann. adr. t. 14. *f.* 112.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta utrinque umbilicata, granulata, ſtriata: ſtriis flexuoſis, dorſo carinato, ſiphone centrali, cameris medio paulisper inflexis.*

Beccarii. 4. N. teſtæ apertura obovata, anfractibus tortuoſis: geniculis inſculptis.

Planc. Conch. 8. *t.* 1. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* H. H. I.
Ginann. adr. 2. *t.* 14. *f.* 111.
Lederm. microſc. 16. *t.* 8. *f.* a. & *t.* 4. *f.* B.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 16.
Schroet. inn. Bau. Conch. t. 1. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 19. *f.* 178. 179. & *t.* 20. *f.* 175-1..

ammonoides. β) Nautilus teſta compreſſa: apertura lineari: anfractibus contiguis: ſtriis elevatis multiradiata. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 5. 6.

Habitat in mari mediterraneo & adriatico, *inter protypa cornuum ammonis foſſilium princeps, teſta ſubdepreſſa minuta.*

balthicus. 5. N. teſta convexa: apertura lineari, anfractuum primo reliquos longe ſuperante.

Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 20. *t.* 1. *f.* 2.
Naturf. 17. *p.* 120.
Habitat in mari balthico, *fucorum radicibus adhærens, n. Beccarii affinis, teſta nunc opaca, nunc nitente, ſæpius pellucida, anfractibus nunc lævibus, nunc ſtriatis, nunc coſtatis, nunc tuberculatis.*

Nautili *plurimi etiamnum in pelagi abyſſo latent, & noti hactenus, Pompilio, Spirula, Orthocerate & foſſilibus exceptis, tam exiles, ut armato oculo examinari penitius debeant.*

Helicites. 6. N. anfractibus occultis.
Schroet. Einl. in Stein. 4. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat - - - hactenus tantummodo foſſilis repertus in monte S. Petri *ad* Moſæ Trajectum, *lentis utplurimum magnitudine, teſta nunc convexiuſcula, nunc depreſſa, nunc lævi, nunc ſtriata.*

rugoſus. 7. N. teſtæ apertura lineari, anfractibus compreſſis incraſſato-marginatis.
Habitat in Oceano auſtrali, *minutus, teſta alba, depreſſo-plana: diſſepimentis internis extrinſecus prominulis, ſ. rugis tranſverſis ſecundum diſſepimenta.*

umbilicatus. 8. N. teſtæ apertura compreſſo-lineari, anfractibus compreſſis, umbilico concavo.
Column. phytob. 2. *t.* 38. *f.* E.
Habitat Liburni, *minutus, teſta, præſertim ad carinam, ſulcis tranſverſis ſecundum diſſepimenta oblique articulata.*

†† *anfractibus disjunctis.*

Spicula. 9. N. teſtæ apertura orbiculari, anfractibus cylindricis.
Muſ. Lud. Ulr. 549. *n.* 150.*
Swammerd. bibl. nat. 1. *t.* 7. *f.* 7. 8.
Liſt. Conch. t. 550. 2.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 39.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 91. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 5. *f.* G. G.
Breyn. polyth. 21. *f.* 2.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 6.
Scheuchz. Schweiz. Naturg. 3. *f.* 15.
Bytem. app. t. 11. *f.* 49.
Knorr Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *p.* 254. *vign.* 11. *f.* 1-3. & *t.* 20. *f.* 184. 185.
Habitat in Oceano americano & indico, *teſta pollicem circiter magna, exalbida, intus matris perlarum inſtar nitente orbiculari, anfractibus introrſum ſenſim decreſcentibus, primo prominulo rectiuſculo, ſiphone teſtæ parietibus contiguo, an protypus lituitarum?*

Spengleri. 10. N. teſta lævi: tuberculis quatuor conicis.
Spengl. Schr. daeniſh. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. b. c.
Habitat in arena buccinorum caſſideorum Indiæ, *teſta minima.*

unguiculatus. 11. N. teſta diaphana: ſeptis intermediis exterius pro-
berantibus, tuberculis conicis ſex.
Spengl. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 9. d.
Habitat in arena buccini caſſidei Indiæ, *teſta mini-*
tenera, nitida, alba ſubcoſtata.

** elongati *rectiuſculi.*

Semilituus. 12. N. teſtæ apice incurvato-ſpirali, anfractibus conti-
Column. phytob. 3. *t.* 38. *f.* D. Semilituus.
Martin. Conch. 1. *t.* 20. *f.* 186. 187.
Habitat Liburni, *ad littus, teſta minima convexiuſ-*
diſſepimentis extrinſecus per inciſuras conſpicuis,
raro umbilicata.

Lituus. 13. N. teſta ſubconica: articulis globoſis ſenſim decreſce-
tibus, apice incurvato ſpirali.
Spengl. Schr. daen. Geſ. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. d-g.
Klein Danz. naturf. Geſ. Schr. 2. *p.* 47. *t.* 1. *lit.*
Habitat rarior in mari rubro, *frequentior inter ſ*

obliquus. 14. N. teſta recto-ſubarcuata: articulis obliquè ſtri
Gualt. teſt. t. 19. *f.* N.
Martin. Conch. vign. 1. *f.* H. h.
Habitat in mari adriatico & mediterraneo, *teſta mi*
ambitu crenata; ſiphone centrali: an protypus or
ceratitarum incurvorum?

Raphaniſtrum. 15. N. teſta ſubcylindrica: articulis toroſis; ſtriis ele
duodenis, ſiphone centrali regulari.
Lederm. microſc. t. 4. *f.* X. *poſter.*
Habitat in mari mediterraneo, *unguis magnitudine*
phano major; an protypus orthoceratitæ cylindr

Rhaphanus. 16. N. teſta articulata: articulis toroſis; ſtriis ele
ſedenis, ſiphone ſublaterali obliquo.
Planc. Conch. t. 1. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* L. L L. M.
Lederm. microſc. t. 4. *f.* X. *prior, & t.* 8. *f.* F.
Habitat in mari adriatico & mediterraneo, *minutus*
protypus orthoceratitæ conici?

Granum. 17. N. teſta ovato-oblonga: articulis toroſis; ſtriis
vatis octonis interruptis, ſiphone obliquo.
Habitat in mari mediterraneo, *minutus, ſtriis ad*
culorum genicula admodum contractis a raphano
tinctus.

Radicula. 18. N. teſta oblongo-ovata : articulis toroſis glabris.
Planc. Conch. 14. *t.* 1. *f.* 5.
Lederm. microſ. t. 8. *f.* e. & *t.* 4. *f.* 1. f.
Habitat rariſſimus in mari adriatico, *minutus*, *ſiphone ſublaterali.*

Faſcia. 19. N. teſtæ articulis ſtriatis : geniculis lævibus elevatis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* O.
Mart. Conch. 1. *vign.* 1. *f.* DD.
Habitat in mari adriatico, *minutus*, *teſta conica*, *confertim ſtriata*, *apice obtuſa*, *margine denticulata : ſiphone centrali.*

inæqualis. 20. N. teſta cylindrica : articulis octo, ſecundo, tertioque breviſſimis, apertura marginata.
Spengl. daen. Geſ. Schr. 1. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 10. a. b. c.
Habitat in maris rubri arena, *teſtacea replente*, *teſta minuta nivea.*

Siphunculus. 21. N. teſta lævi : articulis cylindricis remotis : geniculis attenuatis cylindricis.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* R. S.
Martini Conch. 1. *vign.* 1. *f. f.* F. FF.
Habitat in freto ſiculo, *rupi coralliferæ adhærens*, *teſta minuta*, *articulis* 11, *alternatim anguſtioribus & latioribus.*

Legumen. 22. N. teſta compreſſa articulata, hinc marginata : ſiphone laterali. *Planc. Conch.* 8. *t.* 1. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 19. *f.* P.
Lederm. microſc. t. 8. *f.* g.
Martin. Conch. 1. *vign.* 1. *f.* e. E. I.
Habitat in mari adriatico, *teſta minuta ſubconica*, *apice ad alterum latus cultrato*, *ad alterum leviter arcuato.*

Orthocera. 23. N. teſtæ anfractibus carinato ſtriatis. *It. oel.* 140.
Muſ. Teſſin. 86. Nautilus rectus.
Scheuchz. helv. 7. *f.* 8. *diluv.* 938. Alveolus.
Gmelin act. Petrop. 3. *p.* 246.
Gron. lap. 71.
Habitat in alto pelago, *frequenter foſſilis*, *an diſtincta a reliquis ſpecies protypus ?*

Belemnita. 24. N. teſta æquabili lævi conica acuta.
Habitat – – – – frequens inter foſſilia omnis Europæ; *nonne potius hujus generis*, *quam alcyonii ?*

319. CONUS. *Animal* Limax.
Teſta univalvis, convoluta, turbi-
nata.
Apertura effuſa, longitudinalis,
linearis, edentula, baſi inte-
gra.
Columella lævis.

* Truncati *ſ. ſpira fere truncata.*

marmoreus. 1. C. teſta conica fuſca: maculis ovatis albis, *ſpiræ an-*
fractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 550. *n.* 151.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 2.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 104. a. 104. b.
Liſt. Conch. t. 787. *f.* 39.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 123.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* N. & I.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 25. *t.* 5. *f.* 43. & *t.* 7. *f.* 65.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 11.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* M. O.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 1-4. 13-19. & *t.* 47. *f.* 1-4. & *t.*
f. 2. 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 4. & *t.* 15. *f.* 2. & 4. *t.* 17. *f.*
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 53.
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 685. 686.
β) Valent. Abh. t. 2. *f.* 10. & *t.* 5. *f.* 44.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 5-12.
Martini Conch. 2. *t.* 62. *f.* 687. 688.
γ) Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1279.
δ) Chemn. Conch. 10. *t.* 139. *f.* 1292.
Habitat in Aſia, *δ) rarior, teſta ſubtiliter ſtriata, inter-*
dum atra aut fulva, maculis ſubtrigonis in β) pau-
cioribus & in faſcias confluentibus; ſpiræ paulo ele-
tioris anfractibus emarginatis tuberculato ſpinoſis.

imperialis. 2. C. teſta albida: faſciis longitudinalibus lividis cingu-
liſque linearibus albo fuſcoque articulatis. *Muſ. Lud.*
Ulr. 550. *n.* 152.*
Rumpf muſ. t. 34. *f.* H I. Kroon hoorn.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* E. F. Corona imperialis.
Liſt. Conch. t. 766. *f.* 15.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 26.

Gualt. teſt. t. 22. *f.* A.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 84.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 18-21.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 35.
Martini Conch. 2. *t.* 62. *f.* 690-692.
β) *Martini Conch.* 2. *t.* 62. *f.* 693?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1289.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1290. 1291.
Habitat rarior - - - - -teſta ſatis magna alba, faſciis utplurimum 2 luteis, cinguliſque pluribus ex lineis interruptis albis fuſciſque conflatis, ſpira plana, magis minuſve emarginata, virgiſque undulatis fuſcis picta.

litteratus. 3. C. teſta conica alba: punctis fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 551. *n.* 153.
Rumpf. muſ. t. 31. *f.* D. Voluta muſicalis.
Liſt. Conch. t. 773. *f.* 19? *t.* 774. *f.* 20.
Bonann. recr. 3. *f.* 132? 363.
muſ. Kirch. 3. *f.* 357.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* G. O.
Seb. muſ. 3. *t.* 45. *f.* 1-5.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. c. 101. d.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 4.
Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 3. 3. *t.* 3. *f.* 2. & 4. *t.* 26. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 29. & *t.* 4. *f.* 46.
Martini Conch. 2. *t.* 60. *f.* 666-668.
β) *Gualt. teſt. t.* 22. *f.* B. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 5. 7. *t.* 45. *f.* 8. 9. 12-15. & *t.* 47. *f.* 25.
Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 4. & 5. *t.* 24. *f.* 5.
Martini Conch. 2. *t.* 669.
Habitat in Oceano aſiatico, *teſta interdum rubella aut flaveſcente, punctis ſ. potius maculis ſubcubicis, in ſeries digeſtis: faſciis nonnunquam obſoletis flavis interſitis, aut in β) lineis ſpadiceis, ſpira maculis virgatis fuſcis picta, nunc magis plana, nunc magis convexa.*

Generalis. 4. C. teſta conica nitida: ſpira plana muricata; anfractibus canaliculatis.
Liſt. Conch. t. 786. *f.* 35.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* Y.
Petiv. gazoph. t. 27. *f.* 11.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* G.

Argenv. Conch. t. 12. *f.* T.
zoomorph. t. 3. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 11-13.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 100. 100. 2.
Olear. muſ. 4. *t.* 31. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 3. 2. *t.* 5. *f.* 2. & 3. *t.* 11.
f. 4. 5. & *t.* 18. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 65.
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 645-652.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1301-1303.
Habitat paulo rarior in India, *teſta pulla, lutea, flava vel aurantia, nunc latiore nunc anguſtiore: faſciis 2-4 albis, maculis virgatis pictis; ſpira albida, maculis virgatis undatis varia medio acuminata.*

Virgo. 5. C. teſta conica: baſi cæruleſcente. *Muſ. Lud. Ulr.* 551. *n.* 153.*
Liſt. Conch. t. 753. *f.* 1. *t.* 754. *f.* 2. & *t.* 758. *f.* 3.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* B.
Bonann. recr. 3. *f.* 365.
muſ. Kirch. 3. *f.* 356.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 83.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 8. 9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 24. *f.* 4. & 3. *t.* 22. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 99. b. & *t.* 14. *f.* 105. a. 105. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 595-589.
β) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 16. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 701. 702.
γ) *Liſt. Conch. t.* 767. *f.* 17.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 52. & *t.* 8. *f.* 73.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 4-9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 19.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 653. 654.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 4?
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1281.
Habitat in Oceano africano, *teſta lævi flavicante, frequentius nivea, in γ) albo rubroque teſſellata, in ε) alba: faſcia ſtraminea, ſpira cærulea, aut cærulea: ſpira alba; faſcia ochroleuca.*

Capitaneus. 6. C. teſta conica glabra baſi fuſca: ſpira convexiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 552. *n.* 155.*

Liſt. Conch. t. 780. f. 27. t. 781, f. 28?
Valent. Abh. t. 3. f. 22. 23. & t. 6. f. 49.
Muſ. Gottw. t. 12. f. 85. b. c. & t. 13. f. 99. c-g.
Knorr Vergn. 1. t. 7. f. 6. & t. 15. f. 3. 2. t. 6. f. 3. & 5. t. 16. f. 2.
Martini Conch. 2. t. 59. f. 660-662.
β) *Gualt. teſt. t. 20. f. I.*
γ) *Rumpf muſ. t. 33. f. X.*
Argenv. Conch. t. 12. f. K.
Gualt. teſt. t. 22. f. M.
Regenſ. Conch. 1. t. 7. f. 7.
δ) *Bonann. recr. 3. f. 361.*
muſ. Kircher. 3. f. 354.
Seb. muſ. 3. t. 42. f. 26-36.
ε) *Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 139.*
ζ) *Valent. Abh. t. 5. f. 47.*
Gualt. teſt. t. 20. f. Q.
Seb. muſ. 3. t. 42. f. 40. 41.
Martini Conch. 2. t. 57. f. 630. 631.
η) *Favann. Conch. 2. t. 15. f. A?*
Chemn. Conch. 10. t. 138. f. 1280.
ϑ) *Gualt. teſt. t. 25. f. F.*
Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1298.
ι) *Chemn. Conch. 10. t. 144. A. f. a. b.*
κ) *Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 7. f. 4.*
Habitat in Aſia, *teſta olivacea, lutea, fuſca, ſpadicea aut intermedia, rarius unicolore frequentius faſcia aut 2 albis, maculis virgatis undulatis vel quadratis variis, & præterea crebro punctorum macularumve ſeriebus picta, ſpira rarius plana, utplurimum maculis virgatis varia.*

Tribunus. 7. C. teſta alba: faſciis tribus flavicantibus ſpadiceo maculatis, ſpira convexiuſcula, baſi tranſverſim ſtriata.
Martin. Conch. 2. t. 59. f. 655.
Habitat - - - - teſta lineis ſpadiceis undulatis rarioribus picta.

Miles. 8. C. teſta conica rudi: baſi fuſca, ſpira convexa.
Argenv. Conch. t. 12. f. L. Pſeudo-Archithalaſſus.
Liſt. Conch. t. 786. f. 34.
Rumpf muſ. t. f. W.
Gualt. teſt. t. 20. f. N.
Seb. muſ. 3. t. 42. f. 23. 25.
Muſ. Gottwald. t. 13. f. 99. a 99. b.

Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 4. & 3. *t.* 1. *f.* 2. 3.
Martini Conch. 2. *t.* 59. *f.* 663. 664.
Habitat in India, *teſta albida aut flaveſcente lineis longitudinalibus undulatis notata, baſi tranſverſim ſtriata, faſcia ſpiram fuſco maculatam verſus fuſca.*

Cingulum. 72. C. teſta conica ex luteo flavicante: cingulo medio elevato ſolitario, ſpira acuta. *Mant. univ. Conch.* 1. *t.* 39.
Habitat ad inſulas amicas.

** pyriformes, *baſi rotundata ſubcylindrica ſeſquilongiore, quam ſpira.*

Princeps. 9. C. teſta flava: lineis fuſco purpureis longitudinalibus ramoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 552. *n.* 156.*
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 138?
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 30. *t. f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 779. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* Q.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 30. 31.
Knorr Vergn. 3. *t.* 4. *f.* 2.
Martini Conch. 2. *t.* 63. *f.* 699. 700.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1276.
Habitat - - - - teſta $2\frac{1}{4}$ *pollices longa: faſciis duabus albis hinc inde fuſco maculatis, ſpira obtuſa ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, maculis ſpadiceis, ſuperne atris varia; teſta in* β) *breviore ex atro fuſca.*

Ammirabilis. 10. C. teſta baſi punctato-ſcabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 553. *n.* 157.*
larvatus. α) faſciis nullis.
Mart. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 635. a.
americanus. β) faſciis irregularibus.
a) teſta fuſca albo nebuloſa maculataque.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 46. *f.* 20.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 640.
b) teſta ſpadiceo reticulata nebuloſaque, faſcia interdum alba.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* F. Proarchithalaſſus.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* K. L. V.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 11. 12. 20. 23.
Knorr Vergn. 5. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 638. 639.

c) teſta alba fuſco maculata, guttata, nebuloſa punctata.
Liſt. Conch. t. 759. f. 4. & t. 777. f. 24.
Gualt. teſt. t. 21. f. L.
Knorr Vergn. 6. t. 13. f. 5.
Mart. Conch. 2. t. 61. f. 678.
d) teſta alba, faſciis aurantio lineatis.
Argenv. zoom. t. 10. f. G.
Seb. muſ. 3. t. 44. f. 6.
Mart. Conch. 2. t. 53. f. 590.
e) *Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1297.*
f) faſciis regularibus.
angelicus. a) faſcia unica, *a*) cingulis pluribus punctatis albis, teſta rubra, ſpira fuſco maculata.
Gualt teſt. t. 20. f. P.
Knorr Vergn. 5. t. 17. f. 5. & t. 24. f. 2.
coronatus. *Martin. Conch. 2. t. 61. f. 680.*
b) cingulo punctorum rubellorum, lineiſque tranſverſis elevatis.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. M.
Martin. Conch. 2. p. 275. vign. 26. p. 214. f. 1.
c) faſcia flava media, cinguliſque punctatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. f. N.
Martin. Conch. 2. vign. 26. p. 214. f. 2.
d) teſta fuſca, faſcia alba, ſerieque macularum albarum obliqua.
regius. *Knorr Vergn. 5. t. 25. f. 3.*
a) faſciis duabus *a*) faſciis aurantiis obſcurius lineatis: interſtitiis albis, punctis maculiſque undulatis aurantiis.
Seb. muſ. 3. t. 46. f. 22. 23.
Martin. Conch. 2. t. 61. f. 677.
b) faſciis albo fuſcoque variis, teſta alba: maculis undatis fuſcis.
Martin. Conch. 2. t. 62. f. 684.
c) faſciis flavicantibus trifariam fuſco lineatis, teſta alba fuſco ſtriata.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 3.
d) faſciis fuſcis granulato ſtriatis, teſta albo fuſcoque nebuloſa.
Martin. Naturgeſch. 1. p. 378. t. 19. f. 12.

Coni pauciſſimi europæi, multi parum, ſi patriam nativamque formam ſpectes, noti, &, ſi in nullo alio genere, in hoc certe, difficillimum, ex iconibus & in muſeis aſſervatis ſpeciminibus certo determinare, quid ſpecies ſit, quid varietas, quantum arti in exornando exemplo debeatur: Ammiralium 10 *& varietates nitidas, turbinis ſcalaris & oſtreæ* Mallei *æmulas nobilitavit docta ignorantia, pretiavit, quam patiuntur opes, ſtultitia, emitavit barbara luxuria.*

ordinarius. e) faſciis tribus.
a) teſta teſtacea albo maculata, faſciis albis ſubreticulatis: media cingulo articulato.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* C. Admiral.

guineenſis. b) teſta ſtraminea: faſcia media lineis angulatis auroræ modo tinctis picta.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* Q.*
Chemn. Conch. 18. *t.* 144. A. *f.* i. k.

ſurinamenſis. c) teſta badia, faſciis maculatis: infima fuſco alboque punctata, cingulis punctato articulatis pluribus.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* R.
Martin. Conch. 2. *p.* 282. *vign.* 26. *p.* 214. *f.* 5.

†) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1293.
d) teſta fuſca: maculis cordatis albis, faſciis albis: media maculis duabus quadratis.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.

d) faſciis quatuor.

ſummus. a) teſta ferruginea maculis albis ſparſis: faſciis flavis tenuiſſime reticulatis: tertia cingulo albo maculato.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* B. Opper admiral.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* N. Archithalaſſus primus.
Petiv. gazoph. t. 28. *f.* 4. (male).
amb. t. 15. *f.* 18.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 5. 6.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 6.
Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 17. *f.* I[1].
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. *f.* 11.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 634.
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1308.

††) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1309.

occidentalis. b) teſta teſtacea albo maculata: faſciis flavis reticulatis, cingulo articulato.

c) faſciis quinque & pluribus.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* O. P.
Seba muſ. 3. *t.* 48. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 57. *f.* 635.

Cedo nulli. δ) cingulis punctato-articulatis.
a) teſta flava rubro picta, cingulis lacteis 11.
Argenv. zoom. t. 10. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 8.

Knorr Vergn. 6. *t.* 1. *f.* 1.
Martini Conch. 2. *t.* 57. *f.* 633.
b) teſta aurantia lineis elevatis interruptis ſpadiceis confertis.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. 1. *t.* 9. *f.* 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1306.
Habitat in Oceano Americam auſtralem *alluente, varietate fere infinita, pretioſus.*

Vicarius. 11. C. teſta teſtacea albo maculata: faſciis quatuor flavis immaculatis; ſecunda angulo diviſa.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* H. Archithalaſſus ſecundus.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* D.
Petiv. amb. t. 15. *f.* 11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 3. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 17. *f.* I⁵.
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1307.
Habitat - - - -

Senator. 12. C. teſta conica lævi glabra: ſpiræ anfractibus obtuſis ſcriptis.
Liſt. Conch. t. 784. *f.* 31?
Valent. Abh. t. 6. *f.* 50?
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 659.
Habitat - - - teſta flava albo maculata ſtriiſque tranſverſis albo-fuſcoque articulatis numeroſiſſimis notata.

nobilis. 13. C. teſta ſubcylindrica lævi glabra. *Muſ. Lud. Ulr.* 554. *n.* 158.*
Argenv. Conch. t. 12. *f.* M? Tigris lutea.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 21.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 13? 14?
Martin. Conch. 2. *t.* 62. *f.* 689.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 36. *t.* 1. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 14. *f.* E².
Chemn. Conch. 10. *t.* 141. *f.* 1312.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1313. 1314.
Habitat - - - - teſta nitidiſſima flava, aut fuſca, aliquando in olivaceum vergente, albo maculata, ſtriis tranſverſis obſoletis ſubtiliter punctatis.

genuanus. 14. C. cingulis linearibus albo fuſcoque articulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 554. *n.* 159.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* G. Geneſeſche Toot.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 1. Jamar.
Liſt. Conch. t. 767. *f.* 16. & *t.* 769. *f.* 17. b?
Clear. muſ. t. 32. *f.* 3.

Bonann. recr. 3. *f.* 337.
muſc. Kircher. 3. *f.* 336.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* G. H.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 48. *f.* 1-3.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 624. 525.

Papilio. β) *Argenv. Conch. t.* 12. *f.* V. Ala papilionis.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 623.
Habitat ad Guineæ littora, *teſta rubra : faſciis alternatim fuſco rubroque teſſellatis.*

glaucus. 15. C. teſta baſi emarginata ſtriata : ſpiræ inermis anfractibus contiguis. *Muſ. Lud. Ulr.* 555. *n.* 160.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* GG. Botervegie van Boer.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 128.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 84.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 45. *f.* 6. *t.* 55. *f.* 10. *& tres ic. inter* 20. *& tres inter* 23.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. c. x. c. H. c. o. d. ⊙. d. x. *& f.* 103.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 4. & 2. *t.* 7. *f.* 1.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 670-674.
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1277. 1278.
Habitat in India & Africa, *teſta maculis fuſcis, ſpadiceis, rubris, utplurimum ſeriatis varia, ſpira tranſverſim ſtriata, nunc magis nunc minus convexa, maculis interdum quadratis, rarius virgatis varia.*

Monachus. 16. C. teſta gibba fuſco-cæruleſcente nebulata acuta baſi ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 555. *n.* 161.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* CC. Capucinus ſ. Anicula.
Liſt. Conch. t. 756. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* M?
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 27. & *t.* 48. *f.* 46. 47.
Knorr Vergn. 3. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 55. *f.* 612. a-d.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 142. *f.* 1319. 1320.
Habitat in India? *teſta nonnunquam ſeriatim punctata.*

minimus. 17. C. teſta cineraſcente punctis oblongis cincta. *Muſ. Lud. Ulr.* 556. *n.* 162.*
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 5. & 6. *t.* 1. *f.* 5.

Martin. Conch. 2. *t.* 55. *f.* 613.
Habitat - - -

Ruſticus. 18. C. teſta ovata baſi rugoſa muricatoque ſcabra : ſpira conico-convexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 556. *n.* 163.*
α) faſcia nulla.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* R. Voluta cinerea.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 32 ?
Gualt. teſt. t. 25. *f.* R.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 578.
β) faſcia albido nebulata.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 37-39.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* D.
Knorr Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 86. b ?
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 694. 695.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* e. f ?
Habitat in Africa, *teſta livida : β) lineis punctiſque nigricantibus varia.*

Mercator. 19. C. teſta ovata alba : faſciis reticulatis flavis. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 164.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 3. Tilin.
Liſt. Conch. t. 788. *f.* 41.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 136.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 65. B.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 54.
Knorr Vergn. 2. *t.* 1. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 92. a.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 619. 620. 621 ?
Habitat ad Africæ *littus occidentale ; teſta mediæ magnitudinis interdum flavicante : faſciis nonnunquam fuſcis aut ſpadiceis.*

Betulinus. 20. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa : ſpira planiuſcula mucronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 557. *n.* 165.*
Liſt. Conch. t. 762. *f.* 11.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 131.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* C.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 1-4. & *t.* 45. *f.* 7. 10. 11.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 101. a. b.

Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 60. *f.* 665.

Meduſa. β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 61. *f.* 675?
γ) *Knorr Delic.* 1. *t.* B. III. *f.* 5?
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1321.
Habitat in India, *teſta ſatis magna, flava, utplurimum ochroleuca, faſciis teſſellatim maculatis lineiſque intermediis fuſcis aut luteſcentibus varia; in β) albis ſeriebus tribus characterum violaceorum, in γ) albis faſciis, maculis punctiſque fuſcis varia.*

ſigulinus. 21. C. teſta baſi ſubemarginata rugoſa: ſpira acuminata, anfractibus planiuſculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 558. *n.* 166.* Voluta filoſa.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* V. & *t.* 33. *f.* 1.
Liſt. Conch. t. 785. *f.* 32.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 34.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 1-4. 8.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 98. a-f.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 2. & 5. *t.* 25. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 47.
Martin. Conch. 2. *t.* 59. *f.* 656-658.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 15. *f.* 2?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 27. *t.* 138. *f.* 1285.
Habitat paulo rarior in India, *teſta ad 3 pollices longa, fuſca, ferruginea, flava, rarius olivacea, lineis & ſpira obſcurioribus, intus utplurimum alba, faſcia interdum 1-2 flava, vel alba; in β) teſta magis elongata, aurantia lineis obſcurioribus faſciiſque duabus flaviſcantibus varia, ſpira rubella nigro maculata.*

ebræus. 22. C. teſta ovata alba: faſciis nigris ex maculis tranſverſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 558. *n.* 167.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* BB. Muſica ruſticorum.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* G. Hebraica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 5. Coupet.
Liſt. Conch. t. 779. *f.* 25.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 122.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* T.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 94.
Petiv. gaz. 99. *f.* 12.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 28. 29.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. e. *f.* 104. c. d.

Knorr Vergn. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 617.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* q. r.
Habitat in India, *teſta minore, interdum rubella, maculis parallelogrammis nonnunquam ſpadiceis.*

Stercus muſcarum.

23. C. teſta baſi emarginata ſtriata: ſpiræ anfractibus canaliculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 559. *n.* 168.*
Rumpf muſ. t. 33. *f.* Z. Voluta arcuata.
Liſt. Conch. t. 757. *f.* 9.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 408.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* N. O.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* E.
Petiv. gazoph. t. 75. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 1.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 7.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 5. & 6. *t.* 16. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 88. a. b. c.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 64. *f.* 711-713.
β) *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* 2?
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 23?
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 698. 698. a?
γ) *Liſt. Conch. t.* 761. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* AA.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* P.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 12.
Martin. Conch. 2. *t.* 63. *f.* 696. 697.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1294?
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1295?
Habitat in Aſia, *teſta longa, anguſta alba punctis nigris aut rubris ſparſis, interdum glomeratis, rarius in faſcias aggregatis, anfractibus obtuſis, in β) & γ) coronatis.*

Varius.

24. C. teſta elongata muricata: ſpira coronata acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 559. *n.* 169.*
Liſt. Conch. t. 775. *f.* 21.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 129.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* L.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* R.
zoomorph. t. 10. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 19-22. & *t.* 48. *f.* 14-17. 24. 25
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 4. & *t.* 24. *f.* 5.,

Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 9. 10.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 679. & *t.* 62. *f.* 682.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 26-28.
Favann. Conch. t. 16. *f.* E³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 138. *f.* 1284.
Habitat in Oceano indico, *teſta alba, fuſco, ſpadiceo luteove nebuloſa : ſtriis granulatis per totam ſuperficiem decurrentibus.*

achatinus. 25. C. teſta elongata ſubtiliter tranſverſim ſtriata varie nebuloſa albo punctata : ſpira brevi fuſco maculata, apice rubro.
Seb. muſ. 3. *t.* 44. *f.* 30.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 89. b. 90.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 579. 580.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 44. *f.* 29.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1296?
δ) *Chemn. Conch. t.* 142. *f.* 1317.
Habitat in Oceano americano.

radiatus. 26. C. teſta radiis faſciiſque albis.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 51.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 584.
Habitat - - - teſta fuſca, lutea aut cinerea.

leoninus. 27. C. teſta luteo vel ſpadiceo maculata : faſciis ſæpius tranſverſis albis luteiſve ex granis aut maculis.
Liſt. Conch. t. 772. *f.* 18. & *t.* 777. *f.* 23.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* M.

Coronatæ *teſtæ vocantur, quarum anfractus ſuperne tantum notantur tuberculis ſ. mucronibus; inter teſtas coronatas & calvas nulla datur differentia ſpecialis. An ad conos referendæ cochleæ a* Liſtero *t.* 776. *f.* 22. & *t.* 778. *f.* ... b. *a* Bonanni *muſ. Kirch.* 3. *f.* 391. *ab* Argenville *zoomorph. t.* 11. *f.* D. ... *in muſ.* Gottwald. *t.* 12. *f.* 85. II. III. *f.* 87. *f.* 89. a. *t.* 13. *f.* ... c. *f.* 100. b. *f.* 101. e. x. & *f.* 102. *delineatæ? An diſtinctæ ſpecies, ...cuinam tribui inſerendæ quas* Liſterus *Conch. t.* 743. *f.* 39. *t.* 765. *f.* ... *t.* 768. *f.* 17. a. *t.* 771. *f.* 17. d. *t.* 778. *f.* 24. a. *t.* 782. *f.* 29. *t.* ... *f.* 33. *t.* 786. *f.* 36. & 37. *t.* 789. *f.* 42. & *t.* 790. *f.* 43. Bonanni *recr.* & *muſ. Kircher.* 3. *f.* 124. 125. a. b. *f.* 127. 137. *recr.* 3. *f.* ... *muſ. Kirch.* 3. *f.* 314. & 407. *Rumpf muſ. t.* 33. *f.* DD. *Gualt. teſt.* ... *f.* C. D. *t.* 21. *f.* A. C. I. Q. *t.* 22. *f.* E. L. *t.* 25. *f.* D. G. ... *f.* A. *ab* Argenville *Conch. t.* 12. *f.* I. S. *Seb. muſ.* 3. *t.* 42. *f.* 16. ... *t.* 43. *f.* 15. 16. 17. 18. 19. 23-28. 33. 34. 35. *t.* 44. *f.* (32. 34. ... 26. *t.* 47. *f.* 5. 6. 7. 26. *t.* 48. *f.* 913. 18. 19. 21. 29. *t.* 54. *f.* 5. 6. 9. ... 38.) (31. 35. 36. 39. 40. 43.) 41. 44. 42. 45. *t.* 54. *f.* 5. ... *t.* 55. *f.* 11. *Knorr Vergn.* 2. *t.* 1. *f.* 6. *t.* 5. *f.* 3. 3. *t.* 19. *f.* 2. ... *f.* 5. 5. *t.* 24. *f.* 3. 6. *t.* 1. *f.* 5. *Muſ. Gottwald. t.* 12. *f.* 86. a. & *t.* ... *f.* 100. a. *delineatas ſiſtunt?* Valent...

Valent. Abh. t. 6. f. 48.
Bonann. recr. 3. f. 130. 364.
muſ. Kirch. 3. f. 130. 358.
Gualt. teſt. t. 21. f. N.
Seb. muſ. 3. t. 42. f. 10. 11. 22. & t. 44. f. 13-15.
Regenſ. Conch. 1. t. 3. f. 37.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 603. 604. 606. 607.
β) *Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 4. & 5. t. 22. f. 2.*
Regenſ. Conch. 1. t. 11. f. 54. 55.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 605.
γ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 608.*
δ) *Martin. Conch. 2. t. 55. f. 609-611.*
ε) *Seb. muſ. 3. t. 43. f. 29. 30.*
ζ) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 7.*
η) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 6.*
ϑ) *Knorr Vergn. 2. t. 1. f. 5?*
ι) *Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 3?*
κ) *Knorr Vergn. 6. t. 1. f. 4.*
λ) *Gualt. teſt. t. 21. f. D.*
Favann. Conch. 2. t. 14. f. C[1].
Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1299.
μ) *Chemn. Conch. 10. t. 140. f. 1300.*
Habitat in Oceano indico, *ſpira parum acuta.*

jaſpideus. 28. C. teſta ſubolivacea, punctis multifariis faſciaque obliqua albis.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 612.
β) *Muſ. Gottwald. t. 13. f. 97. a.*
Habitat - - - teſta oblonga, parva.

nebuloſus. 29. C. teſta fuſca cæruleo nebuloſa alboque maculata.
Gualt. teſt. t. 25. f. R.
Valent. Abh. t. 9. f. 74.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 126.*
Knorr Vergn. 3. t. 16. f. 2.
Regenſ. Conch. 1. t. 12. f. 68.
Martin. Conch. 2. t. 55. f. 614.
Habitat - - - teſta anguſta, ſpiram verſus convexiuſcula; an varietas minimi?

oculatus. 30. C. teſta conica flava: ocellis faſciaque albis, baſi oblique ſtriata.
Martin. Conch. 2. t. 56. f. 616.
Habitat - - - ſpira parum prominente, an hujus tribus?

coffeæ. 31. C. teſta brevi fuſca: faſciis duabus albis; ſpiræ propiore fuſco maculata.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 618.
Habitat - - - *teſta mediæ magnitudinis.*

Amadis. 32. C. teſta dilute fuſca: faſcia lata cinguliſque ſupra infraque articulatis; ſpira acuta coronata ſubtiliter tranſverſim ſtriata.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* S.
Conch. t. 1. *f.* 5.
Knorr Vergn. 6. *t.* 5. *f.* 3?
Martin. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 642. 643.
Favann. Conch. t. 15. *f.* M.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1322. 1323.
Habitat - - - *teſta nunc anguſtiori, nunc magis ventricoſa.*

fulmineus. 33. C. ſpira acuta labioque ſpadiceo maculatis, virgis ſpadiceis per totam teſtam decurrentibus, baſi acuta oblique ſtriata.
Mart. Conch. 2. *t.* 58. *f.* 644.
Habitat - - - *an hujus tribus?*

acachnoideus. 34. C. teſta ſpadiceo reticulata: faſciis duabus tribusve obſcurioribus, ſpira coronata acuta.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* T.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 4.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* D.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 676.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* c. d.
Habitat pretioſus - - - *an hujus tribus?*

coſtatus. 35. C. teſta fuſca: faſcia alba rubello undulata, ſtriis craſſis latiſque, ſpira noduloſa; faſcia granulata.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* O.
Habitat - - -

leucoſtictus. 36. C. teſta alba fuſco nebuloſa virgata & maculata: punctorum alborum & fuſcorum ſeriebus pluribus, ſpira coronata.
Liſt. Conch. t. 759. *f.* 4. & *t.* 777. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 21. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 678.
β) *Martin. Naturg.* 1. *p.* 378. *t.* 19. *f.* 12.
γ) *Gualt. teſt. t.* 20. *f.* L?
δ) *Gualt. teſt. t.* 21. *f.* M?

ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 48. *f.* 36. 37.
Chemn. Conch. 10. *t.* 140. *f.* 1305.
Habitat in Oceano americano, *ſpira utplurimum acuta.*

citrinus. 37. C. teſta citrina lineis nigris interruptis inferne varia, ſpira coronata baſique albis.
Mart. Conch. 2. *t.* 61. *f.* 681.
Habitat ad Curacas.

inſularis. 38. C. teſta alba ſpadiceo nebuloſa maculata punctataque, ſpira acuta.
Martin. Conch. 2. *t* 61. *f.* 683.
Habitat - - -

coronatus. 39. C. teſta cingulis articulatis maculiſque teſſellatis alternis, ſpira coronata.
Gualt. teſt. t. 20. *f.* R.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 24.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 134?
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 91. a? b? *f.* 92. b. *f.* 93. a. b. d. e.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 73. *f.* 709.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 63. *f.* 710.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 1286.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 139. *f.* 128. *t.* 1288.
Habitat - - - *teſta minuta varietate innumera, faſcia ſæpius alba.*

punctatus. 40. C. teſta faſciis duabus lineiſque pluribus punctorum ex luteo fuſcorum: ſpira punctis lineiſque luteis varia.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 6.
Habitat - - - *rarior.*

zeylanicus. 41. C. teſta nivea roſeo fuſcoque nebuloſa: cingulis pluribus articulatis maculiſque albo ſpadiceoque variis, ſpira acuminata.
Martin. neueſt. Manigfalt. 1. *p.* 445. *t.* 2. *f.* 20.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1318.
Habitat - - - *baſi oblique ſulcata.*

ſolidus. 69. C. teſta conica craſſa: tranſverſim ſtriata albo fuſcoque nebuloſa: faſcia lata ſpiraque pyramidali albis; anfractibus canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 59. *t.* 441. *f.* 1310.
Habitat - - -

*** elongati, *baſi rotundata, cylindro duplo longiore quam ſpira.*

Clavus. 42. C. teſta ſtriis convexis lævibus : baſi cæruleſcente.
Liſt. Conch. t. 744. *f.* 34.
Knorr Vergn. 5. *t.* 11. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 570.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1327.
Habitat rariſſimus in mari indico, *teſta anguſta, longa, flava, maculis albis, majoribus ſpadiceo marginatis reticulata : faſciis 2 ſaturatioribus albo maculatis, ſpira maculata ſenſim in mucronem obtuſum deſinente.*

Nuſſatella. 43. C. teſta ſubcylindrica rubra inermi ſtriis tuberculatis ſcabra.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* EE. Terebellum granulatum.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* P.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 96. a. b. c. & *t.* 43. *f.* 52. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 7.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 567.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1329.
Habitat rarior ad Aſiæ inſulam Nuſſatello, *teſta pallida rubro nebuloſa maculataque, rarius tota alba, granulis ſtriarum tranſverſarum ex luteo fuſcis, ſpira in mucronem obtuſum abeunte.*

Terebellum. 44. C. teſta alba cæruleo obumbrata ſubcylindrica annulato-ſtriata : faſciis flavis.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 577.
β) *Liſt. Conch. t.* 745. *f.* 36.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1330.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 1.
Habitat in mari indico.

Fuſus. 45. C. teſta fuſiformi alba tranſverſim ſtriata.
Martin. Conch. 2. *t.* 52. *f.* 576.
β) *Gualt. teſt. t.* 22. *f.* 2.
Habitat - - - teſta β) *punctorum fuſcorum ordinibus varia.*

coccineus. 46. C. teſta rubra : lineis tranſverſis nigro punctatis, faſcia ſpiraque albis ſanguineo maculatis.
Knorr Vergn. 5. *t.* 24. *f.* 2.
Habitat - - - β) *faſciis 2, cinguliſque pluribus articulatis albis.*

lætus. 47. C. teſta ſubcylindrica annulato coſtata rubra obſcurius nebuloſa albo faſciata: ſpira maculata.
Liſt. Conch. t. 760. f. 5.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 5.
Habitat - - - an ad granulatum ſpectat?

ochroleucus. 48. C. teſta ſubcylindrica flava: faſcia prope baſin oblique ſtriatam alba, ſpira acuminata virgatim maculata.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 573.
β) *Seb. muſ. 3. t. 44. f. 12.*
Habitat - - - teſta in β) flavo ſpadiceoque maculata: ſtriis rubro punctatis decuſſantibus varia.

lævis. 49. C. teſta rufa maculis ſtriiſque tranſverſis fulvis varia: ſpira flavo maculata, baſi oblique ſtriata.
Valent. Abh. t. 8. f. 70.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 572.
Habitat - - -

affinis. 50. C. teſta cæruleſcente alba: faſciis quatuor fulveſcente lineatis; punctis lituriſve obſcure purpureis intermediis.
Martin. Conch. 2. t. 52. f. 571.
β) *Valent. Abh. t. 2. f. 11. p. 140.*
Habitat - - - arauſiaco affinis, ſpira maculata: maculis in β) virgatis.

violaceus. 51. C. teſta alba violaceo nebuloſa: faſciis violaceis, radiis dilute fuſcis.
Martin. neueſt. Manigf. 1. p. 444. t. 2. f. 18. 19.
Habitat - - - ſpira pyramidali anfractuum 6.

granulatus. 52. C. teſta ſcabra inermis ſtriis ſulcatis lævibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 560. *n.* 170.*
Rumpf muſ. t. 32. f. T. Voluta granulata.
Gualt. teſt. t. 25. f. H.
Pet. aquat. t. 15. f. 1.
Knorr Vergn. 3. t. 6. f. 5.
Liſt. Conch. t. 763. f. 12? t. 760. f. 1.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 632? t. 52. f. 574. 575.
β) *Seb. muſ. 3. t. 48. f. 26.*
Habitat in Oceano africano, *teſta lætius rubra & magis ſulcata, quam congenerum: faſciis albis, ſtriarumque punctis purpureis.*

polyzonias. 53. C. teſta intus alba, extrinſecus ex fuſco lutea lineis granulorum ſubtiliſſimis aſpera, faſcia ad ſpiram alba, inferius denticulata, altera ad baſin dilutius tincta pluribuſque filiformibus.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 7. f. 13.
Habitat - - - ſpira complanata: virgis ſpadiceis varia; baſi exterius obſcura, intus violacea; an hujus tribus?

bifaſciatus. 54. C. teſta alba lineis angulatis ſpadiceis faſciiſque duabus aurantiis varia: ſpira prominula, baſi lineis aurantiis cincta: maculis teſſelatis intermediis.
v Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 10.
Habitat - - -

niveus. 55. C. teſta conica nivea: ſpira prominula coronata, apertura ampla.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. f. 9.
Habitat - - - an hujus tribus?

arauſiacus. 56. C. teſta incornata lævi: faſciis albidis, anfractuum ſummis canaliculatis.
Rumpf muſ. t. 34. f. A. Oranjen Admiraal.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 100.
Pet. amb. t. 7. f. 7.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* I.
Seb. muſ. 3. t. 48. f. 7.
Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 3. & 5. t. 24. f. 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. f. E.
Martin. Conch. 2. t. 57. f. 636. 637.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* I.
Habitat rarus in India, *teſta alba; faſciis 2-3 aurantiis lineiſque albis: maculis teſſellatis pullis, ſpira maculis oblongis rubris, albis fuſciſque varia.*

Magus. 57. C. teſta ſubcylindrica: faſciis longitudinalibus albopunctatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 560. *n.* 171.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* Q. Voluta maculoſa.
Bonann. recr. 3. f. 362?
muſ. Kirch. 3. f. 355.
Gualt. teſt. t. 20. f. F?
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* C.
Seb. muſ. 3. t. 44. f. 27.
Knorr Vergn. 6. t. 16. f. 5? & t. 1. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 58. f. 641.

Habitat in India, *teſta alba, lineis punctatis maculiſque oblongis ſpadiceis luteis, flavis, fuſcis varia, ſpira acuta maculata.*

Striatus. 58. C. teſta ovato-oblonga gibba nebuloſa: ſtriis tenuiſſimis fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *p.* 172.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* F. Voluta tigerina.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 2. Melar.
Liſt. Conch. t. 755. *f.* 7. & *t.* 760. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* D.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 60. 61.
Pet. gaz. t. 98. *f.* 9.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 5-9. & *t.* 47. *f.* 22. 23.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 83. a-g.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 1. & 3. *t.* 12. *f.* 5. *t.* 21. *f.* 1. & *t.* 22. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 13.
Martin. Conch. 2. *t.* 64. *f.* 714-716.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 141. *f.* 1311.
Habitat ad Africæ *littus occidentale frequens, teſta ad* 4 *pollices longa, nivea, ſtriis interdum rubellis aut flaveſcentibus, baſi emarginata, tranſverſe ſtriata.*

Textile. 59. C. teſta venis reticulatis luteis: maculis luteis fuſciſque. *Muſ. Lud. Ulr.* 561. *n.* 173.*
Argenv. Conch. t. 13. *f.* F. I. Pannus aureus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 7. Loman.
Liſt. Conch. t. 788. *f.* 40.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 135.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* O. P.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* I. AA.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 6-12. & *t.* 47. *f.* 13-17.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 1. 3.
Muſ. Gottwald. t. 13. *f.* 85. a. b. c. *f.* 94. a. b. d. h. & *f.* 95. α. β.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 6. & 2. *t.* 8. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 62.
Martin. Conch. 2. *t.* 54. *f.* 598-600.
Martin. Conch. 2. *t.* 54. *f.* 602.
Chemn. Beſch. berl. naturf. Geſ. 3. *t.* 8. *f.* A.
Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1324. 1325.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. a.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 143. *f.* 1326. b. c.

Habitat ad Bandam Aſiæ, *teſta alba, in γ) perſici florum colore tincta, faſciis tribus aurantiis, in β) faſciis 2 obtuſis obſcurioribus varia.*

aulicus. 60. C. teſta venis reticulatis faſciiſque longitudinalibus fuſcis interruptis. *Muſ. Lud. Ulr.* 562. *n.* 174.*
Argenv. Conch. t. 13. *f.* D. G. Nigella.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 133.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* 3. 4.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* V. X. Z.
Seb. muſ. 3. *t.* 43. *f.* 1-5. & *t.* 47. *f.* 10-12.
Olear. muſ. t. 31. *f.* 4. 5.
Knorr Vergn. 2. *t.* 1. *f.* 1-3. & 3. *t.* 19. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 25.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 7. *f.* 14.
Favann. Conch. 2. *t.* 18. *f.* C⁶. C⁷.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1328.
α) *Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 591. 593. 594.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 53. *f.* 592. 595. *t.* 54. *f.* 596.
γ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 597.
δ) teſta ex luteo fuſca: maculis reticulatis cordatis perpendicularibus.
ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 54. *f.* 601.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 3?
ζ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 18. *f.* 2.
Habitat in Aſia, *an ſpecie diſtinctus a textili.*

Thomæ. 70. C. teſta lævi alba characteribus punctiſque feriatis badiis, cingulis tribus maculiſque albis varia apice rubicunda, ſpira conica: anfractibus canaliculatis.
Mart. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 590.
Chemn. Conch. 10. *t.* 143. *f.* 1331. *n.* 2.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 138. *f.* 1282. 1283.
Habitat in mari indico.

**** *teſta medio ventricoſa, utrinque auguſtata.*

ſinenſis. 61. C. teſta medio ventricoſa flava: ocellis albis baſi tranſverſim ſtriata.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 66.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 615.
Habitat - - -

***** Laxi *ventricoſi in dorſum disjecti ſuper menſam tinnitantes.*

Spectrum. 62. C. teſta cæruleſcente flava nebuloſa: punctis ſtriiſque albo-luteis. *Muſ. Lud. Ulr:* 562. *n.* 175.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* S. Voluta ſpectrorum.
Liſt. Conch. t. 783. *f.* 30.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 39.
Gualt. teſt. t. 25. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 47. *f.* 24.
Muſ. Gottwald. t. 14. *f.* 101. f? *t.* 12. *f.* 84. a-d. & *f.* 85. a. d.
Knorr Vergn. 2. *t.* 8. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 53. *f.* 581 - 583.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 140. *f.* 1304.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* g. h.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 144. A. *f.* o. p.
ε) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 79. *n.* 18. *t.* 6. *f.* 2?
Habitat in Oceano Aſiæ auſtrali *rarior, ſpira ſatis acuta.*

bullatus. 63. C. teſta flava albo nebuloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 563. *n.* 176.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. Potan.
Liſt. Conch. t. 741. *f.* 37. *t.* 742. *f.* 38. *t.* 748. *f.* 42. 43. & *t.* 749. *f.* 44. 45.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 14. 15. & *t.* 43. *f.* 15. 16.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 65. a-f. & *t.* 66. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 8. *f.* 2. 3. & *t.* 11. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 11. *f.* 45.
Favann. Conch. 2. *t.* 18. *f.* C[8].
Martini Conch. 2. *t.* 65. *f.* 725-732.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 1.
n. Litterat. 3. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 10. 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 142. *f.* 1315. 1316.
Habitat - - - teſta tenui, nunc unicolore, frequentius maculata, nebuloſa, faſciata, nunc magis nunc minus ventricoſa, apertura utplurimum ampla, cæruleſcente, ſpira nunc plana, nunc acuta.

Tulipa. 64. C. teſta oblonga gibba lævi: apertura dehiſcente.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* B. Tulipa.
Liſt. Conch. t. 764. *f.* 13.
Bonann. muſ. Kircher 3. *f.* 411.
Rumpf muſ. t. 34. *f.* K.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 89.

Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 16-21. *t.* 43. *f.* 20. 21. 22. 36?
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 4. & 5. *t.* 20. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 20.
Martini Conch. 2. *t.* 64. 65. *f.* 718-721.
Habitat in India, Africa & *meridionali* America, *geographo affinis, at teſta non coronata, alba hinc inde cæruleſcente fuſco, luteo rubroque nebuloſa, lineiſque ſpadiceis interruptis picta, apertura cæruleſcente, baſi obſolete oblique ſtriata, ſpira acuta, lævi, maculata, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata.*

Geographus. 65. C. teſta oblonga gibba coronata, apertura dehiſcente.
Rumpf muſ. t 31. *f.* G. Nubecula.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* A. Textile ſericum.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 90. Nubecula, tulipa gallorum.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 6. *f.* 8. Salar.
Liſt. Conch. t. 747. *f.* 41.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 319.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* E.
Pet. gaz. t. 98. *f.* 8.
Seb. muſ. t. 42. *f.* 1. 4.
Knorr Vergn. 3. *t.* 21. *f.* 2. & 6. *t.* 17. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 85. 1.
Martini Conch. 2. *t.* 64. *f.* 717.
Habitat rarior in Oceano indico & africano, *teſta ſubcylindrica ad baſin rugoſam paulo anguſtiore, pellucida, alba, fuſco maculata nebuloſaque, apertura alba, ſpira interdum roſea.*

Nubecula. 66. C. teſta alba aurantio nebuloſa & maculata: punctis ſparſis albis, ſpira prominente acuta.
Seb. muſ. 3. *t.* 42. *f.* 14. 15.
Martini Conch. 2. *t.* 56. *f.* 622.
β) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* H.
Habitat - - - -

ſpurius. 67. C. teſta alba: macularum ſpadicearum aut nigrarum irregularium ſeriebus faſciiſque punctatis interruptis alternis.
Gual. teſt. t. 21. *f.* D. F.
Argenv. Conch. t. 12. *f.* C.
Seb. muſ. 3 *t.* 44. *f.* 24. 25. 28 & *t.* 46. *f.* 24-29. *f.* 3.
Knorr Vergn. 3. *t.* 18. *f.* 5. & 5. *t.* 9. *f.* 6. & *t.* 22. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 56. *f.* 626-628.
Habitat - - - -

Vexillum. 68. C. teſta fuſca albo obumbrata: faſcia alba interrupta.
Rumpf muſ. t. 31. f. S.
Gualt. teſt. t. 20. f. M. *&* *t. 21. f.* E.
Seb. muſ. 3. t. 44. f. 8-11. & t. 45. f. 16. 17.
Mart. Conch. 2. t. 57. f. 629.
β) *Chemn. Conch. 10. t. 144.* A. *f.* m. n.
Habitat - - - teſta interdum ſatis magna, faſcia nonnunquam cruciata.

Ventricoſus. 71. C. teſta fuſca albo faſciata inferne anguſtata cæruleſcente obumbrata lævi, ſpira conica exſerta. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p. 91. n. 46. t. 6. f. 3. 4.*
Habitat - - - -

320. CYPRÆA.

Animal Limax.

Teſta univalvis, involuta, ſubovata, obtuſa, lævis.

Apertura utrinque effuſa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

Exanthema. 1. C. teſta ſubturbinata ferruginea maculis pallidis rotundis adſperſa: linea longitudinali ſubramoſa.
Liſt. Conch. t. 698. f. 45. & t. 699. f 46.
Bonann. recr. 3. f. 257.
muſ. Kirch. 3. f. 256.
Gualt. teſt. t. 16. f. O.
Pet. gaz. t. 96. f. 6.
Seb. muſ. 3. t. 76. f. 4. 5. 16. 18.
Muſ. Gottwald. t. 3. f. 14? & t. 14. f. a. b. c. d. e. f.
Regenſ. Conch. 1. t. 6. f. 63. & t. 10. f. 38.
Martin. Conch. 1. t. 28. f. 289. t. 29. f. 298-300.
β) *Liſt. Conch. t. 697. f. 44.*
Chemn. Conch. 10. t. 145. f. 1343.
Habitat in Oceano americano, atlantico, *mappæ affinis, teſta ſubtus pallida immaculata, dentibus aperturæ fuſcis, ſupra oculis guttiſve pallidis, nunc majoribus, nunc minoribus, detrita fuſco faſciata aut teſſellata, aut cærulea.*

Mappa. 2. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta: linea longitudinali ramoſa. *Muſ. Lud. Ulr. 565. n. 179.*

Rumpf muſ. t. 38. *f.* B. Porcellana montoſa.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* B. Carte géographique.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 3. 13.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 6.
amb. aq. t. 16. *f.* 2.
Knorr delic. B. IV. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 26. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 245. 246.
Habitat in Oceano indico & africano, *rarior teſta breviore ventricoſa ad latera lævi, pallida immaculata ab exanthemate diſcernenda; teſta ſupra ex fuſco lutea, hinc inde ocellis albis varia, ſubtus lævi ſubincarnata: maculis dilute fuſcis, aperturæ dentibus flavis.*

arabica. 3. C. teſta ſubturbinata characteribus inſcripta: macula longitudinali ſimplici. *Muſ. Lud. Ulr.* 566. *n.* 180.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* M. Porcellana literata ſ. arabica.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 20.
Liſt. Conch. t. 658. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* V.
Lochn. muſ. Beſler. t. 21. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 7. a-d. & *f.* 8. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 2. & *t.* 12. *f.* 2. & 6. *t.* 20. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 328-330.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 659. *f.* 3. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 260.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 259.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 8. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 331.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 304.
Habitat in India, *teſta ad 3 pollices longa, ſupra albida aut cæruleſcente, ad latera incraſſata fuſco aut atro maculata, intus violacea, aperturæ labiis planis ex rufo fuſciatis cinereis; detrita teſta nunc cæruleſcente fuſco fuſciata, nunc badia hinc inde albido nebuloſa, nunc dilutius fuſciata: maculis virgatis lineiſque angularibus obſcurioribus, nunc fuſca violaceo miſta, nunc ex cæruleſcente rubido cæruleo miſta, nunc alba cæruleo obumbrata.*

Argus. 4. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica adſperſa ocellis, ſubtus maculis quatuor fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 567. *n.* 181.

Rumpf muſ. t. 38. *f.* D. Argus.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* D. Argus magnus.
Liſt. Conch. t. 705. *f.* 54.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 263.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 25.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 6.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 86.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* T.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 101.
Leſſer teſtaceoth. f. 28.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 5.
Regenſ. Conch. I. *t.* 5. *f.* 57.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 285. 286.
β) *Favann. Cat. raiſ. t.* 2.
Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1344. 1345.

Habitat in Oceano indico & atlantico, *teſta ad* 4 *pollices longa, anguſta, ſupra griſea aut flaveſcente: faſciis tribus fuſcis, ocellis rarius concatenatis, maculis ſubtus ſiniſtris majoribus, labiis ſtramineis, dentibus fuſcis.*

testudi-naria. 5. C. teſta obtuſa ſubcylindrica: extremitatibus depreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 567. *n.* 182.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* C. Teſtudinaria.
Pet. amb. aq. t. 8. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 689. *f.* 36.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 271. 272.
β) *Liſt. Conch. t.* 748. *f.* 42. 43. Larva?

Habitat in ſinu perſico & Oceano indico, *teſta, quam congenerum omnium, majore, exalbida, pullo nebuloſa, maculis hinc inde magnis nigris quaſi farina conſperſis interdum quoque albis.*

stercoraria. 6. C. teſta ſubturbinata gibba livido teſtaceoque maculata utrinque marginata ſubtus plana.
Liſt. Conch. t. 687. *f.* 34?
Gualt. teſt. t. 15. *f.* T?
Column. aq. t. 69. *f.* 1. 2.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 7. 8.
Barrel. ic. t. 1321. *f.* 23. & *t.* 1322. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 10. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 1.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* L. A.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 99. *t.* 1. *f.* 5.

β) Gualt. teſt. t. 13. f. L?
γ) Chemn. Conch. 10. *t.* 144. *f.* 1332.
δ) Chemn. Conch. 10. *t.* 144. *f.* 1333.
Habitat frequens ad Guineam, *teſta ſubovata undato ſi- ca, anterius juxta ſpiram macula fuſca, poſterius preſſo marginata deflexa, labro interiore poſterius retuſo, apertura anterius valde gibba, dentibus al- ſulcis intermediis fuſcis; teſta ſub epidermide nunc vireſcente cærulea hinc inde maculata, nunc fuſcis tranſlucentibus ornata, nunc maculis fuſcis fuſcis cærulea varia, nunc vireſcente: faſciis 5–6 fuſcis faſciis 2 rectis, 2 undulatis, aut altero latere lim- altero vireſcente, aut nigra: maculis 2 albis, cærulea maculis hinc inde rubellis, aut dilute cæru- rubedine tranſlucente varia.*

Carneola. 7. C. teſta ſubturbinata pallida: faſciis incarnatis; ore violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 183.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* K. Carneola.
Pet. gaz. t. 30. *f.* 8.
Liſt. Conch. t. 665. *f.* 9?
Gualt. teſt. t. 13. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* O.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 16. a? b?
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 4.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 8. *f.* 2.
Martyn univ. Conch. 1. *t.* 14.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 287. 288.
β) Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 23?
Habitat in Oceano Aſiæ auſtrali, *teſta tenui, anguſta, 2½ pollices longa, intus ſubtuſque alba, exterius ſupra interdum cinerea: faſciis fuſcis.*

Zebra. 8. C. teſta turbinata cinerea: faſciis fuſcis.
Liſt. Conch. t. 669. *f.* 15.
Bonann. recr. 3. *f.* 266.
muſ. Kirch. 3. *f.* 265.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* G.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 101. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat rarior in India, *carneolæ affinis, at teſta du- majore, ſpira magis prominente, ſubtus ocellis ob- letis dentibuſque aperturæ fuſcis diſtincta.*

Talpa. 9. C. teſta ſubturbinata ſubcylindrica teſtacea: faſciis pal- dis, ſubtus incraſſata fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 568. *n.* 184.

Argenv. Conch. t. 18. *f.* H. Talpa.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* I. Talpa.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 1.
Valent. Abh. t. 2. *f.* 13?
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 668. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* N.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 23. a?
Knorr Vergn. 1. *t.* 27. *f.* 2. 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 37.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 273. 274.
Habitat in India, *teſta ad* 3 *pollices longa nitidiſſima; ſupra nunc hepatica, nunc cinerea, nunc albida, frequentiſſime ex fuſco lutea: faſciis* 3 *dilutioribus, intus alba, dentibus infra fuſcis: interſtitiis canis.*

amethyſtea. 10. C. teſta ſubturbinata: lateribus gibbis corticatis, dorſo violaceo. *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 185.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* Q. Achatina.
Pet. gaz. t. 32. *f.* 10.
Liſt. Conch. t. 662. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 32.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 13. a: b: *t.* 5. *f.* 18. c. & *t.* 7. *f.* 33. h.
Knorr, Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 247-249.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 24?
Habitat in Madagaſcar, *teſta tenui, faſciis ſupra* 4 *fuſceſcentibus nebuloſis, ad alterutrum latus characteribus exornata, intus cærulea, ampliore, quam in Zebra, ſpiraque minus prominente.*

lurida. 11. C. teſta ſubturbinata lurida ſubfaſciata: extremitatibus luteis nigro bimaculatis.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* C. Souris.
Liſt. Conch. t. 671. *f.* 17. & *t.* 673. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 251.
muſ. Kircher. 3. *f.* 250.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* E. I.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 16. e.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 1. D.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 315.
Habitat in mari mediterraneo, americano, *frequentius in* atlantico & æthiopico, *teſta ad* 2 *pollices longa, elongata anguſta, ſubtus alba, ſupra nunc murina obſcurius faſciata,*

nunc vireſcente aut rubella : faſciis cæruleſcentibus, nunc ſubfuſca : faſciis rubellis , & anfractuum margine inter- dum nigro , nunc dilutius fuſca : faſciis exalbidis, nunc badia : faſciis obſoletis , aut cæruleſcentibus , nunc e fuſco lutea, nunc lata hinc inde albo nebuloſa, nunc ſpadicea : faſcia flava , alteraque alba.

Venelli. 12. C. teſta ſubturbinata maculata punctis luteſcentibus, extremitatibus fuſco maculatis, fauce rufa *Muſ. Lud. Ulr.* 569. *n.* 186.*
Pet. gaz. t. 95. *f.* 13.
Habitat - - -

Iota. 13. C. teſta ſubturbinata alba : denticulis ſubulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. *n.* 187.*
Bonann. recr. 3. *f.* 245.
muſ. Kircher. 3. *f.* 244.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 20. a. b. c.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 4. 5.
Martin, Conch. 1. *t.* 30. *f.* 322.
β) *Gualt. teſt. t.* 15. *f.* C ?
Habitat in mari ſiculo , *teſta lactea nitidiſſima , tranſlu- cente inter dentes ſiniſtri labii rubore.*

fragilis. 14. C. teſta turbinata ovata glauca teſtaceo-undata ſubfaſ- ciata. *Muſ. Lud. Ulr.* 570. *n.* 188.*
Rondel. aq. 2. *p.* 102.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* Q.
Habitat in mari mediterraneo , *teſtæ ſtructura arabicæ, at magis tenui undis longitudinalibus faſciiſque pallidis, ab amethyſtea colore potius in cinereum vergente, di- cernenda.*

guttata. 15. C. teſta tenui gibba fulva albo-guttata : linea media horizontali , ſubtus alba : dentibus flavis.
Liſt. Conch. t. 676. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* I.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 252. 253.
Habitat - - - -

cinerea. 16. C. teſta tenui ventricoſa ex rubello cinerea : faſciis dilutioribus , ore albo.
Liſt. Conch. t. 667. *f.* 11. *t.* 668. *f.* 13. a. b. & *t.* 670. *f.* 15.
Gualt teſt. t. 16. *f.* H. L. M.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 254. 255.
Habitat - - - *teſta brevi , faſcia* 1-4.

plumbea. 17. C. teſta ſubturbinata tenui; dorſo plumbeo; faſciis quatuor cæruleo fuſcoque variis fuſceſcente undulatis ad marginem cæruleo fuſcoque lineatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 26. *f.* 256.
Habitat rarior ad Guineam, *exanthemati affinis.*

ocellata. 18. C. teſta ſubturbinata pulla albo ocellata: dorſo faſciis tribus pallidioribus.
Mant. 2. *p.* 548. Cypræa Cervus?
Liſt. Conch. t. 697. *f.* 44.
Bonann. recr. 3. *f.* 267.
muſ. Kircher. 3. *f.* 266.
Knorr Vergn. 1. *t.* 5. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 257. 258.
β) *Valent. Abh. t.* 9. *f.* 83.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 76. *f.* 20.
Habitat in Oceano americano, *teſta ſatis grandi, coffeæ colore tincta.*

Hiſtrio. 120. C. teſta ovata ſubturbinata ſublivido ocellata, ſubtus plana alba, ad latera incraſſata atra fuſco maculata, lineæ dorſali livida, fauce violacea.
Chemn. Conch. 10. *p.* 110. *t.* 145. *f.* 1346. 1347.
Liſt. Conch. t. 659. *f.* 3a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 1.
Martyn Conch. t. 15.
Habitat in mari indico.

Aurantium. 121. C. teſta ſubturbinata aurantia margine alba immaculata, fauce rutila. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 59.
Habitat ad inſulas amicas.

ferruginoſa. 19. C. teſta tenui elongata flaveſcente aut cæruleſcente: maculis ferrugineis, intus cærulea.
Martin. Conch. t. 26. *f.* 260-262.
Habitat - - - teſta detrita cærulea.

livida. 20. C. teſta tenui elongata unicolore ſtraminea, lutea aut rubella, ſubtus fuſco punctata, dentibus ſubulatis.
Liſt. Conch. t. 656. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 405.
Habitat - - -

gibba. 21. C. teſta tenui gibba: dorſo nebuloſo tranſverſim faſciato.
Liſt. Conch. t. 663. *f.* 7.
Habitat - - - amethyſteæ affinis.

turbinata. 22. C. teſta turbinata ovata glauca: maculis angulatis pallidis.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. f. 6.
β) *Liſt. Conch. t. 675. f. 22.*
Habitat - - - fragili affinis, β) teſta fuſca bifaſciata.

venerea. 23. C. teſta oblonga fuſca: maculis aureis virgatis, intus cærulea.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 262.
Habitat - - - bullis affinis.

purpuraſcens. 24. C. teſta oblonga purpuraſcente: ſubtus linea alba cincta.
Gualt. teſt. t. 16. f. A.
β) *Gualt. teſt. t. 16. f. B.*
Habitat - - -

albida. 25. C. teſta oblonga albida: labiorum fine fulvo-maculato.
Gualt. teſt. t. 16. f. C.
Habitat - - -

rufeſcens. 26. C. teſta oblonga ex fuſco rufeſcente, ſubtus albida.
Gualt. teſt. t. 16. f. D.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

tranſlucens. 27. C. teſta cylindrica cinerea: faſciis tranſlucentibus.
Gualt. teſt. t. 16. f. G.
Habitat - - -

punctulata. 28. C. teſta cylindrica fragili alba: faſciis punctorum rubellorum tranſverſis.
Gualt. teſt. t. 16. f. P.
β) *Muſ. Gottwald. t. 6. f. 23. e.*
Habitat - - - -

tigrina. 29. C. teſta obtuſa ovata ſubturbinata; linea longitudinali teſtacea.

An diſtinctæ hujus primæ tribus ſpecies ſunt cypræa *a* Seba *muſ. 3. t. 76. f. 37.* 25-29. 31. *a* Liſtero *Conch. t. 656. f. 1. a* Bonanni *muſ. Kirch. 3. f. 405.* *an diſtinctæ ſpecies in muſ. Gottvvald. t. 4. f. 14. g. t. 5. f. 16. d. t. 7. f. 37.* b. d. *f.* 17. a-e. *f.* 18. g. h. *f.* 19. d. e. *f.* k. *f.* 20. d. *f.* 21. a. b. *f.* 22. d. e. h. t. 6. *f.* 23. b. c. *f.* 24. a. b. t. 7. *f.* 32. b. f. *f.* 33. m. *f.* 25. a-c. *f.* 38. *f.* 39. *f.* 40. b. e. & *f.* 41. a. b. *delineatæ? cui tribui accenſendæ ſunt ſpecies ab* Argenville *conchyl. t.* 18. *f.* 2. *a* Gualtiero *teſt. t. 13. f. G. t. 15.* *f.* D. F. G. Q. V. X. Z. *a* Liſtero *t.* 710. *f.* 62. & *t.* 685. *f.* 32. & *a* Knorr *Vergn.* 4. *t.* 9. *f.* 6. *depictæ? An propriam conſtituit tribum cypræa oblonga alba teſt. t.* 13. *f.* C. *a* Gualtiero *adumbrata?* Cypræ*æ jam ex mari extractæ nitore & colorum elegantia utplurimum placent, detritæ ſæpe, aliiſque artibus nativa varietate aucta in muſeis aſſervatæ, & in catalogis memoratæ*

Seb. muſ. 3. t. 76. f. 12.
Habitat - - - C. tigridi affinis, at ſpira manifeſta guttiſque longe rarioribus diſtincta.

dubia. 30. C. teſta oblonga ferruginea: faſciis dilutioribus.
Seb. muſ. 3. t. 76. f. 15.
Habitat - - - C. Exanthemati affinis.

trifaſciata. 31. C. teſta turbinata tenui ex cæruleſcente fuſca; utroque fine faſciiſque tribus flaveſcentibus fuſco variis.
Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 2.
Habitat - - - pretioſa, rara.

conſpurcata. 32. C. teſta turbinata ex cæruleſcente alba fuſco guttata nebuloſaque.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. f. 1. Cypræa ſtercoraria.
Habitat - - - ſtercorariæ affinis.

bifaſciata. 33. C. teſta oblonga purpuraſcente obumbrata: faſcia ſtraminea alteraque anguſtiore alba, limboque fuſco.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. f. 3. Cypræa Zebra.
Habitat - - - teſta 4 fere pollices longa.

cylindrica. 34. C. teſta cylindrica ſupra dilute amethyſtina ad latera fuſceſcenti maculata; ad utrumque finem maculis duabus fuſcis.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. f. 10.
Habitat rarior - - - labiis albis, faſciis dorſi interdum 3 ſubfuſcis.

teres. 35. C. teſta cylindrica lactea altero latere limbata lituriſque anguſtis luteis rarioribus varia: dorſo faſciis undatis tribus fuſceſcentibus.
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 161. t. 1. f. 7.
Habitat - - - -

ovata. 36. C. teſta ovata depreſſiuſcula altero latere ſublimbata: dorſo albido confertim ex luteo fuſco punctato & undulato: faſciis tribus obſcurioribus obſoletis.
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 165. n. 120.
Habitat - - - teſta tenuiſſima fragili, anguſta, ſubtus & ad latera alba, $1\frac{1}{2}$ pollices longa, $\frac{3}{4}$ lata, lineis 2 infra ſpiram fuſcis, dentibus alterius labii nullis, alterius ſubulatis.

minuta. 37. C. teſta oblonga unicolore perſici florum colore tincta ſubtus albo punctulata: limbo alterius lateris dentibusque labii albis, utroque fine ſupra flavo, ſpiræ apice nigro.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 165. *n.* 121.
Habitat - - - -

ſanguinolenta. 38. C. teſta tenui oblonga fuſco-faſciata, ad latera ſanguineo-punctata.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 234.
Muſ. Gottwald. t. 4. *f.* 14. g. 3. & *t.* 6. *f.* 23. d.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 265. 266.
Habitat - - - -

faſciata. 116. C. teſta turbinata glauca marginata ſupra gibba: faſciis fuſceſcentibus tranſverſis, fauce glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 100. *t.* 144. *f.* 1334.
Habitat ad Guineæ littora.

Regina. 117. C. teſta gibba ex glauco fuſca, maculis trigonis teſtaceis albidiſque faſciiſque tribus tranſverſis picta, fauce nigro-glauca. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 101. *t.* 144. *f.* 1335. 1336.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *ſer.* 5. *n.* 3.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 2. *t.* 27. *f.* 6.
Mart. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 207. 208.
Habitat - - - -

undulata. 118. C. teſta turbinata fuſceſcente undulata ochroleuco-nebuloſa: faſciis ſaturatioribus. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 120. *t.* 144. *f.* 1337.
Habitat rara ad inſulam S. Mauritii.

** *obtuſæ abſque ſpira manifeſta.*

Caput ſerpentis. 39. C. teſta triquetro-gibba poſterius obtuſiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 189.*
Liſt. Conch. t. 702. *f.* 50. Concha veneris maculis quaſi reticulatis.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* F. Caput ſerpentis minus.
Bonann. recr. 3. *f.* 258.
muſ. Kircher. 3. *f.* 257.
Rondel. aq. 2. *p.* 103. *f.* 3.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 9.
amb. aq. t. 12. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* I. O.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 31. a. d. & *f.* 32. a.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* G.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 316.
Habitat frequens ad inſulam Mauritii, *Larique & Nuſſatello, teſta ad* 1½ *pollicem longa, fuſca, albo maculata, ſubtus alba, intus violacea.*

Reticulum. 40. C. teſta ſubrotunda gibba fuſca: ocellis in reticulum confluentibus, lineaque dorſi media horizontali albis, ſubtus alba.
Liſt. Conch. t. 701. *f.* 49.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 259.
β) *Liſt. Conch. t.* 704. *f.* 53.
Habitat – – – *capiti ſerpentis affinis.*

mauritiana. 41. C. teſta triquetro-gibba poſterius depreſſo acuta, ſubnigra. *Muſ. Lud. Ulr.* 571. *n.* 190.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* E. Caput ſerpentis majus.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 31.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 8.
Liſt. Conch. t. 703. *f.* 52.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 261.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 19.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 29. a. b. *f.* 30. a. b. *t.* 7. *f.* 34?
Knorr Vergn. 1. *t.* 13. *f.* 1. 2. 2. *t.* 27. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 317-319.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, Javam & Nuſſatello, *teſta ſatis magna, fuſca maculata.*

Vitellus. 42. C. teſta livida: maculis albis. *Muſ. Lud Ulr.* 572 *n.* 191.*
Rumpf. muſ. p. 115. *t.* 38. *f.* L. Porcellana ſalſa.
Pet. gaz. t. 80. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 692. 693. *f.* 39. 40.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 254.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* T. V.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 9. a. d.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 228. 229.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad* 2½ *pollices longa ſubvitellina, faſciis* 3 *obſoletis tranſlucentibus, maculis rotundis, intus cærulea, ad latera cinereo punctata maculataque.*

Mus. 43. C. teſta retuſa gibba cinerea: faſcia longitudinali fuſca, denticulis nigricantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 572. *n.* 192.*

Liſt. Conch. t. 657. *f.* 2.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 33. 34.
Knorr Vergn. 3. *t.* 12. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 222. 223.
Habitat in mari mediterraneo & americano, *teſta ſolida, vix gibba, ad latera ſubtuſque alba, dorſi maculis dilute fuſcis.*

Tigris. 44. C. teſta ovata poſterius obtuſa anterius rotundata; linea longitudinali teſtacea. *Muſ. Lud. Ulr.* 573. *n.* 193.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* A. Porcellana guttata.
Pet. gaz. t. 96. *f.* 17.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 23. & *t.* 1326. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 681. 682. *f.* 28. 29.
Bonann. recr. 3. *f.* 231. 232. 256. 264. 265. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 231. 232. 255. 264. 265.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 3. & *t.* 3. *f.* 29.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* G. H. I. L.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 7. 9. 14.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 3.
Bytem. app. t. 12. *f.* 55. a.
Muſ. Gottwald. t. 1. *f.* a. b. *f.* 2. a. b. *f.* 3. a. *f.* 4. *t.* 1. *f.* C. *t.* 2. *f.* 6. a. c. d.
Knorr Vergn. 1. *t.* 26. *f.* 4. & 6. *t.* 21. *f.* 4. 5.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 232–236.
Habitat frequens in Oceano indico & mari adriatico, *teſta ad* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa, &* $2\frac{1}{2}$ *alta albida, flavicante aut cæruleſcente, guttis numeroſis ſæpius confluentibus varia, ad latera ſubtuſque alba, linea dorſi obliqua, crebro undulata, Cairi ad lævigandos pannos adhibita.*

flammea. 45. C. teſta ovata poſterius obtuſa anterius rotundata maculis flavis undatis varia.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 30.
Habitat rariſſima - - - tigridi proxime affinis.

olivacea. 46. C. teſta ovata olivacea flavo nebuloſa fuſcoque maculata, ſubtus plana dilute fuſca, intus cæruleſcente, labii denticulis albis.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 332.
Habitat - - - tigridi affinis, at teſta minore, mediæ magnitudinis.

feminea. 47. C. teſta ovata tenuiſſima alba guttis ex viridi flavis ſeriatis varia, intus violacea.
Liſt. Conch. t. 672. *f.* 18.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 1. 2. 8.
Muſ. Gottwald. t. 3. *f.* 11. a. b. & *f.* 12.
Habitat - - - tigridi affinis.

Lynx. 48. C. teſta oblongo ovata, punctis fuſcis lineaque flaveſcente, poſterius acutiuſcula: ore rufo. *Muſ. Lud. Ulr.* 573. *n.* 194.*
Liſt. Conch. t. 683. *f.* 30.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* N.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* Z. & *t.* 14. *f.* B. C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *ic. nonn. ad nr.* 20.
Muſ. Gottwald. t. 1. *f.* 5. *f.* e. *t.* 5. *f.* 18. a. b. c.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 6. & 6. *t.* 23. *f.* 6.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 10.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 8. 9.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 230. 231.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 23. *f.* 7?
Habitat ad inſulam Madagaſcar, S. Mauritii, & *in* Oceano indico, *teſta vix 2 pollices longa albida, cæruleſcente aut flava, ad latera ſubtuſque alba, labiis inter dentes rufis.*

Iſabella. 49. C. teſta ſubcylindrica: extremitatibus luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 195.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* G. Iſabella.
Pet. amb. aq. 16. *f.* 16.
gaz. t. 97. *f.* 16.
Liſt. Conch. t. 660. *f.* 4.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* P.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 36.
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 275.
Habitat ad inſulam S. Mauritii & Madagaſcar, *teſta vix* $1\frac{1}{2}$ *pollices longa anguſta, alba vel griſea nigroque punctata, interdum faſciata, labiorum denticulis albis.*

ambigua. 50. C. teſta pyriformi obſcura dilutius nebuloſa maculataque.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 30.
Habitat - - - an diſtincta ſpecies?

Scurra. 122. C. teſta ovato oblonga ſubtus plana luteſcente: guttis vireſcentibus lividiſve confluentibus, ad latera punctis fuſ-

cis ſparſis varia. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 103. *t.* 144 *f.* 1338. a. b.
Mart. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 276. 277.
Habitat in mari indico, *an eadem cum indica?*

*** Umbilicatæ.

Onyx. 51. C. teſta ſubtus fuſca ſupra albida. *Muſ. Lud. Ulr.* 574 *n.* 196.*
Rumpf muſ. t. 38. *f.* G. Porcellana cærulea.
Bonann. recr. 3. *f.* 255.
muſ. Kircher. 3. *f.* 254.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* N.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 106. *t.* 145. *f.* 1341.
Liſt. Conch. t. 657. *f.* 2.
Habitat in Aſia, *teſta pollicis magnitudine, ſupra ochroleuca, ceterum capiti ſerpentis ſimilis, an mutata? an hujus tribus?*

clandeſtina. 52. C. teſta lineis tranſverſis ſubtiliſſimis flaveſcentibus pallidis concurrentibus.
Habitat in India, *teſta lævi, livida, magnitudine ciceris aſelli, ſubtus alba immaculata, ſupra faſcia una altera ve pallida obſoleta notata, ſtriis luteis oculo nudo vix conſpicuis.* Zoega.

ſuccincta. 53. C. labio interiori utraque extremitate rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 575. *n.* 197.*
Habitat - - -

Ziczac. 54. C. teſta ſubtus lutea punctis fuſcis: extremitatibus maculis duabus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 575. *n.* 198.*
Liſt. Conch. t. 661. *f.* 5. Concha venerea undatim depicta.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 7.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* N. R.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 2., 3. 11.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. i. k.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 224-227.
Habitat - - - *teſta ſupra dilute incarnata, faſciis 3 albis obſoletis lineiſque angulatis rubellis vel flavicantibus varia, ſubtus lutea nigro maculata; interdum pulla faſciis 2 albis fuſco undulatis, ſubtus alba, aut alba lineis longitudinalibus muſtelinis undulatis, ſubtus lutea fuſco punctata, aut cana, lineis angulatis paulo obſcurioribus confertis, ſubtus tota nivea.*

Hirundo. 55. C. teſta ſupra cæruleſcente: extremitatibus maculis duabus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 576. *n.* 199.*
Liſt. Conch. t. 674. *f.* 20. 21.
Pet. gaz. t. 30. *f.* 3.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 235.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 8. 9.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 25. *n.* b. c.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 4.
v. Born muſ, Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 11.
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 282.
Habitat ad inſulas Maldivas, *c. aſello affinis, teſta anguſta elongata, ſubtus alba, ad marginem punctata, ſupra ſæpius fuſco punctata, aut maculata: faſciis 2 tranſverſis albis.*

Aſellus. 56. C. teſta alba: faſciis tribus fuſcis. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 200.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* M. Aſellus.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* T. Aſellus.
Liſt. Conch. t. 666. *f.* 10.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 11.
amb. aq. t. 16. *f.* 18.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 236.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 15. M. CC. DD.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 26. a. b. c.
Bytem. app. t. 12. *f.* 56. 58.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* H.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 280. 281.
Habitat frequens ad inſulas Maldivas, *teſta oblonga, minuta, faſciis flavo marginatis, interdum rubellis.*

Orronea. 57. C. teſtæ macula teſtacea æquali. *Muſ. Lud. Ulr.* 577. *n.* 202.
Habitat - - - macula ſolitaria a ſtolida diſtincta.

Urſellus 58. C. teſta oblonga alba, ſupra lævi fuſco varia: punctis ad umbilicum duobus fuſcis.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* O.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 241.
Habitat rarior - - - teſta minuta.

Pyrum. 59. C. teſta dilute fuſca: faſciis dilutioribus maculiſque ochroleucis, ſubtus & ad latera fulva, intus cærulea.

Gualt. teſt. t. 14. f. E.
Martin. Conch. 1. t. 26. f. 267. 268.
β) *Liſt. Conch. t. 667. f. 12?*
γ) *Muſ. Gottwald. t. 7. f. 33. i. k?*
Habitat - - - labii dentibus albis.

maculoſa. 60. C. teſta anguſta elongata ſupra maculis carneis, palli fulvis glauciſque varia, ad latera ſpadicea.
Bonann. recr. 3. f. 259.
muſ. Kircher. 3. f. 258.
Habitat - - -

pulla. 61. C. teſta tenui ad latera pulla, ſupra alba aut dilute fuſ faſciis tranſverſis lineave horizontali dilutiori nota
Martin. Conch. 1. t. 26. f. 269. 270.
Habitat rarior - - -

indica. 62. C. teſta cylindrica ſupra characteribus, ocellis lineaq horizontali dilutiore notata, ad latera rubella au guttata, labii denticulis fuſcis.
Rumpf muſ. t. 39. f. H.
Habitat rarior in India, *arabicæ affinis, inter prim tertiamque tribum quaſi media, lateribus perſici flor colore tinctis.*

Ovum. 65. C. teſta oblonga tenui olivacea: maculis ferrugineis ſpar ſis, ſubtus alba.
Muſ. Gottwald. t. 5. f. 19. g. h. i. & f. 22. b.
Martin. Conch. 1. t. 27. f. 278. 279.
Habitat - - - teſta anguſta, detrita faſciis ſupra 3 cæ leſcentibus, denticulorum in labiis interſtitiis ſubfuſ

felina. 66. C. teſta oblonga anguſta plumbea: punctis maculiſq ferrugineis, faſciiſque dilutioribus: maculis ad utru que finem duabus fuſcis.
Liſt. Conch. t. 680. f. 27.
Seb. muſ. t. 55. f. 19. n. 7.
Martin. Conch. 1. t. 28. f. 283. 284.
Habitat - - - inter c. hirundinem & aſellum medi teſta detrita ſupra cærulescente.

atomaria. 67. C. teſta oblonga nivea fuſco punctato ad utrumque finem obſcuro biguttata.
Martin. Conch. 1. t. 28. f. 290. 291.
Habitat - - - teſta ½ circiter pollicem longa.

nebuloſa. 68. C. teſta oblonga gibba fuſca ſpadiceo maculoſa.
Liſt. Conch. t. 688. f. 35.
Habitat - - - *olivaceæ affinis.*

ochroleuca. 69. C. teſta tenui ochroleuca; maculis dilutioribus.
Bonann. recr. 3. f. 244.
muſ. Kircher. 3. f. 243.
Habitat - - -

ſtellata. 70. C. teſta tenui cinerea punctata: ſtriis tranſverſis elevatis.
Bonann. recr. 3. f. 248.
muſ. Kircher. 3. f. 247.
Habitat - - -

ſubflava. 71. C. teſta oblongiuſcula gibba lævi ſubflava.
Gualt. teſt. t. 13. f. D.
Habitat - - - *an diſtincta vere ſpecies?*

leucogaſter. 72. C. teſta oblonga purpurea ſubtus alba.
Gualt. teſt. t. 13. f. F.
Habitat - - - *an vere diſtincta ſpecies?*

varioloſa. 73. C. teſta oblonga obſcura: faſciis dorſi duabus maculiſque albidis.
Gualt. teſt. t. 13. f. M.
β) *Gualt. teſt. t. 13. f. N. O.*
γ) *Gualt. teſt. t. 13. f. P.*
δ) *Gualt. teſt. t. 13. f. Q.*
ε) *Gualt. teſt. t. 13. f. TT.*
Habitat - - -

fulva. 74. C. teſta ſolida oblonga fulva: maculis fuſcis ſeriatis faſciiſque duabus obſcuris, ad latera ſubtuſque crocea.
Gualt. teſt. t. 13. f. S.
Habitat - - -

leucoſtoma. 75. C. teſta oblonga gibba fuſco cæruleoque nebuloſa ad latera nigro-maculata, ore albo.
Gualt. teſt. t. 24. f. A.
Habitat - - -

lineata. 76. C. teſta ovata ſupra lineata: limbo maculato.
Muſ. Gottwald. t. 2. f. 7. f.
β) *Muſ. Gottwald. t. 4. f. 14. g. 1.*
Habitat - - -

cancellata. 77. C. teſta ovata gibba cancellatim maculata : li-
ſupra horizontali.
Muſ. Gottwald. t. 5. f. 18. l. m. n. & f. 19. a. b.
t. 6. f. 31. b. c.
Habitat - - -

lutea. 78. C. teſta fuſceſcente : faſciis duabus albis, ſubtus lute-
fuſco punctata. *Gronov. zooph. t. 19. f. 17.*
Habitat - - - *teſta oblonga, anguſta.*

badia. 79. C. teſta oblonga gibba ſupra badia: punctis fuſcis albiſq.
Bytem. appar. t. 12. f. 57.
Habitat - - -

punctata. 115. C. teſta ovata alba : punctis teſtaceis. *Mant. 2. p. 54*
Habitat - - - *teſta vix marginata, magnitudine*
Ziczac, ore albo.

zonaria. 119. C. teſta ovata læviuſcula luteſcente : faſciis quat-
lunulis fuſcis notatis. *Chemn. Conch.* 10. p. 107. t. 14
f. 1342.
Habitat rariſſima ad Guineæ *littora.*

conoidea. 121. C. labro intus dentata : tuberculorum ordinibus tribus
labio edentulo. *Scop. del. inſ. 2. p. 78. t. 24. f. 3.*

**** *marginatæ.*

cribraria. 80. C. teſta umbilicata lutea : punctis rotundis albis. *M-*
Lud. Ulr. 577. *n.* 201.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* X. Argus minor.
Pet. gaz. t. 80. *f.* K. *t.* 8. *f.* 3?
Liſt. Conch. t. 695. *f.* 42.
Muſ. Gottwald. t. 2. *f.* 7. e? *f.* 9. g.
Regenſ. Conch. I. *t.* 12. *f.* 74.
Martin. Conch. I. *t.* 31. *f.* 336.
Habitat - - - *teſta oblonga, anguſta, ovi paſſer-*
magnitudine, ocellata, ſubtus tota alba, inter denticu-
los labii interdum flavo maculata.

Moneta. 81. C. teſta marginato nodoſa albida. *Muſ. Lud. U.*
578. *n.* 203.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* K. Moneta Congo.
Liſt. Conch. t. 709. *f.* 59. Moneta nigritarum.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* C. Thoracium vulgare ſ. cauricu-
Pet. gaz. t. 97. *f.* 8. Concha veneris africana t. M-
neta nigritarum.

Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 14.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 233.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* 3-5.
Leſſer teſtaceoth. f. 26.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 42. a-g.
Bytem. app. t. 12. *f.* 59.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 337-340.
Habitat frequens in mari mediterraneo, atlantico, æthiopico, indico, *inprimis in inſulis* Maldivis *a feminis lecta ſub aqua per tres dies a plenilunio vel ante novilunium, unde tranſportatur navibus in Bengalam, Siam, Americam, inſulaſque illi obverſas, nigritis loco monetæ inſerviens.*

Annulus. 82. C. teſtæ dorſo annulo flavo circumdato. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 204.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* D. Thoracium quadratum.
Pet. gaz. t. 6. *f.* 8.
Rondel. teſt. 2. *p.* 103. *f.* 4.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 240. 241.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* 1. 2.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. *f.* g. *f.* 40. c?
Knorr Vergn. 4. *t.* 9. *f.* 4. & *t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 239. 240.
Habitat ad Amboinam & Alexandriæ *frequens, teſta ochroleuca, intus cærulea, ſubtus planiuſcula.*

caurica. 83. C. teſta margine gibbo inæquali albido fuſco-punctato, dorſo nebulato-teſtaceo.
Liſt. Conch. t. 677. *f.* 24. & *t.* 678. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* P.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* AA.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 13.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 301. 302.
β) *Rumpf muſ. t.* 38. *f.* O.
γ) *Martin. Conch.* 1. *t.* 29. *f.* 303.
Habitat in Oceano indico, *teſta ſolida ſubtus flaveſcente vel alba, faſciis* 4 *obſoletis fuſcis.*

eroſa. 84. C. teſta deroſo-marginata flava albo punctata: lateribus macula ſubfuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 578. *n.* 203.*

Rumpf muſ. t. 39. *f.* A. Thoracium oculatum.
Pet. gaz. t. 97. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 690. *f.* 37.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* H.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 37. a-c *f.* 40. a? d?
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 4.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 8. *f.* 13.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 320. 321.
Habitat ſatis frequens ad inſulas S. Mauritii & Aſcen-
nis, *teſta ad* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa ſupra convexa, interd-*
ſubfuſca aut vireſcente albo-punctata, nonnunquam fu-
fuſco maculata: linea media vireſcente ſubobliqua, ſu-
tus & ad latera alba.

derosa. 85. C. teſta deroſo-marginata carnea: dorſo cineraſcente rufo punctato: lateribus punctis fuſcis. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *eroſæ affinis, teſta ſupra faſciis 3 obſoletis, ſubtus lævi ruſeſcente.*

flaveola. 86. C. teſta deroſo-marginata flaveſcente albo-punctata: lateribus punctis fuſcis obſoletis ſubſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 581. *n.* 209.*
Habitat - - - punctis vel ocellis albis hinc inde in ſtrias confluentibus; eroſæ proxime affinis, an vere diſtincta?

ſpurca. 87. C. teſta ſubmarginata luteſcente luteo irrorata: lateribus fuſco punctatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ovata, lævi, inter- dum livida, immaculata diaphana, edentula, margine ſupra crenulato, fuſco, labio interiori poſterius apice re- flexo.*

oblonga. 88. C. teſta oblongo-ovata ſupra cæruleſcente fuſco punctata maculataque; ſubtus & ad latera alba.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 14.
Habitat - - - ſpira manifeſta, an hujus tribus?

ſtolida. 89. C. teſta cinerea teſtaceo quadrato variegata. *Muſ. Lud. Ulr.* 580. *n.* 207.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* Y.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *n.* 19. *f.* 12. 14.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 22. a. c. *t.* 6. *f.* 28?
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 12? 15?
Martin. Conch. 1. *t.* 28. *f.* 292. 293.

β) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 237.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* F.
Muſ. Gottwald. t. 6. *f.* 27.
Martin. Conch. I. *t.* 28. *f.* 294. 295.
γ) *Gualt. teſt. t.* 16. *f.* E?
δ) *Martin. Conch.* I. *t.* 28. *f.* 296. 297?
ε) *Liſt. Conch. t.* 679. *f.* 26?
Habitat ad Amboinam, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, ſubtus & ad latera alba.*

helvola. 90. C. teſta triquetro-gibba albo-punctata poſterius eroſa ſubtus flava immaculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 579. *n.* 206.
Liſt. Conch. t. 691. *f.* 38.
Bonann. recr. 3. *f.* 247.
muſ. Kircher. 3. *f.* 246.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* B.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* BB.
Leſſer teſtaceoth. f. 27.
Martin. Conch. I. *t.* 30. *f.* 326. 327.
Habitat in Oceano indico, *teſta flava, ſupra nunc albo punctata vel ocellata, nunc inter maculas albas vel cæruleſcentes ſtellulis ſpadiceis notata.*

ocellata. 91. C. teſta ſubmarginata lutea: ocellis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 580. *n.* 208.
Liſt. Conch. t. 696. *f.* 43.
Bonann. recr. 3. *f.* 359.
muſ. Kirch. 3. *f.* 352.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 7.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 32. c. d. e?
Martin. Conch. I. *t.* 31. *f.* 333. 334.
Habitat rarior - - - teſta $\frac{1}{2}$ *pollicem longa, margine albo fuſco-punctato, dentibus labii albis.*

poraria 92. C. teſta ſubviolacea albo-punctata. *Muſ. Lud. Ulr.* 581. *n.* 210.*
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 16?
Martin. Conch. I. *t.* 30. *f.* 324. 325.
β) *Liſt. Conch. t.* 694. *f.* 41.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 19. *n.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. b. c.
Martin. Conch. I. *t.* 24. *f.* 237. 238.
Habitat - - - teſta puſilla, ſupra interdum livida, lutea, aut ſubfuſca.

Pediculus. 93. C. teſta tranſverſim ſulcata. *Muſ. Ludovic. Ulr.* 582. n. 211.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 3. Bitou.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* L. Pediculus.
zoomorph. t. 3. *f.* I. K.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* P. Pediculus.
Liſt. anim. angl. p. 168. *t.* 3. *f.* 17. Concha veneris exigua alba ſtriata.
Liſt. Conch. t. 706. 707. *f.* 56. 57.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 22.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 28.
Ginann. adr. 2. *t.* 13. *f.* 109.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* O. P. *t.* 15. *f.* P. R.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 22.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 21. c. & *t.* 8. *f.* 45. a-h.
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 309-311.
β) *Liſt. Conch. t.* 706. *f.* 55.
Bonann. recr. 3. *f.* 239. 250.
muſ. Kirch. 3. *f.* 239. 248.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 306-308.
Habitat in Oceano Europæ ſeptentrionali, americano, indico, mari mediterraneo, *frequens, teſta minuta, ovata, aliarum nunc albarum, nunc rubellarum, nunc roſearum, nunc maculatarum, nunc immaculatarum dorſo longitudinaliter ſulcato, aliarum rubellarum aut ſubfuſcarum non raro maculis rufeſcentibus ſubfuſcis aut cinereis variarum ſulco longitudinali nullo.*

coſtata. 94. C. teſta dilute carnea: dorſo ſtriis elevatis ſubtiliſſimis tranſverſis aſpero.
Knorr Vergn. 6. *t.* 15. *f.* 7.
Habitat - - - c. pediculo affinis, at teſta magis elongata, ½ *pollicem ſuperante.*

Nucleus. 95. C. teſta utrinque marginata ſubroſtrata rugoſa, ſupra punctata tuberculis. *Muſ. Lud. Ulr.* 582. *n.* 212.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* V. Variolæ.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* I. Nux avellana granulata.
Pet. amb. aq. t. 16. *f.* 11.
gaz. t. 97. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 708. *f.* 58.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* Q. R. S.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 44. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 7. Regenf.

Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 78.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 17.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 312.
Habitat frequens ad inſulam Nuſſatello, *rarior ad* littora Hiloe, *teſta oblonga alba, cinerea aut chalybea, ad pollicem uſque longa, lateribus tranſverſim ſulcatis, labiorum dentibus acutis.*

Madagaſcarienſis. 96. C. teſta albida utrinque roſtrata: dorſo tuberculato; ſtriis tranſverſis undulatis.
Liſt. Conch. t. 710. *f.* 61.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 8. *f.* 44. c. d.
Habitat ad Madagaſcar, *c. nucleo affinis, at teſta latiori.*

Staphylæa. 97. C. teſta ſubroſtrata: punctis elevatis ſine ſtriis, extremitatibus luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 213.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* S. Porcellio.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 33. d? e?
Knorr Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 2.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 18.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 313. 314.
Habitat - - - teſta in ſpadiceum vergente, tuberculis minoribus, quam in c. nucleo, labiorum dentibus reflexis.

Cicercula. 98. C. teſta utrinque roſtrata adſperſa punctis elevatis.
Liſt. Conch. t. 710. *f.* 60.
Bonann. recr. 3. *f.* 243.
muſ. Kircher. 3. *f.* 242.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* K.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* T.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 19.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 243. 244.
Habitat in mari mediterraneo & indico, *teſta alba vel albida: dorſo convexo.*

Globulus. 99. C. teſta utrinque roſtrata lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 583. *n.* 214.*
Rumpf muſ. t. 39. *f.* L. N. Globulus.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* M.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 44. e. f.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 12.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 8. *f.* 20.
Martin. Conch. 1. *t.* 24. *f.* 242.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 7.

Chemn. Conch. 10. *t.* 145. *f.* 1349. 1350.
β) *Gualt. teſt. t.* 14. *f.* N.
Habitat in Aſia, *potiſſimum ad* Amboinam, *teſta globoſa alba, vel flava, rarius fuſco aut ſanguineo punctata.*

affinis. 100. C. teſta oblonga ſubroſtrata lævi flava: anterius utrinque ocellata.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 7.
Habitat - - - c. globulo affinis, aut magis oblonga.

ſqualina. 101. C. teſta tenui oblonga alba: punctis maculiſque ferrugineis.
Liſt. Conch. t. 684. *f.* 31. & *t.* 686. *f.* 33.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 5. *f.* 18. d. e. f.
Martin. Conch. 1. *t.* 25. *f.* 250. 251.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 7. *f.* 33. a. 33. l.
Habitat - - - teſta tenui, maculis interdum confluentibus, margine fuſco maculato, dorſi linea nonnunquam horizontali albida.

fimbriata. 102. C. teſta alba vel griſea: maculis faſciiſque tranſverſis ferrugineis obſoletis, oris labiis violaceo maculatis.
Martin. Conch. 1. *t.* 26. *f.* 263. 264.
Habitat - - - teſta detrita rubra.

cruenta. 103. C. teſta gibba ſupra cæruleſcente ruſo punctata ad latera ſubtuſque alba; labiis citrinis.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* E.
Habitat - - -

reticulata. 104. C. teſta reticulata, margine maculis virgatis variis.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* R.
Habitat - - -

rubiginoſa. 105. C. teſta oblonga alba, intus violacea dorſi litura ferruginea, utroque fine luteo bimaculato, labiorum dentibus flaveſcentibus.
Martin. Conch. 1. *t.* 29. *f.* 305.
Habitat - - -

miliaris. 106. C. teſta tenui brevi ex flavicante viridi lacteo-ocellata: linea laterali horizontali.
Liſt. Conch. t. 700. *f.* 47. & *t.* 701. *f.* 48.
Martin. Conch. 1. *t.* 30. *f.* 323.
Habitat - - - eroſæ affinis.

ciculari-ris. 107. C. teſta ſolida ſupra flaveſcente fuſco punctata: linea horizontali pallida, ſubtus lactea, punctis ad marginem impreſſis.
Martin. Conch. 1. *t.* 31. *f.* 335.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa.

craſſa. 108. C. teſta craſſa ſubflava: faſciis tribus albidis, ore cæruleſcente.
Liſt. Conch. t. 664. *f.* 8.
Habitat - - - carneolæ affinis, teſta ultra 4 *pollices longa.*

vinoſa. 109. C. teſta ſupra ex albo vinoſa: ocellis purpuraſcentibus circulo nigro cinctis lineaque horizontali alba, intus cærulea.
Bonann. recr. 3. *f.* 253.
muſ. Kirch. 3. *f.* 252.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta margine niveo.*

anguſtata. 110. C. teſta anguſtata fuſca: maculis ad latus rufeſcentibus.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* QQ.
Habitat - - -

ſimilis. 111. C. teſta oblonga gibba flavicante albo punctata: macula ad marginem nigricante.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* R.
Habitat - - - eroſæ affinis.

ſtriata. 112. C. teſta convexa ex albo cærulea fuſco punctata ſubtus flava altero latere ſtriata.
Gualt. teſt. t. 14. *f.* F.
Habitat - - - teſta mediæ magnitudinis.

chinenſis. 113. C. teſta oblonga ſolida variegata: labiis aurantiis.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* Z.
Habitat - - -

puſilla. 114. C. teſta cæruleſcente fuſco maculata trifaſciata.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* 1.
Habitat - - -

321. BULLA. *Animal* Limax.
Teſta univalvis, convoluta, inermis.
Apertura ſubcoarctata, oblonga, longitudinalis, baſi integerrima.
Columella obliqua, lævis.

Ovum. 1. B. teſta ovata obtuſe ſubbiroſtri: labro dentato. *Muſ. Lud.*
Ulr. 584. *n.* 218.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* A. Ovum.
Rumpf muſ. t. 38. *f.* Q. Ovum.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 32.
Pet. amb. t. 8. *f.* 9.
gazoph. t. 97. *f.* 7.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 65.
Bonann. recr. 3. *f.* 252.
muſ. Kirch. 3. *f.* 251.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* A. B.
Seb. muſ. 3. *t.* 76. *f.* 6. 10. 11.
Muſ. Gottwald. t. 7. *f.* 43. a. b. c.
Leſſer teſtaceoth. f. 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 205. 206.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 7.
β) Crumpled Cowry. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 60.
Habitat frequens ad Amboinam, β) *ad inſulas amicas media inter cypræas & bullas, teſta lævi ad 4 pollices longa, nivea, ore luteo.*

Volva. 2. B. teſta biroſtri: roſtris elongatis ſtriatis acutis. *Muſ. Lud.*
Ulr. 584. *n.* 216.*
Argenv. Conch. t. 18. *f.* I. Radius textoris.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 63.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 390.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 13-16.
Leſſer teſtaceoth. f. 23.
Knorr Vergn. 5. *t.* 1. *f.* 2. 3. & 6. *t.* 32. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* C.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 217. a. b. & *f.* 218.
Habitat rariſſima ad Jamaicam, *teſta tenui ſubgloboſa, transverſim ſtriata, alba, adultiore ex flaveſcente cinerea, roſtris rarius ſubcurvatis.*

biroſtris. 3. B. teſta biroſtri: margine exterius craſſato, roſtris elongatis lævibus.
Liſt. Conch. t. 711. *f.* 66.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20 *f.* 5.
Habitat rara ad Javam, *valvæ ſimilis, at teſta minore, fabæ magnitudine, anguſtiore, lævi, ex incarnato albida, roſtris æqualibus, ventris fere longitudine, oblique truncatis: altero parum adſcendente, rima ſubæquali verſus roſtrum adſcendente latiori.*

Spelta. 4. B. teſta oblonga utrinque obtuſiuſcula æquali, labro arcuato: margine intus incraſſato.
Liſt. Conch. t. 712. *f.* 68.
Gualt. teſt. t. 15. *f.* 4.
Pet. gaz. t. 66. *f.* 1. 3.
Ginann. adr. 2. *t.* 13. *f.* 95.
Barrel. ic. 31. 32. 35.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 215. 216.
Habitat rara in mari mediterraneo & adriatico, *teſta alba, lævi, ſemine tritici duplo majore, vix biroſtri, at magis patula, ſpira externa nulla, apertura longitudinali lunata cum denticulo obſoleto ad apicem columellæ.*

verrucoſa. 5. B. teſta tranſverſe angulata ovata utrinque puncto oſſeo.
Muſ. Lud. Ulr. 585. *n.* 217. *
Rumpf. muſ. t. 38. *f.* H. Jambos alba.
Petiv. amb. aq. t. 16. *f.* 22. 23. Gibba.
gaz. t. 99. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 712. *f.* 67.
Gualt. teſt. t. 16. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 17.
Leſſer teſtaceoth. f. 24.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 7.
Martin. Conch. 1. *t.* 23. *f.* 220. 221.
Habitat rara in India, *cypræis affinis, teſta tota alba, utroque fine rubeſcente, raro ultra pollicem longa, ovali.*

gibboſa. 6. B. teſta angulata: cingulo elevato. *Muſ. Lud. Ulr.* 585. *n.* 218. *
Column. purp. p. 29. *t.* 30. *f.* 5.
Liſt Conch. t. 711. *f.* 64.
Pet. gaz. t. 15. *f.* 5.
Bonann. recr. 3. *f.* 249. 339.
muſ. Kirch. 3. *f.* 249. 338. 339.

Argenv. Conch. t. 18. f. Q.
Seb. muſ. 3. t. 55. f. 18.
Muſ. Gottwald. t. 8. f. 46. a.
Leſſer. teſtaceoth. f. 25.
Knorr Vergn. 1. t. 14. f. 3. 4. & 6. t. 32. f. 4.
Martin. Conch. 1. t. 22. f. 211-214.
Habitat frequens ad Braſiliam, *teſta elongata anguſta alba, aut auroræ colore tincta ſupra alba: apertura recta, ventre longiori.*

Naucum. 7. B. teſta rotundata pellucida tranſverſim ſubſtriata utrinque umbilicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 586. *n.* 219.*
Rumpf muſ. t. 27. f. H. Bulla.
Liſt. Conch. t. 714. f. 73.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 4.
Gualt. teſt. t. 13. f. GG.
Argenv. Conch. t. 17. f. Q.
Seb. muſ. 3. t. 38. f. 45.
Knorr Vergn. 6. t. 38. f. 2. 3.
Martin. Conch. 1. t. 22. f. 200. 201.
Habitat in Oceano africano & indico, *teſta vix ultra pollicem longa, tenui, dorſi medio interdum glaberrima.*

apertа. 8. B. teſta ſubrotunda pellucida tranſverſim ſubſtriata tota hiante.
Gualt. teſt. t. 13. f. EE.
Martin. Conch. 1. p. 266. vign. 13. f. 3.
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 172. t. 1. f. 8. a. b.
Brit. zool. 4. t. 70. f. 85. A.
da Coſta brit. zool. t. 2. f. 3.
Favann. Conch. t. 27. f. F7.
Chemn. Conch. 10. t. 146. f. 1354. 1355.
Habitat rara ad Caput Bonæ Spei, *nauco affinis, ſed teſta hiante vix umbilicata, potius inflexa, quam involuta, ſtriis ſemilunaribus utrinque conſpicuis diſcernenda.* Spengler.

Hydatis. 9. B. teſta rotundata pellucida longitudinaliter ſubſtriata: vertice umbilicato.
Gualt. teſt. t. 13. f. DD.
Chemn. Conch. 9. t. 118. f. 1019.
Habitat rara in mari mediterraneo, *Fiſi minoris ſtirpe magnitudine, apertæ affinis.*

Ampulla. 10. B. teſta rotundata opaca: vertice umbilicato. *Muſ. Lud. Ulr.* 586. *n.* 220.*

Rumpf muſ. t. 27. *f.* G. Bulla.
Pet. gaz. t. 50. *f.* 13. & *t.* 99. *f.* 14.
Column. aq. t. 69. *f.* 3.
Grew. muſ. t. 9. *f.* 7. 8.
Barrel. rar. t. 1326. *f.* 37.
Liſt. Conch. t. 713. *f.* 69. *t.* 715. *f.* 74. & *t.* 1056. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 34-44.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 55. a. b. & *f.* 63. f.
Leſſer teſtaceoth. f. 31.
Knorr Vergn. 2. *t.* 8. *f.* 1. 5. *t.* 17. *f.* 6. & 6. *t.* 21. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 58. & *t.* 8. *f.* 21.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 188-193.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 1. *f.* 2. Goſſon.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 72.
Bonann. recr. 3. *f.* 3. b.
Gualt. teſt. t. 12. *f.* F-I.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 54. a. b. *f.* 55. c. d. *f.* 56. a. b. c. *f.* 57. a. b. *f.* 58. 59. 61. *f.* 63. a-e.
Murray teſtaceoth. t. 1. *f.* 9.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 202-204.
Habitat frequens in Oceano indico, æthiopico, americano, *teſta ſolidiore ſubpellucida, ad 3 pollices longa alba, cinereo, atro, rufeſcente, rubro, cæruleſcente maculata nebuloſaque, β) magis oblonga, tota opaca, vix ultra* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, γ) lineis cinereis atriſque tranſverſis picta.*

lignaria. 11. B. teſta obovata oblongiuſcula tranſverſe ſtriata: vertice ſubumbilicato.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 71.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 406.
Knorr Vergn. 6. *t.* 37. *f.* 4. 5.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* H.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 194. 195.
Habitat in mari ſiculo & adriatico, *teſta ampullæ fere ſtatura, rarius 3 pollices longa, ligni fere colore, intus alba, tenui, columella flexuoſa, ut oculo ad verticem uſque pateat.*

Phyſis. 12. B. teſta rotundata glaberrima pellucida lineis criſpata: ſpira retuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 587. *n.* 221.*
Liſt. Conch. t. 715. *f.* 75.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 403.
Valent. Abh. t. 2. *f.* 19.
Gualt. teſt. t. 13. *f.* FF.

Argenv. Conch. t. 17. f. I.
Klein oſtr. t. 5. f. 98.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 46-50.
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 196-198. *vign.* 14. *f.* 274. *f.* 3. 6.
β) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 115. *n.* 1. *t.* 9. *f.* 5.
γ) Stripad Bulla. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 11.
Habitat rarior in India, γ) *in* Oceano auſtrali, *teſta tenuiſſima, lineis rarius faſciis ſpadiceis aut nigricantibus, interjectis interdum punctis.*

Ampluſtra. 13. B. teſta ſubrotunda: ſpira elevata obtuſa, faſciis incarnatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 587. *n.* 222.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1350. 1351.
Habitat in Aſia, *teſta alba.*

Ficus. 14. B. teſta obovato-clavata reticulato-ſtriata: cauda exſerta, ſpira obliterata.
Muſ. Lud. Ulr. 637. *n.* 314. Murex Ficus.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* K. Ficus.
Pet. amb. aq. t. 6. *f.* 9.
Liſt. Conch. t. 750. *f.* 46. & *t.* 751. *f.* 46. a.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* I. M.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* O.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 93.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 1-6.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 70. *f.* 70. a. b.
Leſſer teſtaceoth. f. 53.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 7.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 4. 3. *t.* 23. *f.* 1. & 6. *t.* 27. *f.* 7.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 733-735.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 877. *f.* 1.
Mart. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 736. 737.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 19. 20.
δ) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 27.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 79. b.
ε) *Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 10. *f.* 8.
Habitat in Oceano indico & americano, *teſta ad 3 pollices longa, cancellatim ſtriata exalbida, maculata, lineata aut punctata, intus alba vel cæruleſcente, apertura ampla, ſemilunari inciſura, cauda intus cava.*

Rapa. 15. B. teſta rotundata turbinata ſubſtriata: cauda curva, ſpira exquiſita.

Muſ. Lud. Ulr. 638. *n.* 315. Murex Rapa.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* K. Rapa.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* F. Rapa.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 82.
Pet. amb. aq. t. 9. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* H.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 80.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 13-24. & *t.* 68. *f.* 7. 8.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 8.
Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 747-649.
Schroet. Journ. 5. *f.* 1.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 146. *f.* 1364-1366.
Habitat in Oceano indico, *cauda ſua cum ficu ad murices accedens, teſta* 2-3 *pollices longa, alba aut ſubvireſcente, adultiori evidenter ſtriata.*

canaliculata. 16. B. teſta cylindrica: ſpiræ anfractibus canaliculatis.
Muſ. Lud. Ulr. 588. *n.* 224.*
Habitat - - - - *teſta teſtacea pallido nebuloſa.*

conoidea. 17. B. teſta oblongo-turbinata lævi baſi ſubſtriata: ſuturis crenulatis.
Habitat - - - - *teſta ochroleuca, glandis magnitudine; baſi emarginata, labio obtuſo, columellæ plicis* 5-6, *ſpira conica teſta dimidio breviore: anfractibus tenuibus imbricatis, ad marginem punctis quaſi crenulatis.*

fontinalis. 18. B. teſta ovata pellucida contraria: ſpira obſoleta, apertura ovato-oblonga. *Fn. ſuec.* 2160.* *It wgoth.* 49.
Müller verm. aq. & terr. 2. *p.* 167. Planorbis teſta fragili ſiniſtrorſa: vertice obtuſo, apertura ovata.
Müller Naturf. 15. *p.* 1. &c. *t.* 1. *f.* 1-12.
Liſt. Conch. t. 134. *f.* 34.
anim. angl. t. 2. *f.* 25.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* CC.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 11. *f.* 61.
Geoffr. coq. p. 103. *n.* 10.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 16. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 103. *f.* 177. 178.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 879. 880.
Habitat frequentiſſima in Danubii *littore*, Galliæ, Angliæ, Scandinaviæ *fontibus, lacubus, rivis, rarior in aliis* Germaniæ *partibus, teſta tenera,* $\frac{1}{4}$ *pollicem longa, fragili,*

*nitidiſſima, flavicante, interdum alba: ſpiræ anfracti-
bus 3; extimo ventricoſo, incola albo griſeove; palli-
laciniato.*

hypnorum. 19. B. teſta ovata pellucida contraria: ſpira prominente, apertura ovato-lanceolata. *Fn. ſuec.* 2159.*
Chemn. Conch. 9. *t.* 103. *f.* 882. 883. a. b. c.
Habitat in Europæ muſcis humentibus, *nonne varietas b. fontinalis?*

turrita. 20. B. teſta nitida: ſpira acuminata, apertura oblonga.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 169. *n.* 354. Planorbis turritus.
Habitat in Saxonia, Danubio, Daniæ foſſis campeſtribus & aquaticis, *teſta* ½–6 *lineas longa ovata-oblonga contraria pellucida fulva, dum limacem nigerrimum (juniorem griſeum) tentaculorum tamen apice albo, continet, nigra, ſpicæ anfractibus teretibus* 3-6.

gelatinoſa. 21. B. teſta fragiliſſima ſiniſtrorſa: ſpira depreſſa, apertura caudata.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 170. *n.* 355. Planorbis gelatinus.
Habitat rariſſima in Daniæ rivis, *teſta* 2½ *lineas longa, ventricoſa, fulva, diaphana, tenerrima, pluma leviore; ſpira lata; anfractibus, præter extimum, obſoletis: limace inhabitante griſeo, teſta triplo majore, quam pallio craſſo gelatinoſo involvit.*

Terebellum. 22. B. teſta cylindrica: ſpira ſubulata baſi truncata.
Lud. Ulr. 564. *n.* 178.*
Rumpf muſ. t. 30. *f.* S. Terebellum.
Pet. amb. aq. t. 13. *f.* 24.
Liſt. Conch. t. 736. *f.* 30. 31.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 57.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* G.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 48. 49.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 53. a. b.
Leſſer teſtaceoth. f. 33.
Knorr Vergn. 2. *t.* 4. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 568. 569.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 737. *f.* 32.

Petiv. amb. t. 13. *f.* 24.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *t.* 1362. 1363.
Habitat in Oceano indico, *inter conos & bullas media; diſtincti forſan generis, teſta anguſta, ultra* 2 *pollices longa, interdum tranſverſe ſtriata, alba, frequentius luteo maculata, punctata aut nebuloſa, rarius quadrifaſciata.*

Cypræa. 23. teſta ovata: ſpira obliterata; apice prominulo, apertura poſterius magis dilatata, columella torta.
Knorr Vergn. 6. *t.* 4. *f.* 5? & *t.* 27. *f.* 6?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 2?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta magnitudine glandis & ultra, an vere larva cyprææ ſpurcæ? an cono bullato affinis.*

Virginea. 24. B. teſta ſubturrita erecta, columella truncata ſanguinea.
Muſ. Lud. Ulr. 612. *n.* 267. Buccinum virgineum.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 143. *n.* 333. Buccinum. teſta conico acuminata glabra: faſciis anguſtis diverſicoloribus, apertura purpurea.
Liſt. Conch. t. 844. *f.* 72.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* D.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 11.
Argenv. zoomorph. t. 10. *f.* G.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* G.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 3. 4.
inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 4.
Favann. Conch. t. 65. *f.* G'.
Chemn. Conch. 9. *t.* 117. *f.* 1000-1003.
α) cæruleſcens, faſciis quinque.
Liſt. Conch. t. 15. *f.* 10.
Klein oſtr. t. 17. *f.* 116.
Pet. gaz. t. 151. *f.* 1.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* N.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 66.
β) candida, faſciis octo.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* A.
γ) candida, faſciis ſeptem.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 38.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 7.
δ) anfractibus contrariis.
Chemn. Conch. 10. *t.* 173. *f.* 1682. 1673.
Habitat in Aſiæ *fluviis, rarior, teſta turbinis inſtar*

contorta, lævi, nitida, alba; faſciis rubris, viridibus flavis, nigris fuſciſque varia, ventricoſa, apertura fere ſemilunari, ſpiræ anfractibus 8 ſenſim decreſcentibus.

faſciata. 25. B. teſta conico-acuminata: faſciis maculiſque undulatis tranſverſis, apertura alba.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 145. *n.* 334. Buccinum faſciatum.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 64-66. 69-74.
Knorr Vergn. 5. *t.* 25. *f.* 4.
Favann.Conch. t. 65. *f.* G². G³. G⁵. G⁶.
Chemn. Conch. 9. *t.* 117. *f.* 1004-1006.
α) alba. faſciis cæruleis.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 62. 63.
Argenv. Conch. 1. *app. t. f.* G.
Martin. Berl. Mag. 3. *p.* 125. *t.* 5. *f.* 52.
β) alba, faſciis fuſcis.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 67.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* M.
γ) alba, faſciis variegatis.
Liſt. Conch. t. 12. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 68.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* C.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 43.
Regenf. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 46.
δ) faſciis tribus fulva, violacea & aurea.
Bonann. recr. 3. *f.* 379.
muſ. Kircher. 3. *f.* 366.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 117. *f.* 1007. 1008.
Habitat in America *auſtrali &* India, *virgineæ affinis, teſta craſſiuſcula, magis elongata, ad* 27 *lineas longa, minus lævi & nitida, faſciis non tranſlucentibus, columella integra facile diſcernenda.*

ſtrigata. 26. B. teſta conico-acuminata glabra: ſtrigis undulatis fulvis, columella recta reflexa.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 148. *n.* 336. Buccinum ſtrigatum.
Habitat - - - teſta alba, ultra 2 *pollices longa, apertura pallide cæruleſcente, columella perforata: ſpiræ anfractibus* 8.

ſtriatula. 27. B. teſta conica alba ſtriata, columella recta reflexa.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 147. *n.* 335. Buccinum ſtriatulum.

Habitat - - - ſtrigatæ proxime affinis, at teſta minore, vix 22 lineas longa, ſtrigis nullis ſpectabili diſtincta.

exarata. 28. B. teſta oblonga acuminata alba ſulcata: apertura repanda.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 148. *n.* 337. Buccinum exaratum.
Chemn. Conch. 9. *t.* 120. *f.* 1031. 1032.
Habitat rariſſima - - - teſta fragili, pellucida, columella recta imperforata, ſpiræ anfractibus 6-7.

bifaſciata. 29. B. teſta ſubturrita erecta alba: faſciis ad aperturam duabus latis rubellis.
Liſt. Conch. t. 16. *f.* 11.
Habitat terreſtris - - - an diſtincta ſpecies?

ambigua. 30. B. teſta ſubturrita compreſſiuſcula ſubincarnata: faſciis duabus remotis; altera latiore fuſca, altera cærulea.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 4.
Habitat - - - an hujus generis?

Zebra. 31. B. teſta ovata acuminata: faſciis longitudinalibus fuſcis, columella inflexa integra.
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 138. *n.* 331. Buccinum Zebra.
Liſt. Conch. t. 9. *f.* 4. *t.* 10. *f.* 5. *t.* 11. *f.* 6. *t.* 578. *f.* 33. &. *t.* 580. *f.* 3. 4.
Pet. gazoph. t. 44. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 50. 51. 54. 55. & *t.* 71. *f.* 4. 5.
Argenv. zoom. t. 11. *f.* L.
Klein oſtr. p. 34. §. 89. s. & 90. e.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 1.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 6.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 12. *f.* 2.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 103. *f.* 875. 876.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 118. *f.* 1015. 1016.
Favann. Conch. t. 65. *f.* M³.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1014.
Habitat ad Caput Bonæ Spei, & Tranquebariæ, *terreſtris, achatinæ affinis, & cum ea bullas helicibus jungens, at teſta minore, ad* 27 *lineas longa, magis ventricoſa, alba, lineis confertis undulatis varia.*

achatina. 32. B. teſta ovata: apertura obovata apiceque ſanguineis, columella truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 589. *n.* 225.*
Column. aq. c. 8. *t.* 15. Buccinum exoticum.

Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 140. *n.* 132. Buccinum teſta ovato-oblonga, faſcis longitudinalibus rufo fuſcis, axi truncato canaliculato.
Liſt. Conch. t. 579. *f.* 34.
Bonann. recr. 3. *f.* 192.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 1-3.
Klein oſtr. p. 47. *t.* 3. *f.* 60.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 1.
Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 1. & 4. *t.* 24. *f.* 1. & 5. *t.* 12. *f.* 2.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 1.
β) alba, apice flavo.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* B.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 190.
Argenv. Conch. 1. *t.* 10. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 7-10.
Muſ. Gottwald. t. 33. *f.* 220.
Chemn. Conch. 9. *t.* 118. *f.* 1012. 1013.
γ) fulva vel candida, columella ſanguinea.
δ) alba: faſciis crebis, columella pallida.
Argenv. Conch. 1. *app. t.* 2. *f.* L.
Habitat in Oceano americano, *teſta ad 8 pollices longa, ſub epidermide fuſca exalbida, maculis oblongis longitudinalibus undatis fuſcis, ſpadiceis, vel cæruleſcentibus varia.*

hyalina. 33. B. teſta oblonga cornea: ſpira retuſa.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 20?
Martin. Conch. 1. *t.* 21. *f.* 199.
Habitat - - - phyſi affinis, teſta tenui, vix ½ pollicem longa.

ovata. 34. B. teſta ſubovata obtuſe ſubbiroſtri dorſo ſtriata medio gibboſa ſpadicea: maculis faſciiſque albis intus violacea.
Bonann. recr. & muſ. Kirchr. 3. *f.* 261.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 207. 208.
Habitat rarior - - - B. ovo affinis, at teſta leviore magis oblonga, labroque minus dentato diſtincta.

ferruginoſa. 35. B. teſta ſubovata æquabili griſea dilute, fuſco undulata: maculis ferrugineis faſciiſque duabus albis.
Martin. Conch. 1. *t.* 22. *f.* 209.

An ſui generis cochlea, quam Schroeter *n. Litterat.* 2. *p.* 221. *f.* NN. [illegible] *mine deſcribit?*

β) *Muſ. Gottwald. t. 8. f. 53?*
γ) *Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 1.*
Habitat - - - ovatæ affinis, teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

Velum. 36. B. teſta tenuiſſima utrinque umbilicata alba lineis capillaribus fuſcis varia: faſcia nivea utrinque fuſco marginata.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. p. 409. t. 1. f. 10. f. 11.
Chemn. Conch. 10. t. 146. f. 1348. 1349.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. f. 1.*
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

Veſica. 37. B. teſta ovato oblonga cinereo varia intus lactea ſolida pellucida, apertura ampla, dorſo biſulcato.
Bonann. recr. 3. f. 332.
muſ. Kirch. 3. f. 330.
Klein oſtr. t. 5. f. 96.
Habitat ad Braſiliam, *ampullæ affinis.*

cylindrica. 38. B. teſta cylindrica lævi alba tenuiſſima.
Gualt. teſt. t. 15. f. 1.
Favann. Conch. t. 27. f. F5.
Helbl. Boehm. Abh. 4. t. 2. f. 30. 31.
Chemn. Conch. 10. t. 146. f. 1356. 1357.
β) *Gualt. teſt. t. 15. f. 2.*
Habitat - - - hyalinæ affinis, teſta minuta.

Oliva. 39. B. teſta cylindrica: apertura ſuborbiculari infra dilatata.
Liſt. Conch. t. 714. f. 70. b. c.
Klein oſtr. t. 5. f. 99. a. b.
Habitat - - - ſpira non conſpicua.

Voluta. 40. B. teſta lævi cylindrica olivacea; apertura effuſa, columella inflexa truncata. *Chemn. Conch. 9. 117. f.* 1009. 1010.
Habitat rarior - - - ſpiræ anfractibus 7.

dominicenſis. 41. B. teſta ſubcylindrica turrita rufeſcente longitudinaliter ſtriata maculata: ſuturis crenulatis, columella ſinuata truncata. *Chemn. Conch. 9. t. 117. f.* 1011.
Habitat in inſula S. Dominici, *teſta longitudinaliter ſulcata, anguſta, ad ſuturas granulata, anfractibus extimis fuſcis.*

purpurea. 42. B. teſta ventricoſa rugoſa longitudinaliter ſtrigoſa intus purpurea; columella truncata, apertura ovata labro acuto: limbo intus nigerrimo. *Chemn. Conch. 9. t. 118. f.* 1017. 1018.

Knorr Vergn. 4. *t.* 14. *f.* 1.
Habitat in Africæ campis, *oryza conſitis.*

ſpreta. 43. B. teſta ovata tenui fuſca ſcabra.
Knorr Vergn. 2. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat - - -

ſolida. 44. B. teſta ſolida rubra violaceo varia; margine rubro ſpira prominula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 2.
Habitat - - - *ampullæ affinis.*

Stercus pulicum. 45. B. teſta ventricoſa glabra cornea cinnamomea quinquefariam punctata, columella ſinuata, labro acuto.
Chemn. Conch. 9. *t.* 120. *f.* 1026. 1027.
Favann. cat. t. 2. *f.* 129.
Habitat - - - *teſta tenuiſſima ovata.*

Scabra. 46. B. teſta ovata ſcabra dorſo ſubcarinata decuſſatim ſtriata alba, alba roſeo-lineata, columella ſinuoſa reflexa.
Chemn. Conch. 10. *p.* 118. *t.* 146. *f.* 1352. 1353.
Habitat rariſſima in Java.

Akera. 47. B. teſta ovata pellucida: vertice truncato caniculato.
Müll. zool. dan. 2. *p.* 88. *t.* 71. *f.* 1-5. *prodr. n.* 2921.
Chemn. Conch. 10. *t.* 146. *f.* 1358. *n.* 1-3.
Habitat in mari norwegico, *teſta 6 lineas longa.*

ſoluta. 48. B. teſta cylindrica cornea tranſverſim ſtriata: vertice retuſo, anfractibus marginatis canaliculatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 113. *t.* 146. *f.* 1359-1361.
Habitat in Zeylon.

truncata. 49. B. teſta hyalina tenui oblonga: columella incurva truncata.
Kaemmer. Cab. Rudolſt. p. 128. *t.* 10. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta ultra 2 pollices longa.*

carnea. 50 B. teſta ovata incarnata gibba: labro arcuato incraſſato intus dentato. *Poiret. voyag. en Barbar.* 2. *p.* 21.
Habitat frequens ad Africæ *littora.*

322. VOLUTA. *Animal* Limax.
Teſta unilocularis, ſpiralis.
Apertura ecaudata, ſubeffuſa.
Columella plicata: labio umbilicove (utplurimum) nullo.

* *apertura integra.*

Auris Midæ. 1. V. teſta coarctata ovali oblonga: ſpira rugoſa, columella bidentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 589. *n.* 226.*
Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 110. *n.* 311. Helix teſta fuſiformi granulata: apertura lanceolata, labro ad axin bidentato.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* H. H. Auris Midæ.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* G. Auricula Midæ.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* G.
Pet. aq. amb. t. 8. *f.* 2.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 122.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 6. 21. 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 436-438.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* L.
β) *Liſt. Conch. t.* 577. *f.* 32. b.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1395. 1396.
Habitat rarior in Indiæ, *potiſſimum* Ceram, *paludibus ſilvaticis fluviiſque uliginoſis, hèlices bullis jungens, teſta nonunquam ultra 4 pollices longa fuſca, ſolida, rugoſa, vel ſtriata, ſpira magna: anfractibus 6-9 ſingulis faſcia granulata terminatis, extremis cancellatis, apertura longa, infra ampliore.*

flammea. 2. V. teſta ovali oblonga: apertura ampla, columella unidentata.
Liſt. Conch. t. 814. *f.* 24.
Martin. Conch. 2. *t.* 43. *f.* 439.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. e.
γ) *Liſt. Conch. t.* 834. *f.* 60.
δ) *Liſt. Conch. t.* 834. *f.* 61.
Habitat - - - teſta magis ventricoſa & breviore, quam in aure Midæ, alba: maculis virgatis perpendicularibus undatis rubris, columella flavo marginata.

ſulcata. 3. V. teſta coarctata ovali-oblonga ſulcata alba flavo-punctata, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 440. 441.
Habitat - - - auri Midæ proxime affinis, at teſta longe minori, vix ¼ pollicis longa, ſulco inter utramque columellæ plicam profundo.

bifaſciata. 4. V. teſta tenui tranſverſim ſtriata incarnata: faſciis duabus albis, columella unidentata.
Liſt. Conch. t. 835. f. 58.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 442. 443.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa: apertura longa, anguſta.

flava. 5. V. teſta ſuperius coarctata flava, labro crenulato, columella biplicata.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 444.
Habitat - - - - teſta 4½ lineas longa, rarius ſpadicea faſciaque obſoleta obſcura, columellaque alba tridentata, ſpiræ anfractibus 7 planis.

minuta. 6. V. teſta ovali oblonga faſciata, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 834. f. 59.
Martin. Conch. 3. t. 43. f. 445.
Habitat - - - teſta nunc fuſca: faſciis 2-6 albis, nunc alba: faſciis 4, alternatim luteis & coffeæ colore tinctis, labroque tricoſtato.

puſilla. 7. V. teſta tenui fuſca: ſpiræ anfractibus cancellatis, columella tridentata.
Gualt. teſt. t. 55. f. F.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 446.
Habitat - - - - - auri Midæ proxime affinis, at teſta minima.

glabra. 8. V. teſta oblongo-ovali glabra: labro reflexo ſulcato, columella unidentata.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 447. 448.
Habitat - - - teſta ultra 1½ pollicem longa magis ventricoſa, quam in aure Midæ, apertura quoque ſuperius magis coarctata, colore albo: maculis perpendicularibus undatis flavicantibus aut ſpadiceis vario.

Auris Sileni. 9. V. teſta ovali gibba umbilicata: columellæ plica unica craſſa flexuoſa. *v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. f. 3. 4. muſ. Caeſ. Vindob. ind.* 1. *p.* 197.

Habitat - - - teſta glabra ultra 2 pollices longa ventricoſa brevi, fuſca: ſtriis longitudinalibus undulatis ſpadiceis, apertura ovata, ſpira obtuſa.

Auris Judæ. 10. V. teſta coarctata oblonga: ſpira lævi, columella tridentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 590. *n.* 226.*

Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 109. *n.* 310. Helix teſta cylindrica ſubgranulata, apertura lanceolata; labro ad axin tridentato.

Liſt. Conch. t. 32. *f.* 30.

Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 412.

Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 449-451.

Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 10.

Einl. in Conch. 1. *p.* 197. *t.* 1. *f.* 9.

β) *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 12. Voluta Auris Judæ.

Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 9.

Habitat rarior in Indiæ paludibus, *auri Midæ affinis; at teſta minore, anguſtiore, magis oblonga, fuſca aut alba maculis undatis fuſcis varia, ſpiræ anfractibus* 6, *primo & extremis ſubtiliſſime cancellatis.*

Auris Malchi. 11. V. teſta fuſiformi granulata: apertura ovata, columella exciſa patentiſſima.

Müll. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 112. *n.* 312. Helix Auris Malchi.

Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1037. 1038.

β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 121. *f.* 1039. 1040.

γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 121. *f.* 1041.

Habitat β) *in* nova Caledonia, *teſta* 29 *lineas longa; ſub epidermide ſqualide fuſca, alba: ſpiræ anfractibus ſex medio convexis coſtatis, apertura candida; an hujus generis?*

tornatilis. 12. V. teſta coarctata ovata ſubſtriata: ſpira elevata acutiuſcula, columella uniplicata.

Liſt. Conch. t. 835. *f.* 58.

Knorr Vergn. 6. *t.* 19. *f.* 4.

Martin. Conch. 3. *t.* 43. *f.* 442. 443.

Schroet. n. Litterat. 3. *t.* 2. *f.* 12. 13.

β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 19. *f.* 4?

Habitat - - - teſta rubicunda: faſciis albis.

ſolidula. 13. V. teſta coarctata oblongo-ovata opaca ſtriata: ſpira elevata acutiuſcula, columella ſubplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 590. *n.* 228.*

Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 143?

Klein oſtr. t. 3. f. 72?
Schroet. n. Litterat. 3. t. 2. f. 14. 15.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 8. f. 3.
Chemn. Conch. 10. t. 149. f. 1405.
Martin. Conch. 3. t. 43. f. 440. 441.
Habitat - - - - - teſta albo griſeoque longitudinaliter lineata.

livida. 14. V. teſta coarctata ovato-cylindrica: ſpira ſubelevata obtuſiuſcula, columella quinqueplicata. *Muſ. Lud. Ulr. 591. n. 229.**
Gualt. teſt. t. 25. f. B?
β) *Gualt. teſt. t. 25. f. C.*
Habitat rarior in Africa, *ad cylindroideas accedens, teſta tamen magis ventricoſa, vix ultra pollicem longa, livida: faſciis tranſverſis pallidis obſoletis diſtincta.*

Coffea. 15. V. teſta coarctata lævi: ſpira obtuſa, apertura utrinque dentata.
Liſt. Conch. t. 834. f. 59.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 255.
Favann. Conch. t. 65. f. 47.
Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1043. 1044.
Martin. Conch. 2. t. 43. f. 445.
Habitat - - - - ſtructura ad conos accedens, at apertura poſterius coarctata, teſta lurido-livida.

** Cylindroideæ, *ſ. ſubcylindricæ emarginatæ.*

porphyria. 16. V. teſta lævi: ſpira baſi obliterata, labro medio retuſo, columella oblique ſtriata *Muſ. Lud. Ulr. 592. n. 230.**
Argenv. Conch. t. 13. f. K. Porphyria.
Bonan. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 142.
Rumpf muſ. t. 39. f. 1.
Gualt. teſt. t. 24. f. P.
Seb. muſ. 3. t. 53. f. E.
Muſ. Gottwald. t. 42. f. 19. a.
Knorr delic. t. B. IV. f. 4.
Vergn. 1. t. 15. f. 1.
Regenſ. Conch. 1. t. 2. f. 15.
Martin. Conch. 2. t. 47. f. 485. 486. 498.
β) *Liſt. Conch. t. 727. f. 14.*
Argenv. Conch. t. 13. f. N.
Seb. muſ. 3. t. 53. f. A-D.

Muſ. Gottwald. t. 42. f. 22. a. b. c.
Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 1. 2. & 3. t. 2. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 45. f. a b. 477.
γ) *Martin. Conch. 2. t. 48. f. 519?*
δ) *Liſt. Conch. t. 724. f. 11?*
Habitat in Braſilia, *ol væ proxime aſſinis, at teſta quadruplo longiore, 5 quippe pollices longa, rubella, lineis angularibus plurimis fuſcis varia, labro intus ſordide flavo transverſim ſtriato, columella ſubfuſca: plicis albis.*

Oliva. 17. V. teſta lævi: ſpiræ baſi reflexa, columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr. 593. n. 231.**
α) *Rumpf muſ. t. 39. f. 2.* Cylinder.
Liſt. Conch. t. 739. f. 27.
Gualt. teſt. t. 23. f. B.
Seb. muſ. 3. t. 53. f. L.
Muſ. Gottwald. t. 43. f. 49. 40. a.
Knorr Vergn. 5. t. 28. f. 6.
Martin. Conch. 2. t. 45. f. 472. 473.
Chemn. Conch. 10. t. 147. f. 1367-1382.
β) *Martin. Conch. 2. t. 47. f. 502.*
γ) *Knorr Vergn. 5. t. 27. f. 4.*
δ) *Knorr Vergn. 3. t. 17. f. 3.*
Regenſ. Conch. 1. t. 1. f. 2.
Martini Conch. 2. t. 45. f. 474.
ε) *Liſt. Conch. t. 718. f. 2.*
Seb. muſ. 3. t. 53. f. K.
Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 7. & 5. t. 27. f. 5.
Martin. Conch. 2. t. 47. f. 501.
ζ) *Liſt. Conch. t. 740. f. 29.*
Martin. Conch. 2. t. 45. f. 475. & t. 47. f. 507. 508.
η) *Martin. Conch. 2. t. 46. f. 496.*
θ) *Liſt. Conch. t. 728. f. 15.*
Gualt. teſt. t. 24. f. M.
Seb. muſ. 3. t. 53. f. O.
Muſ. Gottwald. t. 42. f. 19. b. c. t. 43. f. 25. a. b. d. f. 26. 27. 31. 31. a.
Martin. Conch. 2. t. 45. f. 478. 479.
ι) *Martin. Conch. 2. t. 46. f. 497.*
κ) *Liſt. Conch. t. 739. f. 28.*
Rumpf muſ. t. 39. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 48. f. 512. 513.
λ) *Valent. Abh. t. 8. f. 69.*
μ) *Gualt. teſt. t. 23. f. G.*

γ) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* P.
ξ) *Gualt. teſt. t.* 23 *f.* PP.
ο) *Gualt. teſt. t.* 23. *f.* QQ.
π) *Martini Conch. t.* 48. *f.* 509. 510.
ρ) *Liſt. Conch. t.* 735. *f.* 25.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 4.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 68.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 91. a. b.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* S.
Muſ. Gottwald. t. 43. *f.* 37. b. c. d. *f.* 34.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* M. & a.
Knorr Vergn. 5. *t.* 19. *f.* 1. & *t.* 26. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 45. *f.* 480. 481. *t.* 47. *f.* 503. 504. & *t.* 53. *f.* 563.
σ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 47. *f.* 499. 500.
τ) *Argenv. zoomorph. t.* 11. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* R.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 6. a. *f.* 7. a. b. *f.* 15. d. e.
Knorr Vergn. 5. *t.* 26. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 517.
υ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 2. *f.* 4.
φ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 23. *f.* 5.
χ) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 30. b. *f.* 35. a. b.
ψ) *Muſ. Gottwald. t.* 37. *f.* d.
ω) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 41. b.
αα) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 42. b.
ββ) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* R.
Martin. Conch. 2. *t.* 49. *f.* 531.
γγ) *Liſt. Conch. t.* 732. *f.* 21. & *t.* 734. *f.* 23. 24.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* M. N.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* Y.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 1. d. 2. a. 13. a-d.

Infinita olivæ variatio, & maxima nonnullarum varietatum cum iſpidula affinitas dubios relinquit, an diſtinctæ ſint varietates, & utri ſpeciei adjungendæ olivæ & volutæ a Martini *Conch.* 2. *t.* 99. *f.* 6. 7. *a* Liſtero *Conch. t.* 718. *f.* 2. a *t* 725. *f.* 12. *t.* 728. *f.* 16. *t.* 730. *f.* 18. *t.* 738. *f.* 33 *t.* 746. *f.* 40. & *t.* 813. *f.* 23. a. *a* Gualtieri *teſt. t.* 23. *f.* R. S. SS. V. & *t.* 24. *f.* B. C. D. E. F. H. I. L. *ab* Argenville *Conch. t.* 13. *f.* L. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 53. *f.* F. S. T. V. b. c. d. h. m. *a* Bytemeiſter *appar. t.* 12. *f.* 62. *Muſ.* Gottwaldian. *t.* 42. *f.* 5. a. b. 8. 11. 12. 14. d. 15. *f.* 16. a. d. e. *f.* 18. b. c. *f.* 20. a. b. *t.* 43. *f.* 28. a. b. c. *f.* 29. a. b. c. *f.* 30. a. b. e. d. *f.* 32. *f.* 23. *f.* 35. a. b. c. d. h. k. *f.* 38. *f.* 40. d. *f.* 43. a. *f.* 44. a. *f.* 45. a. b. *f.* 46. 47. 48. 50. *a* Knorrio *Vergn.* 1. *t.* 15 *f.* 7. & 6. *t.* 24. *f.* 4. 5. & *a* Schroetero *Einl. in Verſt.* 4. *t.* 7. *f.* 3. 4. *delineatæ; an diſtinctæ hujus tribus ſpecies foſſilis ab* Argenville *Conch. t.* 29. *f.* 9. a. *adumbrata?*

Martin. Conch. 2. *t.* 46. *f.* 487. 488.
δδ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 489.
εε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 46. *f.* 490.
ζζ) *Liſt. Conch. t.* 739. *f.* 26.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* H. I.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 511. 511. a.
ηη) *Argenv. Conch. t.* 13. *f.* O.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 514.
θθ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 559.
ιι) *Martin. Conch.* 2. *t.* 51. *f.* 562.
κκ) *Liſt. Conch. t.* 719. *f.* 3. & *t.* 731. *f.* 20.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* F. T.
Seba muſ. 3. *t.* 53. *f.* F?
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 515. 516. 518. 521.
λλ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* G.
Habitat infinita coloris & picturæ varietate in mari indico.

annulata. 18. V. teſta lævi alba; dorſi annulo carinato.
Liſt. Conch. t. 717. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 564.
β) *Martin. neueſt. Mannigfalt.* 1. *p.* 445. *t.* 2. *f.* 21?
Habitat - - - β) *rufeſcente undulata.*

Utriculus. 19. V. teſta elongata lævi: ſpira prominula.
Liſt. Conch. t. 723. *f.* 10. *t.* 730. *f.* 19?
Gualt. teſt. t. 24. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* M.
Knorr Vergn. 2. *t.* 12. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 49. & 50. *f.* 539-542.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 42. *f.* 9. 10. 14. a. b. c. 15. a. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 48. *f.* 520.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 51. *f.* 565. 566.
δ) *Liſt. Conch. t.* 733. *f.* 22.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 543. 544.
ε) *Liſt. Conch. t.* 725. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 173. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 545-547.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 548.
η) *Liſt. Conch. t.* 722. *f.* 9.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 141.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* RR. & *t.* 24. *f.* A.

Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* P. Q.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 2. b. c. & *f.* 4. & *t.* 43. *f.* 51. a. b. c. *f.* h. i. m.
Knorr Vergn. 3. *t.* 17. *f.* 2. & 5. *t.* 18. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 549-554.
Habitat in Oceano indico & æthiopico, *coloris & picturæ varietate numeroſa, forma magis elongata ab oliva diſcernenda.*

hiatula. 20. V. teſta tenui: dorſo cinereo maculoſo ſubtus calloſo, apertura ampla, columella ad baſin dentata.
Liſt. Conch. t. 729. *f.* 17.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 555.
Habitat in mari hiſpanico, *utriculo affinis, ore cæruleo aut fuſco, rarius albo, dorſi callo albo aut flavicante.*

Iaſpidea. 21. V. teſta alba vireſcente fuſco violaceoque punctata: ſpira prominente; anfractibus baſi faſcia maculoſa.
Liſt. Conch. t. 726. *f.* 13. a.
Habitat in mari hiſpanico, *teſta vix pollicem longa, ſpira magis prominente, quam in congeneribus.*

nivea. 22. V. teſta nivea elongata lævi faſciata.
Martin. Conch. 2. *t.* 50. *f.* 558.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 50. *f.* 557.
Habitat in mari hiſpanico, *anfractuum primo ſubfuſco aut rubello: faſciis 2 albis, β) faſciis 2 cæruleis nebuloſis per totam teſtæ ſuperficiem diſperſis; an vere diſtincta ab Utriculo & Oliva?*

Iſpidula. 23. V. teſta lævi: ſpira prominente; margine unico; columella oblique ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 594. *n.* 232.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 7. Agaron?
Bonann. recr. 3. *f.* 369.
muſ. Kirch. 3. *f.* 363.
Barr. ic. t. 1322. *f.* 17.
Rumpf muſ. t. 39. *f.* 7. 8.
Petiv. gaz. t. 59. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 23. *f.* C. D. E.
Argenv. Conch. t. 13. *f.* Q.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* X.
Muſ. Gottwald. t. 42. *f.* 1. a. b. c. *f.* 3. a. b. c. *f.* b. c. d. & *f.* 7. a. & *t.* 43. *f.* 37. e. *f.* 40. b. c. e. f. *f.* 41. a. *f.* 42. a. *f.* 43. c. *f.* 44. b. & *f.* 45. d. f.

Knorr Vergn. 3. t. 19. f. 3.
Martin. Conch. 2. t. 49. f. 522-530. & f. 532-538.
β) Seb. muſ. 3. t. 53. f. g.
γ) Seb. muſ. 3. t. 53. f. I.
) Seb. muſ. 3. t. 53. f. k.
ε) Liſt. Conch. t. 720. f. 4. 5.
Rumpf muſ. t. 39. f. 6.
Gualt. teſt. t. 23. f. H. I. L. Q.
Seb. muſ. 3. t. 53. f. W.
Muſ. Gottwald. t. 42. f. 5. c. & ? t. 43. f. 36.
Knorr Vergn. 2. t. 10. f. 6. 7.
Martin. Conch. 2. t. 46. f. 491. 492.
ζ) Liſt. Conch. t. 721. f. 6. 7.
Muſ. Gottwald. t. 42. f. 5. d. & f. 15. h.
Martin. Conch. 2. t. 46. f. 493. 494.
Habitat varietate numeroſa in India, teſta pollicem, ε) 2 longa, anguſta, alba aliter atque aliter picta, intus obſcuriore aut fuſca.

Carneolus. 24. V. teſta aurantia: faſciis cæruleis, ſpira complanata & apertura albis.
Martin. Conch. 2. t. 46. f. 495.
Habitat - - - -

*** Ovatæ, ſ. obovatæ, effuſæ, emarginatæ.

Dactylus. 25. V. teſta lævi decuſſatim ſtriata obtuſa columella ſexplicata.
Liſt. Conch. t. 813. f. 23.
Gualt. teſt. t. 28. f. P.
Seb. muſ. 3. t. 53. f. S.
Favann. Conch. t. 15 f. F'.
Chemn. Conch. 10. t. 150. f. 1411. 1412.
β) Gualt. teſt. t. 28. f. O.
Habitat rara in India, teſta $1\frac{1}{2}$ pollicem longa ex albido & incarnato varia: labio vix crenato.

Miliaria. 26. V. teſta ſubemarginata alba: ſpira obliterata flaveola; columella oblique ſtriata.
Habitat frequens in mari mediterraneo, monili affinis, at minor, brevior, magis ventricoſa, glaberrima, ſpiræ lineola flava, interdum tota mellea.

Monilis. 27. V. teſta integra alba: ſpira obliterata alba, columella oblique ſtriata.
Muſ. Gottwald. t. 8. f. 46. c.

Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 426.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 5. *f.* 4. Stipon.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 428.
Habitat in Sina, *ad armillas, monilia, coronas adhi*-*bita*, β) *in* Senegalia Africæ, *teſta vix* ½ *pollic*-, β) 2½ *lineas longa, labro prominente, apertura ampl*-, *columellæ plicis* 4-5, β) 8-10 *tenuiſſimis.*

exilis. 28. V. teſta obovata integra flavicante: faſciis duabus fuſcis, ſpira prominente, columella oblique ſtriata.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 427.
β) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 303. *t.* 1. *f.* 18.
Habitat - - - *teſta minuta*, β) *alba nitida: faſcia lutea.*

Perſicula. 29. V. teſta lævi: ſpira retuſo-umbilicata, columella ſeptemplicata, labro marginato crenato.
α) teſta rubro punctata.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 10.
Pet. gaz. t. 8. *f.* 2.
Barrel. ic. t. 1326. *n.* 33.
Bonann. recr. 3. *f.* 246.
muſ. Kirch. 3. *f.* 245.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* C. D. E.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 421.
β) teſta rubro-lineata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 4. Bobi.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 9.
Pet. gaz. t. 8. *f.* 10.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 238. *male.*
Gualt. teſt. t. 28. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 48. a. b. *f.* 49. a. b. c. d. *f.* 51. b.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 419. 420.
γ) teſta rubella albo maculata, aut unicolore alba, vel cæruleſcente.
Muſ. Gottwald. t. 8. *f.* 46. b. 47. 51. a. 62. a. b. c.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 416-418.
δ) teſta nigro-faſciata, ſpira ſubprominula.
Valent. Abh. t. 9. *f.* 78.
Habitat in mari africano, *& ad* Senegaliam, *teſta vix ultra pollicem longa.*

pallida. 30. V. teſta integra oblongo-ovata: ſpira elevata, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 588. *n.* 223.*

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 5. *f.* 2. Falier, & *f.* 3. Simeri.
Liſt. Conch. t. 714. *f.* 70.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 211. *t.* 1. *f.* 10. a. b.
Habitat in Oceano africano, *glabellæ affinis, at teſtæ ventre ſuperne æquali diſtincta, teſta elongata anguſta, vix ½ pollicem longa, exalbida vel cerea, interdum pellucida.*

Faba. 31. V. teſta ſubemarginata lævi ſubplicata: ſpira prominente, columella quadriplicata, labro marginato crenulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 2. Narel.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* Q.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 170. a-d.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 432. 433.
Habitat paulo rarior in Oceano africano, *teſta ad pollicem uſque longa, anguſta, elongata, nitida, cana, ſeriatim nigro punctata.*

Glabella. 32. V. teſta integerrima lævi: ſpira lævigata, columella quadriplicata, labro gibbo marginato denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 574. *n.* 233.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 1. Porcelaine.
Liſt. Conch. t. 818. *f.* 29-32.
Gualt. teſtac. t. 28. *f.* A. L.
Klein oſtrac. t. 5. *f.* 92.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 169. a-h. 170. e. 171. a. b. 172. a-d. 173. a.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 2. 3. & 5. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. neueſt. Manigf. 4. *p.* 425. *t.* 3. *f.* 25-28.
Conch. 2. *t.* 42. *f.* 429-431. 434. 435.
β) teſta ochroleuca atro punctata.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 49.
γ) teſta anguſtiore badia, labro non marginato, columella triplicata.
Bonann. recr. 3. *f.* 326.
muſ. Kirch. 2. *f.* 101.
δ) teſta alba flavis lineis picta.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 36.
ε) teſta alba purpureo nebuloſa, ſpiræ anfractibus marginatis.
Gronov. zooph. p. 298. *n.* 1318. *t.* 19. *f.* 13. 14. Voluta Pyrum.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 890. 891.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1422.
ϑ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1423. 1424.

Habitat in Oceano africano & americano, *teſta* ...
pollices longa, aut unicolore alba, cinerea, vel ...
fuſca, aut ſtriata, undulata, maculis virgatis, ...
albis, lineiſve angulatis picta, ſpiræ anfractibus ...

Prunum. 33. V. teſta integerrima lævi: ſpira lævigata, colum...
quadriplicata, labro æquali mutico.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 3. Egouen.
Liſt. Conch t. 817. *f.* 28.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 422. 423.
Habitat frequens ad Goream, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem long*...
cærulea, cæruleſcente, vel ex vireſcenti cana.

reticulata. 34. V. teſta decuſſatim ſubſulcata: labro interno ſtriat...
columella ſubperforata.
Liſt. Conch. t. 830. *f.* 52-54.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 52.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 53. 55.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 165. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 7?
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1107. 1108. 1109?
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 56?
Habitat in Oceano americano *& ad* Guineam, *teſta* ...
pollices longa, pruni magnitudine albo luteoque ...
aut fuſca, albo faſciata, rarius tota fuſca, aut ...
inflata: ſulcis obſoletis in ſectionis angulo in tuber...
elevatis, apertura alba, labro tranſverſim ſulcato, ...
lumella plicis aliquot geminatis exarata; cauda ...

mercatoria. 35. V. teſta ſtriata: ſpira obtuſata, columella retuſa ...
tata, labro gibbo denticulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 29. Staron.
Liſt. Conch. t. 824. *f.* 43.
Pet. gaz. t. 9. *f.* 4.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* I. L.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 120. b-d. e.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 5. & 6. *t.* 18. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 452-458.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. E.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 6.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 16. *f.* 7.
ε) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 9?

Habitat in mari mediterraneo, æthiopico, americano, indico, *ruſticæ affinis, teſta ¾ pollicis circiter longa, aut unicolore alba vel flava, aut aliter aliterve maculata, nebuloſa vel ſtriata, interdum faſciata, ſolida, brevi: ſtriis tranſverſis elevatis noduloſis.*

ruſtica. 36. V. teſta læviuſcula: ſpira prominente, columella retuſa denticulata, labro gibbo denticulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 28. Siger.
Liſt. Conch. t. 824. *f.* 44. *t.* 825. *f.* 46. *t.* 826. *f.* 49.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* E. G. H.
Bytem. app. t. 11. *f.* 41. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 469-471.
β) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. a.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 462.
γ) *Liſt. Conch. t.* 826. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* D.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 465. 466.
δ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 459.
ε) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 463.
ζ) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 467.
η) *Martin. Conch.* 2. *t.* 44. *f.* 468.
θ) *Liſt. Conch. t.* 825. *f.* 45.
ι) *Liſt. Conch. t.* 827. *f.* 49. b.
Habitat numeroſa coloris, picturæ, magnitudinis varietate in mari mediterraneo, æthiopico, americano, *ſtriis teſtæ nullis a ruſtica diſcernenda, teſta nunc unicolore rubra vel flava, nunc alba fuſco, ſpadiceo, luteove maculata, ſtriata, nebuloſa.*

paupercula. 37. V. teſta integra læviuſcula baſi ſtriata: ſpira prominula, columella quadriplicata, labro obtuſato.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 35.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* L.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1386. 1387.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 217. *t.* 1. *f.* 11.
β) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* O.
γ) *Gualt. teſt. t.* 43. *f.* F ?
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 150. *f.* 1417. 1418.
Habitat rarior in mari mediterraneo & indico, *teſta ſolida ex ferrugineo nigra: lineis albis longitudinalibus.*

mendicaria. 38. V. teſta ſubſtriata: ſpira ſubgranulata, columella læ[vi] labro gibbo denticulato.
Liſt. Conch. t. 826. *f.* 47.
Pet. gaz. t. 11. *f.* 5.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 50.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* E.
Knorr Vergn. 4. *t.* 16. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 44. *f.* 460. 461.
Habitat in mari mediterraneo & indico, *teſta atra obſolete ſcabra, magnitudine ſeminis phaſeoli ventris anfra[ctu] tibus faſciis 3 flavis, ſpira linea unica adſcendente anfractibus ſubnodoſis.*

cancellata. 39. V. teſta integra plicata decuſſatim reticulata, columella triplicata ſubumbilicata productiuſcula.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 751. *n.* 473. Murex ſcabriuſculus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 16. Bivat.
Gualt. teſt. t. 48. *f.* B. C. D. E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. *f.* 7. 8.
Knorr Vergn. 4. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Oceano africano, *& ad* Senegaliam, *murici ſenticoſo affinis, ſed brevior, teſta ultra pollicem non nunquam longa, rugis longitudinalibus ſtrias tranſverſas elevatas acutas decuſſantibus ſcabra, alba: dorſo faſciis 2 ferrugineis, ſpira acuta, columella breviter caudata.*

elegans. 40. V. teſta lævi alba cæruleo faſciata: apertura flava: ſpira ſubobliterata, columella ſexdentata.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 11?
Bonann. muſ. Kircher. 3. *f.* 269.
Martin. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa.

Ovum. 41. V. teſta lævi vireſcenti-alba multifaſciata: labro la[te] flexo, columella quadriplicata.
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 5. & *t.* 27. *f.* 1.
Habitat - - - - eleganti affinis, at teſta majore ad 2½ pollices uſque longa.

Huic tertiæ volutarum tribui accenſendæ videntur, an diſtinctæ ſpecies? voluta a Liſtero *Conch. t.* 822. b. *f.* 41. b. *t.* 823. *f.* 42. *t.* 832. *f.* 56. *a* Bonanni *muſ. Kircher.* 3. *f.* 395. *depictæ: Quartæ autem volutæ a* Liſtero *Conch. t.* 577. *f.* 32. a. *t.* 814. *f.* 23. b. *t.* 821. *f.* 39. *t.* 828. *f.* 50. *a Seba muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 9. 10. 13. 14. 17-20. 25-32. 35-39. 42. 44. *delineatæ.*

marginata. 42. V. ſpira obſoleta, lateribus incraſſato-marginatis, columella quadriplicata. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. f. 5-6.*
Favann. Conch. t. 29. f. E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 150. *f.* 1421.
Habitat - - - teſta nivea lævi, rarius rubella, aut flava faſciiſque 3 obſcurioribus picta; apertura lanceolata.

nucea. 43. V. teſta ſubſtriata: ſpira prominula obtuſata lævi, columella quinqueplicata. *Gronov. zooph. t.* 18. *f.* 11.
Habitat - - - - teſta alba productiore tumidula obſolete longitudinaliter ſtriata, ſpiræ anfractibus 5.

Porcellana. 139. V. teſta ovata alba ſeriatim rufeſcente punctata: ſpira obtuſa baſi emarginata, columella quinqueplicata, labro gibbo denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 164. *t.* 150. *f.* 1419. 1420.
Habitat in Oceano indico.

Conus. 140. V. teſta conica alba: baſi ſulcis tranſverſis excavato-punctatis, anfractibus crenatis, columella ſexplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 163. *t.* 150. *f.* 1415. 1416.
Habitat - - -

**** Fuſiformes.

Tringa. 44. V. teſta integriuſcula oblonga lævi: ſpira prominente detrita, columella triplicata, labro introrſum ſubdentato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 27. Bigni.
Gualt. teſt. 43. *f.* B.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 220. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta nitida, luteo alboque nebuloſa vix pollicem longa, ſpiræ mucrone ſæpius detrito, columellæ plicis tenuiſſimis, labro exterius minime marginato, in medio vere introrſum gibbo, minus tamen quam in præcedentibus.*

Corniculа. 46. V. teſta ſubemarginata oblonga lævi cornea: ſpira longiuſcula, columella quadriplicata, labro æquali mutico.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* N?
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 2.
Einl. in Conch. 1. *p.* 221. *t.* 1. *f.* 13.
Habitat in mari mediterraneo & æthiopico, *tringæ affinis, at ſpira magis elongata, labro minime dentato aut incraſſato, teſta utplurimum lævi, rarius ſubtiliſſime*

tranſverſim ſtriata, atra, ex ochraceo rufeſcente, flavicante fuſca, maculis virgatis undatis varia, cornu pellucidata & pictura æmulante faſciis interdum 2 exalbidis.

Virgo. 47. V. teſta integra turrita plicata tranſverſeque ſtriata columella triplicata perforata.
Habitat - - - teſta pollicis longitudine ſulcis circiter exarata, baſi reticulata: ſpiræ anfractibus linea guinea diſtinctis 10 *biſaſciatis; faſcia inferiore alba ſuperiore lutea, cauda ſtrombi fere inſtar produ*
Spengler.

ſcabricula. 48. V. teſta emarginata ſtriata tranſverſim rugoſa, columella quadriplicata perforata, labro crenulato.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 740 *n.* 412. Buccinum ſcabriuſculum.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* T.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* D. H?
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1388. 1389. 1391?
Habitat frequens in India, *teſta aſpera alba: rugis fuſcis, rarius cinerea: rugis albis, ad* 2 *pollices longa.*

ruſſina. 49. V. teſta integriuſcula tranſverſim rugoſa: columella quadriplicata, labro crenulato.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* G?
Habitat in India, *ſcabriculæ ſimilis, at teſta anguſtior longiore, paſſim incarnato-maculata, cauda aliquem bilico integra, labro recurvo tuberculis rotundatis crenulato.*

nubila. 143. V. teſta integriuſcula lævi luteſcente rubro nebuloſa tranſverſim ſtriata: labro crenulato, columella quadriplicata. *Martin. univ. Conchol.* 1. *t.* 23.
Habitat in Oceano auſtrali *ad* inſulas amicas.

Sanguiſuga. 50. V. teſta emarginata longitudinaliter ſulcata tranſverſe ſtriata: columella quadriplicata, labro lævi.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* V. Turricula granulata.
Liſt. Conch. t. 821. *f.* 38.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 5.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 78.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 11. 12. 15. 16.
Knorr Vergn. 4. *t.* 11. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1367. 1368. 1373. 1374.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 9. *f.* 35? Genot.
Habit

Habitat rarior in mari mediterraneo & indico, *teſta* 1½ *pollicem longa, in confluxu ſulcorum cum ſtriis nodu-loſa, ſulcis rubris aut faſciis tenuibus alternatim albis fuſciſque pictis : ſpira acuta : anfractibus faſcia utplu-rimum duplici ex punctis ſanguineis conflata exornatis.*

caffra. 51. V. teſta emarginata tereti lævi : ſpiræ anfractibus pli-cato-ſtriatis, columella ſubquadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 595. *n.* 234.*
Gualt. teſt. t. 53. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 21. 22. 41.
Knorr Vergn. 5. *t.* 19. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1369. 1370.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 74.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 19. *f.* 5.
Habitat rarior in mari aſiatico, *teſta* 2½ *pollices longa, acuta, atra, violacea, vel flava albido-faſciata, ob-ſoletius vel evidentius plicata.*

Morio. 52. V. teſta ſubemarginata tereti lævi, columella tripli-cata.
Habitat - - - caffræ ſimillima, at teſta duplo craſſiore, fuſca : ventre ſubtus linea alba unica cincto, ſpira non ſtriata, columellæ plicis tantum 3, *iiſque parvis diſ-tincta.* Spengler.

Acus. 53. V. teſta turrita punctorum rubrorum ſeriebus tranſ-verſis picta : ſpira acuminata lævi.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1493. 1494.
Habitat - - - - teſta vix pollicem longa alba, vel ex luteo fuſca.

Vulpecu-la. 54. V. teſta emarginata ſubangulata inermi tranſverſim ſtriata : columella quadriplicata, fauce ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 595. *n.* 235.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* R. Turricula.
Pet. gaz. t. 56. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* B. C.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 33. 34.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 2. & 5. *t.* 16. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1266.
β) Checkered Mitre. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 19.
Habitat in India, *teſta vix* 2 *pollices longa anguſta, elon-gata, coſtata, rufa vel flava : faſciis interdum obſcu-rioribus, labro fuſco maculato, columella alba : media macula fuſca.*

plicaria. 55. V. teſta emarginata angulata: angulis anterioribus ſub- ſpinoſis, columella quadriplicata, labro lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 596. *n.* 236.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* S. Turricula plicata.
Liſt. Conch. t. 820. *f.* 37.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 64. 65.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* D. E. F.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* Q.
Klein oſtrac. t. 5. *f.* 87.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 23. 24.
Knorr Vergn. 1. *t.* 15. *f.* 5. 6. 3. *t.* 27. *f.* 4. & 6. *t.* 12. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1362-1365.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 151. *f.* 1444. 1445.
Habitat in Oceano indico, *teſta ultra* 2 *pollices longa nunc craſſiori nunc tenuiori, anguſta, elongata, acuminata, tranſverſim ſtriata, intus cærulea albo faſciata, aut albo faſciis alterius coloris picta, extrinſecus alba, faſciis ſtriiſque circularibus rubris, violaceis, cinereis aut viridibus picta, apice utroque rubro, cæruleo, aut cinereo.*

bullata. 129. V. teſta cylindrica glaberrima rufeſcente: cingulis ſub- lividis, ſpira obtuſa, columella infra quadriplicata, apertura effuſa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 159. *t.* 150. *f.* 1409. 1410.
Mart. Conch. 2. *t.* 42. *f.* 424. 425.
Liſt. Conch. t. 803. *f.* 11?
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 1. & *t.* 27. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 269.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 218. *ind. p.* 206.
Habitat in Oceano indico.

crenulata. 130. V. teſta cylindrica decuſſatim ſtriata impreſſo punctata alba luteſcente nebuloſa: labro anfractibuſque marginatis crenulatis noduloſis, columella octoplicata. *Chem. Conch.* 10. *p.* 162. *t.* 150. *f.* 1413. 1414.
Habitat in Oceano indico.

ſcutulata. 131. V. teſta turrita atra alba maculata tranſverſim ſtriata anfractu primo ſubventricoſo, columella quadriplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 168. *t.* 151. *f.* 1428. 1429.
Habitat in Oceano indico.

nigra. 132. V. teſta turrita emarginata nigricante: anfractibus planiuſculis, columella quadriplicata. *Chem. Conch.* 10. *p.* 168. *t.* 151. *f.* 1430. 1431.
Habitat ad Guineæ, Indiæ, Groenlandiæ *littora.*

ſubdiviſa. 133. V. teſta turrita emarginata longitudinaliter coſtata plicata ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1434-1437. *Habitat in* Oceano indico.

cruentata. 134. V. teſta turrita emarginata faſciata tranſverſim ſtriata: coſtis longitudinalibus nodoſis ſanguineo-maculatis, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 171. *t.* 151. *f.* 1438. 1439. *Habitat in* Oceano indico.

exaſperata. 135. V. teſta turrita emarginata granuloſa, decuſſatim ſtriata; longitudinaliter coſtata fuſceſcenti faſciata; columella quinqueplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 172. *t.* 151. *f.* 1440. 1441.

β) *Mart. univ. Conchol.* 1. *t.* 21.

Habitat in Oceano indico.

granoſa. 136. V. teſta turrita emarginata tranſverſim ſtriata longitudinaliter ſulcata, elevato punctata rubeſcente lineata apice baſique nigricante, columella triplicata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 173. *t.* 151. *f.* 1442. 1443. *Habitat in* Oceano indico.

caſta. 137. V. teſta turrita lævi brunnea albo faſciata: columella ſexplicata baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 174. *vign.* 20. *f.* C. D.

Martyn Conchol. 1. *f.* 20.

Habitat ad Amboinæ *littus ſeptentrionale.*

leucozonias. 56. V. teſta turrita ſpadicea: faſciis flexuoſis albis, columellæ plicis obſoletis.

Martin. Conch. 4. *t.* 148. *f.* 1371. 1372.

Walch Naturf. 4. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Habitat - - - teſta 2 pollices longa.

maculoſa. 57. V. teſta turrita alba: faſciis fuſcis reticulatis & maculatis.

Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1377.

Habitat - - - teſta pollicem circiter longa.

noduloſa. 58. V. teſta turrita fuſca cancellata: ſectionum angulis noduloſis albo obumbratis, columella quadriplicata.

Gualt. teſt. t. 52. *f.* F. G.

Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1385.

β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 149. *f.* 1390.

Habitat - - -

ſpadicea. 59. V. teſta turrita ſpadicea luteo nebuloſa maculataque: ſpiræ anfractibus octo longitudinaliter plicatis & tranſverſe ſtriatis, columella quinqueplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1392.
Habitat - - -

aurantia. 60. V. teſta turrita aurantia: ſpiræ anfractibus quatuor primis faſcia alba, labro denticulato, columella quadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1393. 1394.
Habitat - - -

decuſſata. 61. V. teſta flava turrita decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus undulatis, columella ſubquadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1395.
Habitat - - -

polygona. 62. V. teſta turrita punctata: anfractibus longitudinaliter coſtatis & tranſverſim ſubtiliter ſtriatis: primis tribus angulatis, labro ſulcato, columella ſubumbilicata ſubquinqueplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1401. 1402.
Habitat - - - *teſta valde elongata & anguſta alba fuſca nigroque obumbrata, ſpiræ anfractibus* 10.

acuminata. 63. V. teſta turrita cancellata: cauda brevi cancellata: columella quadriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1403. 1404.
Habitat Tranquebariæ, *teſta valde elongata lutea vel violacea: faſcia nonnunquam alba: apice ſpiræ valde acuto.*

biplicata. 64. V. teſta turrita lævi alba maculis flavis punctiſque nigris varia, labro acuto, columella biplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1375.
Habitat - - -

Turricula. 65. V. teſta turrita: columella biplicata, anfractibus turgidiuſculis faſcia punctorum nigrorum pictis; anfractu primo duplici.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1376.
Habitat - - - -

lineata. 66. V. teſta turrita: lineis perpendicularibus nigris faſciam albam decuſſantibus, columella ſubtriplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1378. 1379.
Habitat - - - - *minuta.*

discors. 67. V. teſta turrita infra fuſca albo-punctata ſupra alba maculis perpendicularibus virgatis undatis flavis varia.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1400.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 150. *f.* 1405.
Habitat - - - - - teſta minuta, ſubtus ventricoſa; β) magis acuminata, cana: ſtriis ferrugineis longitudinalibus.

ſtriata. 68. V. teſta turrita ſubtiliter tranſverſim ſtriata obſcura rubro punctata: faſciis duabus dilutioribus.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1406.
Habitat - - - - minuta.

ſulcata. 69. V. teſta turrita longitudinaliter ſulcata fuſca: faſcia tranſverſa alba noduloſa, columella quadridentata.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1407.
Habitat - - -

lævigata. 70. V. teſta turrita lævi fuſca: aperturæ limbo ſpiræque faſcia dilutioribus.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1408.
Habitat - - - teſta anguſta, parva.

ocellata. 71. V. teſta turrita ſpadicea: ocellis albis.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1409.
Habitat - - - - lævigata anguſtior, minuta.

naſuta. 72. V. teſta turrita rubra: punctis nigris ſeriatis, labro prominente, cauda reflexa.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1410.
Habitat - - -

marmorea. 73. V. teſta turrita albo fuſcoque varia, labro inflexo.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1411.
Habitat - - -

barbadenſis. 74. V. teſta turrita rufuſcente ſubtiliter tranſverſim ſtriata: apertura oblongo-ovali, ſpira obtuſata.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 33.
Habitat in Oceano americano, *teſta vix* 1½ *pollicem longa.*

clathrata. 75. V. teſta turrita cancellata: ſpira obtuſata, labro marginato, cauda reflexa.
Liſt. Conch. t. 819. *f.* 34.
Habitat in Oceano americano.

tricolor. 79. V. teſta turrita gibba flava: anfractibus ſingulis faſcia alba nigro teſſellata, columella triplicata.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 37.
Habitat - - - teſta caudata: ſpiræ apice obtuſo.

turrita. 77. V. teſta turrita brunnea lineis undulatis fuſcis variis plicis horizontalibus obſoletis ſubnodoſis, apertura ſtriata, columella triplicata.
Martin. Conch. 4. t. 141. f. 1317. 1318.
Liſt. Conch. t. 836. f. 62?
Habitat - - - cauda prominula.

ſyracuſana. 78. V. teſta turrrita lævi alba: maculis virgatis undulatis perpendicularibus ex nigro flavis.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 40.
Habitat in Syracuſano *littore, teſta anguſtiore & magis elongata, quam turritæ.*

nitens. 79. V. teſta turrita glaberrima ſpadicea intus alba, columella quadriplicata.
Bonann. recr. 3. f. 322.
muſ. Kirch. 3. f. 323.
Habitat - - - teſta pauliſper ventricoſa.

citrina. 80. V. teſta turrita citrina, faſciis rufis.
Valent. Abh. 2. t. 2. f. 12.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

mucronata. 81. V. teſta turrita dilute fuſca longitudinaliter ſtriata: ſpira perforata, columella perforata quadriplicata.
Gualt. teſt. t. 52. f. M.
Habitat - - -

rugoſa. 82. V. teſta turrita ſubventricoſa longitudinaliter rugoſa transverſim ſtriata exalbida piceo lineata.
Gualt. teſt. t. 54. f. A.
Habitat - - - ſpiræ apice acuto coſtato, labro marginato.

ſtrigoſa. 83. V. teſta turrita cinerea rubro ſtriata: ſpira glaberrima; anfractibus tumidiuſculis.
Argenv. Conch. t. 9. f. V.
Habitat - - -

fossilis. 84. V. teſta turrita glaberrima, columella quinqueplicata
Argenv. Conch. t. 29. f. 6. b.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta.

leucoſtic-ta. 85. V. teſta turrita tenui glabra fuſca: lineis punctorum alborum cincta.
Knorr Vergn. 2. t. 3. f. 7.
β) Knitted Mitre. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 22.
Habitat β) ad inſulas amicas.

Clathrus. 86. V. teſta turrita exalbida cancellata: anfractibus faſcia macularum flavarum.
Knorr Vergn. 3. t. 27. f. 3.
Habitat - - -

virgata. 87. V. teſta turrita tranſverſim coſtata, faſcia tranſverſa maculiſque longitudinalibus undatis fuſcis varia.
Knorr Vergn. 4. t. 11. f. 2.
Habitat - - - teſta craſſa 2 pollices longa: apertura alba, coſtis ſquamatis.

leucoſto-ma. 88. V. teſta turrita cancellata ſpadiceo alboque varia: maculis undatis fuſcis, apertura ochroleuca.
Knorr Vergn. 4. t. 11. f. 3.
Habitat - - -

variegata. 89. V. teſta turrita tranſverſim ſtriata flava: faſcia maculiſque fuſcis, pluribuſque minoribus albis.
Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 6.
Habitat - - -

filaris. 122. V. teſta emarginata ſubturrita tereti decuſſatim ſtriata ſuccincta filis rubris, columella triplicata. *Mant. 2. p.* 548.
Habitat - - - teſta pallida, fuſiformi longitudine extimi pollicis, fauce alba labiis ſimplicibus, anfractibus 3 quaſi filis rubris moniliformibus, infimo 12 cinctis.

Volva. 126. V. teſta cylindrica albida glabra: ſpira protenſa obtuſa baſi emarginata, apertura effuſa, columella quadriplicata.
Chemn. Conch. 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1389. 1390.
Habitat ad Guineæ *littus, ultra 2 pollices longa teſta.*

Ziervoye-lii. 127. V. teſta ovata badia longitudinaliter rugoſa, infra tranſverſim ſulcata: ſpira obtuſa ad ſuturam crenata, columella quadriplicata, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 156. *t.* 149. *f.* 1406.
Habitat - - -

Rhinoceros. 128. V. teſta ovata-trigona rugoſa, nodoſa tranſverſim ſulcata umbilicata: anfractibus muricato-nodoſis, columella triplicata, labro dentato, fauce ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 157. *t.* 150. *f.* 1407. 1408.
Habitat ad novæ Guineæ *littora.*

coſta. 90. V. teſta turrita alba: ſpira ſtriis ſubtiliſſimis tranſverſis coſtiſque rotundatis; anfractu primo faſciis tribus fuſcis, columella quadriplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 17.
Habitat - - - *cauda ſubreflexa: ſtriis ſex obliquis.*

ſpuria. 91. V. teſta ovata alba: ſpira fuſco maculata; anfractu primo faſciis ſex fuſcis, cauda emarginata, labro impreſſo, columella ſexplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 16.
Habitat - - - *anfractibus punctis nigris ſeriatis pictis.*

pertuſa. 92. V. teſta emarginata ſtriata punctis pertuſis, labro denticulato, columella quinqueplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 596. *n.* 237.*
Liſt. Conch. t. 822. *f.* 40.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 28. 47-49.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* H.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1361.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 4. *f.* 6.
γ) *Favann. Conch. t.* 31. *f.* D³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 151. *f.* 1432. 1433.
Habitat rarior in India, *teſta* 3 *pollices longa, anguſta fuſca ſtriis obſcurioribus longitudinalibus & elevatis tranſverſis, quibus granula planiuſcula inſident.*

Cardinalis. 93. V. teſta emarginata tranſverſim ſtriata alba; maculis ſpadiceis utplurimum teſſellatis ſeriatis, columella quinqueplicata.
Liſt. Conch. t. 838. *f.* 65.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* G. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 50. 51. & *t.* 51. *f.* 6. 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 11. 12.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1358. 1359.
Habitat in Oceano indico, *pertuſæ affinis, at teſta magis ventricoſa & obtuſa.*

episcopalis. 94. V. teſta emarginata lævi: anfractuum margine integro, labro denticulato, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 237.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* K. Mitra epiſcopi.
Liſt. Conch. t. 839. *f.* 66.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 120.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* G. 1.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* C. Mitra.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 8-19.
Bytem. app. t. 11. *f.* 47.
Knorr delic. t. B. III. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1360. 1360[a].
Habitat in India, *inſtrumento venenato, ut perhibent; tangentem & carnes edentem lædens, teſla ab incolis inſulæ auſtralis* Tenna *manubrio firmata ſecuris loco adhibita, anguſta,* 5 *pollices longa, ſub epidermide ſordide ſlava alba maculiſque rubris, rarius flavis, utplurimum quadratis, interdum confluentibus varia; ſpiræ anfractibus* 2 *primis glabris, reliquis ſubtiliter tranſverſim ſtriatis.*

papalis. 95. V. teſta emarginata tranſverſim ſtriata: anfractuum margine labroque denticulatis, columella quatriplicata.
Liſt. Conch. t. 839. *f.* 67. Buccinum dentatum.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 119. Turbo Thiara.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* I. Mitra papalis.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* E. Thiara.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* I. 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 1-5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 1.
Regenſ Conch. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1353. 1354.
β) *Liſt. Conch. t.* 840. *f.* 68.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 45.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* I. 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 37.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1355. 1356.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 29. 30 ?
δ) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 145. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 8.
Habitat rarior in Oceano indico, *potiſſimum ad* Ceram ex moluccis inſulis, *epiſcopali æqualis & affinis, maculis*

ſæpius confluentibus, ſpiræ anfractibus exterioribus f-raminalis pertuſis.

patriarchalis. 138. V. teſta obovata ſolida tranſverſim ſtriata albida croceo & rufeſcente ſtriata, noduloſo plicata; columella quadriplicata, anfractibus tuberculis coronatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 166. *t.* 150. *f.* 1425. 1426.

β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 167. *t.* 150. *f.* 1427.

Habitat in Oceano indico.

muſica. 96. V. teſta marginata: anfractibus ſpinis obtuſis, columella octoplicata, labro lævi craſſiſſimo. *Muſ. Lud. Ulr.* ... *n.* 239.*

Argenv. Conch. t. 14. *f.* F. Papyrus muſica.
Liſt. Conch. t. 805. *f.* 14. & *t.* 806. *f.* 15.
Bonann. recr. 3. *f.* 296-298.
muſ. Kircher. 3. *f.* 297-299.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* x. Z. z.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 4. 7.
Lochner muſ. Beſler t. 21. *f.* 7.
Bytem. app. t. 8. *f.* 48.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 115. a. b. c. 117. a. b. c. d. 118. a. b. 119. b-f.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 7-21-22?
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 1. 2. *t.* 15. *f.* 4. *f.* 3. *t.* 12. *f.* 1. & 6. *t.* 23. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 17.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* G.
Martin. Conch. 3. *t.* 96. *f.* 926-933.

β) *Liſt. Conch. t.* 812. *f.* 21?
γ) *Liſt. Conch. t.* 812 *f.* 22.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1403. 1404.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1401. 1402.
Knorr Vergn. 3. *t.* 12. *f.* 1.

Habitat in Oceano americano, *teſta pluribus faſciis tranſverſis ex lineis fiſcis parallelis, interſtitis punctis guttisque conſtatis, notas muſicas quodammodo referentibus notata, exalbida, rarius olivacea (faſciis tunc & ſtriis punctiſque ſpadiceis varia,) nunc magis elongata & fuſiformi, nunc breviore magiſque ventricoſa, ſpinis nunc acutioribus & longioribus, nunc brevioribus & magis obtuſis, columellæ plicis interdum 9-12.*

Veſpertilio. 97. V. teſta emarginata : anfractibus ſpinis acutis, columella quadriplicata, labio lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 240.
Rondel. teſt. 78. Murex caracoides arabica.
Rumpf muſ. t. 32. *f.* H. Veſpertilio.
Liſt. Conch. t. 807. *f.* 16. & *t.* 808. *f.* 17.
Bonann. recr. 3. *f.* 294. 305.
muſ. Kircher. 3. *f.* 295. 306.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 1. & *t.* 7. *f.* 62.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* F. G. I. M. V.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 89.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 121. a. b. c. *f.* 122. a. b. c. & *f.* 123. a. b.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 4. 5. & *t.* 67.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 22. *f.* 3. & 2. *t.* 6. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 97. & 98. *f.* 936-940.
β) *Gualt. teſt. t.* 28. *f.* T?
γ) *Valent. Abh. t.* 7. *f.* 63?
Naturf. 19. *t.* 1. *f.* 3. 3a.
δ) *Spengl. ſelt. Conch. t.* 2. *f.* AA.
Martin. Conch. 3. *t.* 97. *f.* 934. 935.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 888. 889.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1397. 1398.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 149. *f.* 1399. 1400.
Habitat in mari indico, *teſta 3-6 pollices longa alba, vel luteſcente, vel ſubfulva lineis angularibus maculiſque ſpadiceis fuſciſve varia, nunc productiore, nunc magis ventricoſa, ſpinis nunc longioribus & acutioribus, nunc brevioribus & magis obtuſis.*

arabica. 144. V. teſta emarginata : anfractibus tuberculatis characteribus nigris pictis, columella quadriplicata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 52.
Habitat ad novam Seelandiam.

hebræa. 98. V. teſta emarginata : anfractibus ſpinis ſubacutis, columella plicis quinque validioribus tribuſque obſoletis.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* D. Lignum venoſum.
Liſt. Conch. t. 809. *f.* 18.
Bonann. recr. 3. *f.* 293.
muſ. Kircher. 3. *f.* 292.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* Z. 1.
Olear. muſ. t. 30. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 16. *f.* 115. c. 119. a.

Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 1. 2. 3. 6.
Knorr Vergn. 1. *t.* 24. *f.* 1. 2. & 6. *t.* 15. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 96. *f.* 924. 925.
Habitat ſat pretioſa in India *& ad* Jamaicam, *teſta ad 6 pollices longa, lineis ſpadiceis tranſverſis non raro longitudinales, interdum undulatas, decuſſantibus varia.*

Turbinellus. 99. V. teſta integriuſcula turbinata: ſpinis conicis erectiuſculis; ſuperioribus majoribus, columella quadriplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 634. *n.* 307.* Murex. Turbinellus.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* B. Verrucoſa ſecunda.
Liſt. Conch. t. 811. *f.* 20.
Bonann. recr. 3. *f.* 373.
muſ. Kircher. 3. *f.* 367.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 76. 77. & *t.* 60. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 12. *f.* 79. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 3. & *t.* 13. *f.* 2. 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 18.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 944.
Habitat paulo rarior in Oceano indico *ad* Amboinam & Nuſſaanam, *teſta brevi 3 circiter pollices longa alba, extrinſecus fuſco faſciata.*

Capitellum. 100. V. teſta ovata rugoſa nodoſa, columella triplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 633. *n.* 306.* Murex Capitellum.
Liſt. Conch. t. 810. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 270.
muſ. Kirch. 3. *f.* 272.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* K.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 6. & *t.* 35. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 947. 948.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 99. *f.* 949. 950.
Knorr Vergn. 6. *t.* 35. *f.* 4.
Habitat in Oceano indico & americano, *murici trunculo affinis, teſta craſſa,* $2\frac{3}{4}$ *pollices longa alba, interdum fuſco faſciata, decuſſatim coſtata.*

ceramica. 101. V. teſta ovata acuta: ſpinis divergentibus, columella ſubquinqueplicata.
Muſ. Lud. Ulr. 634. *n.* 286.* Murex ceramicus.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* A. & *t.* 49. *f.* L. Verrucoſa ceramica.
Liſt. Conch. t. 829. *f.* 51.

Bonann. recr. 3. *f.* 286.
muſ. Kirch. 3. *f.* 287.
Gualt. teſt. t. 55. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* E.
Leſſer teſtaceoth. f. 76.
Knorr Vergn. 2. *t.* 2. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 943.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2. & 6. *t.* 20. *f.* 6.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1383. 1384.
Habitat rarior ad Coromandel & *inſulam* Ceram, *turbinello affinis, teſta alba lineis maculiſque fuſcis varia, craſſa, ſpinis in anfractibus extimis in tubercula abeuntibus.*

Pyrum. 102. V. teſta obovata ſubcaudata: ſpiræ anfractibus ſtriatis; apice producto glaberrimo, columella triplicata.
Liſt. Conch. t. 815. *f.* 25.
Bonann. recr. & muſ. Kircher 3. *f.* 194.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* C.
Muſ. Gottwald. t. 33. *f.* 221. a. *f.* 222. b. & *t.* 34. *f.* 221. a.
Knorr Vergn. 6. *f.* 39. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 916. 917.
β) *Liſt. Conch. t.* 816. *f.* 26.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* 7?
Klein. oſtrac. t. 4. *f.* 79ª?
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 918. 919.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 884. 885.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 104. *f.* 886. 887.
Habitat ad Tranquebar & *inſulam* Zeylon, *teſta ultra 7 pollices longa, tranſverſim undulata, pallida, maculis minutis parallelogrammis ſeriatis varia, apice cylindrico, baſi angulato glaberrimo obtuſo, cauda exſerta patula integra.*

lapponica. 103. V. teſta obovata lævi: ſpira acuminata, ventre dilatato.
Rumpf muſ. 3. *t.* 37. *f.* 3. Murex lapponicus.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* 25. 26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 11. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 872. 873. & *t.* 95. *f.* 920. 921.
β) *Rumpf muſ. t.* 37. *f.* 4.
γ) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 395.
Habitat rarior in Oceano indico & americano, *teſta ochroleuca fuſco-punctata aut lineata, rarius undulata, columella quinqueplicata.*

Vexillum. 104. V. teſta ventricoſa flavicante aurantio ſtriata : anfrac-
tu primo reliquis triplo majore tuberculato.
Rumpf muſ. t. 37. f. 2.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* G.
Knorr Vergn. 5. *t.* 1. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* FF.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1098.
Favan. Conch. t. 33. *f.* O¹.
Kaemmer. Rudolſt. Cab. t. 8. *f.* 1. 6.
Chemn. Conch. 10. *vign.* 20. *f.* A. B.
Habitat rariſſima in Oceano indico.

flavicans. 105. V. teſta pyriformi lævi flavicante nebuloſa : ſpira ma-
culis ſpadiceis varia, columella quadriplicata.
Seb. muſ. 3. *t.* 67. *f.* a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 95. *f.* 922. 923.
Habitat rariſſima.

rupeſtris. 106. V. teſta elongata coſtata : coſtis lineas tranſverſas ſub-
tiles decuſſantibus, labro marginato, columella multi-
plicata, ſpiræ apice papillari.
Martin. Conch. 3. *t.* 98. *f.* 941. 942.
*Habitat - - - teſta ad 4 fere pollices longa, flaveſcente
ſubfuſco undulata.*

Naſſa. 107. V. teſta ventricoſa : ſpira coſtata ; coſtis ſtrias tranſver-
ſas ſubtiles decuſſantibus, labro marginato, columella
triplicata umbilicata.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 42.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. 125. *f.* 1172. 1173.
Habitat ad inſulam S. Mauritii & Guineam, *teſta ultra
pollicem longa ſubfuſca : lineis teneris albis.*

craticula-ta. 108. V. teſta turrita tranſverſim ſtriata alba : coſtis longi-
tudinalibus ſpadiceis, labro denticulato ſtriato, colu-
mella triplicata.
Liſt. Conch. t. 919. *f.* 13. & *t.* 967. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 55. 56. & *t.* 51. *f.* 31. 32.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *f.* 1382. 383.
Habitat - - - teſta vix 3 pollices longa.

ſpiralis. 109. V. teſta longitudinaliter coſtata tranſverſim ſubtiliter
ſtriata : anfractibus duobus primis ſerie tuberculorum
acutorum, columella triplicata.

Rumpf amb. t. 29. *f.* X. Buccinum ſpirale.
Habitat in mari indico, *teſta cinerea, fuſca aut alba, phalangis digiti longitudine, baſi anguſta, emarginata, ſubreflexa.*

magellanica. 110. V. teſta ſubventricoſa ochracea lineis albis, fuſciſque varia, labro ſubulato: ſpiræ anfractibus convexis; primo reliquis triplo majore.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 28. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1383. 1384.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat rarior in freto magellanico, *teſta* 4½ *pollices longa: ſpiræ anfractibus* 6-7; *in* β) *teſta* 2 *pollices longa magis elongata, in mucronem acutum terminata, ſpiræ anfractu primo obſcurius undulato.*

filoſa. 111. V. teſta tenuiſſime reticulato ſtriata: cingulis elevatis tranſverſis, columella quadriplicata, labro crenato. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 9. 10.
Habitat rarior - - - teſta alba: cingulis 16 *ſpadiceis, quorum* 4 *in ſpira, columella umbilicata.*

fuſcata. 112. V. teſta rudi fuſca lævi: baſi tranſverſim ſtriata, ſpira obtuſata; anfractu primo ventricoſo faſciis quatuor anguſtis, reliquis faſcia lata alba, columella umbilicata triplicata.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 302. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat - - -

***** Ventricoſæ, *ſpiræ apice papillari.*

æthiopica. 113. V. teſta emarginata: ſpira coronata ſpinis fornicatis, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 598. *n.* 241.*
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *t.* 1. Latina.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* F. Corona æthiopica.
Liſt. Conch. t. 797. *f.* 4. & *t.* 801. *f.* 7. b.
Rumpf muſ. t. 31. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* H. I.
Leſſer teſtaceoth. f. 55.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 1. 2. 4. *t.* 65. *f.* 1. 2. 4. 10-12. & *t.* 66. *f.* 1-3. 6-10. 15.

* *An huic forſan tribui accenſendæ cochleæ ab* Argenville *zoomorph. t.* 3. *f.* G. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 53. *f.* e. a. Byterneiſter *appar. t.* 11. *f.* 41. a. b. & *in muſeo* Gottwaldtiano *t.* 8. *f.* 52. & 62. d. *t.* 16. *f.* 120. a. c. & *t.* 36. *f.* 239. *delineatæ?*

Muſ. Gottwald. t. 9. f. 64. a. & f. 61. b.
Knorr delic. t. B. VI. f. 2.
Vergn. 2. t. 4. f. 1.
Martin. Conch. 3. t. 73-76. f. 777-788.
β) *Liſt. Conch. t. 798. f. 5?*
γ) *Chemn. Conch. 10. t. 148. f. 1387. 1388.*
Habitat rarior in mari perſico, *ad inſulam* Aſiæ Key, *ſi* Caput Bonæ Spei, *teſta ad 7-8 pollices longa flav- cante maculata, interdum faſciata, nunc breviore ma- giſque ventricoſa, nunc magis elongata, ſpinis nu- longioribus, nunc brevioribus, nunc latioribus, nu- anguſtioribus, papilla nonnunquam detrita.*

Cymbium. 114. V. teſta emarginata: ſpiræ anfractibus canaliculato- marginatis, columella quadriplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 599. *n.* 242.
Column. purp. 29. *t.* 30. *f.* 3. Cochlea altera magna.
Adanſ. Seneg. t. 3. f. 1. Yet.
Liſt. Conch. t. 796. f. 3. & t. 800. f. 7.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 2.
Gualt. teſt. t. 29. f. B.
Argenv. Conch. t. 17. f. G.
Seb. muſ. 3. t. 65. f. 5. 6. 8. 9. & t. 66. f. 5.
Knorr delic. t. B. VI. f. 3.
Vergn. 2. t. 30. f. 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. f. N.
Martin. Conch. 3. t. 70. f. 762-765.
Habitat ad Africam, *in* mari hiſpanico *&* americano *rarior, teſta nunc breviore & latiore, nunc longiore anguſtiore, lævi, unicolore, nonnunquam maculis fuſcis, interdum undatis varia, labro calloſo.*

Olla. 115. V. teſta emarginata: ſpira lævigata, columella ſub- triplicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 599. *n.* 243.*
Aldrov. exſang. 560. Concha perſica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 3. *f.* 2. Philin.
Column. aq. t. 69. f. 4. 6.
Liſt. Conch. t. 794. f. 1.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 6.
Gualt. teſt. t. 29. f. A.
Argenv. zoomorph. t. 11. f. H.
Klein oſtr. t. 5. f. 97.
Leſſer teſtaceoth. 54.
Seb. muſ. 3. t. 66. f. 13. 14. 16. 18.

Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 68. & 68. a. b. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 766.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 245. *t.* 1. *f.* 14.
Habitat ad inſulas Philippinas, *in* mari americano, æthiopico, hiſpanico, *teſta ad 4 uſque pollices longa, flavicante aut ruſeſcente, rarius fuſco varia, latiore, quam in cymbio.*

ampla. 116. V. teſta elongata: apertura ampla, labro acuto, ſpiræ anfractibus occultis.
Martin. Conch. 2. *t.* 65. *f.* 722-724.
Habitat - - - teſta alba aut fuſca $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa.*

Neptuni. 117. V. teſta emarginata ſub epidermide fuſca rufeſcente: labro prominulo, columella quadriplicata.
Liſt. Conch. t. 802. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 27. *f.* AA.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 3. *t.* 65. *f.* 3. 7. & *t.* 66. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 767.
Habitat in ſinu perſico, *teſta ad 8 pollices longa & æque fere lata: ſpiræ anfractibus 4.*

Navicula. 118. V. teſta emarginata: labro prominulo, columella ſubquadriplicata.
Liſt. Conch. t. 795. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 10. 11. & *t.* 66. *f.* 11. 12. 17.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 71. *f.* 768-771.
Habitat - - - V. Neptuni ſatis affinis, at teſta minore vix ultra 2 pollices longa, nunc unicolore ochroleuca, rufeſcente aut ſpadicea, nunc maculata aut marmorata.

papillaris 119. V. teſta elongata: apicis papilla elongata.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 9.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 69.
Knorr Vergn. 5. *t.* 28, *f.* 7.
Habitat - - - papilla interdum obliqua.

indica. 120. V. teſta elongata flava: faſciis tribus macularum fuſcarum, columella quadriplicata.
Muſ. Gottwald. t. 10. *f.* 64.
Knorr Vergn. 5. *t.* 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 72. *f.* 772. 773.
Habitat in mari indico, *teſta anguſta: ſpiræ anfractibus 5.*

Scapha. 121. V. teſta rudi nebuloſa : lineis angularibus fuſcis, columella cæruleſcente quadriplicata, labro ſubalato.
Liſt. Conch. t. 799. f. 6.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* S.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 5. 6.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 94.
Leſſer teſtaceoth. f. 56.
Martin. Conch. 3. *t.* 72. *f.* 774-776.
Habitat pretioſa ad Caput Bonæ Spei, *teſta brevi, lata, alba, vel flavicante : apertura ampla, ſpiræ anfractibus* 6.

Cymbiola. 123. V. teſta ovata glabra ſubalbida : lineis longitudinalibus ſanguineis : anfractibus nodoſis, columella triplicata.
Chemn. Conch. 10. *t.* 148. *f.* 1385. 1386.
Habitat in Oceano indico, *teſta* 2 *pollices longa.*

Præputium. 124. V. teſta ſubovata teſtacea: maculis ex rufeſcente badiis, columella quadriplicata baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 143. *t.* 148. *f.* 1391. 1392.
Liſt. Conch. t. 798 *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 66. *f.* 11?
Habitat ad littus Coromandel.

Glans. 125. V. teſta cylindrica luteſcente, columella triplicata emarginata, apertura effuſa patente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 144. *t.* 148. *f.* 1393. 1394.
Seb. muſ. 3. *t.* 64. *f.* 9-11. & *t.* 66. *f.* 13. 14.
Habitat ad occidentale Africæ *littus.*

reticulata. 141. V. teſta alba lævi aureo reticulata emarginata, columella quadriplicata : ſpira conica; anfractu primo cylindrico ventricoſo. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 68. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. 2.
Habitat ad Javam, *teſta ultra* 2 *pollices longa.*

ſpectabilis. 142. V. teſta flavido-fuſceſcente fuſco ſtriata : columella triplicata. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 69. *t.* 7. *f.* 1.
Davil. catal. 1. *t.* 8. *f.* S.
Habitat in freto magellanico, *teſta* $5\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

323. BUCCINUM *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, gibboſa.

Apertura ovata, deſinens in canaliculum (ſ. retuſam lacunam) dextrum, cauda retuſum.

Labium interius explanatum.

a Ampullacea, *inflata*, *rotunda*, *tenuis*, *ſubdiaphana fragilia.*

Olearium. 1. B. teſta ſubrotunda cincta ſulcis obtuſis lineola elevata interſtinctis: apertura edentula.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 6. Minjac.
Liſt. Conch. t. 985. *f.* 44.
Pet. gaz. t. 99. *f.* 11.
Rumpf. muſ. t. 27. *f.* D.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* T.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 74.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 188. a. c. & 189. a. d.
Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 117. *f.* 1076. 1077.

Habitat in mari indico, *teſta vix ultra 4 pollices longa, fuſca aut ſubfuſca crebro maculis nebuliſque obſcurioribus varia, ſpiræ anfractibus* 5 *inflatis ſulco diſcretis.*

Galea. 2. B. teſta obovata cincta ſulcis anterius geminatis, apertura edentula.
Liſt. Conch. t. 898. *f.* 18.
Bonann. recr. 3. *f.* 183.
muſ. Kircher. 3. *f.* 179.
Gualt. teſt. t. 42. *f.* AA.
Martin. Conch. 3. *t.* 116. *f.* 1070.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 308. *t.* 2. *f.* 1.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 26.
muſ. Kirch. 3. *f.* 25.

Habitat in mari mediterraneo & adriatico, *teſta ochroleuca caput humanum magnitudine interdum æquante, fere globoſa columella umbilicata.*

Perdix. 3. B. teſta ovata inflata ſubſulcata alboque undulata, aper-
tura edentula *Muſ. Ludi. Ulr.* 600. *n.* 244.*
Column. aq. t. 69. *f.* 5. Caſſida neritoides minor varie-
gata.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* C. Cochlea pennata.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* A. Perdix.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 5. Teſan.
Liſt. Conch. t. 984. *f.* 43.
Bonann. recr. 3. *f.* 191.
muſ. Kircher. 3. *f.* 189.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 12. 13. 16.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 117. *f.* 1078.-1080.
Habitat in mari indico, æthiopico, americano, *teſta ad
6 pollices longa lutea albo-pennata, undulata vel un-
data, coſtis complanatis, columella umbilicata, ſpira
anfractibus 5-6 prominentibus convexis, ſulco levi
parum interſtinctis.*

Pomum. 4. B. teſta ovata cincta ſulcis obtuſis, apertura dentata.
Muſ. Lud. Ulr. 600. *n.* 245.*
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 4. & *t.* 27. *f.* B. Cochlea ſtriata altera
Bonann. recr. & *muſ. Kircher.* 3. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *f.* 3. 4.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 184. C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 370. 371.
β) *Liſt. Conch. t.* 792. *f.* 45.
Habitat ad Javam Amboinam, Mexico, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices
circiter longa, craſſa, alba, flavo vel ruſeſcenti ma-
culata, ſpiræ anfractu primo coſtis* 12-14 *luteſcentibus
inæquali, apice ſummo nitido.*

Dolium. 5. B. teſta ovata cincta ſulcis obtuſis remotis: cauda pro-
minula. *Muſ. Lud. Ulr.* 601. *n.* 246.*
Rond. teſt. 106. Cochlea rugoſa.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* A. Cochlea ſtriata S. Olearia
Calceol. muſ. 30. *t.* 41.
Liſt. Conch. t. 899. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 16. 17. 25.
muſ. Kircher. 3. *f.* 16. 17. 28.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* E.

Argenv. Conch. t. 17. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 9-11. & *t.* 70. *f.* 1. 2. 5.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 185. b. & *f.* 188. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 4.
Martin. Conch. t. 3. *f.* 116-118. *f.* 1072-1075. 1082.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 70. *f.* 6?
Habitat in mari ſiculo, africano, indico, *galeæ ſatis æqualis, & perquam affinis, at teſta multo tenuiore, alba, interdum fuſco maculata, columella torta.*

caudatum. 6. B. teſta ovata cincta coſtis rotundatis: cauda prominula.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1083.
β?) *Liſt. Conch. t.* 940. *f.* 36.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 61.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 5.
Habitat - - - teſta fuſca umbilicata: apertura ampla, labro plicato intus dentato, ſpiræ anfractibus 6 brevibus inflatis, in b) teſta $1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, tenui, ſtraminea, in coſtis fuſceſcente, ſpiræ anfractibus tenuiſſime horizontaliter lineatis.*

niveum. 7. B. teſta nivea coſtata: ſpiræ anfractibus extremis vix prominulis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 36. *f.* 5.
Habitat - - - teſta vix dimidium pollicem alta lataque; an diſtincta hujus tribus?

clathratum. 8. B. teſta ovata longitudinaliter rugoſa tranſverſe plicata cauda brevi recurva. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 9. *f.* 17. 18.
Habitat - - - teſta dilute cinerea, ſectionum angulis nodulоſis, ſpira acuta prominula, labio crenato intus ſulcato; an hujus tribus?

b Caſſidea caudata, *cauda exſerta brevi reflexa, labro extrorſum inermi.*

echinophorum. 9. B. teſta cingulis quatuor tuberculoſis, cauda prominente.
Muſ. Lud. Ulr. 601. *n.* 247.
Liſt. Conch. t. 1003. *f.* 68.
Bonann. recr. et muſ. Kircher. 3. *f.* 18. 19.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* 3.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* P.

Argenv. zoomorph. t. 3. *f.* H.
Ginann. adr. 2. *t.* 5. *f.* 43.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 18.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 164. & *t.* 27. *f.* 186.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 407. 408.
β) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. e?
γ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 160.
muſ. Kircher. 3. *f.* 162.
δ) *Liſt. Conch. t.* 1011. *f.* 71. f?

Habitat frequens in mari adriatico, & mediterraneo, *teſta fuſceſcente intus tuberculiſque albis tranſverſim ſtriata, umbilicata, ſpira pyramidata, cauda elongata in altum flexa, labro nitido lævigato, cingulis nonnunquam ſ*

plicatum. 10. B. teſta anterius ſubplicata decuſſatim ſubſtriata. apertura dentata, cauda recurva.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* D? Caſſis.
Liſt. Conch. t. 1002. *f.* 67.
Bonann. recr. 3. *f.* 156.
muſ. Kircher. 3. *f.* 161.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 37. *f.* 379. 380.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 28. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 25. *f.* D⁴.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *n.* 1. 2.
Chemn. Conch. 10. *p.* 191. *t.* 153. *f.* 1459. 1460.
γ) *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.

Habitat paulo rarior ad Jamaicam, *teſta cinerea aut ru- feſcente ad ſpiræ baſin aliquando ſeriatim tuberculata, rarius ſtriis evidentibus longitudinalibus, aut cancellata.*

cornutum. 11. B. teſta turbinata ſcrobiculis punctata coronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249.
Rond. teſt. 2. 77. Murex triangularis.
Liſt. Conch. t. 1006. *f.* 70.
Bonann. recr. & *muſ. Kircher.* 3. *f.* 155.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* D.
Jeſſer teſtaceoth. f. 46.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 7. 8. 17. 18.
Muſ. Gottwald. t. 24. *f.* 159. aa. bb.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 33. *f.* 348. 349.

β) *Liſt. Conch. t.* 1008. *f.* 71. b.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* A.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 362.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1009. *f.* 71. c.
Habitat in India, *teſta ad* 9, β) 12 *pollices longa, alba, maculis ruſeſcentibus aut ſpadiceis, interdum undatis.*

ufum. 12. B. teſta decuſſatim ſtriata: cingulis nodoſis interſtinctis linea gemina, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 603. *n.* 250.*
Rumpf muſ. t. 23. *f.* B. Caſſida rubra.
Barrel. rar. t. 1325. *f.* 29.
Bonann. recr. 3. *f.* 328. 329.
muſ. Kircher. 3. *f.* 326. 327.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 3. 4. 9.
Knorr Vergn. 2. *t.* 9. *f.* 2? & 4. *t.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 69.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 341. & *t.* 33. *f.* 346. 347.
Habitat rarior in mari americano & indico, *teſta fuſca ruſeſcente alboque varia, apertura coccinea: dentibus longis albis: ſulcis intermediis nigris.*

tubero-ſum. 13. B. teſta cingulis duobus tuberculoſis, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 602. *n.* 249.*
Labat it. 5. *p.* 262.
Liſt. Conch. t. 1004. *f.* 69?
Bonann. recr. 3. *f.* 323.
muſ. Kirch. 3. *f.* 322.
Gualt. teſt. t. 41. *f.* A. A. A.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 5. 6. 10. 11. 14. 15.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 159. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 10. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 359. & *t.* 38. *f.* 381. 382.
Schroet. inner. Bau Conch. t. 4. *f.* 4.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 2?
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 18. *f.* 1.
Habitat in Oceano americano, *teſta ad* 10 *pollices longa, rubro aut fuſco maculata & undata, adulta ſubtriangulari, decuſſatim ſtriata: cingulis interdum* 3–4, *aperturæ dentibus albis: intermedio nigro.*

flamme-um. 14. B. teſta ſubplicata ſubcoronata: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 603. *n.* 251.*

Liſt. Conch. t. 1005. *f.* 72.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 156.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 2.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 99. 100.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 19. 20.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 160.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 353. 354.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* D.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 73. *f.* 16.
γ) *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 9. Buccinum ſpinoſum.
Habitat in Oceano americano, *teſta 5 fere pollices longa, alba, maculis fuſcis undatis varia: apertura maculis nigris notata; dentibus validis obtuſis, collumella transverſim albo coſtata.*

Teſticulus. 15. B. teſta obovata decuſſatim ſtriata lævigata: ſtriis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 252.*
Liſt. Conch. t. 1001. *f.* 66.
Bonann. recr. 3. *f.* 162.
muſ. Kirch. 3. *f.* 163.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* 3.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 59.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 17-21.
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 145-149.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 2. & 4. *t.* 6. *f.* 1.
Bytem. app. t. 11. *f.* 46.
Martin. Conch. 2. *t.* 37. *f.* 375-376.
β) *Martin. Conch.* 2. *t.* 37. *f.* 377. 378.
Habitat in mari indico & americano, *teſta ad 4 pollices longa alba, aut rufeſcente, uti plurimum flavo-maculata, labio interiore obliterato, exteriori ochroleuco fuſco maculato, collumellæ plicis dentibuſve albis.*

decuſſatum. 16. B. teſta decuſſatim ſtriata lævigata: ſquamulis quadratis, apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 604. *n.* 253.*
Rondel. teſt. 83. *f.* 1. Buccinum parvum.
Liſt. Conch. t. 1000. *f.* 65.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 157.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 154. b. c. *f.* 156. a. 157. a. b.

Knorr Vergn. 2. *t.* 10. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 360–361. 367. 368.
Habitat in mari mediterraneo & africano, *teſta alba, frequenter fuſco aut teſſellata aut undulata; labio exteriori rugoſo, valido, lato, interius crenato, interiore punctis eminentibus aſpero.*

Areola. 17. B. teſta ſubſtriata maculis quadratis quadrifariam cincta: apertura dentata, cauda recurva. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 254.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* B. C. 1. 2. 5. Areola.
Adanſ. ſeneg. 1. *t.* 7. *f.* 8. Saburon.
Liſt. Conch. t. 1012. *f.* 76.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 20. 21. 154?
Valent. Abh. t. 9. *f.* 77.
Klein. oſtr. t. 6. *f.* 102? 103.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* G. H. & *t.* 40. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *f.* 7–9.
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 150–152. b. & *t.* 23. *f.* 156. b. 157. c.*
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 344. 345. & *t.* 34. *f.* 350. 351. 352. 355.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 9. *f.* 7.
β) *Liſt. Conch. t.* 1056. *f.* 9.
Habitat in mari mediterraneo & indico, *teſta vix ultra 3 pollices longa, nunc lævi, nunc magis minuſve evidenter ſtriata: labio exteriori interiore margine dentato.*

tigrinum. 188. B. teſta ovata lævi cæruleſcente: faſciis tranſverſis luteis fuſco maculatis characteribuſque fuſcis intermediis. *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 8.
Habitat ad novam Seelandiam.

undulatum. 18. B. teſta rarius tranſverſim ſtriata undatim maculata: ſpira obtuſa labroque interiori glaberrimis.
Liſt. Conch. t. 996. *f.* 61.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 159.
Gualt. teſt. t. 39. B.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 68. *f.* 14. 15. 17.
Habitat – – – *Areolæ affine, at teſta magis producta.*

cicatricoſum. 19. B. teſta ovata ſcrobiculis punctata lævi: ſpira elongata, labiis dentatis, cauda recurva. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 1. 2.

Habitat in India, *areolæ affine, at teſta magis ovali, ſpi[ra] cancellata, labio exteriori dentato, interiori rugoſo.*

tеſſellatum. 20. B. teſta tenui cinerea: faſciis albis fuſco teſſellatis: anfractibus quinqueſariam tuberculatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 73. *f.* 1. 12. 13.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 369. & *t.* 37. *f.* 374.
Habitat rariſſimum in Oceano auſtrali, *teſta ultra 6 pol[-] lices longa.*

pennatum. 21. B. teſta alba: faſciis flaveſcente ſpadiceo alboque vari[is]: cauda recurva.
Rumpf muſ. t. 23. *f.* C.
Martin. Conch. 2. *t.* 36. *f.* 372. 373.
Habitat rarum in India.

maculoſum. 22. B. teſta faſciis quatuor maculoſis: anfractibus prominulis longitudinaliter coſtatis: primo corona tuberculorum.
Liſt. Conch. t. 997. *f.* 62.
Habitat - - - pennato affine, teſta $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

bilineatum. 23. B. teſta tranſverſim ſtriata: ſpiræ obtuſæ anfractibus faſcia maculoſa lineiſque duabus.
Liſt. Conch. t. 998. *f.* 63.
Habitat - - -

gibbum. 24. B. teſta rudi tranſverſim ſtriata undatim maculoſa: ſpira acuta pyramidali.
Liſt. Conch. t. 999. *f.* 64.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa.*

ventricoſum. 25. B. teſta ventricoſa ſtriata: labio tenui, cauda brevi.
Liſt. Conch. t. 1007. *f.* 71.
Habitat - - - an diſtincta ſpecies ?

ſtrigoſum. 26. B. teſta tranſverſim ſtriata: ſpira acuta; anfractu primo ſecundoque ſpinis coronato. labio exteriore intus ma[-] culato extrinſecus emarginato.
Liſt. Conch. t. 1011. *f.* 71. f.
Habitat - - -

rugoſum. 27. B. teſta lævi undulatim maculata: ſpira rugoſa ſtriataque, cauda quinqueplicata, labio exteriore valido recto.
Liſt. Conch. t. 1014. *f.* 78.
Habitat rarum - - - teſta 3 *fere pollices longa.*

ponderoſum. 28. B. teſta rudi: ſpira prominula acuta; anfractu primo tuberculis coronato, labio exteriori intus coſtato.
Liſt. Conch. t. 1016. *f.* 74.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

recurviroſtrum. 29. B. teſta lævi faſciis macularum rufarum notata: ſpira prominula; anfractu primo inflato.
Liſt. Conch. t. 1016. *f.* 75.
Habitat ad Barbados, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

trifaſciatum. 30. B. teſta tranſverſim ſtriata hinc inde maculoſa, faſciis tribus æqualibus notata: apertura intus cæruleſcente, labio exteriore dentato, interiore ſeriatim tuberculato.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 158.
Habitat - - - teſta 3 *pollices longa.*

ſenegalicum. 31. B. teſta ſubtiliter tranſverſim ſtriata: faſciis macularum tribus, ſpiræ anfractu ſecundo annulo turgido cincto, labio exteriore crenato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 111. *t.* 7. *f.* 7. Faſin.
Habitat ad Senegal.

ochroleucum. 32. B. teſta ochroleuca tranſverſim ſtriata: ſpiræ anfractu primo ſpinis coronato, labio exteriori dentato, interiori repando.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* 2.
Habitat - - - teſta ultra $2\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

ſtriatum. 33. B. teſta tranſverſe ſtriata: ſpira depreſſa; anfractu extimo margine ſubnodoſo, apertura dentata, cauda recurva. *Gronov. zooph. t.* 19. *f.* 18.
Habitat in America.

Caſſis. 178. B. teſta obovata umbilicata fulva tranſverſim denſe ſtriata: cauda recurva, labio membranaceo adnato, labro acuto. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 188. *t.* 152. *f.* 1456.
Habitat in mari mediterraneo Neapoli *vicino.*

ſtrigatum. 179. B. teſta ovata tranſverſim ſulcata albida rufeſcenti-faſciata varicoſa: ſpira conica decuſſatim ſtriata, apertura oblonga dentata, labio interiore plicato granulato, labro fimbriato maculato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 189. *t.* 153. *f.* 1457. 1458.
Favann. Conch. t. 24. *f.* D.
Mart. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 356.
Habitat in Oceano indico.

tyrrhe-num. 180. B. teſta globoſa flaveſcente ſulcata ſtriata: ſpira ...nica, apertura alba, labro marginato intus ſubdent...
Chemn. Conch. 10. *p.* 192. *t.* 153. *f.* 1461. 1462.
Bonann. recr. 3. *f.* 160.
muſ. Kirch. 3. *f.* 162.
Ginann. op. poſth. 2. *t.* 5. *f.* 44. & *t.* 6. *f.* 45.
Habitat in mari tyrrheno.

abbrevia-tum. 181. B. teſta ovata albida tranſverſim ſtriata ſulcataque: ſpira conica ſcalari, labro duplicato intus dentato, labro replicato rugoſo, cauda breviſſima. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 194. *t.* 153. *f.* 1463. 1464.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 153. *f.* 1465. 1466.
Habitat in Oceano indico, β) americano.

c Caſſidea unguiculata, *labro poſterius extror-ſum aculeato, ceterum ſimilia caudatis.*

Erina-ceus. 34. B. teſta ſubplicata papillis coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 605. *n.* 255.*
Liſt. Conch. t. 1015. *f.* 73.
Bonann. recr. & *muſ. Kirch.* 3. *f.* 153.
Rumpf muſ. t. 25. *f.* D. & 6. 7.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* D. I.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 8. 11-16. 29. 30.
Muſ. Gottwald. t. 23. *f.* 155. b. 156. a. 158. 161. b. c. 162. a. b. d. 163. a. b. c.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 363. & *t.* 38. *f.* 383-386.
β) *Liſt. Conch.* 2. *t.* 1013. *f.* 77?
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 21?
Habitat in mari americano & indico, *ad Alexandriam teſta ochroleuca, cæruleſcente aut alba, rarius undatim maculoſa, frequentius faſcia* 1-2 *tranſverſis, nunc obſoletis, nunc manifeſtis teſſellatis.*

glaucum. 35. B. teſta lævi papilliſque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 606. *n.* 256.*
Rumpf muſ. t. 25. *f.* A. & *f.* 4. Caſſis cinerea lævis.
Liſt. Conch. t. 996. *f.* 60.
Gualt. teſt. t. 40. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 11-16.
Muſ. Gottwald. t. 22. *f.* 153. & *t.* 23. *f.* 154. a.
Knorr Vergn. 3. *t.* 8. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 32. *f.* 342. 343.

Schroet. inner. Bau d. Conch. t. 3. *f* 4.

Habitat in mari indico, *teſta ad* 5 *pollices longa, cinerea: faſciis* 4-6 *obſcurioribus notata intus fuſca, rarius extrinſecus obſolete tranſverſim ſtriata: ſpira acuta pyramidali, anfractibus extimis cancellatis, labro exteriore dentato ſpinis ſubtus* 3-4 *armato, interiore infra rugoſo ſubpunctato, ſupra glaberrimo albo.*

Vibex. 36. B. teſta tota lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 606. *n.* 257.*

Rumpf muſ. t. 25. *f.* E. & 8. 9. Fimbriata lævis.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 31. *f.* 152.
Gualt. teſt. t. 39. *f.* F. L.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 3-7. 10. 17-20. 23. 31.
Muſ. Gottvald. t. 25. *f.* 166. a. b. 167. a. b. 168. a. b.
Knorr Vergn. 6. *t.* 11. *f.* 3.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 40.
Martin. Conch. 2. *t.* 35. *f.* 364. 366.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 9.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 26. 27.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 22.

Habitat ad Alexandriam, *in* mari americano & indico, *teſta maculis undatis ex fuſco luteis varia, columellæ plicis* 2, *nonne mera erinacei varietas?*

teſſulatum. 37. B. teſta ſubventricoſa: ſpiræ anfractibus baſi faſcia nigro teſſellata.

Liſt. Conch. t. 975. *f.* 30. b.
Martin. Conch. 2. *t.* 38. *f.* 387. 388.

Habitat - - - *teſta utplurimum maculis undatis aliiſque ſpadiceis varia.*

noduloſum. 38. B. teſta ſubplicata papillis coronata: labro lævi ſuperius maculato, poſterius bifariam acute ſpinoſo.

Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 383. *t.* 2. *f.* 9.

Habitat - - - *erinaceo affine, teſta pollicem circiter longa.*

Fimbria. 39. B. teſta ſulcata: ſpira acuta, anfractibus ſeriatim tuberculatis.

Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 1. 2.

Habitat - - - *teſta grandi ex cinereo flava: ſulcis albis.*

papilloſum. 40. B. teſta undique tuberculata. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 258.*

Rumpf muſ. t. 29. *f.* M. Buccinum granulatum rotundum.
Liſt. Conch. t. 969. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* G.

Argenv. Conch. t. 9. f. I.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 57-59.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1204. 1205.
Habitat rarius in mari indico, *teſta* 2½ *pollices fere longa flavicante: maculis ſpadiceis, tuberculis in ſeries digeſtis, labro ſpinis 6 armato.*

Glans. 41. B. teſta lævi: labio interiore bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 607. *n.* 259.*
Liſt. Conch. t. 981. *f.* 40.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 56. 57. 60.
Knorr Vergn. 3. *t.* 5. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1196-1200.
Habitat rarius in mari indico, *teſta lævi, ſubventricoſa, paulisper ultra 2 pollices longa alba: lineis obliquis flavis vel ex luteo fuſcis, maculis fuſcis, apice rubro.*

*d *Calloſa, *columellæ labio dilatato incraſſato.*

Arcularia. 42. B. teſta plicata papilliſque coronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 608. *n.* 260.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* M. Arcularia major.
Liſt. Conch. t. 970. *f.* 24. 25.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 175. 340.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* O. Q. R.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 28. 32-35. 37-41.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 178. d. *f.* 183. a. b. c.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 409-412.
Schroet. inn. Bau Conchyl. t. 5. *f.* 10.
β) *Rumpf muſ. t.* 27. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* n.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 44. 45.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 413.
γ) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 59.
δ) *Gronov. zoophyl. t.* 19. *f.* 7. 8. Buccinum faſciolatum.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 154. *f.* 1474.
Habitat in Oceano indico, *Malacis ornamento arcarum inſerviens, teſta nunc alba, nunc cinerea, nunc ſubfulva aut fuſca faſcia interdum alba, rarius rubeſcente faſciis alba, cancellata, labro coſtato.*

Pullus. 43. B. teſta gibba oblique ſtriata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 11 ? Totombo.
Liſt. Conch. t. 971. *f.* 26.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* N.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 328. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, *arcularia dimidio minor, teſta ferruginea decuſſatim ſtriata, faſcia una aut* 2 *albis tranſverſis, labio exteriori rotundato dentato, interiori nitido albo.*

Gibboſulum. 44. B. teſta gibba lævi.
Liſt. Conch. t. 972. *f.* 270. *t.* 973. *f.* 28.
Bonann. recr. 3. *f.* 383.
muſ. Kirck. 3. *f.* 369.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 178. c.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 46.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 414. 415.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 329. *f.* 3. a. b.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 4.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 5.
δ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 36. *f.* 5 ?
Habitat rarius in mari mediterraneo & indico, *teſta nivea, aut tincta maculatave.*

Mutabile. 45. B. teſta lævi, adultiore rugoſa: ſpira exſerta, labio interiore ſubexplanato.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* B.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta tenera, lævi, pallide alba, aut ex luteo fuſceſcente, faſciis interdum* 2 *obſoletis: ſpira exquiſita; anfractibus diſtinctiſſimis longitudine teſtæ margine ſuperiore obſolete albis rufiſque; adultiore longitudinaliter rugoſa cinerea opaca, labio interiori antrorſum extenſo craſſiuſculo.*

Neriteum. 46. B. teſta convexa obtuſa lævi: labio interiori obſoleto.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* C. I.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 3. 4.
Habitat rarius in mari mediterraneo, *teſta piſi magnitudine, neritæ facie, at apertura poſterius emarginata a neritis diſtincta, fere orbiculata, pallida, ſubtus planiuſcula, alba, gibboſa: ſutura ſuperiori ſecundum anfractus linea purpuraſcente vermiculari.*

e Detrita, *columellæ labio quaſi abraſo plano.*

Harpa. 47. B. teſta varicibus æqualibus longitudinalibus diſtinctis mucronatis : columella lævigata. *Muſ. Lud. Ulr.* 609. *n.* 261.*
Rumpf muſ. t. 32. *f.* K. L. M. Harpa.
Argenv. Conch. t. 17. *f.* D. Harpa nobilis.
Liſt. Conch. t. 992. 993. 994. *f.* 55-57.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 185.
Gualt. teſt. t. 29. *f.* C. D. E. G.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 105.
Leſſer teſtaceoth. f. 59.
Seb. muſ. 3. *t.* 70. *fig. innom. omn.*
Muſ. Gottwald. t. 15.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 3. & 2. *t.* 8. *f.* 2. & *t.* 19. *f.* 1. 2.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 14.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 14.
Martin. Conch. 3. *t.* 119. *f.* 1090-1092. 1094-1097.
β) *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 1. 2. Buccinum Geverſianum.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1451.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1453.
Habitat in mari indico, *teſta* 4-5 *pollices longa, ovata, nunc majore, nunc minore, ſubtus utplurimum badia aut fuſca, coſtis obliquis nunc latioribus, nunc anguſtioribus, utplurimum, nunc rarius, nunc confertim, ſtriis tranſverſis nigris notatis, aliquando maculatis; maculis nonnunquam teſſellatis, coſtarum interſtitiis creberrime albo, maculis pennatis picto; in β) teſta griſea undulatim maculata, intus ex purpura violacea.*

coſtatum. 48. B. teſta varicibus æqualibus longitudinalibus confertis mucronatis, columella lævigata.
Argenv. zoomorph. t. 11. *f.* F.
Martin. Conch. 3. *t.* 119. *f.* 1093.
Favann. Conch. t. 28. *f.* A*.
Chemn. Conch. 10. *t.* 152. *f.* 1452.
β) Fimbriata Buccinum. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 6.
Habitat rariſſimum - - - β) ad inſulas Falkund, *coſtis approximatis, rarius ſtriatis & maculatis ab harpa diſtinctum, an forſan mera ejus varietas?*

Perſicum. 46. B. teſta ſcabra : labro crenulato, columella plana. *Muſ. Lud. Ulr.* 609. *n.* 262.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* E. Cochlea patula. *Liſt.*
Argenv. t. 17. *f.* E. Concha perſica.

Liſt. Conch. t. 987. *f.* 46. 47.
Gualt. teſt. 51. *f.* H? L.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 10. 11.
Knorr Vergn. 3. *t.* 2. *f.* 5. & 4. *t.* 5. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 760.
β) *Valent. Abh. t.* 3. *f.* 20.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 72. *f.* 12–16.
Favann. Conch. t. 27. *f.* D³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1467. 1468.
Habitat in mari indico, ſinu perſico *rarius, teſta 4 fere pollices longa aut fuſca tranſverſim ſtriata alboque maculata vel ſilis albo fuſcoque maculatis cincta, aut faſciis ejuſmodi picta.*

Monodon. 50. B. teſta ſcabra, labro crenulato, columella plana ſpinam ſubulatam oblique exſerente.
Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 3. 4.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 761.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 7. *f.* 2.
Favann. Conch. t. 27. *f.* D¹.
Martyn Conch. 1. *t.* 10. 2. *f.* 50.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1469. 1470.
Habitat rarum in mari Americam *alluente, perſico affine; teſta griſea, intus alba.*

Patulum. 51. B. teſta muricata: labro extus crenato, columella falcata. *Muſ. Lud. Ulr.* 610. *n.* 263.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 3. Pakel.
Liſt. Conch. t. 989. *f.* 49.
Bonann. recr. 3. *f.* 368.
muſ. Kircher 3. *f.* 361.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* D. E.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 179. a.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 69. *f.* 757. 758.
Habitat rarius in mari æthiopico & americano, *murici neritoideo affine, teſta ad 4 uſque pollices longa, ſolida ſtriis tranſverſis nigris intermediiſque lineis albis varia, faſciis crebro 2 albis, ventris anfractibus cingulo triplici nodoſo acuto, & duplici inferiore magis obtuſo.*

Hæmaſtoma. 52. B. teſta ſubmuricata; labro intus ſtriato, columella planiuſcula, fauce fulva.

Liſt. Conch. t. 988. *f.* 48.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* A.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 80. a? b? e? f?
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 964. 964.
Habitat in mari mediterraneo & æthiopico, *teſta ad 2 pollices longa, ovata, rudi, tranſverſim ſtriata, fuſca vel cinerea interdum fuſco lineata, labro intus crenulato, ſpira obtuſa, anfractibus faſcia duplici nodoſa cinctis.*

Lapillus. 53. B. teſta ovata acuta ſtriata lævi: columella. *Fn. ſuec.* 2167. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 4.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 7. *f.* 4. Sadot.
Müll. zool. dan. prodr. 2944. *O. Fabr. Fn. groenl.* 393. Tritonium Lapillus.
Liſt. Conch. t. 965. *f.* 18. 19. & *t.* 975. *f.* 30. a? *anim. angl. t.* 3. *f.* 5. 6.
Act. pariſ. 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 5-7.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 4.
Stroem. ſondm. 183.
Beſch. berl. Naturf. 4. *n.* 13.
Ferber. n. Beytr. 2. *Mineralg.* 1. *p.* 449.
Martin. Conch. 3. *t.* 121 *f.* 1111. 1112. & 4. *t.* 122. *f.* 1124. 1125. 1128. 1129. 1136. 1137.
Habitat ad Oceani europæi *littora, teſta vix ultra 1½ pollicem longa alba, cinerea vel flavicante, interdum tranſverſim faſciata, nunc tenuiore: apertura edentula, nunc ſolidiore: apertura dentata; incolæ feminini ovaria ſucco glutinoſo albo flavo fuſcoque farta, qui lino aut linteo affricatus & ad ſolem ſiccatus nitido copioſo ſtabili colore purpureo comparet: Ova olim pro hydatidibus triticea habita.*

ſmaragdulus. 54. B. teſta ovata, acuta glaberrima, columella ſubplicata planiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 264.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* P. Smaragdus minor.
Habitat - - - teſta ſulcata matris perlarum tinctura nitente, & viridi quoque colore nitente.

Tuba. 55. B. teſta ſubfuſiformi ex fuſco lutea: ſpira cancellata: anfractu primo ſublævi reliquis triplo longiore.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 908.
Habitat rariſſimum in India, *teſta ſupra ſubventricoſa, infra anguſta.*

Pyrum. 56. B. teſta turbinata: apertura rubra, columella lævi, ſpira brevi; anfractu primo ventricoſo.

Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 909. 910.
β) *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2?
Habitat rariſſimum in India *&* mari rubro.

ſpadiceum. 57. B. teſta oblongo turbinata ſpadicea: lineis tranſverſis undulatis albis.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 911.
Habitat - - -

foſſile. 58. B. teſta convexa tranſverſim plicata: ſpira brevi, columella calloſa.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. *f.* 912-914.
Habitat - - - *hactenus modo foſſile & calcinatum ſat frequens prope* Oedenburg Hungariæ.

umbilicatum. 59. B. teſta oblonga turbinata plicata: ſpira nodoſa, apertura intus ſulcata, columella ſubumbilicata.
Martin. Conch. 3. *t.* 94. 915. 915. a.
Habitat - - -

candidum. 60. B. teſta oblonga turbinata ſolida lævi alba.
Martin. Conch. 3. *vign.* 31. 2. 3. *p.* 198.
Habitat - - -

ſcala. 61. B. teſta oblonga: apertura ovali emarginata quadridentata, baſi alba, ſpira acuta; anfractibus diſtantibus, primo coſtis quatuor glabris.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1089. a. b.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 360. *t.* 2. *f.* 8.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
γ) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 2.
Habitat - - - *teſta nunc alba, nunc fuſca.*

craſſum. 62. B. teſta ventricoſa rudi griſea glabra: apertura ovali, columella calloſa, baſi bicalloſa.

Cui tribui accenſendæ, ſi quidem diſtinctæ ſint hujus generis ſpecies ab Argenville *zoomorph. t.* 4. *f.* A. *a* Liſtero *Conch. t.* 37. *f.* 36. *t.* 560. *f.* 34. a. *t.* 792. *f.* 45. *t.* 827. *f.* 49. d. *t.* 897. *f.* 17. a. *t.* 912. *f.* 3. *t.* 924. *f.* 16. a. b. *t.* 962. *f.* 15. a. *t.* 964. *f.* 49. e. f. *t.* 965. b. *f.* 20. *t.* 968. *f.* 22. b. c. *t.* 976. *f.* 32. *t.* 983. *f.* 42. b. *& t.* 992. *f.* 54 *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 31. *t.* 60. *f.* 36. 50. *& t.* 39. *f.* 61. *ab* Argenvillio *Conch. t.* 10. *f.* I. *& zoomorph. t.* 4. *f.* E. *a* Gualtieri *teſt. t.* 44. *f.* H. I. D. P. *t.* 55. *f.* C. *& t.* 43. *f.* P. *a* Bonanni *Muſ. Kircher.* 3. *f.* 33. 63. 71. 398. 151. *& muſ.* Gottvvaldian. *t.* 26. *f.* 175. c. *& f.* 181. *delineatæ? an buccini ſpecies teſta a* Knorrio *Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 5. *delineata? a* Liſtero *anim. angl. t.* 3. *f.* 10.

Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1099. 1100.
Habitat - - - ſpira vix prominula : anfractibus 5.

margina-tum. 63. B. teſta globoſa glaberrima : apertura ovali utrinque marginata, labro dentato, columella ſubſtriata, ſpira vix prominula.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1101. 1102.
Habitat - - - hactenus modo foſſile repertum in Pedemontio, *teſta ſubfuſca, baſi ſtriis nonnullis obliquis exarata.*

Labyrin-thus. 64. B. teſta ponderoſa convexa glaberrima : anfractibus diſtantibus marginatis, apertura ampla ovali, columellæ plicis obliquis.
Seb. muſ. 3. *t.* 57. *f.* *t.*
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1103.
Habitat ad Scheveningen Hollandiæ, *teſta ex luteo ſubfuſca.*

ruſticum. 65. B. teſta rudi ovato-oblonga alba : ſtriis tranſverſis fuſcis, apertura ovali, cauda prominula, anfractuum primo ventricoſo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 25. Tafon.
Liſt. Conch. t. 831. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 54. *f.* 14-16.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 120. *f.* 1104. 1105.
Habitat in India & Africa, *ſtriis tranſverſis interdum fuſco lacteoque variis, in colorem cæruleum viridemque vergentibus.*

varium. 66. B. teſta ovata rudi flava : coſtis tranſverſis obſcurioribus elevatis noduloſis, apertura ovata edentula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1106.
Habitat - - -

filoſum. 67. B. teſta ovata albida, rubris filis cincta : ſpira prominula, apertura ovali, labro rubro ſtriato, columella ſubumbilicata.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1113. 1114.
Habitat - - -

coronatum. 68. B. teſta ovata ſtriata exalbida ſpadiceo obumbrata : faſcia media alba, maculis utrinque fuſcis ſtipata.
Martin. Conch. 3. *t.* 121. *f.* 1115. 1116.

β) *Liſt. Conch. t. 986. f. 45.*
Klein oſtr. t. 4. f. 75.
Habitat - - - teſta medio gibba.

ſqualidum. 69. B. teſta ſubgloboſa albida maculis porraceis luridiſque teſſellatis in ſeries digeſtis varia.
Bonann. recr. 3. f. 393.
muſ. Kirch. 3. f. 379.
Habitat - - - ſpiræ anfractibus 4.

craſſum. 185. B. teſta ſubcylindrica tranſverſim ſtriata ruſeſcente ſpadiceo faſciata labro denticulato. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p. 119. t. 7. f. 2. 3.*
Habitat ad Zeylon.

fornicatum. 186. B. teſta ſtriata fuſca albo maculata faſciataque: anfractibus canaliculatis quadrifariam noduloſis. *Kaemmerer Cab. Rudolſt. p. 120. n. 14. t. 9. f. 1.*
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

*. Lævigata (*nec præcedenti cuidam tribui inſerta.*)

ſpiratum. 70. B. teſta lævi: anfractibus canali plano diſtinctis, columella abrupta perforata. *Muſ. Lud. Ulr.* 611. *n.* 265.
Columm. purp. 15. t. 16. f. 2.
α) *Argenv. Conch. t. 17. f.* N. Contabulata.
Liſt. Conch. t. 983. f. c.
Bonann. recr. 3. f. 370.
muſ. Kircher. 3. f. 362.
Rumpf muſ. t. 49. f. D.
Gualt. teſt. t. 51. f. B.
Seb. muſ. 3. t. 73. f. 21. 22. 24? 25?
Knorr Vergn. 2. t. 6. f. 5. & 3. t. 3. f. 4.
Regenſ. Conch. 1. t. 10. f. 41.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1118.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. f. 3.
β) *Liſt. Conch. t. 981. f. 41.*
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. f. 70.
Rumpf muſ. t. 49. f. C.
Klein oſtr. t. 2. f. 46.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1120. 1121.
Habitat in India, β. (*rarius*) *in* Sina, *teſta 2 circiter pollices longa, β) paulo longiori, alba, maculis lineiſque ſpadiceis aliter aliterque varia, ſpiræ anfractibus 6-7: primo ventricoſo, apertura ovata emarginata ſupra*

in canalem terminata, umbilico profundo quaſi bipartito, baſi in α) cærulea.

pyrozonias. 71. B. teſta tranſverſim plicata & undulatim ſtriata: baſi ſpiraque prominulis; anfractibus ſingulis faſcia fulva, primo duplici.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1017.
Habitat - - -

læve. 72. B. teſta oblonga tenuiſſime ſtriata dilute fuſca obſcurius faſciata; apertura ovali in canalem deſinente, anfractu primo gibbo maximo.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1150.
Habitat in India, *ſpiræ anfractibus* 5-6.

ocellatum. 73. B. teſta lævi atra: guttis maculiſque albis ſeriatis, ſpira prominula; anfractu primo ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1160. 1161.
Habitat - - -

pyramidale. 74. B. teſta obtuſe pyramidali tranſverſim ſtriata alba, nebulis maculis virgatis aliiſque nigris & ſubfuſcis varia.
Liſt. Conch. t. 676. *f.* 31.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1170. 1171.
β) *Liſt. Conch. t.* 980. *f.* 39.
Habitat ad Tranquebar.

glaberrima. 75. B. teſta glaberrima minuta.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1177. 1180.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1178.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1179.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1181.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1182.
Habitat - - - β) *anfractibus* 2 *primis faſcia teſſulata cinctis,* γ) *anfractu primo ſerie macularum cincto,* δ) *teſta fuſco undulata,* ε) *maculata & punctata.*

ſtrigoſum. 76. B. teſta minuta tranſverſim ſtriata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1183.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1184.
γ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1185.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 125. *f.* 1186-1188.
Habitat - - - *teſtæ apertura in* β) *&* δ) *dentata, in hoc maculata.*

trifaſciatum. 77. B. teſta glabra: faſciis intus tribus latis rubris, ſpiræ anfractu primo ventricoſo.
Gualt. teſt. t. 44. f. A.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

leucozonias. 78. B. teſta glabra: faſcia alba lineiſque ſpadiceis varia.
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 37.
Habitat - - - teſta minuta.

cancellatum. 79. B. teſta glabra faſciis lineiſque decuſſantibus varia.
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 38.
Habitat - - - teſta minuta.

obtuſum. 80. B. teſta glabra ochroleuca: ſpiræ apice obtuſo cæruleo; anfractu primo ventricoſo.
Knorr Vergn. 5. t. 18. f. 3.
Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1193.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa.

glabratum. 81. B. teſta glaberrima: anfractibus obſoletis; infimo baſi ſubcanaliculato producto. *Muſ. Lud. Ulr. 611. n. 266.**
Liſt. Conch. t. 974. f. 29.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 149.
Gualt. teſt. t. 43. f. T.
Argenv. Conch. t. 9. f. G.
Knorr Vergn. 2. t. 16. f. 4. 5.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1117.
β) *Klein oſtr. t. 2. f. 47.* Dipſacus.
Liſt. Conch. t. 982. f. 42.
Martin. Conch. 4. t. 122. f. 1119.
Chemn. Beſch. berl. Naturf. 3. t. 8. f. B.
γ) *Martyn univ. Conch. 2. t. 48.*
Habitat in mari americano & africano *rarius, teſta* $3\frac{1}{2}$-4 *pollices longa nitida, aurantia albo intermiſto, β) alba ſpadiceo maculata apice rubella.*

ſtromboides. 82. B. teſta glabra: anfractibus diſtinctis, ventre retro labrum ſuperne ſolutum portato ad baſin oblique ſtriato.
Hermann Naturf. 16. p. 53. t. 2. f. 5. 6.
Habitat - - - ſtrombo gibberulo affine, teſta ex fuſceſcente lutea, ſpiræ anfractibus 5-6 convexis.

præroſum. 83. B. teſta ovata lævi atra: ſpira carioſa; columella glaberrima.
Liſt. Conch. t. 124. f. 24?
Chemn. Conch. 9. t. 120. f. 1035. 1036.

Habitat in Europa *magis auſtrali v. g. ad aquæductum* Sevillæ, *teſta fabæ fere magnitudine rudi; vertice quaſi præmorſo.*

auſtrale. 173. B. teſta oblonga lævi tenui faſciata: apertura ovali integra. *Chemn. Conch* 9. *t.* 120. *f.* 1033. 1034.
Favann. Cat. t. 1. *f.* 46.
Habitat in novæ Seelandiæ fluviis, *inter buccina, bullas, & helices quaſi media, teſta 3 pollices longa.*

Orbitas 183. B. teſta ovata craſſa albida tranſverſim coſtata ſulcataque: apertura ovali, labro intus plicato, labio plano. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 199. *t.* 154. *f.* 1471. 1472.
Martyn Conchol. 2. *f.* 45.
β) *Martyn Conchol.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 10. *t.* 154. *f.* 1473.
Habitat ad novæ Seelandiæ *littora.*

turgitum. 184. B. teſta obovata ſubumbilicata flaveſcente maculis ſanguineis ſeriatis notata: labro ſinuato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 201. *t.* 154. *f.* 1475. 1476.
Zorn n. danz. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 4.
Martyn Conch. 2. *f.* 49.
Habitat ad novæ Seelandiæ *littora.*

g Angulata (*neque prægreſſis tribubus adſcripta.*)

undoſum. 84. B. teſta ovata: ſtriis tranſverſis elevatis glabris, ventre obtuſe quinquangulari, labro intus ſtriato. *Muſ. Lud. Ulr.* 612. *n.* 268.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* O. Buccinum undoſum.
Liſt. Conch. t. 938. *f.* 33.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 26.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1126. 1127. *& t.* 123. *f.* 1146. 1146a.
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 399?
Habitat rarius in freto Malaccenſi, *teſta 2 circiter pollices longa flavicante; ſtriis fuſcis: angulis nonnunquam 7-8, cauda canaliculata reflexa.*

affine. 85. B. teſta ovata: ſtriis tranſverſis elevatis glabris, ventre cylindrico, labio intus ſtriato.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1135.
Habitat - - - an ſatis diſtinctum ab undoſo?

tranquebaricum. 86. B. teſta ovata: ſpira 12angulata tranſverſim ſtriata, apertura dentata, labro aurantio, columella perforata.
Muſ. Gottwald. t. 26. f. 175. 175. a. b.
Martin. Conch. 4. t. 123. 1147-1149.
Habitat ad Coromandel.

verſicolor. 87. B. teſta rudi ſordide fuſca tranſverſim ſtriata: ſtriarum interſtitiis bifariam nigro maculatis, ſpiræ anfractibus quatuor canaliculatis.
Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1145.
Habitat in India, *teſta brevi: apertura ampla oblonga in canalem brevem deſinente, teſta interdum tenuiore longiuſcula lineis angularibus picta.*

cruentatum. 88. B. teſta tranſverſim ſtriata: maculis rubellis parallelogrammis.
Martin. Conch. 4. t. 123. f. 1143. 1144.
Habitat - - - -

ſulcatum. 89. B. teſta ovata fuſca, maculis niveis varia; ſpiræ anfractibus ſulcatis, fauce ſtriata, labro crenulato.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. f. 5. 6.
Habitat - - - -

Rumphii. 90. B. teſta tenui ventricoſa anguſta: ſpira conico-depreſſa, anfractu primo & ſecundo ſpinis coronato.
Rumpf muſ. t. 25. f. 3.
Habitat - - - teſta 4 fere pollices longa.

Bezoar. 91. B. 91. teſta ſubrotunda rugoſa: anfractibus anterius lamellatis, columella perforata.
Argenv. Conch. t. 15. f. G.
Martin. Conch. 3. t. 68. f. 754-755.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. f. H.
Habitat in Sina, *teſta ſordide ochroleuca fuſco varia, intus flava, rudi, decuſſatim rugoſa vel ſtriata, cauda ſolida flexa rugoſa imbricatim ſquamoſa, ſpira angulata lateribus rectis, anterius planiuſcula plicata aut ſuperne dentata.*

glaciale. 92. B. teſta lævi ſubſtriata ovato-oblonga: anfractu infimo ſubcarinato. *Fn. ſuec.* 2162.*
Müll. zool. dan. prodr. 2942. O. Fabr. Fn. groenl. p. 397. n. 397. Tritonium glaciale.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 270. t. 3. f. 20. 21.

Chemn. Schr. berl. Naturf. 6. *t.* 6. *f.* 4. 5. *Conch.* 10. *t.* 152. *f.* 1446. 1447.

Habitat ad Oceani ſeptentrionalis *a* Groenlandia *ad extremam* Aſiam *littora, teſta ad* 2 *pollices longa craſſa lapidea lævi pallide rubicunda, intus alba polita, ſpiræ anfractibus* 7 *curvato multangulis.*

undatum. 93. B. teſta oblonga rudi tranſverſim ſtriata: anfractibus curvato-multangulis. *Fn. ſuec.* 2263.*

Müll. zool. dan. 2. *t.* 50. *prodr.* 2938. *rar.* 2. *p.* 28. *0.*

Fabr. Fn. groenl.] 394. Tritonium teſta oblonga tranſverſim ſtriata, anfractibus oblique carinatis.

Liſt. Conch. t. 962. *f.* 14.

anim. angl. t. 3. *f.* 2.

Bonann. recr. f. 189.

muſ. Kirch. 3. *f.* 191.

Petiv. gaz. p. 83.

Rumpf muſ. t. 29. *f.* H.

Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 76-80.

Knorr delic. t. B. VI. *f.* 6.

Vergn. 4. *t.* 19. *f.* 1.

v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 14. 15.

Martin. Conch. 4. *t.* 126. *f.* 1206-1211.

β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 399.

γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 81. 82.

δ) *v. Born muſ Caeſ. Vind. teſt. t.* 9. *f.* 15. 16. *ind. p.* 25

Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 892. 893.

Habitat in Oceano europæo, *potiſſimum* ſeptentrionali, mari *quoque* glaciali & indico, *teſta* 4½ *pollices lo-ra- ſcabra, minus ſpectabili cinerea vel ſubfuſca, ra- ſpadicea albo faſciata aut cærulea, tranſverſim & obli-que undulata, ſpiræ anfractibus* 8-9, *apertura lunata, operculo corneo extrinſecus ſtriis ſubtiliſſimis concentricis notato, tecta, incola nigro maculato albo ſubfuſco, tentaculis ſubulatis oculiſque binis, ſiphone canalem mentiente.*

ciliatum. 94. B. teſta turrita patulo ſubcaudata angulata longitudinaliter ciliata, columella ſubplicata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 401. *n.* 402.

Habitat rarius in maris Groenlandiam alluentis *profundioribus, undato affine, ſed magis amplum, teſta* 6 *ſe- lineas longa albida, intus glabra, epidermide ciliato-plicata munita, apertura ampla, ſpiræ anfractibus* 5 *minus convexis, mucrone glabro.*

Viridu-lum. 95. B. teſta oblonga lævi glabra acuminata tranſverſim minute ſtriata, longitudinaliter coſtata. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 402. n. 403.*

Habitat in maris Groenlandiam alluentis *profundioribus undato proximum, teſta 4 lineas longa tenera ſubdiaphana ex albo vireſcente, cauda brevi obtuſa vix reflexa, labio acuto, ſpiræ anfractibus 6-7 minus ventricoſis.*

Striatum. 96. B. teſta oblongo-conica tranſverſim ſtriata: anfractibus ſuperioribus oblique obtuſeque multangulis; inferioribus unicarinatis. *Phipps it. p. 197. t. 13. f. 2.*

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *ad portum* Smeerenberg.

Solutum. 97. B. teſta ovata: varicibus ventris longitudinalibus inæqualiter diſtantibus, labro canaliculo ſubſoluto. *Hermann Naturf. 16. p. 52. t. 2. f. 3. 4.*

Habitat - - - undato affine, teſta exalbida flavo miſta, ſpira obtuſa, anfractu primo ſecundo quintuplo latiori, 6 coſtis inæquali.

Tænia. 98. B. teſta oblonga glabra fuſca: anfractu primo faſcia flavicante media.

Knorr Vergn. 5. t. 10. f. 3.

Habitat - - -

Lineatum. 99. B. teſta cinerea: ſtriis longitudinalibus undulatis tranſverſiſque interruptis fuſcis, margine albo fuſco maculato, apertura alba.

Knorr Vergn. 3. t. 14. f. 4.

Habitat - - - undoſo affine, at teſta non multangula.

Maclo-vienſe. 100. B. teſta oblonga maculis undatis nebuliſque picta; ſpira brevi; anfractu primo gibbo, cauda anguſta ſubprominula.

Valent. Abh. t. 11. f. 97.

Habitat ad fanum S. Maclovii.

Foliorum. 101. B. teſta tenui: ſpira brevi acuta tenuiter coſtata: anfractu primo ſubgloboſo.

Rumpf muſ. t. 29. f. Y.

Habitat in India *ad arborum fruticumque maritimorum folia ramoſque, teſta pollicem circiter longa ex vireſcente cinerea atro punctata.*

Textum. 102. B. teſta ventricoſa cancellata: anfractibus diſtantibus.

Martin. Conch. 4. t. 125. f. 1201. 1202.

Habitat - - - teſta pollicem longa.

ſtrigoſum. 103. B. teſta oblonga longitudinaliter plicata tranſverſim ſtriata: ſtriis fuſcis albo nigroque ſtriatis.
Bonann. muſ. Kirch. & recr. 3. f. 38.
Chemn. Conch. 4. p. 49. vign. 38. f. a. b.
Habitat - - - teſta vix 2 pollices longa ſubventricoſa: apertura coſtata, columella ſubplicata; an ad muricem relegandum?

anglicum. 104. B. teſta oblonga: ſtriis tranſverſis elevatis, ſpiræ anfractibus ſex fuſcis.
Liſt. Conch. t. 663. f. 17.
Bytem. app. t. 11. f. 43.
Martin. Conch. 4. t. 126. f. 1212.
Habitat ad Angliæ *littora, teſta parum ventricoſa.*

porcatum. 105. B. teſta ventricoſa coſtata fuſca: anfractu primo alterum ſubtegente.
Knorr Vergn. 6. t. 33. f. 3?
Martin. Conch. 4. t. 126 f. 1213. 1214.
β) *Liſt. Conch. t. 963. f. 16.*
Habitat ad Angliæ *littora.*

læviſſimum. 106. B. teſta glaberrima alba: ſpiræ apice obtuſo cæruleſcente, anfractu primo ventricoſo reliquis duplo majore.
Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1215. 1216.
β) *Liſt. Conch. t. 978. f. 35.*
Habitat - - -

igneum. 107. B. teſta oblonga anguſta glabra flavicante: maculis undatis nebuliſque rubris, anfractibus extimis perpendiculariter ſtriatis.
Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1217.
Habitat - - - an muricis potius ſpecies?

plumatum. 108. B. teſta oblonga anguſta ſpadicea: cingulis obſcurioribus, fauce anguſta atra cæruleave; dentibus albis, labroque intus ſtriato.
Liſt. Conch. t. 822. b. f. 41.
Knorr Vergn. 4. t. 21. f. 6.
Martin. Conch. 4. t. 127. f. 1218-1220.
Habitat in inſulis americæ auſtrali *obverſis, ſpiræ apice acuto; an ad murices potius referendum?*

lyratum. 109. B. teſta oblonga anguſta horizontaliter coſtata: coſtis tranſverſim ſtriatis.

Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1221. 1222.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 34. ?
Habitat - - - *teſta ſubturrita, naſo ſubprominulo, columella lævi.*

thra-um. 110. B. teſta cana ovato-ventricoſa: rugis longitudinalibus plicas tranſverſas decuſſantibus, labro intus ſulcato.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 9. *f.* 17. 18.
Habitat - - - *ſpira acuta, cauda brevi recurva.*

ticula-um. 111. B. teſta ovato-oblonga tranſverſim ſtriata longitudinaliter rugoſa, apertura dentata.
Liſt. Conch. t. 966. *f.* 21.
Petiv. gaz. t. 64. *f.* 8. & *t.* 75. *f.* 4.
Act. Pariſ. 1710. *p.* 463. & 1711. *p.* 199. *t.* 6. *f.* 9.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 62.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* C.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 3. ?
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 9. *f.* 16.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1164.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 346. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat frequens in mari mediterraneo, anglico, æthiopico, *teſta omnibus fere coloribus variante, avellanæ magnitudine.*

veum. 112. B. teſta ovata cancellata alba: anfractu primo ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1122. 1123.
Habitat Tranquebariæ, *teſta ad pollicem uſque longa, cauda ſubprominula, ſpiræ anfractibus* 7.

ſcalare. 113. B. teſta flava faſciis dilute fuſcis: ſpira cancellata; anfractibus diſtantibus planis, primo ſubconvexo, apertura triangulari; labro dentato, columella plicata verrucoſa umbilicata.
Chemn. Conch. 4. *p.* 1. *vign.* 37. *f.* a. b. c.
Meuſch. muſ. Leenſ. f. b.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. *f.* 1130.
Habitat pretioſum - - - *teſta interdum rubella, ſpiræ anfractibus* 6, *umbilico infundibuliformi.*

icum. 114. B. teſta decuſſatim ſtriata fuſca intus alba.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1138. 1139.
Habitat in India.

noduloſum. 115. B. teſta alba fuſco varia tranſverſim ſtriata hinc in noduloſa.
Muſ. Gottwald. t. 26. f. 175. d. e?
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1140.
Habitat ad inſularum Americæ auſtrali *obverſarum litto*

piſcatorium. 116. B. teſta cancellata in ſectionis angulis noduloſa: apertura utrinque dentata acuta.
Liſt. Conch. t. 1024. *f.* 89.
Habitat in India, *an ad volutas referendum?*

S. Mauritii. 117. B. teſta alba intus flaveſcente: labro ſexdentato, anfractibus ſpinis; primo quadrifariam coronatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1153. 1154.
Habitat in inſula S. Mauritii.

armillatum. 118. B. teſta oblonga: apertura ampla edentula, anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie coronatis.
Liſt. Conch. t. 954. *f.* 5.
Knorr Vergn. 4. *t.* 26. *f.* 2.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 6. 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1155-1157.
Habitat - - - teſta tenui.

plicatulum. 119. B. teſta oblonga perpendiculariter plicata tranſverſimque ſtriata faſciis albis fuſciſque alternis varia intus violacea.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1158. 1159.
β) *Gualt. teſt. t.* 44. *f.* E?
Habitat in India.

vulgatum. 120. B. teſta ventricoſo-oblonga: ſtriis longitudinalibus plici-formibus tranſverſas ſubtiliores undulatas decuſſantibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 61. 62.
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1162. 1163.
β) *Gualt. teſt. t.* 44. *f.* V?
Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1165. 1166.
Habitat frequentiſſimum in mari mediterraneo, *ad An*gliæ inſularumque canarienſium & Azorum littora; *teſta mediæ magnitudinis, coloris varii, ſtriis albis cærulescentibus, ſubfuſcis & flavicantibus alternis.*

ſtolatum. 121. B. teſta faſciis diſcoloribus tranſverſim ſtriatis variis: ſpira horizontaliter coſtata; anfractus primi altera parte glaberrima.

Martin. Conch. 4. *t.* 124. *f.* 1167-1169.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 53. *f.* 43?
Habitat frequens ad Tranquebariæ *littora, teſta nunc fuſca vel rubella faſciis albis, nunc alba faſciis fuſcis vel rubellis, apertura intus dentata, columellæ plica ſimplici.*

122. B. teſta minuta alba cancellata: ſpira acuta.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1176.
Habitat - - -

123. B. teſta parva anguſta cancellata: apertura ampla crenata maculata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1189-1191.
Habitat - - -

124. B. teſta cancellata: coſtis perpendicularibus: interſtitiis lævibus planis, apertura ovata.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1192.
Habitat - - - teſta minuta, ſpira vix prominula.

125. B. teſta decuſſatim ſtriata in ſectionum angulis nodoſa ſubventricoſa lutea: anfractibus ſingulis faſcia cæruleſcente.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* M.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa.*

126. B. teſta gibba decuſſatim ſtriata in ſectionum angulis nodoſa: ſtriis tranſverſis undulatis, labro alato.
Gualt. teſt. t. 43. *f.* Z.
Habitat - - - teſta circiter pollicem longa.

127. B. teſta anguſta rugoſa: rugis albo tuberculatis & nigro punctatis.
Gualt. teſt. t. 44. *f.* F.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{4}$ *pollicis circiter longa.*

128. B. teſta ovato-oblonga nitida faſciata longitudinaliter ſtriato rugoſa: labro intus ſubdentato.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 60?
Gualt. teſt. t. 52. *f.* C.
Martin. Conch. 4. *t.* 125. *f.* 1194? 1195.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta colore faſciiſque varia, ſæpe cingulo nigro circumdata, columellæ labio minime replicato.*

129. B. teſta ovato oblonga nitida fuſco-ſtriata lævi: apertura edentula unilabiata.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* B.

Habitat in mari mediterraneo, *nitidulo affine, at aper-tura minime dentata, columellæ labio nullo: ſpiræ plicis nullis diſtincta, teſta pallida obſolete maculata ſtriis obſcurioribus.*

lamelloſum. 173. B. teſta ſubplicata tranſverſim coſtata ſulcata tuberculata lamelloſa brunneo alboque faſciata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 179. *vign.* 21. *f.* A. B.
Martyn Conchol. 2. *f.* 44.
Habitat in freto novæ Seelandiæ inſulis interjecto.

ſcutulatum. 174. B. teſta lævi brunnea venoſa; anfractibus planiuſculis cauda obtuſa. *Chemn. Conch.* 10. *vign.* 21. *f.* C. D.
Martin. Conchol. 2. *f.* 55.
Habitat ad novæ Seelandiæ *littora.*

Hauſtorium. 175. B. teſta ovata ventricoſa atra: ſpira brevi, columella depreſſa alba, ſauce alba, labro introrſum ſtriato crenulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 183. *t.* 152. *f.* 1449. 1450.
v. Zorn n. Danz. Abh. 1. *p.* 272. *n.* 95.
Martyn Conchol. 1. *f.* 9.
Habitat ad novæ Seelandiæ *littora.*

ventricoſum. 187. B. teſta ovato-oblonga fuſca albo ſtriata ſubplicata.
Martyn univ. Conch. 2. *t.* 47.
Habitat ad Sinum R. Georgii.

teſtudineum. 176. B. teſta ovata lævi maculis albicantibus fuſceſcentibusque alternis interrupte ſeriatis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 187. *t.* 152. *f.* 1454.
Zorn n. Danz. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat ad novæ Seelandiæ *littora.*

Catarrhacta. 177. B. teſta ovata ſcabra tranſverſim confertim ſulcata flammeo undulata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 188. *t.* 152. *f.* 1455.
Habitat ad novam Seelandiam.

tahitenſe. 182. B. teſta turrita tranſverſim coſtata ſulcataque: ſtria ad anfractuum ſuturam ſpirali noduloſa, apertura ovata, labro ſubplicato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 202. *t.* 154. *f.* 1477.
Habitat ad Tahiti *littora.*

lamellatum. 187. B. teſta imperforata lamellata alba intus purpurea: labio albo. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 134. *n.* 43. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.* *h* Tur-

h Turrita, *lævia ſubulata.*

maculatum. 130. B. teſta ſubfuſiformi: anfractibus lævibus indiviſis integerrimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 613. *n.* 269.*
Rumpf muſ. t. 30. *f.* A. Strombus 1.
Liſt. Conch. t. 846. *f.* 74.
Bonann. recr. 3. *f.* 317.
muſ. Kircher. 3. *f.* 313.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* I.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 4.
Knorr Vergn. 3. *t.* 23. *f.* 2. & 6. *t.* 19. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1440.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 23. *f.* 3?
γ) *Rumpf muſ. t.* 30. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 11.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1442.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 349. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat in Aſiæ Africæque *maribus frequens*, γ) *rarius in* Indiæ, *teſta* 8 *pollices longa flaveſcente albo faſciata ſeriatim ſpadiceo maculata, ſpiræ anfractibus* 14 & *pluribus lævibus, extimis modo tranſverſim ſtriatis; in* γ) *omnibus ſtriatis: ſtriis horizontalibus arcuatis.*

ſubulatum. 131. B. teſta ſubulata lævi indiviſa integerrima.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 5. Favat.
Liſt. Conch. t. 842. *f.* 70.
Bonann. recr. & *muſ. Kirch.* 3. *f.* 118.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* B.
Gualt. teſt. 56. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* X.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 16. 23. 24. 27. 28.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1441.
β) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 23. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1443.
γ) *Liſt. Conch. t.* 184. *f.* 69.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1446.
δ) *Martin. Conch.* 4. *t.* 154. *f.* 1447.
ε) *Liſt. Conch. t.* 845. *f.* 72. c.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 39.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. *f.* 9.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta* 5 *fere pollices longa pallida maculis ſubquadratis ferrugineis in ſingulis anfractibus per paria adſcendentibus, teſta minime gibba a maculato diſtinctum.*

renula- 132. B. ſpiræ anfractibus bifidis margine crenatis. Muſ-
tum. *Lud. Ulr.* 613. *n.* 270.*
Liſt. Conch. t. 846. *f.* 75.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 9. 10.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1445.
β) *v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 8. Buccinum candidum.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 35?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 36?
ε) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* Y?
Habitat in mari, Africam & Indiam *alluente, teſta ultra 5 pollices longa, ex carneo ſubfuſca ſæpius exalbida, anfractuum margine inferiori callo crenato cincto, crenu-rum fuſco ſtriatarum lateri nodulis ſubquadratis adjacen-tibus, ſingulis quoque punctorum fuſcorum ſerie du-plici primo triplici cinctis.*

hecticum. 133. B. ſpiræ anfractibus bifidis: margine ſuperiore com-preſſa attenuato.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* C.
Seb. muſ. t. 56. *f.* 21.
β) *Gualt. teſt. t.* 56. *f.* D.
Habitat in mari, Africam *alluente, teſta 4 pollices longa & longiori, alba, anfractibus ſingulis faſcia obſoleta luteo maculata cinctis.*

vittatum. 134. B. teſta ſubſtriata: ſutura anfractuum duplici crenulata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 2. Rafel.
Liſt. Conch. t. 977. *f.* 34.
Klein oſtrac. t. 7. *f.* 121.
Knorr Vergn. 6. *t.* 36. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1461-1463.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 8.
Einl. in Conch. 1. *p.* 352. *t* 2. *f.* 7.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Miran.
Liſt. Conch. t. 977. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1468. 1469. & *t.* 157. *f.* 1491.
γ) *Martin. Conch.* 4 *t.* 155. *f.* 1470.
δ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1471.
Habitat in mari Africam & Indiam *alluente, teſta ultra 3 pollices longa, nunc ex cæruleſcente cinerea: cinguli*

albis, nunc alba: anfractibus extremis rubellis, cinereis aut cæruleſcentibus, ovato-turrita, ſtriis tranſverſis remotis, apertura ampla: margine nitido albo.

ſtrigilatum. 135. B. ſpiræ anfractibus bifidis oblique ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 271.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* H. Strombus nonus granulatus,
Liſt. Conch. t. 845. *f.* 73.
Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 8. 9.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1456.
β) *Liſt. Conch. t.* 979. *f.* 36.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* R.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 10.
Chemn. Conch. 4. *p.* 235. *vign.* 40. *f.* 1.
γ) *Liſt. Conch. t.* 979. *f.* 37?
δ) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* S?
Habitat in mari Aſiam *auſtralem alluente, teſta ſtraminea aut fuſca,* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa, ſpiræ anfractibus* 16-20, *& ultra.*

duplicatum. 136. B. ſpiræ anfractibus bipartitis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 614. *n.* 272.*
Liſt. Conch. t. 837. *f.* 64.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 110.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* N.
Knorr Vergn. 6. *t.* 18. *f.* 6. *& t.* 24. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1455.
β) *v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 13? Buccinum pertuſum.
Habitat in India, *teſta ultra* 4 *pollices longa, fuſca, cingulis dilutioribus & anfractus primi faſcia anguſta alba, aut chalybea, aut rufeſcente, longitudinaliter ſtriata, anfractibus ſingulis cingulo lato plano bipartitis.*

lanceatum. 137. B. teſta lævi: anfractibus integris; lineis longitudinalibus teſtaceis.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* Z.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 134. *f.* 1450.
Habitat rarum in India, *teſta tenui pellucida ad apicem leviſſime ſtriata cana, ſpira acuta, cauda vix retuſa.*

dimidiatum. 138. B. ſpiræ anfractibus bifidis lævibus.
Liſt. Conch. t. 843. *f.* 71.

Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 107
Rumpf. muſ. t. 30. *f.* C.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 15. 19.
Knorr Vergn. 1. *t.* 23. *f.* 5. & 6. *t.* 18. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1444.
β) *Gualt. teſt. t.* 57. *f.* I?
γ) *v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 10. *f.* 7. Buccinum ferrugineum.
Habitat in mari Africam & Indiam *alluente, teſta ultra* 4 *pollices longa, lateritia maculis undatis faſciiſque albis.*

murinum. 139. B. ſpiræ anfractibus ſubangulatis: ſtriis tribus muricatis.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* P.
Habitat ad Africam, *teſta nigra baſi gibba, anfractibus ſæpe baſi albis.*

tigrinum. 140. B. teſta pellucida alba rufeſcenti-punctata: anfractibus ſingulis dorſo ſubemarginatis.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* A.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1448.
Habitat - - - teſta minuta.

Acus. 141. B. teſta acuta exalbida lineis undulatis horizontalibus, anfractibus bifidis crenulatis rugoſis, columella ſpiraliter torta.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1449.
Habitat - - - teſta 1½ *pollicem circiter longa.*

ſuccinctum. 142. B. teſta ſubulata horizontaliter ſtriata: anfractibus ſingulis cingulatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1451.
Habitat frequens in Oceano indico, *teſta alba vel ſtraminea.*

commaculatum. 143. B. teſta ſubulata lituris flavis & rufeſcentibus variis: anfractibus planiuſculis tranſverſim ſtriatis cingulo elevato cinctis.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1452.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 8. 9?
Habitat - - - teſta alba aut cana.

haſtatum. 144. B. teſta ſubventricoſa: anfractibus perpendiculariter ſtriatis; faſciis alternis fuſcis albiſque.
Martin. Conch. 4. *t.* 154. *f.* 1453. 1454.
Habitat - - - teſta vix 1½ *pollicem longa.*

aciculatum. 145. B. teſta alba: faſciis fuſcis punctorum excavatorum.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1457.
Habitat - - -

Phallus. 146. B. ſpiræ anfractibus longitudinaliter coſtatis baſi ſutura rugoſa, labro prominulo ſuperne emarginato.
Martin. Conch. 4. t. 155. f. 1464. 1465.
Schroet. Fluſconch. p. 401. n. 194.
Habitat in Indiæ, *an fluviis? teſta tenui ſub epidermide fuſca flavicante, ſubfuſca aut rufeſcente diaphana, coſtis albis, intus lævis; ſpiræ anfractibus 9, coſtis ſubincurvis.*

flumineum. 147. B. ſpiræ anfractus convexis diſtantibus tranſverſim ſtriatis: ſuperioribus horizontaliter coſtatis.
Liſt. Conch. t. 118. f. 13.
Martin. berl. Mag. 4. t. 10. f. 52.
Habitat in - - - aquis dulcibus, teſta 3½ pollices longa.

aſperum. 148. B. ſpiræ anfractibus coſtatis tranſverſim ſtriatis: primo gibbo, cauda prominula.
Liſt. Conch. t. 925. f. 17.
β) *Liſt. Conch. t. 925. f. 18.*
Habitat - - - teſta 1½ pollicem longa.

muricinum. 149. B. teſta reticulata rugoſa: ſpira incurvata, apertura crenata; columella rugoſa, labro incraſſato. *Gron. zooph. p. 308. n. 1381.*
Liſt. Conch. t. 926. f. 19.
Habitat - - - murici clathrato affine, an hujus tribus?

tuberculatum. 150. B. ſpiræ anfractibus ſingulis tuberculorum ſerie cinctis.
Liſt. Conch. t. 958. f. 11. b.
Habitat - - - teſta exili.

punctulatum. 151. B. teſta ſubulata punctata tranſverſim ſtriata; apertura obovata, ſpiræ anfractibus faſcia cinctis; primo ventricoſo.
Liſt. Conch. t. 979. f. 38.
Habitat - - - teſta vix pollicem longa.

Acicula. 152. B. teſta ſubulata lævi tenuiſſima ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata: ſpiræ anfractibus contiguis.
Liſt. Conch. t. 1055. f. 7.
Habitat in - - - aquis dulcibus, teſtæ apertura ovali.

faſciolatum. 153. B. teſtæ apertura ovato-oblonga : anfractibus ventricoſis diſtantibus horizontaliter ſtriatis : ſtriis elevatis faſcia intermedia ſejunctis.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 45.
Klein oſtr. t. 7. f. 123.
Habitat - - -

niveum. 154. B. teſta ſubulata lævi nivea bifaſciata : ſpiræ anfractibus contiguis.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 109.
Klein oſtr. t. 7. f. 117.
Habitat - - -

mucronatum. 155. B. teſta ſubventricoſa alba fuſco undulata : apertura ovali.
Bonann. muſ. Kirch. 3. f. 400.
Habitat - - - teſta ultra 3 pollices longa, ſpira anfractibus 5.

Digitellus. 156. B. teſta rudi apice obtuſa ſubincurva.
Rumpf muſ. t. 29. f. Q.
Habitat in India, *teſta $\frac{1}{2}$ pollicem longa, nunc granulata griſea & faſciata, nunc læviſſima nivea.*

obliquum. 157. B. ſpiræ anfractibus integris oblique decuſſatimque ſtriatis.
Rumpf muſ. t. 30. f. E. Strombus ſeptimus.
Habitat in India, *ſtrigilato affine, teſta digiti longitudine, calami craſſitie.*

chalybeum. 158. B. teſta ſubangulata ſulcata.
Rumpf muſ. t. 30. f. I. Strombus chalybeus.
Habitat in India, *teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis longa chalybea, aut albo nigroque punctata.*

fluviatile. 159. B. teſta tenui : anfractibus contiguis, cauda ſubemarginata.
Rumpf muſ. t. 30. f. P. Strombus fluviatilis.
Mart. berl. Mag. 4. t. 9. f. 39.
Habitat in Indiæ fluviorum oſtiis *limoſis, teſta opaca et cinereo viridi, 4-5 pollices longa, interdum nigro lineata.*

radiatum. 160. B. teſta ſubulata albida rufeſcenti-radiata : anfractibus convexis ſtriis granulatis cinctis ; primo ventricoſo ſecundo duplo majore.
Gualt. teſt. t. 52. f. D.
Habitat - - -

lividulum. 161. B. ſpiræ anfractibus longitudinaliter rugoſis tranſverſim granulato-ſtriatis: anfractu primo altero duplo majore.
Gualt. teſt. t. 56. f. F.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa.

edentulum. 162. B. anfractibus maculatis, apertura elongata edentula, columella plicata.
Argenv. Conch. t. 11. f. O.
Habitat - - -

Pugio. 163. B. teſta longitudinaliter ſtriata: faſciis punctatis maculatis inter anfractus intermediis.
Argenv. Conch. t. 11. f. Q.
Habitat - - - ſtrigilato affine.

canaliculatum. 164. B. teſta maculata: ſpiræ anfractibus canaliculatis.
Argenv. Conch. t. 11. f. T.
Habitat - - - ſpiræ anfractibus 17.

varicoſum. 165. B. ſpiræ anfractibus convexis coronatis bifariam, primo trifariam punctatis.
Seb. muſ. 3. t. 56. f. 17.
Habitat - - - teſta $3\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

cuſpidatum. 166. B. teſta ſubulata maculata: anfractibus convexis ſubremotis.
Seb. muſ. 3. t. 56. f. 20.
Habitat - - -

cinereum. 167. B. teſta ſubulata lævi cinerea obſolete faſciata: anfractibus indiviſis ad ſuturam longitudinaliter ſtriatis.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. f. 11. 12.
Habitat - - - teſta parum infra 2 pollices longa; ſpiræ anfractibus 14.

virginicum. 168. B. teſta ex vireſcente flava: faſciis duabus ſanguineis, ſpiræ anfractibus planiuſculis, apertura ampla ovali.
Liſt. Conch. t. 113. f. 7.
Martin. berl. Magaz. 4. p. 347. t. 10. f. 48.
Habitat in Virginiæ *fluviis.*

proximatum. 169. B. ſpiræ anfractibus bifidis inferiore ſubſtriato, ſuperiore filiformi. *Mant. 2. p. 550.*
Habitat - - - teſta ſubulata nitida.

Monile. 170. B. ſpiræ anfractibus bifidis: inferiore ſulcato, ſuperiore moniliformi. *Mant. 2. p. 550.*
Habitat - - - teſta ſubulata albida ſubflaveſcente.

cingulatum. 171. B. cingulis tribus elevatis ſupra infraque canaliculatis. *Manṫ. 2. p. 550.*
Habitat in Iſlandia, murici doliario affine, teſta ovata, cinerea, tranſverſim ſtriata, pruni minoris magnitudine: cingulis lævibus, ventris 3, ſpiræ 2, anfractibus ſupra planiuſculis, apertura obovata, columella planiuſcula.

geminum. 172. B. ſpiræ anfractibus bifidis: inferiore ſubſtriato, ſuperiore protuberantiore. *Mant. 2. p. 550.*
Habitat - - - teſta ſubulata alba.

324. STROMBUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, latere ampliata.

Apertura labro ſæpius dilatato, deſinens in canalem ſiniſtrum.

* Digitati, *labio in lacinias lineares exeunte.*

Fuſus. 1. Str. teſta turrita lævi: cauda ſubulata, labro dentato.
Muſ. Lud. Ulr. 638. *n.* 316. Murex Fuſus.
Liſt. Conch. t. 854. *f.* 12.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 1.
Knorr Vergn. 5. *t.* 6. *f.* 1. & *t.* 7. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1495. 1496.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* B.
Chemn. Naturf. 9. *t.* 6. *f.* 2.
Schroet. Journ. 5. *t.* 1. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 158. *f.* 1497.
γ) *Liſt. Conch. t.* 854. *f.* 11. & *t.* 916. *f.* 9.
Bonann. recr. & *muſ. Kircher.* 3. *f.* 121.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* D.
Klein. oſtr. t. 4. *f.* 77.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1500.
Chemn. Conch. 4. *p.* 344. *vign.* 41.
Habitat frequens in mari rubro, γ) *rariſſimus, teſta fuſca, lævi, ad baſin tranſverſim ſtriata, columella alba, cauda extrinſecus nigra, dubii generis, labro dentato*

cum ſtrombis conveniens, cauda magis recta recedens; a muricibus teſta lævi.

Pes pelecani. 2. Str. teſta labro tetradactylo palmato digitis angulato, fauce lævi. *Fn. ſuec.* 2164.* *Muſ. Lud. Ulr.* 615. *n.* 273.*
Liſt. Conch. t. 865. *f.* 20. *t.* 866. *f.* 21. b. & *t.* 1059. *f.* 3.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 85. 87.
Gualt. teſt. t. 53. *f.* A. B. C.
Argenv. Conch. t. 41. *f.* M.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 41. 42.
Leſſer teſtaceoth. f. 80.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 17.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 130. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 4.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 21.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 10. *t.* 87. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 85. *f.* 848-850.
Habitat frequens in Oceano europæo, norwegico, mediterraneo, americano, *teſta vix* 2 *pollices longa mucronata, exalbida, cinerea aut rufeſcente, intus alba lævi nitida, anfractibus trifariam, rarius biſariam tuberculatis.*

Chiragra. 3. Str. teſtæ labro hexadactylo: digitis curvis, cauda recurvata. *Muſ. Lud. Ulr.* 615. *n.* 274.*
Rumpf muſ. t. 35. *f.* A. Harpago.
Liſt. Conch. t. 870. *f.* 24.
Gualt. teſt. t. 35. *f.* B.
Leſſer teſtaceoth. f. 81.
Beſl. gazoph. t. 22. *f.* 2.
Lochn. muſ. Beſler t. 21. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 1. 6. 7. 9. 10. 12.
Muſ. Gottwald. t. 20. *f.* 141. b.
Knorr delic. t. B. 11. *f.* 1.
Vergn. 1. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. t. 86. *f.* 853. 854. & *t.* 87. *f.* 856. 857.

Strombi *junioris teſtæ carent labro, & turbinatam figuram referunt, perperam hinc ab autoribus ad diſtincta genera relatæ: Cui ſtromborum tribui adſcribendæ teſtæ a* Liſtero *Conch. t.* 848. *f.* 2-4. & *t.* 859. *f.* 15. *a* Bonanni *recr.* 3. *f.* 292. & *muſ. Kirch.* 3. *f.* 294. *a* Gualtieri *teſt. t.* 28. *f.* H. *t.* 31. *f.* L. & *t.* 32. *f.* C. *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 17. 18. *t.* 61. *f.* 26. 27. 40. 48. 49. 54. *t.* 62. *f.* 42. 43. *Knorr Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 4. & *minus adultæ a* Liſtero *t.* 890. *f.* 10. a. *a* Bonanni *recr.* 3. *f.* 291. & *muſ. Kirch.* 3. *f.* 293. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 22. 23. *t.* 62. *f.* 33. & *t.* 83. *f.* 8. 9. 11. *delineatæ?*

b) junior.
Liſt. Conch. t. 875. *f.* 31. & *t.* 883. *f.* 6.
Bonann. recr. 3. *f.* 314. 315.
muſ. Kircher. 3. *f.* 317.
Rumpf muſ. t. 35. *f.* B. C. & *t.* 37. *f.* 1. Harpago femina.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* B. & *t.* 35. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 34. *t.* 73. *f.* 29. & *t.* 83 *f.* 1.?
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 144. b.
Martin. Conch. t. 85. *f.* 851. 852. &. *t.* 92. *f.* 895-901.
Habitat pretioſus in Oceano indico, *teſta grandi, fuſca alba varia, dorſo tuberculis coronata, fauce ſanguinolenta, labio interiore ſubſtriata, labio ſubtus antrorſum rima diſtincto, inter digitos poſteriores ad caudam hiante, digitis una cum cauda* 6, *antrorſum incurvatis, longis, infimis duobus furcæ inſtar divergentibus, ſubtus ſutura coalitis.*

Scorpius. 4. Str. teſtæ labro heptadactylo: digitis nodoſis; poſteriore longiſſimo. *Muſ. Lud. Ulr.* 616. *n.* 275. *
Rumpf muſ. t. 36. *f.* K. Cornuta nodoſa.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* B. Scorpio.
Liſt. Conch. t. 867. *f.* 22.
Bonann. recr. 3. *f.* 312. 313.
muſ. Kirch. 3. *f.* 316.
Valent. Abh. t. 3. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 36. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 11. 15.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 144. a.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 1.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 29.
Martin. Conch. t. 88. *f.* 860.
Habitat rarior in Oceano indico, *teſta ad* 4 *pollices longa, craſſa, dorſo tranſverſim ſtriata & trifariam tuberculata, fauce violacea ſtriata, utrinque dentibus albis armata.*

Lambis. 5. Str. teſtæ labro heptadactylo: digitis rectiuſculis, fauce lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 617. *n.* 276. *
Rondel. teſt. 79. *f.* 71. Aporrhais.
Barrel. rar. 1326. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 35. *f.* F. H.
Gualt. teſt. t. 36. *f.* A. B.
Leſſer teſtaceoth. f. 82.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 8.
Muſ. Gottwald. t. 20. *f.* 141. a.

Martin. Conch. 3. *t.* 86. *f.* 855. & (a) *t.* 91. *f.* 888.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 1.
Chemn. Naturf. 9. *t.* 6. *f.* 1. (a).
β) *Rumpf muſ. t.* 35. *f.* E: Cornuta.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* E. Lambis.
Gualt. teſt. t. 35. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 2. 3. 5. 16. 17. 20.
Knorr Vergn. 1. *t.* 28. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 21. *f.* 139. a. *f.* 142.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 45.
Martin. Conch. 3. *t.* 87. *f.* 858. 859.
a) *Rumpf muſ. t.* 35. *f.* D.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 9. 10. & *t.* 83. *f.* 10.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 4.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 205. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 884. & *t.* 91. *f.* 889.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 4.
b) *Liſt. Conch. t.* 866. *f.* 21.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 82. *f.* 18. 19.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 128. b. *t.* 20. *f.* 140. *t.* 21. *f.* 139. b. & *f.* 143.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 92. *f.* 902. 903.
γ) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1508. 1509.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 469. *t.* 2. *f.* 15. & 2. *t.* 7. *f.* 4.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 205. *t.* 155. *f.* 1478.
Habitat in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta ſæpius grandi fuſca albo varia: fauce ruſeſcente, digitis non nodoſis.*

Millepeda. 6. Str. teſtæ labro decadactylo: digitis inflexis, fauce ſubſtriata, dorſo gibbere compreſſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 618. *n.* 277.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* I. Cornuta millepeda.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* B. Millepeda (b.)
Liſt. Conch. t. 868. *f.* 23. & *t.* 869. *f.* 23.
Bonann. recr. 3. *f.* 311.
muſ. Kirch. 3. *f.* 315.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 861. 862. & (a) *t.* 93. *f.* 906. 907.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 207. *t.* 155. *f.* 1479. 1480.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1494. 1495.
Habitat paulo rarior in mari Aſiam auſtralem *alluente.*

Clavus. 7. Str. teſta territa lævi: cauda ſubulata, labro ſimplici.
Mant. 2. *p.* 549.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* A.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1501. 1502.

** Lobati.

lentiginoſus. 8. Str. teſtæ labro anterius trilobo incraſſato, dorſo verrucoſo-coronato, cauda obtuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 619. *n.* 378.
Rondel. teſt. 91. Turbo auritus.
Rumpf muſ. t. 37. *f.* Q. Lentiginoſa.
Barrel. rar. 1326. *f.* 4. & 1327. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 861. *f.* 18.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 300.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 11. 30.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 128. b. †. c. †. d. †.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 2. & *t.* 26. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. 81. *f.* 825-828.
a) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 7.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 128. a. †.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 800-802. & *t.* 91. *f.* 892.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 17. 18.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1510. 1511.

Habitat in Aſia auſtrali & Africa, *teſta fuſca aut rufeſcente, ranæ inſtar varia,* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, ponderoſa, apertura glabra, rarius ex atro violacea, crebrius cum labro & columella matris perlarum inſtar nitente; operculum inter blattas byzantinas.*

faſciatus. 9. Str. teſtæ labro integro, dorſo trifariam verrucis coronato inter verrucas roſeo.
Liſt. Conch. t. 860. *f.* 17.
Bonann. recr. 3. *f.* 306.
muſ. Kircher. 3. *f.* 307.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 107.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 6-8.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 127.
Knorr Vergn. 3. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 82. *f.* 833. 834.
a) *Liſt. Conch. t.* 883. *f.* 5.
Knorr Vergn. 5. *t.* 16. *f.* 4.

Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 880. & *t.* 91. *f.* 893.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 155. *f.* 1483. 1484.
Habitat in Africa, *teſta tenuiore, duplo longiori, labro magis prominulo a lentiginoſo diſtinctus, teſta ceterum alba, anfractibus plurimis ſimplici verrucarum corona cinctis.*

...inus. 10. Str. teſtæ labro tenui rugoſo ſuperne repando, dorſo aurantio tranſverſim ſtriato verrucis coronato, apertura alba nitida.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 8.
Habitat - - -

...llus. 11. Str. teſtæ labro anterius mucronato longiſſimo, dorſo coronato, cauda recta. *Muſ. Lud. Ulr.* 619. *n.* 279.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* 5. Laphoon.
Liſt. Conch. t. 874. *f.* 30.
Bonann. recr. 3. *f.* 309. 310.
muſ. Kirch. 3. *f.* 310. 311.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 129. a.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 3.
Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 841. 842. & *t.* 85. *f.* 846.
β) *Liſt. Conch. t.* 871. *f.* 25.
Bonann. recr. 3. *f.* 307. 308.
muſ. Kirch. 3. *f.* 308. 309.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 91.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* F.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 108.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 4. 5. 9. 10. 12. 14. 15. 27.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 133. a.
Knorr Vergn. 3. *t.* 11. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 83. *f.* 836. 837.
a) *Liſt. Conch. t.* 891. *f.* 11.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 199. a. 201.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 35 – 37.
Knorr Vergn. 5. *t.* 9. *f.* 5.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 871. & *t.* 91. *f.* 891.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 6.
δ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 84. *f.* 843–845.
ε) *Liſt. Conch. t.* 873. *f.* 29.
Martin. Conch. 3. *t.* 85. *f.* 847.
a) *Argenv. Conch. t.* 14. *f.* K.

Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 890.
ζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 453. *t.* 11. *f.* 13.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 62. *f.* 3?
ϑ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 62. *f.* 2.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* A.
Chemn. Conch. 10. *t.* 158. *f.* 1506. 1507.
Habitat in mari Aſiam Americamque auſtralem *alluentis etiam rubro, teſta cum mucrone bipollicari 6 pollices longo, nunc unicolore fuſca, flava aut violacea, nunc maculis radiiſque varia lata, dorſo coſtis lævibus, nunc ſimplicibus, nunc duplicibus cincto, anfractu primo corona tuberculorum, in ſequentibus vix conſpicuorum.*

AurisDianæ. 12. Str. teſtæ labro mucronato, dorſo muricato, cauda ... acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 620. *n.* 280.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* R. Pugiles.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* O. Auris Dianæ.
Liſt. Conch. t. 872. *f.* 28.
Bonann. recr. 3. *f.* 301. 302.
muſ. Kircher. 3. *f.* 302. 303.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* D. H.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 106.
Leſſer teſtaceoth. t. 79.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 131. a-k. *f.* 132. *f.* 133. b. *f.* 135. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 3–6. & *t.* 62. *f.* 13.
Knorr Vergn. 2. *t.* 15. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 838. 839.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 9.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 1. 2. & *t.* 62. *f.* 16.
Martin. Conch. 3. *t.* 84. *f.* 840.
γ) *Liſt. Conch. t.* 871. *f.* 26.
δ) *Favann. Conch. t.* 21. *f.* A[2].
Martyn Conch. 1. *f.* 1.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1485. 1486.
ε) *Liſt. Conch. t.* 872. *f.* 27.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1487. 1488.
Habitat in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta vix ultra 3 pollices longa, craſſa, rarius unicolore, quam variegata, dorſo trifariam vel quadrifariam tuberculis acutis coronato, interſtitiis ſeriatum transverſim coſtatis, anfractibus extimis cancellatis, fauce incarnata, columella alba.*

Pugilis. 13. Str. teſtæ labro anteriori prominente rotundato lævi, ſpira ſpinoſa, cauda triloba obtuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 620. *n.* 281.*

Liſt. Conch. t. 864. *f.* 19.
Bonann. recr. 3. *f.* 229. 299.
muſ. Kircher. 3. *f.* 229. 301.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 15. A.
Muſ. Gottwald. t. 17. *f.* 125. 125. a. b. 126. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 9. *f.* 1. & 3. *t.* 16. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 81. *f.* 830. 831.
a) *Rumpf muſ. t.* 36. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 44. 50.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 202. a. b. c. 203. 204. a. b. 207. a.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 1. & 6. *t.* 29. *f.* 6. 7.
Mart. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 882. 883.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch* 10. *t.* 156. *f.* 1493.
Habitat in Oceano, Jamaicam & auſtralem Americam *alluente, teſta incarnata, rufeſcente aut ſubfuſca, intus ſpiraque dilutiore nitida, labro intus ſubdentato, dorſo lævi, ſpiræ anfractu primo ſpinis coronato, in ſequentibus ſenſim evanidis, anfractibus extimis cancellatis.*

...tus. 14. Str. teſtæ labro anteriori prominente rotundato lævi, ſpira inermi, cauda triloba obtuſa.
Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 894.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 454. *t.* 2. *f.* 14.
Habitat - - - *teſta fuſca: faſcia alba fuſco maculata, ſpira alba fuſco radiata & undulata, ventre & columella dilute badiis, cauda incarnata, fauce alba, labro intus fuſco cæruleo rubroque nitente, ad marginem incarnato, dorſo lævi ad baſin tuberculis ſubacutis coronato.*

marginatus. 15. Str. teſtæ labro prominulo, dorſo marginato lævi, cauda integra.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 816.
Schroet Einl. in Conch. 1. *p.* 431. *t.* 2. *f.* 10.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1489. 1490.
Habitat rarior - - - *teſta ex fuſco lutea: faſciis anguſtis albis filis fuſcis interruptis, anfractibus primis dilute ſubfuſcis extimis roſeis, labro columellaque niveis, intus dentatis, dorſo lævi, anfractibus* 4 *primis marginatis.*

Luhuanus. 16. Str. teſtæ labro prominulo, dorſo lævi, anfractibus rotundatis æqualibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 621. *n.* 282.*
Rumpf muſ. t. 37. *f.* S. Luhuana.

Liſt. Conch. t. 850. *f.* 5. & *t.* 851. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* H. I.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* N. (*deſcr.*)
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 11. 12. 20. & *t.* 62. *f.* 31. 3?
Knorr Vergn. 5. *t.* 16. *f.* 5. & 6. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 77. *f.* 789-791. 799.
a) *Liſt. Conch. t.* 849. *f.* 4. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 13. 14.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 191. a. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 865-869.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 2.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1499. 1500.
Habitat frequens in mari Aſiam auſtralem *alluente, te-*
alba crebro radiata aut tranſverſim faſciata, $2\frac{1}{2}$ *pollic-*
circiter longa, columella nigro-lineata, fauce rubr-
labro ruſeſcente.

gibberulus. 17. Str. teſtæ labro prominulo, dorſo lævi, anfractibus gibboſis inæqualibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 621. *n.* 28?
Rumpf muſ. t. 37. *f.* V. Canarium.
Liſt. Conch. t. 847. *f.* 1.
Bonann. recr. & *muſ. Kircher.* 3. *f.* 150.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 64.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* N. (*ic.*)
Seb. muſ. 3. *t.* 61 *f.* 17-19. 51-53. & *t.* 62. *f.* 48. 49.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 190. a. b. c. *f.* 195.
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 3. & 3. *t.* 13. *f.* 4.
Martin. Conch. t. 27. *f.* 792-798.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 3.
a) *Muſ. Gottwald. t.* 28. *f.* 190. d.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 21.
Martin. Conch. 3. *t.* 88. *f.* 863. 864.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alb-*
crebro faſciata, maculata, aut nebuloſa, labro intus
ſtriato & columella intus partim nunc cæruleis vel
cæruleſcentibus, nunc rubellis, vel rubris.

Oniſcus. 18. Str. teſta obovata cingulis nodoſis, mucrone ſubulato lævi.
Liſt. Conch. t. 791. *f.* 44.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 33.
Gualt. teſt. t. 22. *f.* I.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 179. b. 180.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 23.
Knorr Vergn. 4. *t.* 12. *f.* 4. & 6. *t.* 15. *f.* 4. *Mu-*

Martin. Conch. 2. *t.* 34. *f.* 357. 358.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 8.
Habitat in Oceano, Americam *auſtralem alluente, teſta vix ultra pollicem longa, avellanæ magnitudine, pallida maculis nigricantibus, nodis triſariam longitudinaliter diſpoſitis, cauda nulla baſique vix manifeſte emarginata, ſpira obtuſiſſima cingulo ſolitario noduloſo, apertura alba longitudinali, columella lævi, labro exteriore vix repando; an hujus generis?*

*** Ampliati.

Lucifer. 19. Str. teſtæ labro anterius rotundato integro, ventre dupliciter ſtriato, ſpira coronata: tuberculis ſuperioribus minutis.
Liſt. Conch. t. 887. *f.* 8. & *t.* 888. *f.* 9.
Bonann. recr. 3. *f.* 288. 303.
muſ. Kircher. 3. *f.* 289. 305.
Barrel. rar. t. 1327. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* M.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 54. *f.* M. & *t.* 55. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* I.
Klein. oſtr. t. 4. *f.* 85.
Leſſer teſtaceoth. f. 75.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 8? & *t.* 62. *f.* 38-40.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 199. b. 200. a. b. c. & *t.* 31. *f.* 215-217.
Knorr Vergn. 2. *t.* 29. *f.* 1. & 3. *t.* 5. *f.* 4. & *t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 90. *f.* 878. 879. 881. 885. 886.
β) *Valent. Abh. t.* 10. *f.* 90.
γ) *Gualt. teſt. t.* 48. *f.* F?
δ) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 86?
ε) *Liſt. Conch. t.* 886. *f.* 7?
ζ) *Gualt. teſt. t.* 54. *f.* M.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, teſta variegata, tenuiori, ſpiniſque longe minoribus armata, quam in Str. Gigante; nonne ætate minore ſolummodo ab hoc diverſus?*

Gigas. 20. Str. teſtæ labro rotundato maximo, coronata ventre ſpiraque ſpinis conicis patentibus.
Aldrov. exang. Rondel. piſc. 76. Murex marmoreus.
Geſn. aq. 340. Conchylium.
Lochn. muſ. Beſler. t. 20. Murex aculeata.
Columm, aq. t. 60. *f.* 5.

Bonann. recr. 3. *f.* 304. 321. 404. 405.
muſ. Kircher. 3. *f.* 304. 321. 385. 386.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* A. & *t.* 34.
Olear. muſ. t. 32. *f.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 18. *f.* 128. a.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. *f.* 824.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Oceano, Americam auſtralem *alluente, ad* 11 *pollices longa, 9 lata nitente alba, intus viride roſea, perquam ſolida.*

latiſſimus. 21. Str. teſtæ labro rotundato maximo, ventre inermi, ſpira ſubnodoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 622. *n.* 284.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* L. Alata lata.
Liſt. Conch. t. 856. *f.* 12. c. & *t.* 862. *f.* 18. a.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 1-3.
Martin. Conch. 3. *t.* 82. *f.* 832. & *t.* 83. *f.* 835.
a) *Seb. muſ.* 3. *t.* 83. *f.* 12-14.
Martin. Conch. 3. *t.* 89. *f.* 874.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 89. *f.* 875. 876.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta ſolida, ad* 14 *pollices longa, fuſco alboque varia, interdum radiata, labro intus albo, fauce roſea.*

Epidromis. 22. Str. teſtæ labro rotundato brevi, ventre lævi, ſpira ſubnodoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 622. *n.* 285.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* M. Epidromis.
Liſt. Conch. t. 853. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 21. 22. 26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 33. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 821.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 342.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* 3 ½ *pollices longa, nunc alba, nunc variegata, ſpira plicis nodoſis inæquali, extima-cancellata, labro ſemilunari intus columellaque niveis.*

minimus. 23. Str. teſtæ labro retuſo gibbo, ventre ſpiraque plicato nodoſis, apertura bilabiata lævi. *Mant.* 2. *p.* 549.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* P. Epidromis minima.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 46.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* L.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 439. *t.* 2. *f.* 11.
Chemn. Conch. 10. *t.* 156. *f.* 1491. 1492.

Habitat in India, *urceo affinis, ſed teſta minore vix* 1½ *pollicem longa, nunc teſtacea, nunc alba, faſciis ſuperne 2 flaveſcenti punctatis, inferne 2 ſpadiceis, radiiſque per anfractibus decurrentibus, labio utroque albido, fauce lævi flava nec ſtriata.*

Canarium. 24. Str. teſta ſubcordata: labro rotundato brevi retuſo ſpiraque lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 623. *n.* 287.*
Liſt. Conch. t. 853. *f.* 9.
Petiv. gazoph. t. 98. *f.* 11.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 146. 147.
Rumpf muſ. t. 36. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* Q.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 73.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 23-25. 28. 29.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 137. a. b. c.
Knorr Vergn. 1. *t.* 18. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 817. 818.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 16?
γ) *Knorr. Vergn.* 3. *t.* 13. *f.* 3?
δ) *Muſ. Gottwald. t.* 19. *f.* 135. b?
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta* 2½ *pollices circiter longa flava vel fuſca, lineis tranſverſis fuſcis angulatis interdum notata, valde gibba, columella nivea.*

dilatatus. 25. Str. teſtæ labro rotundato brevi, ventre lævi, ſpiræ elongatæ anfractibus ſutura elevata diſtinctis. *Muſ. Lud. Ulr.* 623. *n.* 287.*
Rumpf muſ. t. 36. *f.* O. Epidromis.
Liſt. Conch. t. 852. *f.* 8. *t.* 855. *f.* 12. a. b.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 62. *f.* 18-20.
Muſ. Gottwald. t. 19. *f.* 136. 138. & *t.* 28. *f.* 206.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 79. *f.* 815. 819. 820.
β) *Walch. & Knorr Petref.* 2. *t.* C. II. *f.* 1?
γ) *Favann. Conch. t.* 20. *f.* A8.
Chemn. Conch. 10. *t.* 155. *f.* 1481. 1482.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1496.
Habitat rarior in mari Aſiam auſtralem *alluente, teſta 4 circiter pollices longa, rarius unicolore, quam albida, faſciis fuſcis, aut fuſca faſciis albis maculatis, ſpira longiore, anfractibus magis diſtantibus & longitudinaliter plicatis ab epidromide diſtinctus.*

ſuccinctus. 26. Str. teſtæ labro rotundato retuſo, ventre lævi cingulis quatuor pallidis lineari-punctatis.
Liſt. Conch. t. 859. f. 16.
Rumpf muſ. t. 37. f. X.
Gualt. teſt. t. 33. f. B.
Argenv. Conch. t. 10. f. C.
Seb. muſ. 3. t. 61. f. 15.
Muſ. Gottwald. t. 19. f. 134. a. b.
Martin. Conch. 3. t. 79. f. 815. 816.
a) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 10. f. 14. 15.*
Martin. Conch. 3. t. 89. f. 877.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta lævi teſtacea: dorſo lævi ſubcarinato, cincto lineis bigeminis albo-punctatis, ſpiræ anfractibus ſtriatis: carinula crenata, labio exteriori intus ſtriato, interiori adnato lævi gibbo, anterius ſubſtriato.*

ſpinoſus. 27. Str. teſtæ labro attenuato integro ſubplicato coronato ſpinis argutis, ſpira aculeata.
Syſt. nat. XI. *p.* 715. *n.* 271. Conus ſpinoſus.
Gualt. teſt. t. 55. f. E?
Pet. gaz. t. 78. f. 11.
Argenv. Conch. t. 29. f. 10.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventus, ſtatura volutæ veſpertilionis, baſi tamen minime emarginata, nec columella ſemper plicata, teſta albida lineolis purpuraſcentibus parallelis numeroſis varia ſuperne angulata, & ſpinis accutiſſimis coronata.

Fiſſurella. 28. Str. teſtæ labro continuato in carinam fiſſam longitudinalem.
Argenv. Conch. t. 33. lin. 2. n. 6. Mitra.
Pet. gaz. t. 73. f. 7. 8.
Murray teſtaceol. t. 1. f. 30.
Martin. Conch. 4. t. 158. f. 1498. 1499.
Habitat in India, *frequentius foſſilis in* Campania Gallica, *teſta alba, magnitudine & ſtatura Turbinis Clathri, anfractibus coſtis carinatis, excepto maximo ſubtus lævi, apertura oblongiuſcula, labro exteriore parum dilatato, interiore adnato, cauda brevi recta.*

Urceus. 29. Str. teſtæ labro attenuato retuſo brevi ſtriato, ventre ſpiraque plicato-nodoſis, apertura bilabiata inermi.
Muſ. Lud. Ulr. 624. *n.* 288.*
Rumpf muſ. t. 37. f. T. Cauarium.

Petiv. gazoph. t. 98. *f.* 19.
Liſt. Conch. t. 857. *f.* 13.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 144.
Valent. Abh. t. 7. *f.* 65.
Gualt. teſt. t. 32. *f.* E? G.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 28. 29. *t.* 61. *f.* 24-30. 31. 57-59. 62-64. 66. 68. & *t.* 62. *f.* 41. 45. 46. 47?
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 193. 194. a. b. 196. a-d. 197. 198. a-e.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 803-806.
α) *Muſ. Gottwald. t.* 28. *f.* 194. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 80. *f.* 870.
β) *Rumpf muſ. t.* 37. *f.* W. *f.* 870.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 28. 29. 36. 37.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 32. 33.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 35.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 38. 39.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 50.
θ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 60. 61.
Habitat in Oceano indico *frequens ad* Amboinam & *inſulam* S. Mauritii, *teſta ad* 2½ *pollices longa, utplurimum minore, colore pictura mirifice varia.*

tridentatus. 30. Str. teſta tenui alba aurantio maculata & nebuloſa, dorſo, lævi plicato, cauda violacea, anfractibus canaliculatis, labro triacantho.
Liſt. Conch. t. 858. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 33. *f.* C. D.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 34.
Martin. Conch. 3. *t.* 78. *f.* 810-814.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 157. *f.* 1503.
Habitat rarior in mari indico, *urceo affinis.*

dentatus. 31. Str. teſtæ labro attenuato brevi dentato, ventre ſpiraque plicatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 61. *f.* 25. 41-47.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 12.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 55.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 65?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 61. *f.* 56?
Habitat – – – urceo affinis, at ſpiræ plicis obliquis & anfractibus longius diſtantibus aperturæque ſtriis evidentioribus diſtinctus, teſta ceterum 1½ *pollicem longa, nunc varia, nunc alba ad marginem ſubfuſco maculata, nunc lutea albo lineata, nunc tenui diaphana, nunc ſolida opaca.*

coſtatus. 32. Str. teſtæ labro craſſiſſimo, anfractu primo verrucis coronato: interſtitiis verrucarum plicatis, altero tranſverſim coſtato, reliquis tranſverſim ſtriatis.
Liſt. Conch. t. 863. *f.* 18. b.
Martin. Conch. 3. *t.* 81. *f.* 829.
a) *Muſ. Gottwald. t.* 17. *f.* 824.
Martin. Conch. 3. *t.* 91. *f.* 887.
Habitat - - - teſta craſſa $5\frac{1}{2}$ *pollices longa, 5 lata, ſæpius lutea, & inter verrucas roſea.*

Bryonia. 33. Str. teſtæ conicæ labro mucronato octodentato, ſpira nodoſa.
Liſt. Conch. t. 882. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 93. *f.* 904. 905.
a) *Seb. muſ.* 3. *t.* 63. *f.* 3.
Chemn. Conch. 10. *t.* 159. *f.* 1512-1515.
Habitat rariſſimus - - - teſta ultra 7 pollices longa, fuſca, albo varia, hinc inde cærulescenti-nebuloſa; utrum huic, an priori cuidam tribui accenſendus.

affinis. 34. Str. teſta tranſverſim ſtriata gibba: ſpira inermi; anfractu primo verrucis coronato.
Liſt. Conch. t. 889. *f.* 10.
Habitat - - - Lucifero affinis.

latus. 35. Str. teſtæ labro prominulo inferne his emarginato, ſpiræ anfractu primo medio lævi utrinque tranſverſim ſtriato, reliquis nodis obtuſis coronatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 4. 5.
Habitat - - -

lævis. 36. Str. teſta lævi argentea-fuſco radiata tranſverſim obſolete plicata, ſpiræ elongatæ anfractibus inflatis rotundis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 67.
Habitat - - - teſta paulisper ultra 2 pollices longa.

vexillum. 52. Str. teſta ſolidula ſubcylindrica rufeſcenti & ochroleuco alternatim faſciata: labro intus denticulato, columella plana glabra, baſi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 222. *t.* 157. *f.* 1504. 1505.
Kaemmer. Rudolſt. Cabin. t. 7. *f.* 2. 3.
Habitat rariſſimus in Oceano indico.

norwegicus. 53. Str. teſta oblonga ſubalata alba: anfractibus teretibus, apertura patula ovata, cauda ſubadſcendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 218. *t.* 157. *f.* 1497. 1498.

Habitat ad Norwegiæ *littora, utrum diſtincta hujus generis ſpecies?*

**** Turriti, *ſpira longiſſima.*

tuberculatus. 37. Str. teſta ovato-oblonga tuberculata, labro incraſſato.
Seb. muſ. 3. t. 55. f. 21.
v. Born. muſ. Caeſ. t. 10. f. 16. 17.
Martin. Conch. 4. t. 157. f. 1490.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta rudi, quaſi calce abducta, anfractibus punctis corneis eminentibus ſeriatis, labro ſutura quaſi gibbo, apertura ovata, cauda breviſſima, recurvata.*

paluſtris. 38. Str. teſta læviuſcula: labro poſterius ſoluto.
Liſt. Conch. t. 837. f. 63.
Rumpf muſ. t. 30. f. Q.
Seb. muſ. 3. t. 50. f. 13. 14. 17. 18.
Knorr Vergn. 3. t. 18. f. 1. & 5. t. 13. f. 8.
Martin. Conch. 4. t. 156. 1472.
Habitat in Indiæ inſularumque Oceani indici *paludibus, teſta utplurimum craſſa, lutea vel fuſca: ſpiræ anfractibus 12-16, primo altero duplo majore, reliquis longitudinaliter plicatis & ter tranſverſim ſtriatis.*

acr. 39. Str. teſta lævi: labro anterius & poſterius ſoluto. *Muſ. Lud. Ulr. 624. n. 289.*
Müll. hiſt. verm. fluv. & terr. 2. p. 188. n. 375. Nerita teſta ſubulata lævi, apertura antice poſticeque ſinuata.
Liſt. Conch. t. 115. f. 10.
Petiv. gaz. t. 13. f. 16.
Rumpf muſ. t. 33. f. R.
Seb. muſ. 3. t. 56. f. 13. 14.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1227.
Habitat in Amboinæ paludibus, *teſta 26 circiter lineas longa, ex fuſco atra vel badia intus alba, ſubtiliſſime tranſverſim ſtricta; apertura ovata; ſpira ſubulata; anfractibus 12 planiuſculis contiguis.*

lineatus. 40. Str. teſta ſubulata: lineis ſeptem ſpiralibus impreſſis, apertura ovata.
*Müll. hiſt. verm. fl. & terr. 2. p. 189. n. 376.** Nerita lineata.
Liſt. Conch. t. 116. f. 11.
Klein oſtr. p. 54.
Martin. Berl. Magaz. 4. p. 348. t. 10. f. 50

Habitat - - - teſta 18 lineas longa, glabra, fauce cærulescente decuſſatim ſtriata.

punctatus. 41. Str. teſta ſubulata luteſcente: faſcia juxta ſuturam candida ſtriis rubris, anfractibus minoribus ſulcatis.
Müll. hiſt. verm. fluv. & terr. 2. p. 190. n. 377. *Nerita* punctata.
Liſt. Conch. t. 979. f. 36.
Pet. gaz. t. 13. f. 15.
Rumpf muſ. t. 30. f. P.
Gualt. teſt. t. 6. f. E. F?
Knorr Vergn. 1. t. 8. f. 7.
Martin. Berl. Magaz. t. 9. f. 39.
Habitat - - - teſta tenera, pellucida, glabra, 18½ lineas longa, fauce & columella albidis, apertura obovata, ſpiræ anfractibus 12-13, majoribus 6 lævibus.

Vibex. 42. Str. teſta ſubulata cinerea tranſverſim ſtriata: anfractibus nodulosis ſtrigiſque ſanguineis.
Müll. hiſt. verm. fl. & terr. 2. p. 191. n. 378. *Nerita* tuberculata.
Liſt. Conch. t. 119. f. 4.
Petiv. gazoph. t. 100. f. 11.
Gualt. teſt. t. 6. f. G.
Klein oſtr. p. 34.
Martin. Berl. Mag. 4. t. 10. f. 51.
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1261. 1262.
β) *Crinchled. Club. Martyn. univ. Conch.* 1. t. 12.
Habitat in Coromandel, *teſta albida, pellucida, 4-14 lineas longa, labio interiori glabro* β) *ad* inſulas *amicas candido, apertura ovata, anfractibus 8-11, ſingulis bifariam nodulosis.*

auritus. 43. Str. teſta fuſco-faſciata: anfractibus muricatis, apertura ovata.
Müll. hiſt. verm. fl. & terr. 2. p. 192. n. 379. *Nerita* aurita.
Liſt. Conch. t. 121. f. 16.
Klein oſtr. p. 30.
Martin. Berl. Magaz. 4. t. 10. f. 55.
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1265. 1266.
Habitat in Africa, *teſta duriuſcula, 16 lineas longa; nunc lutea, nunc alba, nunc flava, fauce columellaque albis, labio exteriore repando, ſpiræ anfractibus 7, ſingulis tuberculis 7 luteis, craſſis, obtuſis, compreſſis.*

aculeatus. 44. Str. teſta fuſca tuberculoſa: anfractibus muricatis; labro depreſſo crenulato.
Müll. hiſt. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 193. *n.* 380. Nerita aculeata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 1. Popël.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 17. & *t.* 122. *f.* 20.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 39.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* &c.
Martin. Berl. Mag. 4. *t.* 11. *f.* 58.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1267. 1268.
β) *Hercules Club. Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 13.
Habitat in Africæ torridæ paludoſis, *teſta duriuſcula*, 18 *lineas longa, fauce columellaque albis, ſpiræ anfractibus* 12, *ſingulis quinquefariam nodoſis: nodis in* 5 *extimis conicis acutis.*

agnatus. 45. Str. teſta læviuſcula: labro valde prominulo poſterius emarginato.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 19.
Habitat - - -

dealbatus. 46. Str. teſtæ anfractibus tranſverſim ſtriatis nigris, extimis lævibus & labri columellæque margine albis.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 13. 14.
Habitat - - -

fuſcus. 47. Str. teſta fuſca, anfractibus multifariam tuberculatis; labro anterius poſteriuſque ſoluto, intus fuſco ſtriato.
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 8.
Habitat - - - *tuberculato affinis.*

marginatus. 48. Str. teſta fuſca: anfractus infimi margine albo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat - - - *an hujus generis?*

lividus. 49. Str. teſta ſubangulata nodoſo-ſpinoſa, labro anterius ſoluto. *Muſ. Lud. Ulr.* 625. *n.* 290.*
Müll. hiſt. verm. fl. & terr. 2. *p.* 149. *n.* 338? Buccinum (torridum) teſta elongata fuſca tranſverſim ſtriata, anfractibus muricato dentatis.
Schroet. Fluſconch. p. 314. *n.* 111.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1269. 1270.
Habitat - - -

ſtriatus 50. Str. teſta convexa ſtriata alba : ſtrigis raris fulvis, columella ſinuata inflexa.
Müll. hiſt. verm. fluv. & terr. 2. *p.* 149. *n.* 339. *Buccinum* ſtriatum.
Habitat rarus - - - teſta tenera, pellucida, 3-7 lineas ultra 2 pollices longa, apertura ovato-oblonga, ſpiræ anfractibus 7-8 : marginibus incumbentibus: utrum hujus generis, an potius ad helices relegandus.

Sniſter. 51. Str. teſta contraria tenui longitudinaliter ſtriata. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 982. 983.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis repertus in Helvetia, teſta $1\frac{1}{4}$ *pollices longa : anfractibus* 10.

325. MUREX. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, exaſperata ſuturis membranaceis.
Apertura deſinens in canalem integrum rectum ſ. ſubadſcendentem.

α ſpinoſi, *cauda exſerta.*

Hauſtellum. 1. M. teſta ovata tuberculata, cauda elongata ſubulata recta muricata. *Muſ. Lud. Ulr.* 626. *n.* 291.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* F. Hauſtellum.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* B. Hauſtellum.
Liſt. Conch. t. 903. *f.* 23.
Bonann. recr. 3. *f.* 268.
muſ. Kircher. 3. *f.* 270.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* E.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 81.
Leſſer lithoth. f. 71.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 5. 6.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 115. *f.* 1066.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 1.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 115. *f.* 1068.
γ) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 9. *f.* 4.
δ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 115. *f.* 1067.
Habitat paulo rarior in mari rubro, *omnique Aſiam Americamque auſtralem alluente, colore caudæque obliquis*

tuberculorum ordinibus armatæ longitudine varians, apertura rotundata utplurimum roſea, fauce nunc alba, nunc cæruleſcente.

Tribulus. 2. M. teſta ovata ſpinis ſetaceis trifariis, cauda elongata ſubulata recta ſimiliter ſpinoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 626. *n.* 292.*

α) *Column. aq. t.* 60. *f.* 6. Purpura clavata.
Bonann. recr. 3. *f.* 269. Hyſtrix marina.
muſ. Kirch. 3. *f.* 271.
Liſt. Conch. t. 902. *f.* 22.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* A. 1-3.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 4.
Olear. muſ. t. 29. *f.* 1.
Leſſer teſtaceoth. f. 72.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 5.
Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 3. 4.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 15.
Martin. Conch. 3. *t.* 113. *f.* 1053-1056.

β) *Rumpf muſ. t.* 26. *f.* 3. Tribulus.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* A. 4.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 1-3.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 113. *f.* 1052.

Habitat in mari rubro, *omnique* Aſiam Americamque *auſtralem alluente, teſta exalbida vel ruſeſcente tranſverſim ſtriata, ſpinis in β) rariore multo longioribus.*

Cornutus. 3. M. teſta ſubrotunda ſpinis ſubulatis obliquis cincta, cauda elongata ſubulata recta ſpinis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 627. *n.* 293.
Column. aq. t. 60. *f.* 3. Purpura cornuta.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 20. Bolin.
Petiv. gaz. t. 68. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 901. *f.* 21.
Bonann. recr. 3. *f.* 283.
muſ. Kirch. 3. *f.* 284.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 78. *f.* 7-9. 10? 11?
Knorr Vergn. 6. *t.* 17. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 114. *f.* 1057.
Habitat pretioſus in mari, Africam, *potiſſimum* occidentalem,

alluente, teſta ad 8 pollices longa, tranſverſim ſtriata, alba flava vel ſubſpadicea intus roſea, ſpinis ad 2 pollices longis, anfractibus rotundis inflatis.

Brandaris. 4. M. teſta ſubovata ſpinis rectis cincta, cauda mediocri ſubulata recta ſpiniſque oblique circumdata.
Rondel. teſt. 64. Murex Purpura.
Petiv. gaz. t. 68. *f.* 12.
Ginann. adr. 2. *t.* 8. *f.* 61. 62.
Liſt. Conch. t. 900. *f.* 20.
Argenv. zoomorph. t. 4. *f.* C.
Bytem. app. t. 12. *f.* 60.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 262. a-d. 263. a-c. & 264. a-d.
Knorr Vergn. 2. *t.* 18. *f.* 1. 2. & *t.* 22. *f.* 4. 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 67.
Martin. Conch. 3. *t.* 114. 115. *f.* 1058-1065.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 282.
muſ. Kirch. 3. *f.* 283.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* F.
γ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 281.
muſ. Kirch. 3. *f.* 282.
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 4.
δ) *Favann. Conch. t.* 38. *f.* E[1].
Chemn. Conch. 10. *t.* 164. *f.* 1571.
ε) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1530. 1531.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f.* 1532-1535.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1571.
Habitat frequens in mari mediterraneo & adriatico, *teſta alba, cinerea aut ſubfuſca, triplici ſpinarum, earumque minorum ſerie, tertia ex brevioribus compoſita, β) duplici, γ) ſpinis conicis, rarius ſerie ſimplici, caudaque inermi.*

Trunculus. 5. M. teſta ovata nodoſa anterius ſpinis cincta: cauda breviore truncata perforata. *Muſ. Lud. Ulr.* 627. *n.* 294.
Columm. purp. t. 13. *f.* 1.
Liſt. Conch. t. 947. *f.* 42. *t.* 952. *f.* 1? & *t.* 1010. *f.* 71. dt
Bonann. recr. 3. *f.* 271. 272. 274. 277?
muſ. Kirch. 3. *f.* 273. 274. 276.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 104.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 15. 16.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 256. c. 258? 259 a-f. & 261. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 13. *f.* 1. & 5. *t.* 13. *f.* 4. & *t.* 19. *f.* 6.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. *f.* 1018-1020.

β) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 119. *t.* C. II. *f.* 2?
γ) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 122. *t.* C. III. *f.* 7?
δ) *Spengl. catal. raiſ. t.* 2. *f.* 2. 3.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 105. *f.* 897. 898.
ζ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 161. *f* 1528. 1529.
η) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 107. *n.* 112. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in mari mediterraneo, & Jamaicam *alluente teſta colore varia, interdum faſciata tranſverſim ſtriata, cauda nunc recta, nunc ſiniſtrorſum flexa.*

Pomum. 6. M. teſta ovata nodoſa: varicibus tribus ad ſeptem, cauda latiore.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 22.
Liſt. Conch. t. 944. *f.* 39. a.
Argenv. zoom. t. 3. *f.* E.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 109. 110. *f.* 1021-1025.
Habitat in mari, Africam *occidentalem alluente, teſta ponderoſa, trunculo affinis.*

decuſſatus. 7. M. teſta ovata tranſverſim ſulcata coſtata: coſtis convexis nodos perpendiculares decuſſantibus, cauda imperforata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 21. Jaton.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 65?
Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 110. *f.* 1026.-1028.
Chemn. Conch. 118. *t.* 161. *f.* 1540. 1541.
Habitat in mari, Africam occidentalem *alluente, labri margine membranaceo, ſpiræ anfractibus* 7 *diſcretis.*

triacanthus. 8. M. teſta turgida nodoſa tranſverſim ſtriata trifariam ſpinoſa.
Walch Petref. 2. 1. *p.* 118. *t.* C. I. *f.* 5.
Habitat - - - *hactenus modo inter foſſilia inventus, teſta ficus figura, cingulis* 5-6 *horizontalibus ſtrias decuſſantibus inæquali: cauda ultra pollicem longa, anfractibus* 3 *extimis nodoſis prominulis.*

melanamathos. 9. M. teſta tranſverſim ſtriata octofariam ſpinoſa: ſpinis cavis nigris, ſpira ſubnodoſa aculeata, cauda ſubulata.
Martin. Conch. 3. *t.* 108. *f.* 1015.
Habitat rarus - - - *teſta abbreviata.*

Radix. 10. M. teſta alba multifariam frondoſo-ſpinoſa: frondibus nigris undulatis.
Argenv. zoom. t. 11. *f.* K.
Habitat rariſſimus - - - *an hujus tribus?*

candidus. 11. M. teſta alba ſeriatim ſpinoſa cauda breviſſima.
Argenv. Conch. t. 16. f. G.
Habitat - - - teſta 2 pollices longa, ſpinarum nonnullis nigris.

faſciatus. 12. M. teſta inſtata ſeriatim ſpinoſa alba fuſco faſciata, ſpiræ anfractibus quatuor diſcretis turgidis.
Knorr Vergn. 6. t. 40. f. 6.
Habitat - - -

β Frondoſi, *ſuturis criſpato-frondeſcentibus, cauda abbreviata, vulgo* Purpuræ *dicti.*

ramoſus. 13. M. teſta trifariam frondoſa: ſpira contigua, cauda truncata. *Muſ. Lud. Ulr. 628. n. 295.**
Rumpf muſ. t. 26. f. A. & 1. Murex ramoſus.
Argenv. Conch. t. 16. f. C. E. Purpura ramoſa.
zoomorph. t. 4. f. D.
Columm. aq. t. 60.
Liſt. Conch. t. 946. f. 41.
Bonann. recr. 3. f. 275. 276.
muſ. Kirck. 3. f. 280. 281.
Valent. Abh. t. 4. f. 38. & t. 9. f. 85.
Gualt. teſt. t. 37. f. H. & t. 38. f. A.
Klein oſtr. t. 4. f. 82.
Seb. muſ. 3. t. 52. f. 21. & t. 77. f. 1-4. 7. 8. 11. 12.
Bytem. app. t. 11. f. 45.
Muſ. Gottwald. t. 37. f. 255. a. & 256. b. & 38. f. 257. 1.
Knorr Vergn. 1. t. 25. f. 1. 2. & t. 26. f. 1. 2. 3. t. 9. f. 3. & 5. t. 11. f. 1.
Regenſ. Conch. 1. t. 7. f. 6.
Martin. Conch. 3. t. 102-105. f. 980-989. 992. 995-997.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. f. 1.
β) *Rumpf muſ. t. 26. f. C.*
Valent. Abh. t. 5. f. 42.
Gualt. teſt. t. 37. f. D. G. I. L.
Argenv. Conch. t. 16. f. H.
Seb. muſ. 3. t. 77. f. 9. 10.
Knorr Vergn. 2. t. 7. f. 4. 5.
Martin. Conch. 3. t. 105. f. 990. 991.
γ) *Martin. Conch. 3. t. 105. f. 993. 994.*
δ) *Bonann. recr. 3. f. 278.*
muſ. Kirch. 3. f. 277.
Martin. Conch. 3. t. 110. f. 1029. 1030.
ε) *Martin. Conch. 3. t. 110. & 111. f. 1031-1037?*

Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 550. *t.* 3. *f.* 8.
ζ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 111. *f.* 1038?
μ) *Valent. Abh. t.* 1. *f.* 5?
Habitat in mari rubro, ſinu Perſico, *omnique fere* mari, Aſiam Americamque *auſtralem alluente, teſta tranſverſim ſtriata, ceterum forma, colore, frondium ſinubus quam maxime varia.*

liatus. 174. M. teſta trifariam frondoſa: apertura unidentata. *Martin. univ. Conchol.* 2. *t.* 66.
Chemn. Conch. 10. *f.* 153.
Habitat ad Americæ ſeptentrionalis littus occidentale.

Scorpio. 14. M. teſta quadrifariam frondoſa: ſpira capitata, cauda truncata. *Muſ. Lud. Ulr.* 628. *n.* 296.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* D. Scorpio.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 36. 37.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* M.
Argenv. Conch. t. 16. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 13-16.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 106. *f.* 998-1003.
Spengl. ſelt. Conch. t. 2. *f.* C.
Habitat pretioſus & rarus in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba fuſca aut nigra, apertura orbiculari, ſpiræ anfractu altero turgido & reliquis majore.*

xatilis. 15. M. teſta quinquefariam frondoſa, ſpira contigua, cauda abbreviata. *Muſ. Lud. Ulr.* 629. *n.* 297.*
Rumpf muſ. t. 26. *f.* 2. Murex minor.
Klein oſtr. t. 6. *f.* 109.
Seb. muſ. 3. *t.* 77. *f.* 5. 6.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 255. aa. bb. 256. a. 257. b. c.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 2. & 6. *t.* 19. *f.* 1. & *t.* 40. *f.* 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 6. & *t.* 9. *f.* 26.
Murray. teſtac. t. 1. *f.* 26.
Martin. Conch. 3. *t.* 107. 108. *f.* 1004-1014.
Schroet. Journ. 5. *p.* 418. *f.* 4.
β) *Martin. Conch.* 3. *t.* 108. *f.* 1013.
γ) *Walch Petref.* 2. 1. *p.* 116. *t.* C. *f.* 3. 4.
Habitat in mari mediterraneo & Aſiam auſtralem *alluente, varietate multiplici.*

diaphanus. 16. M. teſta alba diaphana ſexfariam frondoſa: frondibus apice nigris.

Argenv. Conch. t. 16. f. F.
Habitat - - -

Cichoreum. 17. M. teſta ochroleuca tranſverſim ſtriata multifariam frondoſa.
Argenv. Conch. t. 16. f. K.
Habitat - - - frondibus minus prominentibus minusque criſpis.

verſicolor. 18. M. teſta albo rubroque varia, frondibus planis acutis acie nigris.
Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 1.
Habitat - - -

Erinaceus. 19. M. teſta multifariam ſubfrondoſo ſpinoſa: ſpiræ anfractibus retuſo coronatis, cauda abbreviata.
Gualt. teſt. t. 49. f. H.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 11. *f.* 3. 4?
Habitat in mari mediterraneo.

ſtriatus. 20. M. teſta ſeptifariam frondoſa alba: ſtriis tranſverſis elevatis fuſcis.
Gualt. teſt. t. 30. f. C?
Martin. Conch. 3. t. 109. f. 1016.
Habitat in India, *ſpiræ anfractibus* 7.

tripterus. 21. M. teſta elongata trigona: angulis alato-membranaceis.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. ind. p. 287. t. 10. f. 18. 19.
Habitat - - - foſſilis in Campania gallica, *teſta nivea tranſverſim rugoſa: rugis ſtrias longitudinales decuſſantibus, apertura oblongo-ovata granulata, ſpiræ anfractibus 7, inter ſuturas granulatis; an diſtincta a ramoſo ſpecies?*

Sacellum. 164. M. teſta umbilicata muricato coſtata: anfractibus ſupra late planiuſculis margine acutis, labro crenato, cauda recta adſcendente. *Chemn. Conch. 10. p. 267. t. 163. f.* 1561. 1562.
Habitat ad inſulas Nicobaricas.

Motacilla. 165. M. teſta triangulari nodoſa tranſverſim ſulcata trifariam varicoſa, cauda ſubulata elongata recta, fauce alba.
Chemn. Couch. 10. p. 268. t. 163. f. 1563.
Habitat in Oceano indico.

triqueter. 22. M. teſta elongata triquetra ſubulata reticulatim coſtata; roſtro recto clauſo. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. ind. p. 288. t. 11. f.* 1. 2.
Habitat

Habitat - - - teſta alba rubro maculata, apertura elliptica, labro crenato, teſtæ pyramidalis anfractibus ſex; an hujus tribus?

γ Varicoſi, *ſuturis rotundatis toroſis craſſiſque.*

lyratus. 175. M. teſta varicibus cingula lævia decuſſantibus, apertura ovata. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 43.
Habitat ad ſinum R. Georgii.

Rana. 23. M. teſta varicibus oppoſitis compreſſis ſcabra: cingulis muricatis, apertura ſubedentula ovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 629. *n.* 298.*
α) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* G. Rana.
Pet. gazoph. t. 100. *f.* 12.
Liſt. Conch. t. 995. *f.* 58.
Bonann. recr. 3. *f.* 182.
muſ. Kirch. 3. *f.* 183.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* L.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 13. 15-18.
Muſ. Gottwald. t. 36. *f.* 232. a. b. 233. a?
Knorr Vergn. 2. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 64.
Martin. Conch. 4. *t.* 133. *f.* 1268-1273.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 9.
β) *Liſt. Conch. t.* 949. *f.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 19.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 133. *f.* 1274-1276.
γ) *Liſt. Conch. t.* 995. *f.* 59.
δ) *Bonann. recr.* 3. *f.* 350.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 346.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem *alluente, teſta alba, cineraſcente aut ſubfuſca, cingulo muricato in* α) *duplici, in* β) *ſimplici, ſtriis tranſverſis elevatis, in* α) *granulatis.*

Cytinus. 24. M. varicibus oppoſitis continuatis, punctis tuberculoſis faſciata, apertura orbiculari.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 8. *f.* 13? Jabick.
Liſt. Conch. t. 939. *f.* 34.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* E.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* P.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 21-27.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 228. a. & *t.* 36. *f.* 231. a. b. 235. a. b. 236. 237. a. b. 238.

Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 5. 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1224-1227. & *t.* 128. *f.* 1229-1235.
β) *Valent. Abh. t.* 11. *f.* 93?
β) *Martin. univ. Conch.* 2. *t.* 41.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, americano, indico, *teſta alba, ſubfuſca aut fuſca, quadrupla, interdum avellanæ magnitudine, cingulis ex punctis elevatis compoſitis, alternis minoribus, a tertio ad extimum ſpiræ anfractum in ſingulis anfractibus duplici.*

affinis. 25. M. teſta turgida: varicibus oppoſitis continuatis, ſpira acuminata, anfractibus tuberculorum corona cinctis extimis glabris.
Valent. Abh. t. 11. *f.* 95.
Habitat - - - *tuberculorum teretium corona in primo ſpiræ anfractu triplici vel quadruplici.*

Lampas. 26. M. teſta varicibus ſuboppoſitis, gibboſa tuberibus longitudinaliter tuberculoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 630. *n.* 299.
Rondel. teſt. 2. *p.* 81.
Rubo. β) *Rumpf muſ. t.* 28. *f.* C. Hector.
Liſt. Conch. t. 1023. *f.* 88.
Gualt. teſt. t. 50. *f.* D.
Muſ. Gottwald. t. 25. *f.* 174. x. a. b.
Martin. Conch. 4. *t.* 129. *f.* 1238. 1239.
Rubeta. γ) *Rumpf muſ. t.* 28. *f.* D. Ajax.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 103.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* D.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 59.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 174. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 28. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 128. *f.* 1236. 1237.
Habitat in Oceano indico, *teſta rubra, aut ſpadicea, β) 14 pollices longa, tuberculis minimis ſparſis aſperrima, apertura ovali utrinque dentata ex albo incarnata, limbo intus ovali aurantio.*

Olearium. 27. M. teſta varicibus ſubalternis numeroſo tuberculatis, dorſo poſterius mutico ſtriato, apertura edentula.
Rondel. teſt. 2. *p.* 88.
Column. aq. t. 53.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 105.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* G.
Knorr Vergn. 3. *t.* 9. *f.* 5.

Martin. Conch. 4. *t.* 130. *f.* 1242?
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 267.
Einl. in Conch. I. *p.* 492. *t.* 3. *f.* I.
β) *Walch Petref.* 2. I. *p.* 119. *t.* C. II. *f.* 5?
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 34?
Habitat in mari mediterraneo, africano.

Femorale. 28. M. teſta varicibus decuſſatis trigona rugoſa anterius nodulоſa, apertura edentula anterius tranſverſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 630. *n.* 300.
Grew. muſ. t. II. *f.* 7. 8.
Liſt. Conch. t. 941. *f.* 37.
Bonann. recr. 3. *f.* 290.
muſ. Kirch. 3. *f.* 291.
Gualt. teſt. t. 50. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* B.
Seb. muſ. 3. *t.* 63. *f.* 7-10.
Muſ. Gottwald. t. 32. *f.* 218. a-i.
Knorr del. t. B. IV. *f.* 2.
Vergn. 4. *t.* 16. *f.* I.
Regenſ. Conch. I. *t.* 2. *f.* 21.
Martin. Conch. 3. *t.* III. *f.* 1039.
Habitat in mari, Aſiam auſtralem, Guineam, Americam *alluente, teſta nonnunquam ultra 7 pollices longa fuſca, coſtis tranſverſis aperturam verſus albis: ſulcis intermediis tranſverſim ſtriatis, apertura ovali, cauda intorta.*

Cutaceus. 29. M. teſta varice ſolitaria nodis angulata ſubrugoſa, apertura dentata, columella perforata.
Liſt. Conch. t. 942. *f.* 38?
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 63. 64. 71-73. & *t.* 52. *f.* 10? II.
Muſ. Gottwald. t. 27. *f.* 187. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 24. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *t.* 118. *f.* 1085? 1086? 1087. 1088.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1559. 1560.
Habitat ad Barbariæ; Guineæ, Americæ auſtralis & inſularum obverſarum *littora, teſta ſubfuſca, perſici florum colore tincta aut alba, lineis perpendicularibus undulatis,* $2\frac{1}{2}$*-3 pollices longa.*

Lotorium. 30. M. teſta varicibus decuſſatis angulata: nodis longitudinaliter tuberculoſis, cauda flexuoſa, apertura dentata, *Muſ. Lud. Ulr.* 631. *n.* 301.*
Liſt. Conch. t. 934. *f.* 29. *t.* 937. *f.* 32. & *t.* 948. *f.* 43.

Rumpf muſ. t. 26. f. B.
Argenv. Conch. t. 10. f. M.
Martin. Conch. 4. t. 130. f. 1246. 1247. 1249.
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 493. t. 3. f. 2.
β) *Seb. muſ.* 3. t. 57. f. 30.
Knorr Vergn. 5. t. 21. f. 1.
Martin. Conch. 4. t. 131. f. 1252. 1253.
Chemn. Conch. 10. t. 169. f. 1634.
Habitat – – –

Pileare. 31. M. teſta varicibus decuſſatis ſubnodoſo rugoſa: apertura dentata, cauda ſubadſcendente.
Adanſ. Seneg. 1. t. 8. f. 12? Vojet.
Rumpf muſ. t. 49. f. I.
Gualt. teſt. t. 49. f. A.
Seb. muſ. 3. t. 52. f. 1. 2. & t. 57. f. 23? 24.
Muſ. Gottwald. t. 35. f. 227. a.
Martin. Conch. 4. t. 130. & 131. f. 1243. 1248. 1250. 1151?
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 493. t. 3. f. 3.
neue Litterat. 3. p. 267.
β) *Seb. muſ.* 3. t. 52. f. 3?
Habitat in mari mediterraneo.

bufonius. 32. M. teſta varicibus ſex oppoſitis continuatis fornicatis, cingulis nodoſis, cauda obliqua.
Argenv. Conch. t. 9. f. R.
Seb. muſ. 3. t. 60. f. 14. 20.
Muſ. Gottwald. t. 39. f. 234. b.
Martin. Conch. 4. t. 129. f. 1240. 1241.
Habitat rarior – – – *gyrino affinis.*

Pyrum. 33. M. teſta varicoſa ovata tranſverſim ſulcata nodoſa, cauda longiore flexuoſa ſubulata.
Rumpf muſ. t. 26. f. E. Pyrum exſiccatum.
Gualt. teſt. t. 37. f. F.
Argenv. Conch. t. 10. f. O. & t. 16. f. I.
Klein oſtr. t. 6. f. 110.
Knorr Vergn. 2. t. 7. f. 2. 3. & 6. t. 26. f. 2.
Regenſ. Conch. 1. t. 6. f. 60.
Martin. Conch. 3. t. 112. f. 1040-1044.
β) *Rumpf muſ.* t. 24. f. H.
Klein oſtr. t. 3. f. 64.
Regenſ. Conch. 1. t. 5. f. 50.
Martin. Conch. 3. t. 112. f. 1048. 1049.
γ) *Martin. Conch.* 3. t. 67. f. 743. a.

δ) *Liſt. Conch. t.* 935. *f.* 29. a.
Rumpf. muſ. t. 24. *f.* I.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1050. 1051.

ε) *Mart. Conchelog.* 2. *t.* 56.
Habitat in Oceano indico auſtrali, *teſta alba interdum fuſco varia, aut ſpadicea, aut ex luto fuſca angulata; longitudinaliter ſtriata, tranſverſim ſulcata, apertura ovali dentata, columella nunc dentata, nunc edentula.*

caudatus. 34. M. teſta tenui tranſverſim ſtriata fuſca albo varia, cauda ſubulata, ſpira prominula apice fuſca: anfractibus canaliculatis; primo gibbo.
Martin. Conch. 3. *t.* 112. *f.* 1045-1047.

β) *Liſt. Conch. t.* 893. *f.* 13?
Habitat - - -

Rubecula. 35. M. teſta varicibus decuſſatis, obtuſa rugis nodoſis; ventre æquali, apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 631. *n.* 302.*
Gualt. teſt. t. 49. *f.* F? I.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* K.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 1-6.
Muſ. Gottwald. t. 36. *f.* 228. b-d. 229. a. b. 230. a. b.
Knorr Vergn. I. *t.* 13. *f.* 3. 4. & 3. *t.* 5. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 132. *f.* 1259-1267.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1546. 1547.
Habitat ad Indiæ, Africæ, americæ auſtralis *littora; rarior, teſta rubra vel flava, faſciata.*

Scrobiculator. 36. M. teſta varicibus ſcrobiculatis ſuboppoſitis, lævigata, apertura dentata.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* B.
Liſt. Conch. t. 943. *f.* 39?
Petiv. gaz. t. 100. *f.* 12.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 257. *t.* 2. *f.* 16. 17.
Favann. Conch. t. 32. *f.* E.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1556. 1557.
Habitat in mari mediterraneo.

reticularis. 37. M. teſta varicibus ſuboppoſitis reticulata, maculis tuberculatis, columella ſubedentula, cauda adſcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 632. *n.* 303.
Liſt. Conch. 935. *f.* 30.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 193.
Gualt. teſt. t. 49. *f.* M. & *t.* 50. *f.* A.
Leſſer teſtaceoth. f. 64.

Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 18.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t 11. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 405. 406. & 4. *t.* 128. 1228.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 263. *t.* 3. *f.* 18. 19.
Habitat in mari mediterraneo, & Americam *alluente; rarior, teſta interdum 6 pollices longa, tranſverſim coſtata longitudinaliter ſtriata, nodis in decuſſatione diverſicoloribus, aperturæ limbo rubro, labro dentato.*

lamelloſus. 174. M. teſta varicibus membranaceis per ſpiram continuatis, ſpina terminatis. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 42.
Habitat ad inſulas Falkland.

nodatus. 177. M. anfractibus nodoſis, cauda recta apertura violacea, labio dentato. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 51.
Habitat ad novam Hollandiam.

Anus. 38. M. teſta varice labiiſque dilatato-membranaceis, gibboſa reticulato-tuberculata, apertura ſinuoſa, cauda erecta. *Muſ. Lud. Ulr.* 632. *n.* 304.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* F. Auris hirſuta.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* H. Diſtorſio ſ. Grimace.
Liſt. Conch. t. 833. *f.* 57.
Pet. gaz. t. 74. *f.* 9. *vel t.* 99. *f.* 10.
Bonann. recr. 2. *f.* 279. 280.
muſ. Kirch. 3. *f.* 278. 279.
Gualt. teſt. t. 37. *f.* B. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 4. 6. 7.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 177. 178. a. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 3. *f.* 5.
Martin. Conch. 2. *t.* 41. *f.* 403. 404.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* G.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 7.
β) *Gualt. teſt. t.* 31. *f.* D.
Habitat in mari mediterraneo & Aſiam auſtralem *alluente; teſta vix ultra 3 pollices longa, utplurimum fuſca: faſciis albis; apertura ſubtriangulari.*

miliaris. 39. M. teſta varicoſa: cingulis tuberculatis, apertura ſubdentata, cauda elongata, anfractibus ventricoſis.
Valent. Abh. t. 2. *f.* 14. a. 15. b. 16. c. 17. d. 18. e.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 5.
Martin. Conch. 3. *p.* 303. *vign.* 36. *f.* 1-5.
Chemn. Conch. 10. *t.* 161. *f.* 1532-1535.

Habitat - - - teſta nunc cinerea, nunc ex vireſcente alba, nunc ruſa, nunc alba, tuberculis utplurimum nigris, rarius ruſis.

ſenegalenſis. 40. M. teſta tranſverſim ſtriata varicoſa: varicibus ſpinoſis; ſpinis apicem verſus decreſcentibus.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 19. Sirat.
Habitat ad Senegal, *teſta circiter* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, varicibus 9, alternatim minoribus, ſingulis 8 ſpinis armatis, ſpiræ anfractibus 8.*

δ. Ecaudati *ſubechinati.*

Ricinus. 41. M. teſta obovata: ſpinis ſubulatis, apertura dentata; labro dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 633. *n.* 305.*
Rumpf muſ. t. 24. *f.* E. Os luteum.
Gualt. teſt. t. 28. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 37. 39. 42.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 19.
Habitat in Oceano aſiatico, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, ſpinis ſeriatis, ſpira prominula, fauce violacea.*

Nodus. 42. M. teſta obovata: ſpinis conicis, labro dentato, columella lævi colorata. *Muſ. Lud. Ulr.* 635. *n.* 309.*
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 7?
Habitat - - - teſta longiore, quam ricini, ad $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, utplurimum tamen minore, apertura intus incarnata.*

neritoideus. 43. M. teſta nodoſa plurimis ordinibus: labro angulato, columella planiuſcula.
Syſt. nat. X. I. *p.* 777. *n.* 628. Nerita nodoſa.
Liſt. Conch. t. 804. *f.* 12. 13.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 173.
Klein. oſtr. t. I. *f.* 30.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 41. 48.
Muſ. Gottwald. t. II. *f.* 81. a? b? c.
Knorr Vergn. t. 25. *f.* 5. 6.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 972. 973. & *t.* 102. *f.* 976-979.
Habitat in India, *ſtructura neritæ, habitu muricis, teſta nunc alba tuberculis nigris, fauce violacea, nunc luteo-fuſca, tuberculis fuſcis, apertura flava: anfractus primi dorſo tuberculorum ordinibus 4, labro ſubalato, ſpinis 3-4 armato, columellæ dentibus 2-4.*

Fucus. 44. M. teſta rudi ventricoſa nodorum ordinibus quatuor tranſverſim ſtriata, columella impreſſa & anfractibus extimis planiuſculis.
Liſt. Conch. t. 990. f. 50.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 174.
Gualt. teſt. t. 66. f. B, o.
Martin. Conch. 3. t. 100. f. 959-962.
Habitat rarior - - - teſta vix ultra $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, columella guttis 2-3 nigris notata.

Loco. 45. M. teſta obovata anterius nodoſa: apertura edentula ſuborbiculata. *Molin. hiſt. nat. Chil. p. 180.*
Habitat in mari regnum Chilenſe *alluente, teſta 4-5 pollices alta, incola in veſicula collari ſuccum purpureum continente, carne duriuſcula, ſapida, eduli.*

Hyſtrix. 46. M. teſta ſubovata: ſpinis acutis, apertura edentula repanda. *Muſ. Lud. Ulr. 635. n. 310.**
Argenv. Conch. t. 14. f. A. Hericius.
Gualt. teſt. t. 28. f. R. & t. 44. f. S.
Seb. muſ. 3. t. 52. f. 29? 30. 31. & t. 60. f. 33. 38? 43. 47.
Regenſ. Conch. 1. t. 3. f. 32.
Martin. Conch. 3. t. 101. f. 974. 975.
β) *Walch. Petref. 2. 1. p. 120. t. C. II. f. 9?*
Habitat - - - teſta nunc badia alboque varia, nunc ex luteo fuſca, unicolore vel maculata, ſpinarum ordinibus 4, apertura ampla.

Mancinella. 47. M. teſta ovata: ſpinis obſoletis, apertura edentula, columella tranſverſim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr. 636. n. 311.**
Liſt. Conch. t. 956. f. 8. & t. 957. f. 9. 10.
Rumpf muſ. t. 24. f. 5.
Argenv. Conch. t. 17. f. H.
Seb. muſ. 3. t. 60. f. 45.
Muſ. Gottwald. t. 11. f. 80. c. d. & t. 26. f. 176.
Knorr Vergn. 3. t. 29. f. 6.
Born muſ. Caeſ. Vindob teſt. t. 9. f. 19. 20.
Martin. Conch. 3. t. 101. f. 966-968. 970. a. b. 971.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. t. 7. f. 7.
β) *Liſt, Conch. t. 956. f. 7.*
Martin. Conch. 3. t. 100. f. 963.
γ) *Adanſ. Seneg. 1. p. 100. t. 7. f. 1* Sakum.
Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem, β) Africam occidentalem *alluente, teſta alba, interdum ſubfuſca albo-*

varia, ſpinis aliquando nigricantibus, nunc magis, nunc minus turgida.

Hippocaſtanum. 48. M. teſta ovata ſtriata quadrifariam ſubſpinoſa, apertura transverſim ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 636. *n.* 312.*

Rumpf muſ. t. 24. *f.* C. Pimpeltjes e Banda.
Liſt. Conch. t. 958. *f.* 11?
Bonann. recr. 3. *f.* 346?
muſ. Kircher. 3. *f.* 345?
Gualt. teſt. t. 37. *f.* C. & *t.* 43. *f.* V.
Argenv. Conch. t. 14. *f.* L.
Klein oſtrac. t. 3. *f.* 58. & *t.* 7. *f.* 112.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 22. 23. 27. 28. & *t.* 60. *f.* 12. 30. 31? 32?
Knorr Vergn. 5. *t.* 4. *f.* 2. & 6. *t.* 24. *f.* 2. & *t.* 35. *f.* 3.
Muſ. Gottwald. t. 38. *f.* 260. a? b?
Martin. Conch. 3. *t.* 99. *f.* 945. 946. & *t.* 100. *f.* 951? 952? 953?
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 7. *f.* 2. Laborin.
Liſt. Conch. t. 991. *f.* 52. 53.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 11.
Martin. Conch. 3. *t.* 100. *f.* 956-958.
γ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 100. *f.* 954. 955.
δ) *Liſt. Conch. t.* 896. *f.* 16.
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1518. 1519.
ε) *Liſt. Conch. t.* 896. *f.* 16. a. b.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 67. *f.* d.
Martin. Conch. 3. *t.* 101. *f.* 969.
η) *Liſt. Conch. t.* 955. *f.* 6. & *t.* 990. b. *f.* 51.
Bonann. recr. 3. *f.* 381.
muſ. Kirch. 3. *f.* 368.
Muſ. Gottwald. t. 26. *f.* 182.
θ) *Martin. Conch.* 3. *t.* 121. *f.* 1110.
ι) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* D.

Habitat in Guinea, India, inſuliſque Oceani indici, *teſtæ dorſo transverſim ſtriato, ſpinarum obtuſarum ordinibus numero variantibus armata, ſpiræ anfractibus diſtantibus.*

lenticoſus. 49. M. teſta ſubtorrita longitudinaliter coſtata transverſim cancellata, apertura ſtriata.

Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 35.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 51. *f.* G.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* O.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 45-48.

Knorr Vergn. 4. *t.* 23. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1466. 1467.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad 2 pollices uſque longa flavicante, anfractibus ſingulis faſcia fuſca cinctis, co... aculeatis, apertura oblonga, columellæ plica ſolitaria, ſpira acuminata: anfractibus diſtantibus.*

Melongena. 50. M. teſta obovata glauca, anfractu ſubſpinoſo, ſpira prominula, apertura lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 637. *n.* 317.
Liſt. Conch. t. 904. *f.* 24.
Bonann. recr. 3. *f.* 186. 295.
muſ. Kircher. 3. *f.* 186. 296.
Rumpf muſ. t. 24. *f.* 2. 3.
Gualt. teſt. t. 26. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 15. *f.* H.
Seb. muſ. 3. *t.* 72. *f.* 1-9.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 71. 72. 73. a. b.
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 5. & 2. *t.* 10. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 49. & *t.* 10. *f.* 36.
Martin. Conch. 2. *t.* 39. & 40. *f.* 389-397.
β) *Knorr Vergn.* 5. *t.* 4. *f.* 2.
γ) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 33. *f.* 3?
δ) *Rumpf muſ. t.* 24. *f.* 6.
Martin. Conch. 2. *p.* 76. *n.* 2.
ε) *Rumpf muſ. t.* 23. *f.* D. & *t.* 24. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 31. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 80-82. *t.* 52. *f.* 19. 20. & *t.* 60. *f.* 10.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 74. *t.* 27. *f.* 187. a. & *t.* 28. *f.* 207. b.
Knorr Vergn. 3. *t.* 7. *f.* 3.
Martin. Conch. 2. *t.* 40. *f.* 398-401.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 60. *f.* 9.
Muſ. Gottwald. t. 11. *f.* 75. 77. 78.
Martin. Conch. 2. *t.* 40. *f.* 402.
η) *Chemn. Conch* 10. *t.* 164. *f.* 1568.
Habitat in Oceano indico & Americam auſtralem *inſulaſque obverſas alluente, teſta ad* $5\frac{1}{2}$ *pollices uſque longa, utplurimum fuſca, albo faſciata, apertura ovali ampla, ſpira anfractibus rarius lævibus, quam nodoſis, anfractu primo maximo turgido, ſpinarum utplurimum coronis cinctis.*

Conſul. 159. M. teſta craſſa ventricoſa alba tranſverſim ſulcata nodoſa, apertura repando-ovata, labro ſinuoſo intus plicato denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 236. *t.* 160. *f.* 1516. 1517.
Habitat in Oceano indico.

lima, 176. M. teſta fuſca ſubovata ſubcaudata: cingulis confertis noduloſis dilutioribus. *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 46.
Habitat ad ſinum *a* R. Georgio *denominatum.*

ζ Caudigeri, *cauda ſubulata clauſa recta elongata, teſta inermi.*

arioſus. 51. M. teſta ecaudata ſubplicata ovata acuminata, apice carioſo.
Habitat in aquæductu *ad* Sevillam, *teſta magnitudine fabæ, oblonga, acuminata, cinerea, ſubdiaphana, longitudinaliter ſulcata, baſi emarginata; an vere diſtincta integra hujus generis & hujus tribus ſpecies?* Alſtroamer.

abylonius, 52. M. teſta turrita cingulis acutis maculatis recto-caudata, labro fiſſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 639. *n.* 317.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* L. Turris babylonica.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* M. Turris babylonica.
Liſt. Conch. t. 917. *f.* 11.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* N.
Knorr delic. t. B. IV. *f.* 6.
Vergn. 4. *t.* 13. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1 *f.* 9.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1331. 1332.
Schroet inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 8.
β) *Chemn. Conch.* 4. *p.* 143. *Vign.* 39. *f.* C.
γ) *Argenv. zoomorph. t.* 4. *f.* b.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *Vign.* 39. *f.* B.
δ) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 46.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 221. f.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1334. 1335.
ε) *Martin. Conch.* 4. *t.* 145. *f.* 1345. 1346.
ζ) *Favann. univ. raiſ. t.* 4. *f.* 997.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1550. 1551.
Habitat in Oceano indico γ) *rarior quoque in* mari *inſulas* Americæ oppoſitas *circumfluente, teſta ad* 4 *uſque pollices longa, cingulis albis: maculis quadratis fuſcis vel atris.*

javanus. 53. M. teſta turrita: cingulis nodoſis immaculatis, labro ſinu ſeparato.
Liſt. Conch. t. 915. *f.* 8.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1336–1338.
Habitat in Oceano indico, *babylonico ſimillimus, at teſta alba, immaculata, radiis modo interdum ex fuſco luteis*

varia, cauda nunc longiore, nunc breviore, anfractibus nunc carinatis, nunc tuberculis carinatis, ſubſtriatis.

ſinenſis. 54. M. teſta ventricoſa acuminata, cauda canaliculata reflexa, apertura ovali, anfractibus granulatim tranſverſim ſtriatis, baſi ſpinis coronatis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 3. Goumier.
Liſt. Conch. t. 1018 *f.* 80.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* M. N.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 23. 24.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1489.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 157. *f.* 1487?
γ) *Liſt. Conch. t.* 122. *f.* 18?
Klein oſtr. t. 2. *f.* 40?
Martin. berl. Mag. t. 10. *f.* 57?
δ) *Schroet. Fluſconch. t.* 9. *f.* 9.
ε) *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 58.
Habitat in mari Senegaliam *alluente, teſta utplurimum maculata, columellæ plica unica, an hujus tribus?*

ſtramineus. 55. M. ſpica annulis elevatis: interſtitiis bacillis repletis, anfractibus ſingulis baſi tuberculis coronatis, apertura violacea, labro undulato columellaque niveis.
Spengl. Naturſ. 17. *t.* 2. *f.* A. B.
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1520. 1521.
Favann. Conch. t. 79. *f.* S.
Martyn Conch. 2. *f.* 53. 54.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta ſtraminea, 3 pollices longa.*

auſtralis. 56. M. teſta ovata longitudinaliter ſtriata; labro undulato, ſpiræ anfractibus canaliculatis: primo turgido quadriplicato, altero triplicato.
Spengl. Naturſ. 17. *t.* 2. *f.* C. D.
Habitat in Oceano auſtrali, *ſtramineo aſſinis, teſta quoque ſtraminea, at.* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, columella flavis labio niveo, an hujus tribus?*

uncinatus. 57. M. ſpira acuminata tranſverſim ſtriata: anfractibus quatuor primis callo medio uncis armato, quinto ſextoque coſtatis, reliquis glabris.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 15.
Habitat - - - teſta pollicem longa, apertura ovali, labro dentato, ſpiræ anfractibus novem.

Turris. 58. M. teſta turrita: ſpiræ anfractibus tuberculis coronatis cinguloque granulato cinctis; primo ſubtiliter tranſverſim ſtriata.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 79.
Habitat - - - babylonio affinis, at labro integro, teſta alba faſcia anfractuum coloris inter vinoſum & rufum intermedii.

Coſtatus. 59. M. cauda ſubreflexa oblique ſtriata, ſpiræ anfractibus tribus primis coſtatis, reliquis quatuor cancellatis, primo obconico, columellæ plica unica.
Argenv. Conch. t. 29. *n.* 10. *f.* 3.
Knorr Petref. 2. *t.* C. II. *f.* 7.
Schroet. Einl. in Verſtein. 4. *t.* 8. *f.* 3. 8.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis prope Courtagnon Campaniæ gallicæ *repertus, coſtis primorum anfractuum ſuperne in ſpinas terminatis; an hujus tribus?*

Aſper. 60. M. teſta longitudinaliter plicata tranſverſim coſtata: ſpira parum prominula, apertura ovata, labro crenulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 150. *f.* 1396. 1397.
Habitat - - - teſta rufeſcente, ſpiræ anfractibus 5-6, *coſtis acutis.*

Colus. 61. M. teſta turrita ſubrecto-caudata ſtriata nodoſa carinata, labro crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 639. *n.* 317.*
Rumpf muſ. t. 29. *f.* F. Fuſus.
Liſt. Conch. t. 917. *f.* 10. & *t.* 918. *f.* 11. a.
Bonann. recr. 3. *f.* 360?
muſ. Kircher. 3. *f.* 353?
Gualt. teſt. t. 52. *f.* L.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* B.
Klein oſtr. t. 4. *f.* 78?
Knorr Vergn. 3. *t.* 5. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1342.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 6.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 62?
γ) *Favann. Conch. t.* 33. *f.* A⁵.
Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1523.
δ) *Favann. Conch. t.* 35. *f.* C¹.
Chemn. Conch. 10. *t.* 161. *f.* 1536. 1537.
Habitat paulo rarior in Oceano indico, *teſta alba tranſverſim ſtriata nunc terete, nunc angulata, ſpiræ anfractibus ſulco diſcretis nodis coronatis ſuperioribus fuſcis, cauda 3 fere pollices longa, infra ſubfuſca.*

Morio. 62. M. teſta patulo caudata nigra: faſcia alba, ſpiræ anfractibus ſubnodoſis, columella rugoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 640. *n.* 319.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 9. *f.* 31. Nivar.
Liſt. Conch. t. 928. *f.* 22.
Bonann. recr. 3. *f.* 357.
muſ. Kircher. 3. *f.* 350.
Seb. muſ. 3. *t.* 80. *f. fere omnes.*
Muſ. Gottwald. t. 29. *f.* 209. a. & *t.* 31. *f.* 209. b.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 4.
Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 1. & 2. *t.* 6. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 61.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1300. 1301.
Schroet. Journ. 5. *f.* 5.
inn. Bau der Conch. t. 2. *f.* 4.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 140. *f.* 1302. 1303.
Habitat in mari Africam, *potiſſimum* occidentalem *alluente, teſta ad 6 pollices longa, ex atro fuſca, rarius ſubfuſca, β) cinerea, tranſverſim ſtriata.*

Cochlidium. 63. M. teſta patulo-caudata: ſpiræ anfractibus ſupra planis. *Muſ. Lud. Ulr.* 640. *n.* 320.*
Argenv. Conch. t. 9. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 6. *t.* 57. *f.* 27. 28.
Favann. Conch. t. 35. *f.* B³.
Chemn. Conch. 10. *t.* 164. *f.* 1569.
Habitat in Oceano indico.

Spirillus. 64. M. teſta caudata: ſpiræ mucronatæ anfractibus ſupra convexis.
Knorr Vergn. 6. *t.* 24. *f.* 3.
Martin. Conch. 3. *t.* 115. *f.* 1069.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* E.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 517. *t.* 3. *f.* 4.
Habitat Tranquebariæ, *hauſtello & canaliculato affinis, at anfractibus ſulco non diſtinctis, corpore ſubtus ventricoſo ſupra convexo, ſpiræ centro mucrone prominente obtuſo, anfractibus ſupra margine acuto cinctis, cauda ſubcylindrica, verſus aperturam ventris non dilatata, columella ruga tranſverſa a ventre diſtincta.*

canaliculatus. 65. M. teſta patulo-caudata: ſpiræ anfractibus ſupra canaliculo diſtinctis. *Muſ. Lud. Ulr.* 641. *n.* 321.*
Valent. Abh. t. 11. *f.* 92.

Gualt. teſt. t. 47. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 68. *f.* 21? 22?
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 4.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 738-740. & *t.* 67. *f.* 742. 743.
Habitat ad Canadam & *in* mari glaciali, *teſta fuſca nunc majore unicolore, nunc minore radiata lævi aut tranſverſim ſtriata, dorſi margine nodoſo.*

Ficus. 66. M. teſta patulo-caudata ſtriata: anfractibus canaliculo diſtinctis, extimis fuſcis, primo baſi nodis coronato.
Martin. Conch. 3. *t.* 66. *f.* 741.
β) *Gualt. teſt. t.* 26. *f.* N.
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 163. *f.* 1564. 1565.
Habitat γ) *in* mari rubro.

Carica. 67. M. teſta patulo-caudata tranſverſim ſtriata: ſpiræ prominulæ anfractibus baſi ſpinis coronatis.
Liſt. Conch. t. 880. *f.* 3. b.
Gualt. teſt. t. 47. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 4. & 6. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. Conch. 3. *t.* 67. *f.* 744. & *t.* 69. *f.* 756. 757.
Habitat - - - teſta ad 8 *pollices & ultra longa.*

Rapa. 68. M. teſta ſolida umbilicata trifariam nodoſa tranſverſim ſtriata: apertura ampla ſtriata.
Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 2.
Martin. Conch. 3. *t.* 68. *f.* 750-753.
Spengl. ſelt. Conch. 3. *f.* C.
β) *Liſt. Conch. t.* 894. *f.* 14?
γ) *Liſt. Conch. t.* 895. *f.* 15?
Habitat in India, *minor* Tranquebariæ, *Bullæ Rapæ affinis.*

Niveus. 69. M. teſta patulo-caudata nivea diaphana: ſpiræ anfractibus canaliculo diſtinctis; primo coſtis tranſverſis carinatis.
Bonann. recr. 3. *f.* 338.
muſ. Kircher. 3. *f.* 337.
Habitat in mari Braſiliam *alluente.*

Granum. 70. M. teſta hemiſphærica glabra diaphana, cauda recta patula, vertice papillari. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 752. *n.* 477.
Liſt. Conch. t. 881. *f.* 3. e.
Muſ. Gottwald. t. 30. *f.* 2. 5.
Ellis corall. t. 33. *f.* Aa.
Habitat - - - anfractibus convexis, apicem verſus ſenſim decreſcentibus.

aruanus. 71. M. teſta patulo-caudata: ſpira ſpinoſo-coronata. Muſ. Lud. Ulr. 641. n. 322.*
Rumpf muſ. t. 28. *f.* A. Buccinum aruanum.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 101.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *vign.* 39. *f.* D.
Habitat rarus ad inſulam Am, *&* novam *Guineam, teſta ponderoſa rudi ſæpius atra aut cæruleſcente annulis cincta, apertura angulata, cauda ſatis longa, ſpira mucronata.*

perverſus. 72. M. teſta patulo-repandoque caudata: ſpira contraria ſubcoronata. *Muſ. Lud. Ulr.* 642. *n.* 323.*
Argenv. Conch. t. 15. *f.* F. Unique.
Liſt. Conch. t. 907. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 30. *f.* B.
Muſ. Gottwald. t. 32. *f.* 219. a. 219. b.
Ellis corall. t. 33. *f.* B.
Baſt. op. ſubſec. t. 6. *f.* 1. B.
Chemn. Conch. 9. *t.* 107. *f.* 906. 907.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 8. 9.
β) *Liſt. Conch. t.* 908. *f.* 28?
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 107. *f.* 904. 905.
Habitat rariſſimus in mari americano, *ſpinis nunc acuminatis, nunc magis obtuſis.*

antiquus. 73. M. teſta patulo-caudata oblonga: anfractibus octo teretibus *Fn. ſuec.* 2165.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 64. *t.* 118. *f.* 1-3. *prodr.* 2939. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 397. *n.* 396. Tritonium antiquum.
Jonſt. exſang. t. 11. Turbo longus.
Liſt. Conch. t. 962. *f.* 15.
anim. angl. t. 3. *f.* 1. 3.
Bonann. recr. 3. *f.* 190.
muſ. Kircher. 3. *f.* 192.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 75. *t.* 83. *f.* 3-6. *& t.* 93. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 138. *f.* 1292-1294. 1296.
Hermann Naturf. 16. *t.* 2. *f.* 7.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 83. *f.* 7?
γ) *Martin. n. Mannigf.* 4. *p.* 419. *t.* 2. *f.* 14?
δ) *Liſt. Conch. t.* 913. *f.* 4.
Habitat frequens in Oceano ſeptentrionali, *mari quoque* glaciali, *buccino undato affinis, teſta ſqualida, ad 6 uſque pollices longa, ſubtiliſſime cancellata, vel tranſverſim ſtriata, vel longitudinaliter obſolete plicata, ſpiræ anfractibus*

fractibus ſulco diſcretis, medio nonnunquam tuberculis coronatis, rarius contrariis.

deſpectus. 74. M. teſta patulo-ſubcaudata oblonga: anfractibus octo lineis duabus elevatis. *Fn. ſuec.* 1266. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 8. *Müll. zool. dan. prodr.* 2940. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 396. *n.* 395. Tritonium deſpectum.
Martin. Conch. 4. *t.* 138. *f.* 1295.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 523. *t.* 3. *f.* 5.
β) *Liſt. Conch. t.* 1057. *f.* 1?
γ) *Martin. Conch.* 1. *f.* 5.
Favann. cat. raiſ. t. A. *f.* 946.
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1558.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta rudi, cana: anfractibus extimis utplurimum fuſcis, apertura interdum aurata.*

fornicatus. 75. M. teſta patulo-caudata ovato-oblonga: anfractibus ventricoſis ſtriatis longitudinaliter angulato ſubfornicatis. *O. Fabr. Fn. groenl.* 399. Tritonium fornicatum.
Habitat in mari, auſtralem Groenlandiam *alluente, incola eduli, teſta ultra* 3 *pollices longa ſubdiaphana læviuſcula flava, intus alba & glabra, ſpiræ anfractibus* 7 *late tranſverſim ſtriatis; an diſtincta a deſpecto ſpecies?*

incraſſatus. 76. M. teſta oblonga tranſverſim rugoſa longitudinaliter ſtriata: labro intus denticulato extus incraſſato.
Müll. zool. dan. prodr. 2946. Tritonium incraſſatum.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 96. *t.* 16. *f.* 25.
Habitat - - - *an hujus generis?*

truncatus. 77. M. teſta oblonga longitudinaliter coſtata: cauda ſubreflexa emarginato-truncata.
Müll. zool. dan. prodr. 2947.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 97. *t.* 16. *f.* 26.
Habitat - - - an hujus generis?

Argus. 78. M. teſta gibba tranſverſim tuberculato-coſtata fuſca obſcurius faſciata intus alba, apertura ovata.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* B.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 128.
Leſſer teſtaceoth. f. 62.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 127. *f.* 1223.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 57. *f.* 33.
Martin. Conch. 4. *t.* 131. *f.* 1255. 1256.

Chemn. Conch. 10. *t.* 160. *f.* 1522.
γ ?) Flag-Buccinum. *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 3.
Habitat rarus in India, γ) *ad* inſulas amicas & *ſociales.*

maculoſus. 79. M. teſta cancellata flava: faſciis albis lituriſque ſpadiceis alternis, columella lævi, ſpiræ anfractibus undecim teretibus.
Liſt. Conch. t. 1022. *f.* 86.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 20. 21.
Martin. Conch. 4. *t.* 132. *f.* 1257. 1258.
Favann. Conch. t. 33. *f.* X3?
Chemn. Conch. 10. *t.* 163. *f.* 1552. 1553.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 48.
Habitat rariſſima in India.

magellanicus. 80. M. teſta ventricoſa umbilicata tranſverſim ſtriata cinerea intus violacea: ſpiræ anfractibus parallele *coſtatis*; primo prægrandi.
Knorr Vergn. 4. *t.* 30. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1297.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1570.
Habitat in freto magellanico, Buccino Harpæ *ſtructura ſimilis, apertura ovali, anfractuum coſtis altis, acutis, foliaceis.*

cancellatus. 81. M. teſta ovata ſolida opaca cinerea: ſpiræ anfractibus cancellatis ſulco diſtinctis.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat - - -

ſcolopaceus. 82. M. teſta fuſca: ſpiræ anfractibus ſulcis cinctis ſupra tuberculis cinctis; tuberculorum apice & apertura albis.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 4.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 26. *f.* 5?
Habitat - - - teſta β) magis elongata ſordide lutea, anfractuum faſcia obſoleta, tuberculis magis globoſis.

litteratus. 83. M. teſta ventricoſa turrita nigro maculata: columella uniplicata, cauda brevi. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 327. *t.* 11. *f.* 14. 15.
Habitat - - - teſta nivea, apertura ampliata, ſpira anfractibus octo aculeatis.

trigonus. 84. M. teſta ſubtrigona cancellata : ſpiræ anfractibus inflatis contiguis ; primo tuberculo magno diſtincto.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 122. *t.* 8. *f.* 14. Samier.
Habitat in Senegalia, *teſta* 2 *circiter pollices longa: ſpiræ anfractibus* 7; *an hujus tribus?*

ſemilunaris. 85. M. teſta longitudinaliter coſtata ſubtiliter tranſverſim ſtriata : ſpiræ anfractibus planiuſculis diſtantibus ſeriatim tuberculatis, apertura ſemilunari.
Adanſ. Seneg. 1. p. 122. *t.* 8. *f.* 15. Solat.
Habitat in Senegalia, *teſta pollicem longa, ſpiræ anfractibus tuberculorum ſerie ſimplici, ſecundo duplici vel triplici, primo 6-7 plici.*

coſtatus. 86. M. teſta annulatim ſtriata : ſpiræ anfractibus teretibus inflatis; ſingulis coſtis novem rotundatis parallelis ſpinoſis.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 19. Sirat.
Habitat in Senegalia, *teſta* $2\frac{1}{2}$ *pollices circiter longa.*

ſulcatus. 87. M. teſta rotundata annulatim ſulcata, apertura ovali, ſpiræ anfractu primo turgido.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 133. *t.* 9. *f.* 25. Taſon.
Habitat in Senegalia, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, ſpiræ anfractibus novem ſubcontiguis, nunc ſubinflatis, nunc planiuſculis, an hujus generis?*

fuſiformis. 88. M. teſta elongata : tuberculis minimis confertis multifariam aſpera.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 132. *t.* 9. *f.* 23. Loſet.
Habitat in Senegalia, *teſta 6 circiter lineas longa, ſpiræ anfractibus circiter 8, primo tuberculorum ordinibus 12-15, ſecundo 5.*

Tritonis. 89. M. teſta ventricoſa oblonga lævi : anfractibus rotundatis, apertura dentata, cauda brevi. *Muſ. Lud. Ulr.* 642. *n.* 324.*
Rondel. teſt. 81. Buccinum.
Rumpf muſ. t. 28. *f.* B. & 1. Buccinum Tritonis.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 66-67.
Liſt. Conch. t. 959. *f.* 12.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 188.
Gualt. teſt. t. 48. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 81. *fig. ann.*
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 224. a. & *t.* 35. *f.* 225. b.
Knorr delic. t. B. VI. *f.* 1.

Knorr Vergn. 2. *t.* 16. *f.* 2. 3. & 5. *t.* 5. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 134. 135. *f.* 1277-1283.
β) *Liſt. Conch. t.* 960. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 35. *f.* 224.
Martin. Conch. 4. *t.* 136. *f.* 1284. 1285.
γ) *Klein oſtr. t.* 7. *f.* 127?
Habitat in Oceano indico & auſtrali, β) *in mari* mediterraneo, *teſta a* novæ Seelandiæ *incolis tibiæ muſicæ loco, ab* Orientis & Africæ *paſtoribus pro cornu militari adhibita vehementiori ſono quam tubæ ſtentoreæ vulgaris, aut cornu capri :*

Buccina jam priſcos cogebat ad arma Quirites.

teſta ad 16 *uſque pollices longa alba, fuſco, flavo & nigro quaſi ſquamata, apice utplurimum læſa, columella alba: ſtriis tranſverſis nigris, ſpiræ anfractibus & ſutura nodulosa diſtinctis, hinc inde quaſi abſciſſis & nodo agglutinatis, primo ſulcis ſtriatis notato.*

Fuſo. 90. M. teſta ventricoſa oblonga lævi : ſpira ſtriata ; anfractibus rotundatis, apertura lævi, cauda brevi.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 4. *f.* 3. Nifat.
Liſt. Conch. t. 914. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* E.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* I.
Martin. Conch. 4. *t.* 147. *f.* 1357.
Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, & *ad* Africæ *littora, teſta avellanæ magnitudine, raro* 1½ *pollicem ſuperante, alba maculis fuſcis aut fulvis interdum ſeriatis.*

Tulipa. 91. M. teſta ventricoſa oblonga lævi: anfractibus rotundatis ſutura geminata, columella biplicata, cauda patula ſtriata.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* K. Tulipa.

An hujus generis diſtinctæ ſpecies & cujus tribus ſunt teſtæ, quas Liſter *Conch.* *t.* 905. *f.* 24. a. *t.* 906. *f.* 26. *t.* 929. *f.* 23. & 24. *t.* 950. *f.* 44. c. *t.* 953. *f.* 2-3. *t.* 954. *f.* 4. & *t.* 962. *f.* 15. a. *a* Bonanni *recr.* & *muſ. Kircher.* *f.* 51. 58. 61. 77. 81. & 343. *recr.* 3. *f.* 273. 284. 185. 289. & 338. *muſ.* *Kircher.* 3. *f.* 275. 285. 286. 290. & 337. *a* Kleinio *oſtr. t.* 3. *f.* 57. 65. *t.* 5. *f.* 86. *t.* 7. *f.* 120. *a* Rumpf *muſ. t.* 24. *f.* 1. *a* Gualtieri *teſt. t.* 31. *f.* E. M. *t.* 43. *f.* R. S. *t.* 49. *f.* C. D. *t.* 51. *f.* I. *t.* 54. *f.* I. *t.* 56. *f.* L. & *t.* 57. *f.* B. C. F. *ab* Argenville *Conch. t.* 9. *f.* L. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 8. 49. 50. 54. 66-68. 78. *t.* 50. *f.* 52-53. *t.* 51. *f.* 36. *t.* 52. *f.* 8. 12-15. *t.* 24. 25. & *t.* 57. *f.* 29. 31. 32. *a* Knorr *Vergn.* 6. *t.* 26. *f.* 2. *t.* 35. *f.* 1. *t.* 40. *f.* 6. & *Petref.* 2. *t.* C. I. *f.* 8. & C. II. *f.* 11. *et muſ. Gottwald. t.* 34. *f.* 223. o. *et t.* 36. *f.* 231. c. *depictas dederunt?*

Liſt. Conch. t. 910. *f.* 1. & *t.* 911. *f.* 2.
Bonann. recr. 3. *f.* 187.
muſ. Kircher. 3. *f.* 186.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* H.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 71. *f.* 23-31.
Muſ. Gottwald. t. 29. *f.* 220. a. b.
Knorr Vergn. 5. *t.* 18. *f.* 5. & 6. *t.* 29. *f.* 1.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 35.
Martin. Conch. 4. *t.* 136. 137. *f.* 1286-1291.
β) *Gualt. teſt. t.* 46. *f.* E.

Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta utplurimum maculata & nebuloſa, intus tranſverſe ſtriata, anfractibus utplurimum bicinctis, rarius unicinctis.*

clathratus. 92. M. teſta oblonga caudata: plicis longitudinalibus ſubmembranaceis, ſulcata.
Liſt. Conch. t. 926. *f.* 19.
Klein. oſtr. t. 3. *f.* 67.

Habitat in mari, Iſlandiam *alluente, teſta magnitudine & facie Turbinis Clathri, at breviſſime caudata, plicis plurimis erectis, compreſſis, ſuperne inclinatis.*

Naſſa. 93. M. teſta ſolida nigra vel dilute fuſca: faſcia alba ſubdiaphana, anfractibus nodoſis, columella ſubplicata.
Liſt. Conch. t. 828. *f.* 50.
Valent. Abh. t. 8. *f.* 71.
Knorr Vergn. 6. *t.* 20. *f.* 7.
Martin. Conch. 4. *t.* 122. 123. *f.* 1131-1134.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 1.
Spengl. ſelt. Conch. t. 3. *f.* F.
Habitat rarus - - - inter volutas & murices quaſi intermedius.

plicatus. 94. M. ſpiræ anfractibus plicatis nodoſiſque.
Liſt. Conch. t. 939. *f.* 34. a.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 56.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 70.
Martin. Conch. 4. *t.* 123. *f.* 1141. 1142.
Habitat paulo rarior in India.

Scala. 95. M. teſta umbilicata: ſpiræ anfractibus diſtantibus cuneatis coſtatis tranſverſim ſtriatis, apertura cordata.
Muſ. Leeſſ. f. b.
Chemn. Conch. 4. *p.* 1. *vign.* 37. *f.* a. b. c.

Habitat rarus - - - *teſta ex rufeſcente alba, frequentius flava faſciis dilute fuſcis varia.*

Fiſcellum. 160. M. teſta angulata longitudinaliter plicata transverſim ſtriata: labro dentato, fauce violacea, cauda recta brevi.
Chemn. Conch. 10. *p.* 242. *t.* 160. *f.* 1524. 1525.
Habitat ad inſulam Pulo Condore, *prope* Sinam.

Corona. 161. M. teſta faſtigiata fuſco & flaveſcente faſciata: anfractibus ſupra planiuſculis; lamellis undoſis imbricatis, cauda recta integra. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 243. *t.* 161. *f.* 1526. 1527.
Davil. catal. raiſ. 1. *t.* 9. *f.* A.
Habitat in ſinu mexicano.

Dolarium. 96. M. teſta patulo-caudata ovata: anfractibus cingulis aliquot elevatis obtuſis.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 347.
Seb. muſ. 3. *t.* 49. *f.* 74? 75?
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Oceano, *teſta cornea, juglandis magnitudine, utrinque attenuata, cingulis pluribus obtuſis maxime elevatis cincta, duobus in ſpira anfractus, columella perforata, apertura ovata, anterius ſubtranſverſa, ad marginem exteriorem ſecundum cingula excavata, poſterius in canalem vix manifeſtum vixque emarginatum attenuata.*

corneus. 97. M. teſta oblonga: rudi anfractuum marginibus complicatis, apice tuberculoſo, apertura edentula, cauda adſcendente. *It. wgoth. t.* 5. *f.* 6. (*foſſilis.*)
Liſt. anim. angl. t. 3. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* F?
Habitat in mari ſeptentrionali & britannico, *teſta digito breviore, ſub cornea epidermide alba, pellucida, tranſverſim ſtriata, ſpiræ anfractibus* 8 *teretibus.*

lignarius. 98. M. teſta oblonga rudi: anfractibus obtuſe nodoſis: apertura edentula, cauda brevi rectiuſcula.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 32?
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 4.
Knorr Vergn. 6. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta vix digitum longa, lævi, rudi, anfractibus ſimplici nodorum ſerie.*

Trapezium. 99. M. teſta oblonga obtuſe angulata: anfractibus ſubnodoſis, apertura dentata, cauda breviore recta. *Muſ. Lud. Ulr.* 643. *n.* 325.

Rumpf muſ. t. 29. f. E. & t. 49. f. K. Pſeudopurpura.
Liſt. Conch. t. 931. *f.* 26.
Bonann. recr. 3. *f.* 287.
muſ. Kirch. 3. *f.* 288.
Gualt. teſt. t. 46. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* F.
Muſ. Gottwald. t. 28. *f.* 208. *& t.* 29. *f.* 210. 210. a. b.
Knorr Vergn. 4. *t.* 20. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 139. *f.* 1298. 1299.
β) *Liſt. Conch. t.* 920. *f.* 12.
Rumpf muſ. t. 29. *f.* G. *& t.* 49. *f.* F.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* T.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* H.
Muſ. Gottvald. t. 34. *f.* 22. a. b.
Knorr Vergn. 2. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f* 1310. 1311.
Schroet inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 10.
Habitat in Oceano indico, *teſta interdum ultra 6 pollices longa, apertura intus tranſverſim ſtriata, columella plicata, cauda extus rugoſa, anfractibus ſingulis linea gemina fuſca, & tuberculorum obtuſorum ſerie notatis.*

Veſpertilio. 100. M. teſta ſolida ventricoſa lævi: apertura oblongo-ovali, cauda ſpiraque coronata ſtriatis: anfractibus extimis canaliculatis.
Liſt. Conch. t. 884. *f.* 6. a. *& t.* 885. *f.* 6. b.
Valent Abh. t. 6. *f.* 57. 58.
Muſ. Gottwald. t. 31. *f.* 213. a.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1323. 1324. 1326. 1327.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 2.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 52. *f.* 6?
γ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 164. *f.* 1566. 1567.
Habitat in Oceano indico, *teſta ultra 4 pollices longa ſpadicea, intus incarnata.*

Scolymus. 101. M. teſta tenui diaphana ventricoſa tranſverſim ſtriata, dorſi medio lævi, ſpira obtuſe undulatimque nodoſa, columella triplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1325.
β) *Gualt. teſt. t.* 52. *f.* R?
Habitat - - - inter volutas & murices quaſi medius, teſta alba: ſpiræ anfractibus 9-10, *tuberculis intus cavis, cauda annulata.*

Harpa. 102. M. teſta ventricoſa longitudinaliter coſtata: coſtis tranſverſim ſtriatis, ſpira prominula; anfractibus diſtantibus.
Martin. Conch. 4. *t.* 142. *f.* 1328-1330.
Habitat - - -

Tuba. 103. M. teſta fuſiformi tranſverſim ſtriata alba: *ſpiræ apice* ſubfuſco, anfractibus diſtantibus baſi nodis coronatis.
Martin. Conch. 4. *t.* 143. *f.* 1333.
Habitat rarus in Sina, *teſta 6 fere pollices longa, cauda ſatis longa, ſpiræ anfractibus* 8.

ſyracuſanus. 104. M. teſta oblonga: anfractibus ſtriatis plicatis tuberculoſo-carinatis, apertura edentula, cauda brevi.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 80.
Habitat rariſſimus in mari mediterraneo, *anfractuum tectis teſtaceis, parietibus albis, cauda mediocri extrinſecus oblique ſtriata.*

craticulatus. 105. M. teſta oblonga: anfractibus rotundatis plicatis tranſverſim reticulatis, apertura dentata, cauda brevi.
Rondel. teſt. 89. Turbo angulatus.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta albida longitudinaliter ſubplicata: angulis elevatis ferrugineis, anfractibus ſtriis elevatis, apertura intus ſtriata.*

ſcriptus. 106. M. teſta ſubecaudata fuſiformi lævi pallida: ſtriis fuſcis longitudinalibus variis, labio dentato.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta oblonga, ſemine hordei paulo majore, ſtriis flexuoſis ſubpiceis notata.*

Ternatanus. 107. M. teſta tranſverſim ſtriata anfractibus diſtantibus undulatim tuberculatis, apertura oblonga, cauda recta longiuſcula.
Liſt. Conch. t. 892. *f.* 12.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 52. *f.* 5.
Muſ. Gottwald. t. 31. *f.* 211. a. b. c. *f.* 212. a. b. *& f.* 214.
Knorr Vergn. 6. *t.* 15. *f.* 4. *& t.* 26. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1304. 1305.
Habitat ad littora inſulæ Ternate, *teſta flava, ad 4 uſque pollices longa.*

Infundibulum. 108. M. teſta umbilicata undulatim nodoſa, ſtriis elevatis fuſcis varia, umbilico infundibuliformi columella biplicata.
Liſt. Conch. t. 921. *f.* 14.

Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 104.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 54.
Chemn. Conch. 4. *p.* 143. *vign.* 39. *f.* A.
Habitat rariſſimus - - - teſta 4 *pollices longa, ſpiræ anfractibus* 9.

ygonus, 109. M. teſta ſubventricoſa undulatim tuberculata ſtriata ſulcataque obtuſe multangula atra: apertura ovali, cauda brevi.
Liſt. Conch. t. 922. *f.* 15.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 75.
Gualt. teſt. t. 52. *f.* P.
Argenv. Conch. t. 10. *f.* L.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 222. g.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 4. & 6. *t.* 15. *f.* 5. & *t.* 37. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 140. *f.* 1306–1309. & *t.* 141. *f.* 1314–1316.
Habitat in Oceano indico, *infundibulo affinis, teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, nunc umbilicata, nunc umbilico nullo, columella nunc plicata, nunc læviſſima.*

landicus, 110. M. teſta tranſverſim ſtriata ſub epidermide fuſca nivea; ſpiræ apice papilloſo, anfractibus teretibus; primo prægrandi ventricoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1312. 1313.
Habitat frequens ad Iſlandiæ littora, *teſta ad* 5 *fere pollices longa, ſpiræ anfractibus* 6-9, *apertura oblonga, cauda brevi, labro acuto, columella lævi.*

lævigatus, 111. M. teſta fuſiformi: ſpiræ tranſverſim ſtriatæ anfractibus diſtantibus planiuſculis; primo tereti lævi, cauda longiuſcula.
Argenv. Conch. t. 29. *n.* 6. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1319. 2320.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis in Campania gallica *inventus, teſta ad* $3\frac{1}{4}$ *pollices longa, apertura ovali.*

foſſilis. 112. M. teſta fuſiformi tenui cancellata: cauda longa.
Martin. Conch. 4. *t.* 141. *f.* 1321. 1322.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat - - - foſſilis modo repertus prope Courtagnon Campaniæ gallicæ, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa, anfractibus nunc magis nunc minus diſtantibus, columella nunc plicata, nunc lævi.*

candidus. 113. M. teſta nivea tranſverſim ſtriata; ſpiræ anfractibus diſtantibus medio carinatis tuberculis coronatis, apertura ovali, labro intus ſulcato margine denticulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1339.
Habitat - - - teſta $9\frac{1}{2}$ *pollices longa.*

anſatus. 114. M. teſta fuſca tranſverſim ſtriata: ſpira mucronata: anfractibus convexis diſtantibus baſi nodoſis, cauda longa.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 62.
Martin. Conch. 4. *t.* 144. *f.* 1340.
Habitat - - - teſta $5\frac{1}{4}$ *pollices longa, ſtriis alternatim minoribus.*

undatus. 115. M. teſta ſolida ventricoſa undato-multangula tenuiſſime tranſverſim ſtriata, ſpira mucronata: anfractibus baſi nodoſis, labro denticulato.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1343.
Habitat rarus in India, *teſta alba,* $8\frac{1}{2}$ *pollices longa ponderoſa, ſpiræ anfractibus* 14, *cauda ſubincurva.*

longiſſimus. 116. M. teſta tenui ſtriata: ſpira obtuſa nodoſa, cauda longa rectiſſima.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1344.
Habitat rarus in India, *teſta alba* 9 *pollices longa, ſpiræ anfractibus* 10; *nodis crebrioribus humilioribus, quam in undato.*

Lancea. 117. M. teſta anguſta: ſpiræ anfractibus tranſverſim coſtatis longitudinaliter crenatis, apertura ovata intus albo-coſtata margine dentata, columella biplicata.
Martin. Conch. 4. *t.* 145. *f.* 1347.
Habitat in Amboina, *teſta inter murices tenuiſſima & anguſtiſſima, juniorum rubella, adultiorum alba, coſtarum interſtitiis & apertura violaceis, ſpiræ anfractibus* 11-13.

anguſtus. 118. M. teſta anguſta: ſpiræ anfractu primo longitudinaliter plicato tranſverſim coſtato; reliquis lævibus teretibus, cauda tranſverſim coſtata.
Valent. Abh. t. 1. *f.* 6.
Habitat - - - Lanceæ affinis.

verſicolor. 119. M. teſta ſubcylindrica: ſpira obtuſa; anfractibus teretibus ſtriatis inferioribus ceterum glabris.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 1.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1348.

Habitat in India, *teſta fuſca varia, rarius nivea, ſpiræ anfractibus* 9.

Verrucoſus. 120. M. teſta umbilicata cingulis, mediis elatioribus, cincta: anfractibus tuberculis fuſco maculatis coronatis, cauda inflexa.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1349. 1356.
α) *Martin. Conch.* 4. *t.* 144. *f.* 1341.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 88.
γ) *Muſ. Gottwald. t.* 43. *f.* 221. e?
Habitat in mari rubro.

Hiatulus. 121. M. teſta tenui tranſverſim ſtriata: ſpira mucronata; anfractibus teretibus, cauda longa, apertura ovata, labro crenulato.
Muſ. Gottwald. t. 34. *f.* 221. c. d.
Martin. Conch. 4. *t.* 146. *f.* 1351. 1352.
Habitat - - - *teſta 4 pollices longa: epidermide fuſca.*

Pardalis. 122. M. teſta rotundata alba violaceo maculata longitudinaliter coſtata tranſverſim ſtriata: ſpira obtuſa, cauda elongata.
Knorr Vergn. 2. *t.* 3. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 149. *f.* 1384.
δ) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 145.
Habitat - - -

Gigas. 123. M. ſpiræ anfractibus turgidis gibbis nodoſis annulatis, cauda reflexa, labro inferne denticulato.
Liſt. Conch. t. 931. a.
Habitat - - - *teſta* 21 *pollices longa.*

[...]gnoſus. 124. M. teſta albida: ſpira obtuſa: anfractibus ſubcoronatis tuberculis rugoſis inæqualibus, cauda tranſverſim ſtriata.
Gualt. teſt. t. 52. *f. O.*
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

Globulus. 125. M. teſta turrita aurantia: ſpira obtuſa; anfractibus diſtantibus longitudinaliter coſtatis tranſverſim flexuoſe ſtriatis, cauda brevi.
Knorr Vergn. 5. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat rarus - - - *an varietas polygoni?*

Granulatus. 126. M. teſta turrita: ſpiræ anfractibus contiguis linea flexuoſa diſcretis; primo ventricoſo.
Knorr Vergn. 5. *t.* 14. *f.* 4.
Habitat in mari adriatico.

Vexillum. 127. M. teſta turrita tranſverſim coſtata : ſpiræ anfractibus convexis, apertura ovali, labro denticulato, cauda brev.

Knorr Vergn. 6. t. 26. f. 5.

Habitat - - - teſta aurantia : cingulis fuſcis.

vulpinus. 128. M. teſta oblonga ventricoſa : anfractuum margi ſtriato, apertura glabra, cauda brevi extrorſum flex.

v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. I. *p.* 318. 319. *t.* 11. *f.* 10. 11.

Habitat - - - teſta ſpadicea mediæ magnitudinis, ſpiræ anfractibus 8.

afer. 129. M. teſta ovata tranſverſim ſtriata : ſpiræ anfractibus planiuſculis tuberculorum rotundatorum ſerie coronatis.

Adanſ. Seneg. 1. *p.* 125. *t.* 8. *f.* 18. Lipin.

Habitat ad Senegal, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, fulva aut alba fuſcoque varia, ſpiræ anfractibus* 9.

campanicus. 130. M. teſta ventricoſa : ſpira obtuſa cancellata ; anfractibus carinatis, primo ventricoſo caudaque longa lævibus.

Argenv. Conch. t. 29. *n.* 6. *f.* 5.

Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 8. *f.* 7.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis in Campania gallica *inventus, teſta* 3 *pollices longa.*

arenoſus. 131. M. ſpiræ anfractibus decuſſatim coſtatis : primo præ grandi, tribuſque extimis lævibus, cauda acuta, apertura ovali, labro exterius dentato.

Spengl. n. Samml. Schr. daen. Geſ. I. *p.* 373. *t.* 2. *f.* 8.

Habitat in arena littorea Indiæ, *teſta minuta.*

maroccenſis. 132. M. teſta anguſtata ſubfuſca tranſverſim ſtriata : ſpira mucronata : anfractibus diſtantibus contrariis tereti bus longitudinaliter coſtatis, cauda prominula, apertura ovali.

Martin. n. Mannigfalt. 4. *p.* 422. *t.* 2. *f.* 17-19.

Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 6.

Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 896.

Habitat frequens ad littus maroccenſe, *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicem longa.*

An diſtinctæ hujus tribus ſpecies teſtæ, quas Liſter *Conch. t.* 913. *f.* 5. *t.* 914. *f.* 6. *t.* 921. *f.* 14. *t.* 924. *f.* 16. *t.* 926. *f.* 20. *t.* 927. *f.* 21. *t.* 930. *f.* 25. *t.* 932. *f.* 27. *t.* 935. *f.* 28. *t.* 926. *f.* 31. *t.* 950. *f.* 44. b. & *t.* 1057. *f.* 2. Klein *oſtr. t.* 3. *f.* 62. & 68. Bonanni *recr.* & *muſ. Kircher.* 3. *f.* 47. 53. 72. 76. 77. & 145. Gualtieri *teſt. t.* 46. *f.* D. *t.* 50. *f.* B. *t.* 52. *f.* A. H. Q. S. Argenville *Conch. t.* 9. *f.* S. & *t.* 10. *f.* N. Seba *muſ.* 3. *t.* 49. *f.* 60. & *t.* 52. *f.* 7. & 9. & Muſ. Gottwald. *t.* 31. *f.* 210. c. & 213. b. *t.* 34. *f.* 221. b. 221. d. 222. e. 222. *f.* 222. h. 222. i. & 223. a. b. *delineatas ſiſtunt?*

...catus. 166. M. teſta oblonga albida tranſverſim rufeſcente ſtriata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 278. *t.* 164. *f.* 1572.

Habitat ad novam Seelandiam.

...rron. 167. M. teſta ſubturrita: anfractibus ſupra carinatis, marginatis, complanatis, cauda recta elongata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 278. *t.* 164. *f.* 1573. 1574.

Davil. cat. raiſ. 1. *t.* 5. *f.* L.

Habitat in Oceano auſtrali.

...iva. 163. M. teſta cylindrica: ſpira cingulo calloſo-crenato; anfractibus ſuperioribus plicato-nodoſis, inferioribus planiuſculis, cauda recta brevi emarginata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 280. *t.* 164. *f.* 1575. 1576.

Habitat - - -

...itoideus. 169. M. teſta ſolida craſſa rudi: ſpira exſerta anfractibus tranſverſim ſtriatis, apertura ſemiorbiculata ſtriata, cauda brevi recta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 280. *t.* 165. *f.* 1577. 1578.

...iſmaticus. 170. M. teſta ovato-angulata longitudinaliter ſulcata plicataque irideſcente, cauda recta, labro denticulato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 282. *t.* 169. *f.* 1635. 1636.

Martyn Conch. 1. *f.* 2.

Habitat in Oceano indico & auſtrali.

Columbarium. 171. M. teſta longitudinaliter plicato-coſtata tranſverſimque ſulcata angulata ſpinoſa, carinata alternatim albo fuſcoque varia, anfractibus gradatis, cauda recta brevi, fauce violacea. *Chemn. Conch.* 18. *p.* 284. *t.* 169. 1637. 1638.

Martyn Conch. 1. *f.* 4.

Habitat ad inſulam Pulo Condore.

...perrimus. 172. M. teſta fuſco, flavo alboque varia coſtata; anfractibus obliquis margine tuberculatis: faſcia media fuſca, altera alba cauda brevi dilatata adſcendente. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 137. *n.* 4. *t.* 9. *f.* 7.

Habitat - - - *teſta* 2 *fere pollices longa.*

...dulatus. 173. M. teſta alba badio undulata ſulcata: ſulcis elevato-ſtriatis, anfractibus margine noduloſis, cauda recta. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 138. *n.* 5. *t.* 10. *f.* 1.

Habitat in mari rubro, *teſta ultra* 4 *pollices longa.*

η Turriti *ſubulati, cauda breviſſima.*

Vertagus. 133. M. ſpiræ anfractibus ſuperne plicatis, cauda adſcendente, columella intus plicata.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* K. Strombus caudatus albus.
Petiv. gaz. t. 56. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 1020. *f.* 83.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 84.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* P.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 118.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 22. & 42. & *t.* 51. *f.* 24. 33. 34.
Knorr Vergn. 6. *t.* 40. *f.* 4. 5.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 28.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. 157. *f.* 1479. 1480.
β) *Liſt. Conch. t.* 1021. *f.* 85. b.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* F. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 43. 44.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 3. & 5. *t.* 15. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1481. 1482.
Habitat in India, *teſta alba* 3 *circiter pollices longa, forma digiti, ſpiræ anfractibus teretibus,* 15 *& pluribus, ſulco diſcretis, inferioribus altera parte lævibus cauda breviſſima.*

Aluco. 134. M. ſpiræ anfractibus tuberculatis: ſtria media ſpinoſa, columella uniplicata, cauda adſcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 643. *n.* 326.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* O. Strombus angulosus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 2. Cerite.
Liſt. Conch. t. 1025. *f.* 87.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 67. 69.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* G.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 15. 16. 36.
Knorr Vergn. 1. *t.* 16. *f.* 4.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1473-1477.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 13.
β) *Argenv. Conch. t.* 11. *f.* H. Eruca contabulata.
Liſt. Conch. t. 1017. *f.* 79.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* N.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 37. 39. & *t.* 51. *f.* 22. 23 25.
Knorr Vergn. 3. *t.* 16. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 156. *f.* 1478.
γ) *Spengl. Naturf.* 9. *t.* 5. *f.* 3.

Favann. Conch. t. 79. f. N.
Chemn. Conch. 10. *t.* 162. *f.* 1548. 1549.
δ) *Schroet. Fluſconch. t.* 8. *f.* 11. 12.
ε) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 82.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 57. *f.* B?
Habitat in Oceano auſtrali indico, mari rubro, atlantico, *teſta ad 4 pollices longa, utplurimum exalbida, guttis cæruleis vel ſubfuſcis conſperſa, anfractibus tranſverſim ſtriatis, labro rotundato, apertura ovali.*

ularis. 135. M. ſpiræ anfractibus cingulatis: cingulis longitudinaliter, anfractu primo tranſverſim ſtriato, cauda adſcendente.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1486.
Habitat - - -

icatulus. 136. M. teſta ventricoſa: ſpira tranſverſim ſtriata; anfractibus longitudinaliter nodoſo-plicatis, apertura ovali.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1488.
Habitat - - - teſta flavicante: plicis albis, ſpiræ anfractibus 8, *columellæ ruga ſolitaria.*

rdidus. 137. M. teſta ventricoſa tranſverſim ſtriata nodis atris coronata: labro ſubalato.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1490.
Habitat - - - teſta utplurimum cæruleſcente, cauda vix prominula; an forſan ſtrombi tuberculati varietas?

gulatus. 138. M. ſpira tranſverſim ſtriata ſulcataque: anfractibus granulis trifariam cinctis; primo ſubnodoſo.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1492.
Habitat Tranquebariæ.

cus. 139. M. teſta fuſca rotundata: ſpiræ anfractu primo gibbo, ſequentibus varicoſis, extimis multifariam ſpinoſis.
Liſt. Conch. t. 120. *f.* 15.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 38.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 10. *f.* 54.
Habitat in - - - fluviis.

iatus. 140. M. teſta tranſverſim ſtriata: ſpira coronata.
Liſt. Conch. t. 121. *f.* 16.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 10. *f.* 55.
β) *Liſt. Conch. t.* 121. *f.* 17.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 39.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 10. *f.* 56.
Habitat in Africæ fluviis.

fluviatilis. 141. M. teſta fuſca : ſpiræ anfractibus primis ſpinis, reliqui nodis coronatis, apertura repanda.
Liſt. Conch. t. 122. *f.* 20.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 11. *f.* 58.
Habitat in - - - fluviis.

alatus. 142. M. teſta reticulata : ſpira mucronata ; anfractu prim ſulcato & tranſverſim ſtriato, labro alato.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1503. 1504.
Habitat - - - ſpira annulata : anfractibus 6 faſcia ſtriat cinctis.

nodulofus. 143. M. teſta tranſverſim ſtriata alternatim fuſco alboque faſciata : ſpira mucronata ; anfractibus diſtantibus un dulato-nodoſis.
Martin. Conch. 4. *t.* 159. *f.* 1505. 1506.
Habitat - - - labro prominulo.

Terebella. 144. M. ſpiræ anfractibus ſingulis cingulo triplici monilifor mi, apertura ovali intus arcuatim ſtriata.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 155. *f.* 1458-1460.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 2.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 327.
muſ. Kircher. 3. *f.* 328.
γ) *v. Born. muſ. Caſ. Vindob. teſt. p.* 329. *t.* 11. *f.* 16.
Habitat - - - teſta pollicem ad $2\frac{1}{2}$ *longa, nunc ſpadice nunc fuſca, nunc ex ſpadiceo alba, nunc unicolor, nu ſpadicea cingulis albis, nunc alba cingulis ſpadiceis apertura interdum ex cæruleo alboque varia.*

fuſcatus. 145. M. ſpiræ anfractibus crenulatis : ſtria ſuperiore denticu lata.
Gualt. teſt. t. 56. *f.* H.
Argenv. Conch. t. 11. *f. ult.*
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſub epidermide fuſca al ba, baſi obtuſa, anfractibus ſingulis medio cingulo nodo ſo, utrinque faſcia altera granulata, altera crenulat*

An hanc muricum familiam quoque ſpectant teſtæ a Liſtero *Conch. t.* 1019. *f.* 82. *t.* 1024. *f.* 90. & 91. *a* Bonanni *recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 81. 83. & 344. *a* Klein *oſtr. t.* 7. *f.* 120. *a* Gualtieri *teſt. t.* 56. *f.* E. L. *f.* F. & *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 50. *f.* 20. 21. 26. 27. 32-36. 38. 40. 41. 45. & 53. & *t.* 51. *f.* 26-30. *an diſtinctæ ſpecies ?*

146. M.

toruloſus. 146. M. ſpiræ anfractibus ſuperne zona toruloſa, cauda brevi.
Habitat - - - teſta alba lævi vel obſolete longitudinaliter ſtriata, apice plicata, anfractuum zona elevata, gibba, obtuſa.

Radula. 147. M. ſpiræ anfractibus tuberculatis: ſtriis duplici ſerie punctatis.
Schroet. Einl. in Conch. I. p. 539. t. 3. f. 6.
Habitat in mari africano, *teſta rubella, fuſca, vel ſubfuſca, tuberculis ſæpe apice albis, apertura ovali.*

aſper. 148. M. ſpiræ anfractibus ſulcatis tranſverſim ſtriatis muricatis, cauda adſcendente.
Schroet. Einl. in Conch. I. *p.* 540. *t.* 3. *f.* 7.
Habitat ad Guineam, *teſta lactea, ſeriatim fuſco punctata, ſolida: ſulcis longitudinalibus* 12-14, *apertura ſubovali, columellæ plica ſolitaria.*

granulatus. 149. M. teſta tuberculis decuſſatim adſperſa: cauda acuta adſcendente.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* L. Strombus caudatus anguloſus.
Liſt. Conch. t. 1020. *f.* 84.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* K.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 119.
Seb. muſ. 3. *t.* 51. *f.* 35.
Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1483.
Habitat in India, *teſta* 2 *pollices longa, alba anfractibus longitudinaliter coſtatis tranſverſim ſtriatis, apertura ovali, columellæ plica unica.*

decollatus. 150. M. ſpiræ anftactibus longitudinaliter plicato ſulcatis: apice decollato.
Habitat - - - helici decollatæ ſimilis, at baſi emarginata, apertura obovata, anfractuum margine ſuperiori attenuato: ſtriis longitudinalibus plicis imbricatis: ſulcis ipſis atris opacis.

moluccanus. 151. M. teſta ſtriata: ſpiræ anfractibus tranſverſim ſulcatis longitudinaliter undulatim plicatis, labro ſubulato crenulato, cauda tubuloſa.
Liſt. Conch. t. 1021. *f.* 85.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 68.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* T.
Gualt. teſt. t. 57. *f.* E.

Martin. Conch. 4. *t.* 157. *f.* 1484. 1485.
Habitat in inſularum moluccarum uliginoſis.

minimus. 152. M. teſtæ ſtriis tranſverſis undulatis lineas longitudinales decuſſantibus, apertura orbiculata.
Liſt. Conch. t. 1018. *f.* 81.
Habitat in mari Jamaicam circumfluente.

ſtrigilatus. 153. M. teſta longitudinaliter ſtriata: anfractibus indiviſis cingulo ſuturali niveo rufo maculato. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. ind. p.* 260. *t.* 10. *f.* 10.
Habitat - - -

tuberculatus. 154. M. teſta tranſverſim ſtriata nodis glabris cincta: labro incraſſato. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 28. *t.* 10. *f.* 16. 17.
Habitat - - - teſta ſolida, ſubgibba, obtuſa: nodis nigris, apice albis.

gibboſus. 155. M. ſpiræ anfractibus marginatis, ventre gibbo, labro fiſſo denticulato, cauda brevi. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 325. *t.* 11. *f.* 12. 13.
Habitat - - - ſpiræ anfractibus 9 *tranſverſim ſtriatis, longitudinaliter plicatis, cauda recta alba, maculis rubellis varia.*

atratus. 156. M. teſta atra: anfractibus tranſverſim ſtriatis tuberculatis, columella uniplicata, cauda recta. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p.* 329. *t.* 11. *f.* 17. 18.
Habitat - - - ſpiræ anfractibus 10, *labro crenulato.*

contrarius. 157. M. teſta patulo-caudata contraria, ſtriis geminatis.
Mant. p. 551.
Liſt. Conch. p. 950. *f.* 44. b. c.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *n.* 399.
Regenſ. Conch. 2. *t.* 4. *f.* 36.
Mant. n. Mannigf. 4. *t.* 2. *f.* 14.
Favann. Conch. t. 32. l. N. *t.* 79. l. F. *t.* 80. l. R.
Chemn. Conch. 9. *t.* 105. *f.* 894. 895.
Habitat in mari ſeptentrionali.

eburneus. 158. M. teſta contraria hyalina: anfractibus ſex ſubtiliſſime crenulatis. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 66. *t.* 105. *f.* 89
Habitat in mari - - -

conditus. 174. M. teſta turrita granulis ſcaberrima: labro duplicato utrinque emarginato intus dentato, apertura ovali ſtriata. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 254. *t.* 162. *f.* 1544. 1545.
Habitat - - - Aluconi affinis.

Clava. 162. M. teſta tranſverſim ſtriata maculata, anfractibus plicato-nodoſis, cauda adſcendente, labro duplicato dilatato, labio replicato glabro. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 256. *Vign.* 22. *f.* A. B.
Martyn Conch. 2. *f.* 57.
Habitat ad inſulam Pulo-Condore *prope* Sinam.

hexagonus. 163. M. teſta flaveſcente hexagona tranſverſim granulatim ſtriata: anfractu primo tuberculato, apertura ſubrotunda, labro dilatato. *Chemn. Conch.* 10. *t.* 162. *f.* 1554. 1555.
Habitat in mari auſtrali, *frequentior inter petrefacta.*

326. TROCHUS. *Animal* Limax.

Teſta univalvis ſpiralis ſubconica.
Apertura ſubtetragono-angulata ſ. rotundata ſuperius tranſverſa coarctata; columella obliquata.

* Umbilicati *erecti, columellæ perforata.*

niloticus. 1. Tr. teſta conica læviuſcula ſubumbilicata.
Ol. muſ. t. 29. *f.* 5.
Liſt. Conch. t. 617. *f.* 3. *t.* 619. *f.* 5. & *t.* 620. *f.* 6.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 102.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* A. & 3. 4.
Gualt. teſt. t. 59. *f.* B. C.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* C.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 265. a. b. c.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 42.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12. *f.* 4. & 2. *t.* 5. *f.* 1. & *t.* 6. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* C. *t.* 167. *f.* 1605-1609. & *t.* 168. *f.* 1614.
Habitat rarior in Oceano indico, *congeneribus major, teſta ponderoſa, ſtriis oblique perpendicularibus rubris, etiam ſubtus picta, detracta extima tunica tota argentea; apice*

obſolete noduloſo, anfractibus minime nodoſis, apertura argentea, labro interiore obſolete bilobo; a maculato teſtæ fauce lævi, columella non denticulata, baſi ventris convexa lævi diſtinctus.

macula-tus. 2. Tr. teſta conica tuberculata: umbilico obliquo, labio interiore obſolete bilobo. *Muſ. Lud. Ulr.* 644. *n.* 327.*
Rumpf muſ. t. 21. *f.* B. Trochus maculoſus.
Liſt. Conch. t. 632. *f.* 20?
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 96.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* DD.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 266. a? b?
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1615-1618.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 648. *t.* 3. *f.* 9.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 169. *f.* 1623. 1624.
γ) *Rumpf muſ. t.* 21. *f.* C?
Habitat in mari, Aſiam Americamque auſtralem *alluente, teſta magnitudinis variæ, ponderoſa, tuberculis feriatis variæ altitudinis cincta, radiis rubris, fuſcis, albis, viridibus varia, ſpiræ anfractibus* 9 *planiuſculis.*

perſpecti-vus. 3. Tr. teſta convexa, obtuſa marginata: umbilico pervio crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 646. *n.* 329.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* L. Umbilicata.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* M. Solarium.
Liſt. Conch. t. 636. *f.* 24.
Pet. amb. t. 2. *f.* 14.
Bonann. recr. 3. *f.* 27. 28.
muſ. Kircher. 3. *f.* 26. 27.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* O.
Leſſer teſtaceoth. f. VII.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 1. 2. 13. 14. 28. 41. 42.
Knorr Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 1. 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 61.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 326. *vign. f.* b.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* E. *t.* 172. *f.* 1691-1696.
Schroet. Journ. 5. *p.* 431. *f.* 8.
β) *Liſt. Conch. t.* 633. *f.* 21.
γ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* D.
δ) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 196?
ε) *Bonann. recr.* 3. *f.* 211?
muſ. Kirch. 3. *f.* 210?
ζ) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 213?

Habitat ad Aſiæ auſtralis & Africæ *littora, teſta* $2\frac{1}{4}$ *pollices ex diametro, & pollicem alta, altero latere plana, umbilico infundibuliformi cingulo granulato duplici, ſtupendo naturæ artificio.*

hybridus. 4. Tr. teſta convexa, columella bidentata, umbilico crenulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 646. *n.* 330.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1702?-1705?
Habitat in mari mediterraneo, *perſpectivo affinis, at teſta minore albo fuſcoque varia, ſubtus tota alba, umbilico anguſtiore.*

cruciatus. 5. Tr. teſta convexa: ſtriis calloſo-punctatis, columella unidentata. *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1674.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 653. *t.* 3. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ferruginea aut rubella, avellana minore, faſciis albidis, ſpiræ anfractibus* 4-5.

Pharaonis. 6. Tr. teſta ſubovata ſtriata: punctis concatenatis globoſis, columella aperturaque dentata, umbilico crenato. *Muſ. Lud. Ulr.* 647. *n.* 331.*
Rondel. teſt. 104. Umbilicus varius.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* L. Q. Camiſole.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 3. Vaſſat.
Liſt. Conch. t. 637. *f.* 25.
Petiv. gaz. t. 14. *f.* 10.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 222. 223.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* B.
Knorr Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 6. & 4. *t.* 26. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1672. 1673.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1678.
Habitat rarior in mari rubro, mediterraneo, & *ad* Braſiliæ *littora, teſta rubra, ſtriis ex punctis concatenatis obſita, alternatim ex albis nigriſque, & ex rubris.*

Magus. 7. Tr. teſta oblique umbilicata convexa: anfractibus obtuſe noduloſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 647. *n.* 332.*
Argenv. Conch. t. 8. *f.* S. Sorciera.
Liſt. Conch. t. 641. *f.* 32.
Gualt. teſt. t. 62. *f.* L. *t.* 64. *f.* C?
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 4-6.
Knorr Vergn. 6. *t.* 27. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1656-1660.
β) *Adanſ. ſeneg.* 1. *t.* 12. *f.* 8? Datat.

Habitat rarior in mari mediterraneo & rubro, *teſta cinerea aut rubra nebuloſa, ſpiræ anfractibus 4-5 longitudinaliter nodoſis, obſolete ſtriatis.*

Modulus. 8. Tr. teſta ſtriata ſupra plicata, ſubtus convexiore: apertura obovata unidentata.
Liſt. Conch. t. 653. f. 52.
Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1665.
Schroet. Einl. in Conch. 1. p. 656. t. 3. f. 11.
β) *Liſt. Conch. 653. f. 53.*
γ) *Liſt. Conch. t. 654. f. 54.*
Habitat in mari rubro, *pharaonii magnitudine, teſta ſublenticulari, albida, purpuraſcenti-maculata: fauce ſtriata. Muſ.*

murica-tus. 9. Tr. teſta ſubumbilicata ovata: tuberculis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr. 648. n. 333.**
Gualt. teſt. t. 64. f. H.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta avellanæ magnitudine alba: apertura ovata, lævi; umbilico minuto oblongo.*

ſcaber. 10. Tr. teſta ſubovata: ſulcis alternis majoribus moniliformibus. *Muſ. Lud. Ulr. 648. n. 334.**
Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1667?
Habitat - - - mago affinis, teſta nigricante: apertura flaveſcente.

varius. 11. Tr. teſta oblique umbilicata convexa: anfractibus ſubmarginatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta pallida: faſciis cineraſcentibus, obſoleto margine cincta.*

cinera-rius. 12. Tr. teſta oblique umbilicata ovata: anfractibus rotundatis. *Fn. ſuec. 2167. Müll. zool. dan. 3. p. 35. t. 102. f. 1-4. prodr. 2925. O. Fabr. Fn. groenl. p. 399. n. 388.*
Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1686.
Habitat in mari mediterraneo & norwegico, *teſta cinerea: faſciis obliquis pallidis, aut alba: maculis ſubſpadiceis.*

divarica-tus. 13. Tr. teſta ſubumbilicata ovata: anfractu infimo remotiore, umbilico ſubconſolidato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 392. n. 389.*
Habitat in mari mediterraneo & groenlandico, *teſta viridi, punctis ſanguineis faſciata.*

umbilica-ris. 14. Tr. teſta cylindrico-umbilicata conica-convexa; anfractu ſubemarginato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1666.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta cinerea aut ferruginea nebuloſa: umbilico pervio exacte cylindrico, intus albo.*

olatis. 15. Tr. teſta convexo conica: anfractibus ſpinoſo radiatis, apertura ſemicordata. *Muſ. Lud. Ulr.* 645. *n.* 328.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* K. Zonnehooren.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 419. *t.* 2. *f.* 15.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1700. 1701.
β) *Liſt. Conch. t.* 622. *f.* 9.
Bonann. recr. 3. *f.* 366. 367.
muſ. 3. *f.* 359. 360.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 19.
Leſſer teſtaceoth. f. 15.
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 1-4.
Knorr Vergn. 4. *t.* 8. *f.* 2. & C. *t.* 26. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 174. *f.* 1716. 1717.
Schroet. Journ. 5. *f.* 9. (*Operc.*)
Habitat rariſſimus in India, β) *minus rarus in* mari Americam auſtralem *alluente, teſta diametri* 2 *pollicum, tranſverſim ſtriata, baſi arcuatim, albida,* β) *aurata fuſco radiata.*

Tectum. 16. Tr. teſta depreſſa obliqua alba fuſco lineata: ſpira tranſverſim ſtriata longitudinaliter coſtata; anfractu primo ventricoſo, apertura orbiculari.
Liſt. Conch. t. 653. *f.* 51.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* 6.
Knorr Vergn. 4. *t.* 6. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1567. 1568.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 165. *f.* 1569. 1570?
γ) *Liſt. Conch. t.* 654. *f.* 54.
Favann. Conch. 2. *t.* 8. *f.* D.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 12. *f.* 1.
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1583. 1584.
Habitat - - - turbini affinis columellæ limbo fuſco, anfractu primo reliquis duplo majore: an helicis potius ſpecies?

Conus. 17. Tr. teſta conica alba rubro maculata: ſpiræ anfractibus teretibus: cingulis granulorum moniliformibus.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1610.
Habitat in India, *umbilico tantum ſpiræ primum anfractum tranſeuntem.*

ſpinoſus. 18. Tr. teſta ſubæquali mucronata: ſpiræ anfractibus inferne ſpinoſis, faſcia utrinque albo nigroque lineata, cinguloque nodulorum triplici.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1611.
Habitat rariſſimus - - - teſta mediæ magnitudinis violacea & nigricante, ſpiræ anfractibus 9.

jujubinus. 19. Tr. teſta lateritia albo-maculata: baſi plana lineis concentricis punctorum concatenatorum: anfractibus canaliculatis margine inferiore albo ſpadiceoque teſſellatis, utrinque punctis elevatis cinctis.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 269?
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1612. 1613.
Habitat rarus ad inſulam S. Mauritii, *& in* mari *Americam auſtralem alluente, zizyphino affinis.*

Alveare. 20. Tr. teſta plicato-noduloſa granulatim tranſverſim ſtriata cinguliſque punctorum concatenatorum exornata, umbilico infundibuliformi, columella crenulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1619.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* P.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 168. *f.* 1622.
Habitat in India, *teſta dilute viridi & alba, intus margaritacea, ſubtiliter annulata.*

concavus. 21. Tr. teſtæ baſi & umbilico continuo infundibuliformi, ſpiræ anfractibus contiguis undulatim plicatis, apertura margine denticulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 168. *f.* 1620. 1621.
β) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* A.
γ) *Liſt. Conch. t.* 627. *f.* 13.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 20.

Huic tribui trochorum adſcribendæ quoque, an diſtinctæ ejus ſpecies, quas Liſter Conch. t. 61. *f.* 58. *t.* 583. *f.* 37. *t.* 585. *f.* 44. *t.* 616. *f.* 2. *t.* 618. *f.* 4. *t.* 621. *f.* 7. & 8. *t.* 623. *f.* 9. a. *t.* 626. *f.* 11. a. *t.* 629. *f.* 15. *t.* 630. *f.* 16. *t.* 631. *f.* 18. *t.* 632. *f.* 19. *t.* 633. *f.* 21. *t.* 638. *f.* 26. *t.* 639. *f.* 27. & 28. *t.* 640. *f.* 29. *t.* 641. *f.* 31. *t.* 643. *f.* 35. *t.* 646. *f.* 39. *t.* 648. *f.* 42. *t.* 648. *f.* 43. & *t.* 654. *f.* 54. Bonanni *recr. & muſ. Kirſcher.* 3. *f.* 89. 94. 95. 97. 98. 170. 171. 195. 196. 202. 207. 213. 341. 396. *recr.* 3. *f.* 211. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 210. Klein *oſtr. t.* 2. *f.* 35. Rumpf *muſ. t.* 21. *f.* 1. 2. *nr.* 3. *f.* 5. *nr.* 5. *f.* 6. *nr.* 6. *t.* 21. *f.* 8. *nr.* 8. *f.* 9. *nr.* 9. 10. *f.* 10. Gualtieri *teſt. t.* 60. *f.* A C. R. *t.* 61. *f.* A. H. I. L. & *t.* 65. *f.* L. M. Argenville *Conch. t.* 8. *f.* K. R. & *t.* 27. *f.* 4. *zoomorph. t.* 3. *f.* D. Seba *muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 2. Knorr *Vergn.* 1. *t.* 12. *f.* 1. 2. *t.* 2. *f.* 4. 5. 4. *t.* 8. *f.* 2. & *t.* 23. *f.* 2. & 6. *t.* 27. *f.* 5. & Regenfus *Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 27. *delinearunt?*

Habitat in India, *teſta* 2 *circiter pollices lata & alta, ex thalaſſino, rubro & violaceo miſta, apertura utrinque compreſſa.*

ernus. 22. Tr. teſta granulis nodiſque cincta viridi apicem verſus albicante, apice ipſo guttis nigris vario.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1625. 1626.
Habitat in India.

conſperſus. 23. Tr. teſta maculis albis, virentibus & cervinis, apice rubris nigriſque varia, intus margaritacea, baſi alba ſanguineo maculata anfractibus multifariam nodulofis margine inferiori glabris.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* B.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1627.
Habitat in India.

Tentorium. 24. Tr. teſta rugoſo plicata ſub epidermide hyalina thalaſſina intus margaritacea, anfractibus inferne nodulofis, medio punctis concatenatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1628.
Habitat in India, *anfractibus* 2 *primis quam maxime diſtantibus, umbilico infundibuliformi.*

ochroleucus. 25. Tr. teſta plicato rugoſa oblique crenata tranſverſim ſtriata, baſi plana alba ſanguineo guttata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1629.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 169. *f.* 1632.
Habitat in India.

ſtellatus. 26. Tr. teſta plicato-rugoſa thalaſſina: ſpiræ anfractibus punctis concatenatis: ſupremis margine radiato-ſpinoſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1630.
Habitat in India.

Spengleri. 27. Tr. nodulis graniſque ochroleucis rubro undatis multifariam cincta, baſi altera parte lævi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1631.
Habitat – – –

coſtatus. 28. Tr. teſta punctis elevatis concatenatis: anfractibus infra nodis oblongis albis: ſulcis intermediis purpureis.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* T.
Chemn. Conch. 5. *t.* 169. *f.* 1633. 1634.
Habitat – – – *teſtæ baſi alba ſtriata punctataque, ſpiram verſus rubro radiata.*

inæqualis. 29. Tr. teſta nodis graniſque inæqualibus aſpera: anfractibus multifariam nodoſis: ordine utroque marginali tuberculis majoribus.
Gualt. teſt. t. 60. f. O.
Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1635. 1636.
Habitat - - - teſta utplurimum viridi ſpadiceo nebuloſa & radiata, baſi alba granuloſa, radiis roſeis.

regius. 30. Tr. teſta tranſverſim ſtriata multifariam nodoſa alba roſeo obumbrata, anfractuum margine utroque prominulo umbilico infundibuliformi.
Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1637.
Habitat - - - teſtæ baſi plana alba, ſtriis concentricis granulatis cincta.

verrucoſus. 31. Tr. teſta conica alba purpureo radiata, umbilico infundibuliformi immaculato, anfractuum margine nodoloſo.
Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1638.
Habitat - - -

cylindricus. 32. Tr. teſta cylindrica ſubfuſca: anfractibus convexis; ſtriis tranſverſis crenulatis, umbilico ſubcrenato.
Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1639. a. b.
Habitat rarus - - - teſta mediæ magnitudinis.

radiatus. 33. Tr. teſta pyramidali rubro radiata: anfractibus punctis concatenatis, umbilico infundibuliformi.
Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1640.
β) *Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1641.*
γ) *Chemn. Conch. t. 170. f. 1642. α. β.*
δ) *Gualt. teſt. t. 61. f. E.*
Habitat in America *auſtrali*, inſuliſque *obverſis.*

viridis. 34. Tr. teſta viridi: anfractu primo quinquefariam, ſecundo quadrifariam noduloſis, reliquis glabris.
Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1643. 1644.
Habitat - - - teſta mediæ magnitudinis, umbilico infundibuliformi, ſecundum ſpiræ anfractum non aſſequente.

ruſticus. 35. Tr. teſta obtuſe pyramidali ex atro fuſca.
Chemn. Conch. 5. t. 170. f. 1645. 1646.
Habitat in Sina.

nigerrimus. 36. Tr. teſta nigerrima: ſpira tranſverſe ſtriata; anfractibus planiuſculis, columella unidentata.

Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1647.
Habitat in Sina, *teſta mediæ magnitudinis.*

Parvulum. 37. Tr. ſpiræ anfractibus ochroleucis plicato-tuberculatis ſulco maculato rugoſo diſcretis.
Bonann. recr. 3. *f.* 396.
muſ. Kircher. 3. *f.* 372.
Knorr Vergn. 4. *t.* 25. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1648. 1649.
Habitat in aquis ſernambucenſibus.

Rugoſus. 38. Tr. teſta pyramidali tranſverſim ſtriata ochroleuca ſanguineo varia apice nigra: ſpiræ anfractibus planiuſculis margine ſanguineo maculato tumidiuſculis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1650.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 170. *f.* 1651.
Habitat ad littus Maroccenſe, *teſta minuta.*

Pyramis. 39. Tr. teſta pyramidali ſpadiceo maculata & nebuloſa: anfractibus margine fornicato-noduloſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1652.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 170. *f.* 1653.
Habitat - - - teſta ultra dimidium, in β) *integrum pollicem alta, inter nodulos marginis granulato ſtriata.*

Capenſis. 40. Tr. teſta depreſſa albo ſpadiceoque varia: baſi convexa annulo coccineo obſcurius maculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1661. 1662.
Habitat ad Caput Bonæ Spei.

ægyptius. 41. Tr. teſta depreſſa alba rubro maculata: anfractibus diſtantibus tranſverſe ſtriatis plicatiſque: columella unidentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1663. 1664.
Habitat rarior in mari rubro *prope* Suez, *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis alta.*

depreſſus. 42. Tr. teſta depreſſa albida rubello radiata apice rubra: anfractibus cingulo punctorum moniliformi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1668.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 171. *f.* 1669.
Habitat - - - teſta mediæ magnitudinis.

lævigatus. 43. Tr. teſta dilute fuſca baſi ſubconvexa: ſpiræ anfractibus lævibus obſolete tranſverſim ſtriatis, umbilico infundibuliformi albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1670.
Habitat - - - teſta minuta.

groenlandicus. 44. Tr. teſta pellucida incarnata baſi convexa : anfractibus convexis ſubtiliſſime tranſverſim ſtriatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1671.
Habitat ad Groenlandiæ *littora, ſpiræ anfractibus 6, apertura ſuborbiculari.*

roſeus. 45. Tr. teſta convexa roſea ſulcata : umbilico minimo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1675.
Habitat frequens ad Caput Bonæ Spei, *teſta exili.*

patholatus. 46. Tr. teſta depreſſa fuſca albido maculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1676.
Habitat - - - teſta minima.

viridulus. 47. Tr. teſta virente oblique albo radiata : ſpiræ anfractibus convexis cingulo granorum moniliformi inſtructis, columella dentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1677.
Habitat - - - teſta mediæ magnitudinis.

urbanus. 48. Tr. teſta convexa multifariam granulata, umbilico denticulato, apertura crenulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1679.
Habitat - - - granulis vel nodulis partim albis, partim incarnatis.

guineenſis. 49. Tr. teſta fuſco canoque nebuloſa, multifariam granulata & noduloſa; apertura crenata, umbilico dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1680.
Habitat ad Guineam, *teſta* 8 *lineas lata, & ultra 6 alta.*

Nodulus. 50. Tr. teſta cinerea : cingulis granorum moniliformibus, umbilico albo dentato, apertura crenata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1681.
Habitat - - - guinenſi minor.

carneus. 51. Tr. teſta depreſſa ſubcarnea : cingulis granorum moniliformibus confertis, umbilico amplo unidentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1682.
Habitat - - - nodulo minor.

teſſellatus. 52. Tr. teſta tranſverſim ſtriata : ſpiræ anfractibus diſtantibus maculis quadratis multifariis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1683.
Habitat frequens in mari mediterraneo.

croceus. 53. Tr. teſta convexa ſpadicea : ſpiræ anfractibus convexis : extimis croceis.

Chemn. Conch. 6. *t.* 171. *f.* 1684.
Habitat frequens ad Africæ, *præſertim* Marochii *littora.*

obliquatus. 54. Tr. teſta convexo-depreſſa radiis obliquis ſubviolaceis varia; ſpiræ anfractibus convexis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1685.
Habitat in mari mediterraneo.

vittatus. 55. Tr. teſta convexa ſpadicea: anfractibus margine ſuperiori vitta ex rubro alboque varia.
Chemn. Conch. 5. *t.* 171. *f.* 1687.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* E?
Habitat - - -

Schroeteri. 56. Tr. teſta depreſſo-pyramidali baſi concava: ſpiræ anfractibus tranſverſe ſtriatis oblique coſtatis; primo margine carinato, umbilico infundibuliformi.
Schroet. Einl. in Conch. 1. *p.* 716. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat - - - *hactenus modo foſſilis in* Campania gallica *inventus.*

indicus. 57. Tr. teſta convexo-conica: anfractibus muticis, apertura ſemicordata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1697. 1698.
Habitat in India, *teſta vix pollicem alta ſubtiliſſime oblique ſtriatus umbilico ſpirali, ſpiræ anfractibus* 5 *hyalinis.*

infundibuliformis. 58. Tr. teſta depreſſa ſpadicea: ſpiræ anfractibus planiuſculis multifariam granulatis tranſverſim ſtriatis, crenatis, umbilico pervio crenulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1706. 1707.
Habitat rariſſimus - - -

stramineus. 59. Tr. teſta ſtraminea: anfractibus convexis crenatis decuſſatim ſtriatis ſulco diſcretis, umbilico pervio.
Liſt. Conch. t. 635. *f.* 23.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1699.
Habitat ad Tranquebariæ *littora, ſpiræ anfractibus* 5-6.

variegatus. 60. Tr. teſta alba ſubfuſco radiata ſtriis crenatis exarata; umbilico pervio crenato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1708. 1709.
Habitat - - -

Areola. 61. Tr. teſta convexa tranſverſim ſtriata alba maculis quadratis rubellis varia; umbilico crenulato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1710. 1711.
Habitat - - - *anfractibus ſtria alba diſcretis.*

inermis. 62. Tr. teſta ex viridi lutea: coſtis longitudinalibus plicatis ſpina terminatis, apertura compreſſa umbilico rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. *f.* 1712. 1713.
Habitat - - -

imperialis. 63. Tr. teſta conica olivacea, ſquamis violaceis ſeriatis fornicatis tecta: anfractibus inflatis margine ſpinoſo radiatis umbilico infundibuliformi albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 173. 174. *f.* 1714. 1715.
Habitat in mari auſtrali, *teſta ſatis magna: ſpiræ anfractibus* 7.

planus. 64. Tr. teſta depreſſa ſtraminea obſcurius coſtata: ſpiræ anfractibus plicatis, umbilico pervio.
Chemn. Conch. 5. *t.* 174. *f.* 1721. 1722.
Habitat - - -

albidus. 65. Tr. teſta conica alba: faſciis obliquis fuſcis, anfractibus prope ſuturam canaliculatis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 11. *f.* 19. 20. Trochus cinerarius.
Habitat - - -

fuſcatus. 66. Tr. teſta conica: baſi ex viridi cinerea fuſco maculata, anfractibus teretibus, umbilico cylindrico.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 1. 2. Trochus umbilicaris.
Habitat - - -

faſciatus. 67. Tr. teſta conica lævi alba fuſco maculata roſeo faſciata: anfractibus teretibus ad ſuturam planiuſculis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. ind. 1. *p.* 336. *t.* 12. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *turbini affinis.*

corallinus. 68. Tr. teſta conica rubra albo punctata ſubumbilicata: anfractibus teretibus; primo 15fariam, altero ſexfariam tuberculatis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 4. Fujet.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 5. Sari.
Habitat in Senegalia, *teſta* 4 *lineas longa, ſpiræ anfractibus* 6; *an hujus tribus?*

griſeus. 69. Tr. teſta griſea albido maculata: ſpiræ anfractibus planiuſculis tranſverſim ſulcatis.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 6. Lonier.
Habitat in Senegalia.

ferrugineus. 70. Tr. teſta convexa: ſpiræ anfractibus contrariis. *Martin. neueſt. Manigf.* 4. *p.* 404. *t.* 1. *f.* 1. 2. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 977. a. b.
Habitat - - - in mineram ferri converſus prope Scaphuſiam.

novus. 71. Tr. teſta pyramidali: anfractibus contrariis teretibus; tribus quatuor trifariam tuberculatis, quarto maximopere diſtante.
Spengl. n. Samml. daen. Geſ. Wiſſenſch. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 970.
Habitat - - - baſi plana, apertura compreſſa.

fragilis. 72. Tr. teſta tenuiſſima cerea: ſpiræ anfractu primo magno; faſcia media fuſca.
Schroet. Fluſconch. p. 281.
Einl. in Conch. 1. *p.* 754. *t.* 3. *f.* 16.
Habitat - - - teſta minima.

callosus. 73. Tr. teſta obtuſe pyramidali: ſpiræ anfractibus quatuor elevatis contiguis margine tumidis.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1051.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 10.
β) *Schroet. Fluſconch. t.* 6. *f.* 12.
Habitat - - - apertura compreſſa, umbilico pervio.

afer. 74. Tr. teſta convexa griſea albido maculata: ſpiræ anfractibus planiuſculis.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 6. Lonier.
Habitat in Senegalia, *teſta 6 circiter lineas longa, at duplo fere latiori.*

neritoideus. 123. Tr. teſta ſubovata convexo depreſſa lævi rubicunda glabra. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 393. *n.* 391.
Habitat frequens ad Groenlandiæ *littora, cinerario affinis, teſta 2 lineas longa, incola ex nigro cæruleſcente.*

Perlatus. 128. Tr. teſta rubeſcente punctis elevatis inæqualiter coſtata: ſpira depreſſa; anfractibus convexis. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 163. *n.* 20. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat - - - teſta 7 lineas alta.

** Imperforati, *erecti*, *umbilico clauſo.*

veſtiarius. 75. Tr. teſta conico-convexa, baſi gibboſo-calloſa, apertura ſubcordata.
Liſt. Conch. t. 649-652. *f.* 44-50.
Petiv. gaz. t. 11. *f.* 6.
Bonann. recr. 3. *f.* 208-210. 355. 356.
muſ. Kircher. 3. *f.* 208. 209. 211. 348. 349.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* E-H.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 13-15.
Knorr Vergn. 4. *t.* 21. *f.* 4. & 6. *t.* 22. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1601. a-h.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 212.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1602. *n.* 1-3
γ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* A.
δ) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 666. *t.* 3. *f.* 12.
ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 1. *p.* 666. *t.* 3. *f.* 13.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 65. *f.* B.
Habitat in mari mediterraneo, & Aſiam auſtralem *alluente, teſta lævi, minuta, ſtatura pharaonii ſupra glauca lineis transverſis undatis pallidis, ſæpe varia, ſubtus callo convexo lato albido notata.*

Labio. 76. Tr. teſta ovata ſubſtriata: columella unidentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 649. *n.* 335.*
Rumpf muſ. t. 21. *f.* E. Labio.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 2. Retan.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 42. & *t.* 645. *f.* 37.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* N.
v. Born muſ. Cæſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1579-1581.
β) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 10. *f.* 7.
γ) *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 34.
Habitat in Oceano, Aſiam auſtralem, Africam, novam Seelandiam *alluente; nonne ad turbines relegandus!*

Tuber. 77. Tr. teſta depreſſiuſcula: anfractibus ſubcarinatis margine ſuperiore inferioreque nodulosis.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 12.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* I.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 2. & 4. *t.* 4. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 76.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1561. & *t.* 156. *f.* 1572-1576
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 27.
Habitat in mari mediterraneo, & Americam auſtralem al*luente, teſta ponderoſa, viridi, varia, diametri aliquan*[illegible]

do 2 pollicum, anfractibus longitudinaliter coſtatis; nonne potius turbinis ſpecies?

ſtriatus. 78. Tr. teſta conica: anfractu infimo ſubangulato, apertura obovata.
Gualt. teſt. t. 61. f. N.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1527. 1528.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta alba: lineis obliquis nigris.*

Conulus. 79. Tr. teſta conica lævi: anfractibus linea elevata interſtinctis.
Liſt. anim. angl. t. 3. *f.* 15.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 91. 93. 99?
Gualt. teſt. t. 61. *f.* B. G. M.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1588-1591.
Habitat in mari mediterraneo aliiſque europæis, *an varietas zizyphini? teſta rubra vel flava, crebro ſpadiceo varia, faſciata aut radiata, apice tuberculata, anfractibus planiuſculis, extimis noduloſis.*

zizyphinus. 80. Tr. teſta conica livida lævi: anfractibus marginatis. *Fn. ſuec.* 2 168. *Muſ. Lud. Ulr.* 650. *n.* 336.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2926.
Liſt. Conch. t. 616. *f.* 1.
an. angl. t. 3. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* N.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 36.
Knorr Vergn. 3. *t.* 14. *f.* 2. 3. & 6. *t.* 27. *f.* 5.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 9. 10.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1592-1594. 1597. 1598.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 165. *f.* 1595. 1596.
γ) *Rumpf muſ. t.* 21. *f.* 1?
Habitat in mari mediterraneo & omni europæo, *etiam ad Africæ littora frequens, teſta ſub tunica extima plumbea, tranſverſim ſtriata; anfractibus contiguis, ſuperioribus ſubtiliter granulatis.*

Obeliſcus. 81. Tr. teſta conica granulis albis vel viridibus moniliformibus multifariam cincta, columella unidentata.
Knorr Vergn. 1. *t.* 12.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1510-1512.
Habitat rarior in India, *teſta 2 pollices alta, & ejuſdem diametri.*

diſtortus. 82. Tr. teſta alba ſolida nitida ſtriata diſtorta apice obtuſa: ſpiræ anfractu primo gibbo, apertura compreſſa ovata.
Pall. ſpic. zool. 10. *t.* 3. *f.* 7. 8. Helix hyoneriana.
Martin. berl. Samml. 7. *t.* 1. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1513. a. b.
Habitat - - - *ſpiræ anfractibus* 7, *an hujus tribus?*

virgatus. 83. Tr. teſta pyramidali roſeo alboque virgata multifariam nodulofa: baſi circulis concentricis albis rubriſque.
Liſt. Conch. t. 631. *f.* 17.
Chemn. Conch. 5. *t.* 160. *f.* 1514 1515.
β) *Muſ. Gottwald. t.* 39. *f.* 268. 270.
Habitat in India.

foveolatus. 84. Tr. teſta cinereo, virente albido rubelloque varia: ſpiræ anfractibus margine inferiori tuberculatis; extimis circum circa ſcrobiculatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1516. 1517.
β) *Chemn Conch.* 5. *t.* 161. *f.* 1518. 1519.
Habitat in mari rubro, *teſta ſatis ſpectabili, ſpiræ anfractibus* 13, *columella unidentata.*

diaphanus. 85. Tr. teſta tenui pellucida: cingulis granulorum moniliformibus alternatim ſpadiceis & albis, anfractibus convexis.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 152. *t.* 5. *f.* 2. a. b.
Chemn. Conch. 5. *t.* 61. *f.* 1520. 1521.
Habitat ad novæ Seelandiæ *littora, teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem alta, & perinde lata, apertura ampla.*

Iris. 86. Tr. teſta ſub epidermide glaberrima cæruleſcente lineis rubellis angulatis undulatiſque varia iridis coloribus micante ſtriata.
Walch Naturf. 4. *p.* 42. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Zorn Naturf. 7. *p.* 161. *t.* 2. *f.* C. 1. C. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1522. 1523.
β) *Martyn univ. Conchol.* 1. *t.* 24.
Habitat in Oceano auſtrali, *ſpira acuta: anfractibus* 7-9 *contiguis.*

roſtratus. 87. Tr. teſta pyramidali tranſverſim ſtriata albo rubroque varia apice viridi pellucida.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1524. 1525.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta pollicem alta, ſpiræ anfractibus* 7.

notatus. 88. Tr. teſta decuſſatim ſtriata intus ſulcata apice ruberrima.
Schroet. Journ. 5. *p.* 438. *f.* 10. 11.
Einl. in Conch. 1. *p.* 682. *t.* 3. *f.* 14.
Habitat in Oceano auſtrali?

elegans. 89. Tr. teſta pyramidali ſtriata ex purpureo ſubfuſca.
Zorn Naturf. 7. *p.* 167. *t.* 2. *f.* D. 1. 2.
Habitat in Oceano auſtrali, *nonne cum notato varietas roſtrati?*

melanoſtoma. 90. Tr. teſta obtuſe pyramidali virente maculata; apertura intus nigerrima.
Chemn. Conch. 5. *t.* 161. *f.* 1526. a. b.
Habitat in Oceano auſtrali, *vix avellanæ magnitudine.*

erythroleucos. 91. Tr. teſta minuta pyramidali albo rubroque ſtriata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1529. a. b.
Habitat ad Marochii *littora.*

punctulatus. 92. Tr. teſta minima rubra punctulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1530.
Habitat ad Marochii *littora, erythroleuco minor.*

imbricatus. 93. Tr. teſta pyramidali oblique ſulcata plicata & coſtata; anfractibus margine prominulis.
Liſt. Conch. t. 628. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* Q.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 19. 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1531.
β) *Knorr Vergn.* 3. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1532. 1533.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente.*

americanus. 94. Tr. teſta longitudinaliter ſulcata ochroleuca: anfractibus tranſverſim ſtriatis, labio denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1534. 1535.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſtæ mediæ magnitudinis: ſpiræ anfractibus* 6.

cælatus. 95. Tr. teſta thalaſſina varicibus pliciſque ſquamoſis obliquis inæquali; ſpiræ anfractibus medio tranſverſim ſulcatis ſtriatiſque, anfractus primi margine inferiori ſpinis fornicatis aſpero.
Liſt. Conch. t. 646. *f.* 38. *t.* 647. *f.* 40.
Bonann. recr. 3. *f.* 11. 167. 394.
muſ. Kircher. 3. *f.* 11. 12. 167. 380.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 1. 2.

Knorr Vergn. 5. *t.* 12. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1536. 1537.
β) *Favann. Conch. t.* 79. *f.* 1?
Martyn Conch. 1. *f.* 33.
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1581. 1582.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta baſi ſubconvexa, ſpiræ anfractibus teretibus, apertura argentea.*

purpureus. 96. Tr. teſta purpurea: anfractibus plicato tuberculatis, cingulis granulorum minimorum moniliformibus, apertura ſuborbiculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 162. *f.* 1538. 1539.
Habitat rariſſimus - - - teſta mediæ magnitudinis.

Cookii. 97. Tr. teſta thalaſſina multifariam tuberculata oblique & undulatim plicata: ſpiræ anfractibus utrinque canaliculatis; primo ſupra convexo, ſubtus planiuſculo.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 156. 203. *t.* 3. *f.* 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1640. & *f.* a. b. & *t.* 164. *f.* 1551.
Habitat in Cookii freto *ad* novam Seelandiam, *teſta* 4 *pollices alta, & æqualis diametri, operculo corneo.*

nodulosus. 98. Tr. teſta ſubfuſca baſi convexa: anfractibus unifariam, primo bifariam tuberculato, utroque labio marginato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1545. 1546.
Habitat in Oceano auſtrali, & *(minor)* mari, Americam meridionalem *alluente, tuberculis minutis albis.*

mauritianus. 99. Tr. teſta pyramidali albo, rubello viridique varia; anfractibus margine inferiori obtuſo ſpinoſis, columella emarginata plicata.
Liſt. Conch. t. 625. *f.* 11.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 90.
Gualt. teſt. t. 61. *f.* D. F.
Chemn Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* C. & *t.* 163. *f.* 1547. 1548.
Habitat frequens ad inſulas Barboniæ & S. Mauritii, *ſpiræ anfractibus* 10-12.

feneſtratus. 100. Tr. teſta alba pyramidali: ſpiræ anfractibus longitudinaliter coſtatis; cingulis granulorum viridium moniliformibus tranſverſis.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* 7.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* N.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 13.
Muſ. Gottwald. t. 39. *f.* 267.

Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1549. 1550.

Habitat in Oceano indico & auſtrali, *teſtæ diametro circiter* $1\frac{1}{2}$ *pollicis, columella ſubincurvata: dente excavato.*

helicinus. 101. Tr. teſta utrinque convexa ſolida: ſpira lævi, anfractibus duobus primis oblique coſtatis medio excavatis, apertura ſubſemilunari.

Knorr Vergn. 4. *t.* 6. *f.* 2.

Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1560.

Habitat in Oceano Americam Auſtralem *alluente?*

Argyroſtomus. 102. Tr. teſta ovata undulatim coſtata tranſverſim ſtriata: apertura ſubcompreſſa, ſpiræ anfractibus ventricoſis; primo baſi ſubcarinato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1562. 1563.

Habitat in Oceano auſtrali, *teſta* 2 *pollices lata & alta nigra, coſtis in primo anfractu ſerie tuberculorum terminatis, columella viridiſſima.*

...enſis. 103. Tr. teſta obtuſe pyramidali nigra: baſeos faſcia purpurea, columella alba, ſpiræ anfractibus omnibus rotundatis.

Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 1.

Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1564. 1565.

Habitat in Sina, *ſpiræ anfractibus* 5–6, *faſcia baſeos ſæpe albo flavoque maculata.*

...ugubris. 104. Tr. teſta nigra baſi ſubconvexa granulata: anfractibus ſulcatis; cingulis granulorum alternatim alborum nigrorumque moniliformibus.

Chemn. Conch. 5. *t.* 165. *f.* 1571.

Habitat in Oceano auſtrali, *teſta minuta: anfractibus* 5.

aſper. 105. Tr. teſta obtuſa: ſpiræ anfractibus teretibus multifariam tuberculatis ſulcatis tranſverſim ſtriatis, columella dentata, apertura lunata.

Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1582.

Habitat – – – *teſta mediæ magnitudinis cinerea vel teſtacea, labio intus plicato rugoſoque.*

teſſellatus. 106. Tr. teſta conico-convexa tranſverſim ſtriata maculis oblongo-quadratis ſeriatis varia, apertura ampla ſubcompreſſa, labio nigro maculato, columella alba dentiformi.

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 5. 6.

Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1583.

β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1585.

γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 166. *f.* 1586. 1587.
δ) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 1. Oſilin.
Liſt. Conch. t. 642. *f.* 33. 34.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 201.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* D. E. G.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 53. 54.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1584.
Habitat in mari mediterraneo, δ) *etiam in* mari Africam occidentalem *alluente, ſpiræ anfractibus teretibus, maculis nigricantibus, cinereis, rarius rubellis.*

citrinus. 107. Tr. teſta conico-convexa citrina lineis angulatis nigris picta: anfractibus duobus primis fuſco obumbratis.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 7.
Habitat in Aſia, *an diſtincta ſpecies?*

Granatum. 108. Tr. teſta pyramidali alba coccineo varia baſi ſubconvexa: ſpiræ anfractibus convexis; cingulis granorum moniliformibus, primis duobus maximis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 170. *f.* 1654. *f.* 1655.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta 2 fere pollices alta, & pene perinde lata, ſpiræ anfractibus* 9-10.

crocatus. 109. Tr. teſta lævi conica alba apice crocea: ſpiræ anfractibus teretibus ſulco ad ſuturam diſcretis.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 11. 12.
Habitat - - -

conchyliophorus. 110. Tr. ſpiræ anfractibus teretibus obſolete plicatis: anfractu primo aperturaque compreſſa ſubfuſcis, fauce baſique concava fuſcis.
Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. *t.* 12. *f.* 2. 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 12. *f.* 21. 22.
Chemn. Conch. 5. *t.* 172. *f.* 1688-1690.
Habitat rarus in Oceano, Americam auſtralem *alluente, ſæpius lapides, teſtacea, corallia, accreſcentia ſibi habens, teſta 2 pollices alta, & diametri baſeos* 2½ *pollicum, ſpiræ anfractibus* 6.

pantherinus. 111. Tr. teſta convexa alba viridi fuſco fulvoque maculata: ſpiræ anfractibus bifariam tuberculatis; anfractu ſecundo plicato carinato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 9. Kachin.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *t.* 12. *f.* 10. Gor.

Habitat in Senegalia, *teſta 8 circiter lineas longa, & paulo latiori.*

grandinatus. 126. Tr. teſta globulis concatenatis ſcaberrima baſi convexa concentrice granulatim ſtriata: labro duplicato dentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 291. *t.* 169. *f.* 1639.
Martyn Conch. 1. *f.* 38.
Habitat ad Palmerſtoni inſulam.

inæqualis. 127. Tr. teſta depreſſa ſubtus cingulis albo-punctatis varia; anfractibus ſpinis duplicique punctorum eminentium ordine coronatis. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 31.
Habitat ad inſulas amicas.

Tigris. 128. Tr. teſta ſubovata griſea ſanguineo virgata tranſverſim albo ſtriata. *Mart. Conchol.* 2. *t.* 75.
Habitat ad novam Seelandiam.

Pulligo. 131. Tr. teſta conica fuſca oblique nigro ſtriata. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 76.
Habitat ad ſinum *a* R. Georgio *denominatum.*

*** Turriti, *columella exſerta, qui poſiti cadunt in latus.*

Teleſcopium. 112. Tr. teſta imperforata ſtriata: columella ſpiratli. *Muſ. Lud. Ulr.* 650. *n.* 337.*
Argenv. Conch. t. 11. *f.* B. Teleſcopium.
Liſt. Conch. t. 624. *f.* 10.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 92.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 60. *f.* D. E.
Seb. muſ. 3. *t.* 50. *f.* 1-12.
Knorr delic t. B. IV. *f.* 9.
Vergn. 3. *t.* 22. *f.* 2. 3.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 27.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 8.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 326. *vign f.* d.
Chemn. Conch. 5. *p.* 3. *vign.* 42. *f.* A. B. *t.* 160. *f.* 1507-1509.
Habitat in Oceano indico, *teſta 4 pollices longa, nunc fuſca aut hepatica, nunc nigricante: anfractu primo utplurimum albo-faſciato, columellæ prominulæ dente plicave media: ſpiræ anfractibus planiuſculis.*

dolabratus. 113. Tr. teſta umbilicata glabra; columella recurvato contorta plicata. *Muſ. Lud. Ulr.* 651. *n.* 338.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 121. *n.* 318. Helix teſta turrita perforata polita : axi contorto-triplicato, apertura dentata.
Liſt. Conch. t. 844. *f.* 72.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* L.
Knorr Vergn. 6. *t.* 29. *f.* 2.
Walch Naturf. t. 3. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 167. *f.* 1603. 1604.
β) *Liſt. Conch. t.* 844. *f.* 72. b.
γ) *Pet. gaz. t.* 118. *f.* 15.
δ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 123. *n.* 319. Helix Terebella.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* M.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta alba, lineis utplurimum flavis, nonnullis fuſcis cincta; anfractibus teretiuſculis ſulco ſubtili diſcretis, apertura dentata, columella triplicata.*

perverſus. 114. Tr. teſta imperforata glabra : anfractibus contrariis ſerie duplici excavato-punctatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta parva fere cornea: anfractibus cylindricis præter margines etiam crenato punctatis, apertura quadrata, columella baſi prominula.*

puſillus. 115. Tr. teſta baſi plana : ſtriis ſubtilibus tranſverſis ſubtiliores obliquas decuſſantibus, apertura compreſſa, anfractibus contrariis.
Spengl. n. Schrift. daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 966.
Habitat in arena *teſtaceis majoribus* maris indici *intruſa; teſta vix* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa; nonne mera perverſi varietas?*

undulatus. 116. Tr. teſta baſi plana : coſtis longitudinalibus ſtrias tranſverſas flexuoſas decuſſantibus, apertura ſemilunari, anfractibus contrariis.
Spengl. n. Schr. der daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 2.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 967.
Habitat in arena maris indici, *puſillo minor.*

ventricoſus. 117. Tr. teſta cancellata baſi glabra : apertura ſubovata; anfractibus contrariis, primis ventricoſis turgidis.
Spengl. n. Schrift. der. daen. Geſ. 1. *t.* 7. *f.* 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 968.
Habitat in arena maris indici, *æqualis cum undulato magnitudinis.*

nnula-tus. 118. Tr. ſpiræ anfractibus contrariis utrinque coſtatis, apertura ſubtetragona.
Spengl. n. Schr. daen. Geſ. 1. *t.* 1. *f.* 4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 969.
Habitat in arena maris indici, *æqualis cum ventricoſo magnitudinis, ſpiræ anfractibus* 12-15. *Ad poſteriores* 5 *ſpecies accedit* Trochites contrarius, *in Dania repertus, &* a Chemnizio *Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 981. *delineatus?*

omi-ſus. 119. Tr. teſta ſubpyramidali umbilicata lævi alba apice rubella, anfractibus ſulco diſtinctis, apertura ſemilunari.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 12.
Habitat in humo conchacea; *an hujus tribus?*

ncta-tus 120. Tr. teſta imperforata: anfractibus ſerie triplici punctorum prominentium.
Habitat in mari, Europam auſtralem & Africam *alluente, teſta ferruginea, magnitudine grani hordei, tota granis obtuſis obſita, apertura quadrata, columella vix manifeſte canaliculata.*

riatel-lus. 121. Tr. teſta imperforata: ſtriis longitudinalibus parallelis obliquatis.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta admodum parva, ſubalata, alba, apice violacea.*

Ziczac. 122. Tr. teſta ſubſtriata lineis angulatis obſcurioribus picta; apertura ſuborbiculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1599. a. b.
β) *Liſt. Conch. t.* 583. *f.* 38.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1600. a. b.
Habitat - - - *ſpiræ anfractibus* 5-6, *an hujus tribus & generis?*

unatis. 123. Tr. teſta contraria modice convexa lævi ſubumbilicata.
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 971.
Habitat - - - *anfractibus* 5, *turbini affinis.*

ortenſis. 124. Tr. teſta pyramidali ſubimperforata candida: faſcia rufeſcente. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1055. 1056.
Müll. hiſt. verm. t. 2. *p.* 79. *n.* 275. Helix-Trochus.
Habitat in terrarum calidiorum hortis.

337. TURBO. *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, ſolida.
Apertura coarctata, orbiculata, integra.

* Neritoidei, *aperturæ margine columnari plano imperforato.*

obtuſatus. 1. T. teſta ſubrotunda lævi ſuperne ventricoſiore obtuſiſſima.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1854. *n.* a - f?
Müll. zool. dan. prodr. 2928?
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta fuſca albo varia.*

neritoides. 2. T. teſta ovata glabra obtuſiuſcula.
Knorr Vergn. 6. *t.* 23. *f.* 9.
Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1854. *n.* 1-11?
Habitat numeroſiſſimus in mari mediterraneo, mari Americam auſtralem *alluente, teſta minuta nunc unicolore flava, rubra vel ſubfuſca, nunc variegata, faſciata, lineata, apertura ovata; nonne potius ad neritas relegandus?*

littoreus. 3. T. teſta ſubovata acuta ſtriata. *Fn. ſuec.* 2169. *It. wgoth.* 169. 199. *t.* 5. *f.* 4.
Baſter. opuſc. ſubſec. 3. *p.* 110. *t.* 14. *f.* 1. Turbo littoralis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 403. *n.* 405. Nerita littorea.
Liſt. Conch. t. 585. *f.* 43.
anim. angl. t. 3. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* A. C. G.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* L.
zoomorph. t. 3. *f.* A.
Swammerd. bibl. nat. 183.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 1. *t.* 185. *f.* 1852. *n.* 1-8.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 5. & *t.* 11. *min.* C. *f.* 5.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1853.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1855. a-g.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 6. 7. 16. 18. 19. 7. a. b.
δ) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 6.
ε) *Liſt. Conch. t.* 1059. *f.* 7.
Habitat in Oceano europæo, *frequens ad* Groenlandiæ & Norwegiæ *littora, littorum ſcopulos adſcendendo ventum impetuoſum, deſcendendo quietem prænuncians, teſta li-*

pollicis alta, ſubtiliter tranſverſim ſtriata, nunc atra lineis albis, nunc fuſca lineis obſcurioribus, nunc griſea aut lutea lineis fuſcis, nunc flavicante lineis fuſcis & apice vireſcente, anfractibus 7 contiguis, primo reliquis majore, apertura ſubovata.

muricatus. 4. T. teſta umbilicata ſubovata acuta cincta ſtriis punctis eminentibus, margine columnari obtuſiuſculo.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 2. Boſon.
Liſt. Conch. t. 30. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 45. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 15. 16.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1752. 1753.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 2.
Habitat in mari, Europam Americam*que* auſtralem & Africam *alluente, teſta vix pollicem magna ex albido cærulescente: fauce fuſca, anfractibus tranſverſim ſtriatis diſtantibus, primo reliquis ſimul ſumtis minore.*

lituus. 111. T. teſta ſubovata lævi, apertura laterali marginata, umbilico tecto. *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 27.
Habitat ad Pulo Condore; *an hujus generis?*

punctulatus. 113. T. teſta ſubovata lævi fuſca: cingulis dilutioribus planis obſcurius punctatis, apertura margaritacea. *Mant. univ. Conchol.* 1. *t.* 36.

** Solidi *imperforati.*

Cimex. 5. T. teſta oblongo ovata ſtriis decuſſatis: punctis eminentibus.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 6? Soni?
Gualt. teſt. t. 44. *f.* X.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta albida, labio intus albo limbato, ſpiræ anfractu primo ſequentibus* 4-5 *majore.*

Pullus. 6. T. teſta ovata lævi: apertura anterius diducta.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 12. *f.* 17. 18.
Habitat in mari mediterraneo, *petholato teſtæ apertura potiſſimum antrorſum angulata affinis, teſta nitida, magnitudine ſeminis carthami faſciis maculiſve purpuraſcentibus fuſcis albidiſve picta.*

perſonatus. 7. T. teſta convexa lævi; apertura diducta. *Muſ. Lud. Ulr.* 632. *n.* 339.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 1.

Habitat in India, *teſta cinerea fuſco punctata, avellanæ magnitudine, neritæ ſimili.*

pethola-tus. 8. T. teſta ovata lævi nitida: anfractibus furſum ſubangulatis.
Muſ. Lud. Ulr. 652. *n.* 340.*
Bellon. aq. 340. Cochlus ſ. Umbilicus.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* D. & 5. 6. 7. Cochlea petholata.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* K. Cochlea variegata.
zoomorph. t. 10. *f.* D.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 39.
Valent. Abh. 6. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* F.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 51.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 17-19. 23-29.
Knorr delic. t. B. T. III. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 4. 2. *t.* 22. *f.* 1. 2. 3. 1. 3. *f.* 3. & *t.* 23. *f.* 4. & *t.* 28. *f.* 2-5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 18. & *t.* 9. *f.* 27.
Chemn. Conch. 5. *t.* 183. & 184. *f.* 1826-1839.
β) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 3.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 5.
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 7. 8.
ε) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 16.
ζ) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* I.
η) *Valent. Abh. t.* 2. *f.* 27.
θ) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 320?
Habitat ad inſulas maris indici & Americam auſtralem *alluentis, teſta ſpectabili, nitida, glaberrima, ſpadicea, faſciata: anfractibus teretibus, columella ex flaveſcente viridi.*

Cochlus. 9. T. teſta ovata ſtriata: ſtria unica dorſali craſſiore.
Liſt. Conch. t. 584. *f.* 40.
Valent. Abh. t. 6. *f.* 53. 54. 56.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 55.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 30.
Knorr Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 12.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1805. 1806.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 12. *t.* 3. *f.* 17.
β) *Liſt. Conch. t.* 586. *f.* 45.
γ) *Argenv. Conch. t.* 6. *f.* C?
δ) *Knorr delic. t.* B. III. *f.* 6?
Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 3?
Habitat rarus in India, *teſta viridi, interdum ex viridi fuſcis albo varia: faſciis albis fuſco-maculatis apertura argentea.*

tea, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis, tranſverſa unica craſſa dorſi.

Chryſoſtomus. 10. T. teſta ſubovata rugoſa: anfractibus bifariam ſpinulis fornicatis cincta. *Muſ. Lud. Ulr.* 653. *n.* 341.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* E. Cochlea lunaris aſpera.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* D. Os aureum.
Gualt. teſt. t. 62. *f.* H.
Klein. oſtr. t. 7. *f.* 126.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 9-11
Knorr Vergn. 2. *t.* 14. *f.* 2. & 5. *t.* 13. *f.* 3.
Chem. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1766.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 4.
Habitat rarior in India, *teſta flavicante fuſco radiata intus aurata, labio & columella albis, anfractibus diſtantibus tranſverſim ſtriatis, longitudinaliter lineatis, ſuperioribus plicatis.*

plicatus. 110. T. teſta ſubovata rugoſa, anfractibus ſpinulis obtuſis fornicatis, labio expanſo crenato. *Mart. univ. Conch.* 1. *t.* 26.
β) *Martyn univ. Conch.* 1. *t.* 30.
Habitat in Oceano auſtrali, *ad* inſulas amicas.

ctum. ſcum. 11. T. teſta ovata: ſpinis obtuſis depreſſis, ſubtus papilloſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 653. *n.* 342.*
Argenv. Conch. t. 8. *f.* P?
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1543. *f.* 1544.
β) *Gualt. teſt. t.* 60. *f.* M?
Habitat in India, *teſta cinerea fuſco faſciata, ſpiræ anfractibus* 6, *tranſverſim rugoſis, bifariam ſpinoſis, ſpinis in* β) *acuminatis, fauce alba ſulcata.*

odus. 12. T. teſta conica: ſpinis obtuſis concatenatis, ſubtus papilloſo-ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 654. *n.* 343.
Rumpf muſ. t. 21. *f.* D. Trochus papuanus ſ. longævus.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* A. Pagodus.
Liſt. Conch. t. 644. *f.* 36.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 37.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *f.* 3.
Knorr Vergn. 1. *t.* 25. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 163. *f.* 1541. 1542.
Spengl. Conch. t. 2. *f.* K.
Habitat rarus in India, *teſta ad* 3 *pollices alta, aſpera, undulatim plicata & rugoſa, teſtacea: apertura ochroleuca, ſpiræ anfractibus* 8-9, *primo bifariam ſpinoſo.*

ſulcatus. 112. T. teſta ſubconica atro griſeoque varia fornicato-ſquamoſa: apertura margaritacea crenulata. *Murr. univ. Conch.* 1. *t.* 35.
Habitat ad inſulas amicas.

Calcar. 13. T. teſta ſubimperforata depreſſa: anfractibus ſcabris, ſupra ſpinis fornicato-compreſſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 654. *n.* 344.*
Rumpf muſ. t. 20. *f.* I. Calcar.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* R. & *t.* 8. *f.* H. Calcar.
Liſt. Conch. t. 608. *f.* 46? 46. a.
Gualt. teſt. t. 65. *f.* N. P.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 21? 27.
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 5. 6.
Knorr Vergn. 4. *t.* 4. *f.* 2. & *t.* 6. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 164. *f.* 1552. & *t.* 124. *f.* 1718-1720.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 164. *f.* 1553.
γ) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 3?
δ) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 4. *f.* 4?
ε) *Knorr Vergn.* 4. *t.* 7. *f.* 1?
ζ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 180. *f.* 1786. 1787.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 435. *t.* 2. *f.* 16. 17.
η) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1585. 1586.
Habitat paulo rarior in India, β) *in* Oceano auſtrali, ζ) *in* mari mediterraneo, *teſta vireſcente: anfractibus* 5 *nodoſis diſtantibus.*

rugoſus. 14. T. teſta ſubovata ſtriata: anfractibus ſuperne rugoſis.
Liſt. Conch. t. 647. *f.* 41.
Bonann. recr. 3. *f.* 12. 13.
muſ. Kirck. 3. *f.* 12. 13? 14.
Gualt. teſt. t. 63. *f.* F. H.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* O.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 50.
Knorr Vergn. 3. *t.* 20. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1782-1785.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 181. *f.* 1803. 1804?
γ) *Gualt. teſt. t.* 63. *f.* C.
Habitat in mari mediterraneo & adriatico, β) *ad novam* Seelandiam, *teſta vireſcente, cinereo albove o umbra ta, columella rubra, fauce argentea, anfractibus latere ſuperiore rugis obſolete nodoſis: Operculum hujus umbilici veneris nomine notum.*

marmoratus. 15. T. teſta ſubovata lævi: anfractibus trifariam marginato noduloſa, cauda poſterius explanata. *Muſ. Lud. Ulr.* 655. *n.* 345.*

Liſt. Conch. t. 587. *f.* 46.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 26. *f.* 1. & *t.* 27. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1775. 1776.

Habitat rarior in mari, Aſiam auſtralem *alluente, oleario affinis, at teſta tenuiori, nodulorum ordinibus binis incompletis diſtinctibus, teſta ceterum obſcure viridi: faſciis ex maculis albis, fuſcis & rubellis conflatis.*

rmaticus. 16. T. teſta convexa obtuſa: anfractibus ſupra nodoſis canali interſtinctis.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 166?
Argenv. Conch. t. 8. *f.* V.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1777. 1778. 1781.
Schroet. Journ. 5. *f.* 12.
β) *Knorr delic. t.* B. III. *f.* 2.
Vergn. 1. *t.* 3. *f.* 1.

Habitat rarus in mari, Aſiam Africam*que* auſtralem *alluente, teſta ſub epidermide aurantia flavicante, ſub hac nigerrima, intus argentea, anfractibus multifariam nodoſis, nodis ſupremæ ſeriei maximis.*

learius. 17. T. teſta convexa obtuſa angulato-lævi.
Rondel. teſt. 96.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 9. 184.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* A. B.
Gualt. teſt. t. 68. *f.* A.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 124.
Knorr Vergn. 2. *t.* 9. *f.* 1.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1771. 1772.
β) *Bonann. recr.* 3. *f.* 406.
muſ. Kircher 3. *f.* 386.
γ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 52?
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1773. 1774?

Habitat in India, *teſta dorſo trifariam nodoſo, anfractu primo obliquo gibbo.*

nnutus. 18. T. ſpiræ anfractibus teretibus decuſſatim ſtriatis: primo trifariam imbricato-ſpinoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 179. *f.* 1779. 1780.
Habitat in Sina, *teſta ſatis magna, olivacea.*

radiatus 19. T. teſta rugoſa : anfractibus teretibus diſtantibus tranſverſim ſtriatis imbricatim ſpinuloſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1788. 1789.
Habitat in mari rubro, *teſta albida ſpadiceo radiis, vel ſubfuſca albo radiata, intus argentea.*

imperialis. 20. T. teſta glaberrima nitida viridi, intus nivea : apertura argentea, columellæ labio ſuperne calloſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1790.
Habitat rarus in Sina, *teſta ſpectabili : anfractibus valde convexis.*

coronatus. 21. T. teſta rugoſa alba vireſcente-nebuloſa, apice aurantia : anfractibus ſpinis nodiſque coronatis, columella caudata.
Liſt. Conch. t. 575. *f.* 28?
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1791. 1792.
β) *Argenv. Conch. t.* 6. *f.* Q.
Chemn. Conch. 5. *t.* 180. *f.* 1793.
Habitat rariſſimus in freto Malaccenſi.

canaliculatus. 22. T. teſta ſulcata tranſverſim ſtriata alba viridi hinc inde ſpadiceo varia : anfractibus valde convexis.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 44.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1794.
Habitat in India, *teſta ponderoſa : anfractibus ſex.*

ſetoſus. 23. T. ſpiræ anfractibus cylindricis ſulcatis tranſverſim ſtriatis, labio externo crenato.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* C.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* B.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1795. 1796.
Habitat rariſſimus in India, *teſta maculis piceis, radiiſque albis & ſpadiceis, alternis varia, anfractibus* 6.

ſpinoſus. 24. T. teſta oblonga tranſverſim ſtriata : ſtriis ſpinoſis, apertura argentea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1797.
Habitat in India, *chryſoſtomo affinis, teſta albida luteoque nigro radiata, anfractibus* 6.

ſparverius. 25. T. teſta oblonga late & glabre ſtriata flavicante fuſco maculata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1798.
Habitat in India, *ſtriis inæqualibus, anfractibus* 6 *teretibus, apertura matris perlarum inſtar nitente.*

26. T.

Moltkianus. 26. T. teſta ex argenteo cana: faſciis luteis & aurantiis tranſverſis: ſpiræ anfractibus cingulis granorum moniliformibus ſuperne plicatis, nodoſis & fornicato ſpinoſis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1799. 1800.
Habitat - - - apertura matris perlarum inſtar nitente, columella argentea.

Spenglerianus. 27. T. teſta alba flavicante varia: ſpiræ anfractibus teretibus tranſverſim ſtriatis canali interſtinctis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 181. *f.* 1801. 1802.
β) *Hermann Naturf.* 16. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Habitat rariſſimus in Oceano indico, *apertura intus argentea.*

Caſtanea. 28. T. teſta tranſverſim ſtriata fuſca b. albo maculata: anfractibus nodulorum ordinibus cinctis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1807. 1808.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1809. 1810.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1813. 1814.
δ) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 12. *f.* 70?
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, ſpiræ anfractibus* 5.

Crenulatus. 29. T. teſta ex argenteo cana nodulis multifariam cincta: apertura intus lactea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1811. 1812.
Habitat - - - Caſtaneæ affinis.

Smaragdus. 30. T. teſta ponderoſa ſubdepreſſa læviuſcula oblique rugoſa: ſpiræ anfractibus quatuor; primo terete ampliore.

Huic *tribui inſerendæ videntur, an diſtinctæ ſpecies? teſtæ a* Liſtero *Conch. t.* 583. *f.* 36. *t.* 584. *f.* 41. *t.* 1059. *f.* 8. a. Bonanni *recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 100. 199. 335. *muſ. Kirch.* 3. *f.* 389. 397. *a* Rumpf *muſ. t.* 21. *f.* 11. *a.* Gualtieri *teſt. t.* 45. *f.* F. *t.* 62. *f.* E. F. G. I. M. N. *& t.* 63. *f.* L. M. N. *ab* Argenville *Conch. t.* 6. *f.* G, I. T. *& zoomorph. t.* 8. *f.* 4. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 39. *f.* 25-28. & *f.* 47. *t.* 40. *f.* 44. *& a* Knorr *Vergn.* 3. *t.* 4. *f.* 3. *delineatæ? quintæ autem tribui, quas* Liſter *Conch. t.* 18. *f.* 13. *t.* 19. *f.* 14. & 14. A. *t.* 20. *f.* 15. *t.* 21. *f.* 17. 18. *t.* 22. *f.* 19. *t.* 31. *f.* 29. *t.* 588. *f.* 52. *t.* 589. *f.* 53. *t.* 591. *f.* 56. 57. *t.* 592. *f.* 60. *t.* 593. *f.* 61. Klein *oſtr. t.* 2. *f.* 44. Martini *berl. Mag.* 3. *t.* 5. *f.* 57. 58. 60. 64. 65. & 4. *t.* 9. *f.* 44. Bonanni *recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 39. 42. & 106. Valentyn *Abh. t.* 1. *f.* 7. Gualtieri *teſt. t.* 4. *f.* F. G. H. I. L. N. R. *t.* 44. *f.* Z. Argenville *Conch. t.* 11. *f.* I. *t.* 27. *n.* 5. *f.* 32. *& t.* 28. *f.* 15. 16. 18. 24. *& zoomorph: t.* 9. *f.* 12. 14. Seba *muſ.* 3. *t.* 56. *f.* 22. 29. Knorr *Vergn.* 5. *t.* 15. *f.* 7. & 6. *t.* 39. *f.* 2. *Quartæ denique tribui teſtæ a* Gualtieri *t.* 58. *f.* G. *&* I. *ultima etiam a* Schroetero *Einl. in Verſtein.* 4. *t.* 10. *f.* 5. *delineatæ.*

v. Zorn. Naturf. 7. *p.* 157. *t.* 2. *f.* A. 1. A. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1815. 1816.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta viridi ultra 2 pollices lata & alta.*

papyraceus. 31. T. teſta pellucida tenuiſſima ſubtiliſſime annulata: anfractu primo maximo, faſcia ad alterum albo rubroque varia, apertura ovali.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1817. 1818.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1819?
Habitat - - -

Æthiops. 32. T. teſta tranſverſim ſulcata nigra: anfractibus primis argutis ſtriatis, ſequentibus argenteis labio utroque limbo fuſco.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 340. *vign. f. b.*
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1820. 1821.
Habitat - - - *teſta mediæ magnitudinis, apertura dilatata.*

nicobaricus. 33. T. teſta ſubfuſca reticulata: anfractibus cingulatis, apertura limbo vireſcente pellucido, columella callo citreo, fauce aurata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 182. *f.* 1822. 1823.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 182. *f.* 1824. 1825.
γ) *v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 13. *f.* 16. 17. Helix paradoxa.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta mediæ magnitudinis.*

Cidaris. 34. T. teſta lævi: anfractibus ex compreſſo tereiuſculis, primo tereti ampliſſimo, apertura compreſſa viridi argentea, columella prominula.
α) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1840. 1841. Cidaris turcica.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1842. 1843. Cidaris viridis.
Valent. Abh. t. 4. *f.* 35.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1844. 1845. Cidaris aurantia.
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1846. Cidaris faſciata.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* B.
ε) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 184. *f.* 1247. Cidaris ſpadicea.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* O.
ζ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 13. 14. Cidaris marmorata.
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 15. Cidaris polyzonias.
θ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 82. Cidaris flavicans rubro lineata.
ι) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 82. Cidaris ex cæruleo rubella variegata.

κ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris vireſcens ſpadiceo lineata.

λ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris ſubfuſca, baſi marginata.

μ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris dilutius & obſcurius fuſco radiata.

ν) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 83. Cidaris lutea obſcurius radiata.

Habitat rarior in India *&* Sina, *infinitæ fere varietatis.*

…gerri-mus. 35. T. teſta lævi nigerrima: anfractibus margine excavatis diſtantibus.

Chemn. Conch. 5. *t.* 185. *f.* 1848.

β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1849.

Habitat in Oceano auſtrali.

…licinus. 36. T. teſta lævi ſubimperforata ſubrotunda: anfractibus convexis contiguis, columella incraſſata. *v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p.* 355. 356. *t.* 12. *f.* 23. 24.

Habitat — — — *teſta purpurea & vireſcente fauce argentea.*

…nctatus. 37. T. teſta ovata craſſa; ſpira mucronata; anfractibus lævigatis planiuſculis, primis duobus maximis.

Adanſ. Seneg. 1. *p.* 163. *t.* 12. *f.* 1. Marnat.

Habitat in Senegalia, *teſta 6-7 lineas longa; plumbea, interdum rubella, ſeriatim albo-punctata, intus coffeæ more tincta.*

…maſto-mus. 38. T. teſta ovata ſolida glabra: anfractibus ſenis ſtriatis, apertura marginata ovali.

Scopol. delic. inſubr. 1. *p.* 67. *t.* 25. *f.* B. Bulinus hæmaſtomus.

Habitat — — — *teſta triunciali alba: anfractibus ventricoſis contiguis, primo ſupra rufeſcente, apertura intus fuſceſcente.*

…rrua-tus. 106. T. teſta ovata convexo-tranſverſim ſulcata & ruguloſo ſtriata, anfractibus cingulo nodoſo, fauce argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 295. 6. *vign.* 24. *f.* A. B. *Martyn Conch.* 2. *f.* 71.

Habitat ad novam Seelandiam.

…ndula-tus. 107. T. teſta ovato-convexa longitudinaliter undulatim ſtrigoſa: ſpira obtuſa, fauce argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 296. *t.* 196. *f.* 1640. 1641.

Martyn Conch. 1. *f.* 29.
Habitat ad novam Seelandiam & Hollandiam.

niveus. 108. T. teſta ſpirali nivea diaphana tranſverſim ſtriata: an-
fractibus ſæpe diſtortis. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 298. *t.*
165. *f.* 1587. 1588.
Kaemm. Cab. Rudolſt. t. 8. *f.* 4. 5.
Habitat ad inſulas nicobaricas.

helicoides. 109. T. teſta cornea ſubdiaphana tricarinata læviuſcula:
anfractibus prioribus diſtantibus, apertura triangulari.
Chemn. Conch. 10. *p.* 298. *t.* 165. *f.* 1589. 1590.
Habitat in mari indico, *nonne potius ad helices ſpectat*

*** Solidi, *umbilico perforato.*

pica. 39. T. teſta conico-rotundata lævi: denticulo umbilicali.
Muſ. Lud. Ulr. 655. *n.* 346.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* G. Pica.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 12. *f.* 7. Livon.
Liſt. Conch. t. 640. *f.* 30.
Petiv. gazoph. t. 70. *f.* 9.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 29. 30.
Gualt. teſt. t. 68. *f.* B.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 52.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 1. & 2. *t.* 21. *f.* 3?
Bytem. app. t. 12. *f.* 51.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 66. & *t.* 11. *f.* 57. & 5. *t.* 176.
Chemn. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1420. 1421. & 5. *t.* 176.
f. 1750. 1751.
Schroet. Journ. 5. *f.* 15.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1850?
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 185. *f.* 1851?
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 178. *f.* 1769. 1770?
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 1. 2.
Habitat frequens in mari *fere omni, teſta ſolida* $2\frac{1}{4}$ *pollices alta,* $3\frac{1}{2}$ *lata nigro-radiata, columella tenui alba, anfractibus* 6 *convexis, umbilico canali duplici obtuſo.*

ſanguineus. 40. T. teſta ſubumbilicata conico-convexa ſtriata lævi: anfractibus ſubſulcatis.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1756. 1757.
Habitat in Africæ *littore, teſta convexa, ſanguinea, piſi magnitudine: umbilico nunc perforato, nunc clauſo.*

argyroſtomus. 41. T. teſta ſubovata exarata lineis dorſalibus elatioribus tranſverſe ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 656. *n.* 347.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* F. Os argenteum.
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 6.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 5.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 50.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1758-1761. & *f.* 1763-1765.
β) *Valent. Abh. t.* 9. *f.* 79-81.
γ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 74. *f.* 20-22.
Habitat potiſſimum in India, *cochlo affinis, teſta albida; fuſco radiata, apice interdum rubra: ſpiræ anfractibus 6 teretibus; primo reliquis multo majore, apertura argentea.*

margaritaceus. 42. T. teſta ſubovata: lineis dorſalibus elatioribus lævibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 656. *n.* 348.*
Rumpf muſ. t. 19. *f.* 3. 4.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* A?
Seb. muſ. 3. *t.* 74. *f.* 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 43.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1762.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 29. 1. *t.* 3. *f.* 18.
Habitat rarior in mari indico, *teſta ventricoſa fuſco, viridi & flaveſcente varia, ſpiræ anfractibus* 5-6.

verſicolor. 43. T. teſta glaberrima ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata viridi alboque varia: anfractibus planiuſculis contiguis; primo maximo rotundato.
Liſt. Conch. t. 576. *f.* 29.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1740 1741.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1747. a. b.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1747. c. d.
Habitat in Oceano auſtrali; *ſpiræ anfractibus 4, labro ſubfiſſo crenato, apertura matris perlarum inſtar nitente.*

Delphinus. 44. T. teſta umbilico hiſpido: anfractibus ſpinis ramoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 657. *n.* 349.*
Argenv. Conch. t. 6. *f.* H. Delphinus.
Rumpf muſ. t. 20. *f.* H. Cochlea laciniata.
Valent. Abh. t. 5. *f.* 41.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 1.
Grew. muſ. t. 11. *f.* 5. 6.
Liſt. Conch. t. 608. *f.* 45.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 31.

Gualt. teſt. t. 68. f. C. D.
Seb. muſ. 3. t. 59. f. 12-27.
Knorr Vergn. t. 22. f. 4. 5. & 4. t. 7. f. 2. 3. & 8. f. 1.
Regenſ. Conch. 1. t. 8. f. 14.
Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1727-1735.
β) *Chemn. Conch. 5. t. 174. f. 1725-1726.*
γ) *Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1736.*
Habitat rarior in India, *teſta fuſca, nigricante aut rubello albo varia, infinita, ſi magnitudinem, anfractuum ſuperficiem, ſpinarum formam & ambitum ſpectes, varietatis, umbilico ſpinis ſquamiſque horrido, anfractibus tranſverſim ſtriatis utplurimum biſariam ſpinoſis extimis complanatis.*

nodulo-ſus. 45. T. teſta depreſſa nodoſa granulatim tranſverſim ſtriata: anfractus primi carina dorſali inæqualiter tuberculata.
Chemn. Conch. 5. t. 174. f. 1723. 1724.
Habitat rarus in India, *teſta ex rubello alba, granulis nigris.*

diſtortus. 46. T. teſta ſubmucronata undique ſpinis lævibus. *Muſ. Lud. Ulr. 657. n. 350.**
Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1737-1739.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 32. 1. t. 3. f. 19.
Habitat in India, *teſta roſea baſi alba multifariam noduloſa, nodulis ſanguineis, apertura & umbilico lævi flaviſi, ſpiræ anfractibus 6 prominulis, diſtantibus, ſulco diſtinctis: carina media noduloſa.*

ſtellaris. 47. T. teſta vireſcente baſi convexa: anfractibus radiato-ſpinoſis; primi ſpinis duodecim maximis.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1553.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta* $\frac{5}{4}$ *pollicis alta,* $\frac{7}{4}$ *lata.*

aculeatus. 48. T. teſta baſi convexa: anfractibus ſpinis laciniatis coronatis; primo novem maximis, extimis complanatis.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1554. 1555.
β?) *Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1556. 1557.*
Habitat rarus ad inſulas Nicobaricas, *ſpinis thalaſſinis.*

ſtellatus. 49. T. teſta flavicante ſubpyramidali baſi complanata: anfractibus margine inferiori ſpinuloſis.
Knorr Vergn. 4. t. 4. f. 5.
Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1558. 1559.
Habitat - - -

Meſpilus. 50. T. ſpiræ anfractibus convexis faſcia fuſco alboque teſſellata diſtinctis, apertura argentea, columella alba.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1742. 1743.
Habitat in Oceano auſtrali; *colore meſpilos referens.*

granulatus. 51. T. teſta annulis granulato-nodoſis cincta ſordide viridi apice rubella: apertura intus argentea, columellæ labio aurantio maculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1744. 1745.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 176. *f.* 1746
γ) *Liſt. Conch. t.* 575. *f.* 28.
Habitat in mari indico & auſtrali.

Ludus. 52. T. teſta ſupra impreſſa ſubtus concava: ſpira annulata; anfractu primo maximo, umbilico cochleato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 176. *f.* 1748. 1749.
Habitat in mari auſtrali, *teſta heic alba, ibi viridi, maculis obſcuris violaceis viridibus & rubris utplurimum teſſellatis.*

atratus. 53. T. teſta nigricante: cingulis granorum moniliformibus alternatim binis nigris & cinereis, columella unidentata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 177. *f.* 1754. *f.* 1755.
Habitat ad inſulas Nicobaricas, *teſta avellanæ magnitudine.*

dentatus. 54. T. teſta depreſſa orbiculata alba fuſco varia: columellæ margine inferiori denticulato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 178. *f.* 1767. 1768.
Habitat. - - -

Diadema. 55. T. teſta ſordide viridi fuſco varia filis confertis quaſi cincta: anfractibus quatuor; primo maximo.
Chemn. Conch. 5. *p.* 145. *vign.* 43. *f.* A. B.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta magna.*

cinereus. 56. T. teſta lævi ſubrotunda cinerea albo nigroque varia: anfractibus ſubſtriatis ventricoſis ad ſuturam complanatis.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 356. 357. *t.* 12. *f.* 25. 26.
Habitat - - -

carinatus. 57. T. teſta tenui diaphana alba rotundo-pyramidali: anfractibus carinatis, umbilico ſpirali.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 361. 362. *t.* 13. *f.* 3. 4.
Habitat - - - *ſpiræ anfractibus* 6.

afer. 58. T. teſta tenui lævi: anfractibus complanatis. *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 171. *t.* 12. *f.* 3. Daki.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 172. *t.* 12. *f.* 4. Rifet.
Habitat in Senegalia, *teſta vix 2 lineas longa fuſca, fulva aut griſea.*

planorbis. 59. T. teſta depreſſa lævi fuſca opaca. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 394. *n.* 393.
Habitat frequens in ſabulo littorum Groenlandiæ *limoſo ſub lapidibus marinis teſtæ diametro* 1 – 1½ *lineæ, anfractibus* 4.

marginellus. 102. T. teſta hyalina lævi ſubcarinata, anfractibus ſex rotundatis, labro fimbriato reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1063.
Habitat - - -

helicoides. 103. T. teſta alba ſupra lineis angulatis fuſcis varia, anfractibus rotundatis: umbilico profundo amplo infundibuliformi. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1067. 1068.
Habitat - - -

foliaceus. 104. T. teſta pyramidali rugis lamellatis inæquali alba roſeo varia: umbilico amplo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1069. 1070.
Habitat - - -

Anguis. 110. T. teſta tranſverſim ſtriata viridi nigro virgata intus margaritacea. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 70.
Habitat ad Veleſiam auſtralem.

Porphyrites. 111. T. teſta granulata atro, viridi flavo alboque varia, ſubumbilicata intus margaritacea. *Martyn Conch.* 2. *t.* 72.
Habitat ad novam Caleda.

ſmaragdus. 112. T. teſta glaberrima ſtriata viridi. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 73. 74.
Habitat ad novam Seelandiam.

**** Cancellati.

crenellus. 60. T. teſta umbilico patente planiuſcula, anfractibus teretibus: ſtriis crenatis.
Habitat - - - *teſta ſolida, rufa, magnitudine ſeminis lupini, ſupra plano-convexa, ſubtus concava: ſtriis longitudinalibus.*

thermalis. 61. T. teſta umbilicata oblongiuſcula obtuſa: anfractibus teretibus lævibus.

Habitat prope thermas piſanas *in* aquis dulcibus, *teſta alba, ſemine braſſicæ paulo majore, anfractibus quaternis, umbilico minore.*

ſcalaris. 62. T. teſta conica anfractibus diſtantibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 658. *n.* 351.*

Argenv. Conch. t. 11. *f.* V. Scalaris.
Rumpf muſ. t. 49. *f.* A. Scalare, Wendeltrap.
Pet. amb. t. 2. *f.* 9.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 101.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* ZZ.
Knorr Vergn. 4. *t.* 20. *f.* 2. 3. & 5. *t.* 23. *f.* 1. & *t.* 24. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 152. & 153. *f.* 1426. 1427. 1430-1433.
Spengl. ſelt. Conch. t. 1. *f.* B.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 7.
β) *Pall. ſpic. zool.* 10. *t.* 3. *f.* 5. 6. Turbo principalis.
Martin. berl. Samml. 7. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1428. 1429.

Habitat pretioſus ad Barbariæ *littora,* β) *rarior in arena littoris* Coromandel, *teſta ad* 2-2½ *pollices longa, alba, aut rubella coſtis albis, umbilicata* β) *imperforata, columella nulla, anfractibus rotundatis* 8, *in* β) 10, *coſtis tenuibus, carinatis, ſubobliquis, longitudinalibus, continuis. Vix varietas clathri.*

Clathrus. 63. T. teſta turrita ex umbilicata: anfractibus contiguis lævibus. *Fn. ſuec.* 2170. *Muſ. Lud. Ulr.* 658. *n.* 352.*

Rumpf muſ. t. 29. *f.* W. Buccinum ſcalare.
Rondel. teſt. 89. *f.* 5
Liſt. Conch. t. 588. *f.* 51.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 111.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* H.
Klein. oſtr. t. 3. *f.* 66.
Planc. Conch. t. 5. *f.* 7. 8.
Ginann. adr. 2. *t.* 6. *f.* 54.
Bytem. app. t. 12. *f.* 54.
Knorr Vergn. 1. *t.* 11. *f.* 5. 4. *t.* 71. *f.* 5. & *t.* 20. *f.* 4-6. & 6. *t.* 39. *f.* 3.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1434-1438.
β) *Liſt. Conch. t.* 588. *f.* 50.

Habitat frequens in mari mediterraneo atlantico, indico, *teſta vix* 2 *pollices longa, utplurimum alba, aliquando*

punctata aut lineata, interdum ſubfuſca obſcurius faſciata, ſpiræ anfractibus anguſtioribus & minus convexis, coſtis 12-16, *utplurimum convexis a ſcalari diſcernenda. Ex hac purpura violacea veterum, nec punicea deſumta.* Plancus.

ambiguus. 64. T. teſta turrita umbilicata: anfractibus contiguis lævibus. *Habitat in* mari mediterraneo, *clathro ſimillimus, at umbilico, anfractibus pallidis lineis* 2-3 *ferrugineis pictis, coſtis duplo pluribus diſtinctus.*

crenatus. 65. T. teſta ſubcancellata turrita: anfractibus contiguis ſupra crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 659. *n.* 353.* *Habitat rarus - - - clathro affinis, teſta alba,* ¼ *fere pollicis longa: ſpiræ anfractibus* 8, *coſtis rotundatis hinc inde obſoletis.*

lacteus. 66. T. teſta turrita: ſtriis longitudinalibus elevatis confertis. *Ginann. adr. t.* 6. *f.* 55. *Habitat in* mari mediterraneo, *clathro ſimilis, at minor, teſta grani hordei magnitudine, nivea, ſtriis non membranaceis.*

ſtriatulus. 67. T. teſta ſubcancellata turrita: anfractibus contiguis, cinguliſque varicoſis interceptis. *Habitat in* mari mediterraneo; *teſta alba, magnitudine ſeminis hordei: anfractibus cinctis ſtriis membranaceis parvis, paſſimque rugis convexis calloſis, apertura obovata ſubtus ſubangulata.*

Uva. 68. T. teſta ovata obtuſa: anfractibus contiguis; ſtriis longitudinalibus imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 659. *n.* 354.
Pet. gaz. t. 27. *f.* 2. Olivaris ſtriata faſciata.
Liſt. Conch. t. 588. *f.* 47-49.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 140.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 55. *f.* 21.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 340. *vign. f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 153. *f.* 1439. a. b.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 2. *f.* 7.
β) *Spengl. n. Schr. daen. Geſ.* 1. *t.* 2. *f.* 7?
Chemn. Conch. 9. *t.* 113. *f.* 974.
γ) *Liſt. Conch. t.* 40. *f.* 38.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 965.

Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente, teſta ad* 1½ *pollicem longa, alba, cinerea aut ſpadicea, umbilicata, anfractibus circiter* 12, *primo triplo majore ſecundo: ſulcis intermediis ſtriis æqualibus, apertura unidentata.*

corneus. 69. T. teſta umbilicata rotundata acutiuſcula: anfractibus teretiuſculis decuſſato-ſtriatis, apertura reflexa. *Muſ. Lud. Ulr.* 660. *n.* 355.

Habitat - - - teſta pellucida fuſca aut cornea: apertura intus alba, umbilico pervio.

reflexus. 70. T. teſta umbilicata convexo-prominula: anfractibus teretibus ſubſtriatis, apertura reflexa.

Habitat in Europa *auſtrali.*

Lincina. 71. T. teſta oblonga obtuſa rugoſo-ſtriata, apertura limbo dilatato plano crenato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 178. *n.* 364. Nerita (Licinia) teſta ovata incarnata ſtriata, apertura in puncto adnata.

Petiv. gaz. t. 118. *f.* 11.

Liſt. Conch. t. 26. *f.* 24.

Klein oſtr. t. 3. *f.* 71. a. b.

Sloan. jam. 2. *t.* 240. *f.* 12. 13.

Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1060. a-e.

Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 54.

Habitat in Jamaica & inſulis vicinis, *teſta 8 circiter lineas longa, dura, pellucida, umbilicata, anfractibus* 5.

lunulatus. 72. T. teſta cylindrica alba reticulata: apertura remota.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 180. *n.* 366. Nerita lunulata.

Habitat - - - teſta dura, pellucida, 7 lineas longa, anfractibus 5, lineis lunularum rufeſcentium tranſverſis 4 - 5 notatis.

Labeo. 73. T. teſta oblonga umbilicata fuſca punctis convexis ſtriata: labro albo dilatato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 180. *n.* 367. Nerita Labeo.

Brown jam. p. 401. *t.* 40. *f.* 5.

Liſt. Conch. t. 25. *f.* 23.

Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 43?

Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1061. 1062.

Habitat in Jamaica, *teſta 15 lineas longa, pellucida, punctis ſplendidis, fauce fuſca glabra, anfractibus 5 protuberantibus, umbilico pervio.*

elegans. 74. T. teſta ovata cinerea ſpiraliter convexa ſtriata: apertura adnata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 177. *n.* 363. Nerita elegans.
Column. purp. c. 9. *p.* 27.
Liſt. Conch. t. 27. *f.* 25.
anim. angl. t. 2. *f.* 5.
exerc. anat. p. 2. *t.* 1.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 11. 12.
zoomorph. t. 9. *f.* 9.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 604. *t.* 1. *f.* 4. 6.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 15. a. b.
Geofr. teſt. 1.
Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ *fluviis? teſta diurna, imperforata, 6 lineas longa, anfractibus 5 convexis, operculo corneo, cochleato, ſtriis ſubtiliſſimis radiantibus exarato.*

dubius. 75. T. teſta oblonga umbilicata: anfractibus æqualibus decuſſato ſtriatis, apertura dilatata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt t. 13. *f.* 5. 6. Turbo Lincina.
Habitat - - -

limbatus. 105. T. teſta ſubovata rugoſa perforata alba. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 123. *f.* 1075. *a. β.*
Habitat in Coromandel.

***** Turriti *proprie dicti.*

imbricatus. 76. T. ſpiræ anfractibus deorſum imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 660. *n.* 356.*
Gualt. teſt. t. 58. *f.* E.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 26. 31. 33. 34.
Knorr Vergn. 2. *t.* 27. *f.* 1. & 6. *t.* 25. *f.* 2.
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1422.
Habitat in inſulis Americæ *mediæ* obverſis, *teſta fuſca variegata, rarius cinerea, ad 4* pollices *longa, anfractibus 12-18 intus albis complanatis tranſverſim ſtriatis: ſtriis ſubtiliſſime granulatis.*

replicatus. 77. T. teſta lævi: anfractibus ſurſum imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 661. *n.* 357.*
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 24.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* E.
Knorr Vergn. 6. *t.* 25. *f.* 3?

Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1412.
β) *Liſt. Conch. t.* 590. *f.* 55.
Habitat Tranquebariæ, *teſta* 3 *pollices longa, & longiori, cornea, β) fuſca, tenuiſſime tranſverſim ſtriata: ſpiræ anfractibus circiter* 10, *apertura ovali.*

acutangulus. 78. T. ſpiræ anfractibus carina unica majore acuta. *Muſ. Lud. Ulr.* 661. *n.* 358.*
Liſt. Conch. t. 591. *f.* 59.
Bonann. recr. & muſ. Kircher 3. *f.* 117?
Gualt. teſt. t. 58. *f.* B.
Knorr Vergn. 3. *t.* 19. *f.* 5.
Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1413.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 19. *f.* 5.
Habitat ad Tranquebariæ *littora, teſta ad* $4\frac{1}{4}$ *pollices longa cornea, cinerea aut ochroleuca, rarius hyalina, anfractibus* 15–17 *tranſverſim ſtriatis teretibus.*

duplicatus. 79. T. ſpiræ anfractibus carinis duabus acutis. *Muſ. Lud. Ulr.* 662. *n.* 359.*
Liſt. an. angl. t. 3. *f.* 7.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 114.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 7. 8.
Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1414.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 4. *f.* 5.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt.* 1. *p.* 368. *t.* 13. *f.* 8. Turbo torcularis.
Habitat ad littora Coromandel, *acutangulo affinis, teſta ad* 6 *pollices longa, carnea, cornea intuſque fuſca, cæruleſcente, aut violacea, interdum faſciata; anfractibus ad* 16 *tranſverſim ſtriatis.*

exoletus. 80. T. ſpiræ anfractibus carinis duabus obtuſis diſtantibus.
Liſt. Conch. t. 591. *f.* 58.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 113.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* 10.
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1424. 1425.
Knorr Vergn. 6. *t.* 39. *f.* 2.
Schroeter Fluſconch. t. 8. *f.* 10.
inn. Bau Conch. t. 3. *f.* 6.

Turriculæ autorum militant ſub murice, ſtrombo, buccino, trocho, turbine:

Habitat ad Guineæ *littora, teſta, vix 2 pollices longa, nunc eburnea, nunc alba fuſco, rarius cæruleſcente varia, rariſſime alba, intus fuſco-faſciata, anfractibus complanatis, contiguis, tranſverſim ſtriatis.*

Terebra. 81. T. Spiræ anfractibus carinis ſex acutis. *Fn. ſuec.* 2171.
Muſ. Lud. Ulr. 662. *n.* 460.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 10. *f.* 6. Ligar.
Columbn. aq. t. 53. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 590. *f.* 54.
anim. angl. t. 3. *f.* 8.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 23. 115.
Rumpf muſ. t. 30. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 58. *f.* A.
Argenv. Conch. t. 11. *f.* D.
zoomorph. t. 4. *f.* F?
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 12. 18. 25. 32. 40.
Knorr Vergn. 1. *t.* 8. *f.* 6.
Martin. Conch. 4. *t.* 151. *f.* 1415-1419.
β) *Adanſ. Seneg.* 1. *p.* 159. *t.* 10. *f.* 7. Meſal.
γ) *Regenſ. Conch.* 2. *t.* 12. *f.* 57.
Martyn Conch. 1. *rubr.*
Chemn. Conch. 10. *t.* 165. *f.* 1591.
δ) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1592. 1593.
Habitat in mari Sinam, Africam occidentalem, Angliam, Sueciam *alluente*, adriatico, *teſta fuſca vel ſubfuſca, creberrime alba 2 ad 6 fere pollices longa, anfractibus ad 36 ſubconvexis, diſcretis, ſingulis carinis 5-9.*

variegatus. 82. T. ſpiræ anfractibus planiuſculis; ſtriis ſeptem obſoletis.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 112.
Seb. muſ. 3. *t.* 56. *f.* 30. 37. 38.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 8?
Martin. Conch. 4. *t.* 152. *f.* 1423.
Habitat in mari, Americam auſtralem & Barbariam *alluente, imbricato affinis, teſta 2-3 pollices longa, teſta variegata fuſca vel ex fuſco lutea, 2-3 pollices longa, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, anfractibus ſubconvexis: ſtrigis nonnullis maculoſis.*

unguli-nus. 83. T. ſpiræ anfractibus ſtriis decem exoletis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2930.
Habitat in mari Europæo, & mediterraneo, *inter terebrum & variegatum quaſi medius, verme ventricoſo proboſcide*

longiſſima emiſſili apice globoſa & cirris plurimis armata inſtructo, teſta 2-4½ pollices longa albo varia ex fuſco lutea vel ſpadicea, anfractibus ad 24 uſque.

ryſtallinus. 84. T. ſpiræ anfractibus coſtatis: apertura ovata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2929.

Habitat in mari Daniam *alluente.*

Albulus. 85. T. teſta imperforata glabra: anfractibus rotundatis ſtriatis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 394. *n.* 392.

Habitat rarus in profundis maris Groenlandiam *alluentis ad ramulos ſertulariarum, teſta pellucida, albida, fragili longitudinaliter ſulcata, vix* 1⅓ *lineam longa, anfractibus* 5 *ventricoſis lente decreſcentibus.*

...ulatus. 86. T. anfractuum ſutura marginata prominente.

Gualt. teſt. t. 58. *f.* L.

Habitat - - - teſta candida, ¼ *pollicis longa: apertura ſubovali.*

...dens. 87. T. teſta pellucida: anfractibus contrariis; ſutura ſubcrenata, apertura poſterius bidentata.

Müll. zool. dan. prodr. 2917. *verm. hiſt.* 2. *p.* 116. *n.* 315. Helix teſta turrita fuſca glabra ſiniſtrorſa: apertura canaliculata.

Liſt. Conch. t. 41. *f.* A.

Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 41.

Gualt. teſt. t. 4. *f.* D. E.

Stroem. act. Nidroſ. 3. *p.* 436. 437. *t.* 6.

Schroet. Erdconch. p. 136. A. B. *t.* 1. *f.* 4. a. & *f.* 5.
Einl. in Conch. 2. *p.* 55. 1. *t.* 3. *f.* 22.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 960. *n.* 1. 2.

β) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 120. *n.* 317. Helix papillaris.

Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 23.

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 963. 964.

γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 961. 962.

Habitat in Europa, *potiſſimum* auſtrali, *frequens* e. g. *in cavis arborum truncis, teſta glaberrima, dimidium circiter pollicem longa fuſca, rarius ex fuſco aurantia, anfractibus* 10-11, *in commiſſuris papillis vel denticulis albis munitis.*

...verſus. 88. T. teſta pellucida: anfractibus contrariis non crenatis, apertura tridentata. *Fn. ſuec.* 2172.*

Müll. zool. dan. prodr. 2918. *hiſt. verm.* 2. *p.* 118. *n.* 316. Helix teſta turrita fuſca ſtriata ſiniſtrorſa, apertura canaliculata.
Liſt. Conch. t. 40. *f.* 38. & *t.* 41. *f.* 39.
anim. angl. p. 124. *t.* 2. *f.* 10.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* C.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 11. 19. 20.
zoomorph. t. 9. *f.* 13. 14.
Geoffr. teſt. 23.
Stroem. act. Nidroſ. 3. *t.* 6. *f.* 17.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 2.
Schio terb. act. helvet. 5. *t.* 3. A. *f.* 17. 18.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 4. a. b. *f.* 5.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 959. a. b.
β) *Martin. berl. Mag. t.* 5. *f.* 60.
γ) *Liſt. Conch. t.* 20. *f.* 16?
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 958. α. β.
ε) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 957.
ζ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 112. *f.* 956.
η) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 114. *f.* 980. α. β.
Habitat vulgatiſſimus in Europæ ſilvis & muſcoſis; *teſta* ½ *circiter pollicis longa, dilute fuſca, tenui, glabra, rarius rugoſula, apertura alba.*

Fuſulus. 89. T. teſta obtuſa curvatim ſulcata: apertura edentula, anfractibus undecim.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 109. *n.* 309. Helix Fuſulus.
Habitat – – – *teſta*, $7\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

Fuſus. 90. T. teſta obtuſa recte ſulcata alba: apertura dentata, anfractibus novem.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 108. *n.* 308. Helix Fuſus.
Bonann. recr. 3. *f.* 140.
Habitat – – – *teſta fuſiformi, apertura lunata, labro reflexo.*

ſulcatus. 91. T. teſta obtuſa oblique ſulcata alba: apertura ſubquadrata, labro reflexo.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 108. *n.* 387. Helix ſulcata.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1231. 1232.
Habitat – – – *teſta ſubpellucida, alba, immaculata, ſubventricoſa,* 12 *lineas longa, anfractibus* 8, *apertura perpendiculari.*

quadridens. 92. T. teſta ſiniſtrorſa flavicante: apertura quadridentata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 107. *n.* 306. Helix quadridens. *Liſt.*

Liſt. Conch. t. 40. *f.* 38.
Geoffr. teſt. 24.
Habitat in Italia, *teſta glabra* 5 *lineas longa, anfractibus* 9, *apertura arcuata, labro ſubreflexo dentibuſque albis.*

tridens. 93. T. teſta albida: apertura tridentata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 106. *n.* 305. Helix tridens.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* F.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1236.
Habitat in Italia, *teſta glabra, minutiſſime ſtriata,* 5 *lineas longa, anfractibus* 7, *apertura arcuata, labro ſubreflexo.*

muſcorum. 94. T. teſta ovata obtuſa pellucida: anfractibus ſenis ſecundis, apertura edentula. *Fn. ſuec.* 2173.* *It. oel.* 99.
Müll. zool. dan. prodr. 2915. *hiſt. verm.* 2. *p.* 105. *n.* 304.
Helix teſta cylindracea obtuſa: apertura edentula orbiculata, labro albo.
Liſt. anim. angl. t. 2. *f.* 6.
Argenv. zoomorph. t. 9. *f.* 11.
Stroem. act. Nidroſ. 3. *t.* 1. *f.* 7.
Geoffr. teſt. 20.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 63.
Schroeter Erdconch. t. 1. *f.* 7.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1076. *n.* 1. 2.
β) *Liſt. anim. angl. t.* 2. *f.* 8?
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 17.
Martin. berl. Magaz. 3. *t.* 5. *f.* 55.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 6.
Habitat frequens in Europæ muſcis, *teſta lineam longa, tenera, glabra, dilute fuſca, anfractibus* 5-6, *apertura limbo albo, in* β) *dentibus* 8 *munita.*

obtuſus. 95. T. teſta fragili: anfractibus quinis diſtinctis tranſverſim ſtriatis albulo-faſciatis. *Scopol. delic. inſubr.* 1. *p.* 68. *t.* 25. *f.* C.

Habitat - - - *teſta rufeſcente, digiti auricularis longitudine imperforata, anfractibus rotundatis: ſingulis faſcia albida; primo duplici, apertura ſubovata, operculo griſeo.*

Auriſcalpium. 96. T. teſta alba læviſſima; aperturæ labio porrecto planiuſculo concavo obtuſo.
Argenv. Conch. t. 32. *f.* 19?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ſubulata lactea: anfractibus* 7-8, *apertura dilatata auriſcalpium referente, marginata.* Logie.

politus. 97. T. teſta imperforata glaberrima: apertura ovata.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta nivea, non pellucida, nitidiſſima, grani hordei magnitudine, anfractibus linea excavata tenui interſtinctis.*

nautileus. 98. T. teſta planiuſcula: anfractibus annulatis dorſo criſtatis.
Syſt. nat. X. I. *p.* 709. *n.* 234. Nautilus Criſta.
Müll. zool. dan. prodr. 2286. *hiſt. verm.* 2. *p.* 165. *n.* 351. Planorbis (imbricatus) teſta alba umbilicata: carina dentata.
Roeſ. inſ. 3. *t.* 97. *f.* 6. 7.
Hofer act. helv. 4. *p.* 212. *t.* 9. *f.* 21. 22.
Geoffr. teſt. 8.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 269.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1077. A. a.
Habitat in Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ, Daniæ ceratophyllo, *aliiſque plantis aquarum ſtagnantium, teſta diametri dimidiæ lineæ*, pellucida, *fragiliſſima, albo pallida vel cinerea, ſupra plana, ſubtus convexa umbilicata, anfractibus* $2\frac{1}{2}$, *apertura longa; nonne potius ad tertiam tribum referendus?*

obſoletus. 99. T. ſpiræ anfractibus carinis duabus obſoletis approximatis. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 13. *f.* 7.
Habitat - - - exoleto affinis.

quinque- 100. T. teſta ſubumbilicata albida: apertura quinquedentata.
dentatus. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt.* I. *p.* 378. *t.* 13. *f.* 9.
Habitat - - - bidenti affinis, teſta ſubpellucida: anfractibus 12.

pyrami- 101. T. teſta cornea pellucida ventricoſo-pyramidali: aper-
dalis. tura ſupra ſubcompreſſa.
Schroet. Erdconch. t. I. *f.* 8.
Habitat rarius in Germania, *teſta* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ad ſolem & aerem primo cineraſcente, poſt albicante & opaca.*

328. **HELIX.** *Animal* Limax.

Teſta univalvis, ſpiralis, ſubdiaphana, fragilis.

Apertura coarctata, intus lunata ſ. ſubrotunda: ſegmento circuli demto.

* Ancipites, *teſta longitudinaliter utrinque angulata.*

Scarabæus. 1. H. teſta ovata ſubancipiti: apertura dentata. *Muſ. Lud. Ulr.* 663. *n.* 361. *
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 88. *n.* 286. Helix (Pythia) teſta ſubumbilicata ovata utrinque ſubcarinata, apertura dentata.
Rumpf muſ. 91. *t.* 27. *f.* 1. Cochlea imbrium.
Liſt. Conch. t. 577. *f.* 31. 32.
Pet. gaz. t. 4. *f.* 10.
amboin. t. 12. *f.* 8.
Bonann. recr. 3. *f.* 385.
muſ. Kircher. 3. *f.* 370.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 9. *f.* T.
Seb. muſ. 3. *t.* 60. *infra in angulo.*
Klein. oſtr. t. 1. *f.* 23. 24.
Knorr Vergn. 6. *t.* 19. *f.* 2. 3.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. 1. *p.* 364. *vign. f.* a.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 6. *f.* 67.
Favann. Conch. t. 65. *t.* D¹. D. D⁴.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1249-1253.

Habitat in Aſiæ montibus, inſulis amicis, *olim cum pluvia cœlitus delabi credita, teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa fuſco alboque varia, anfractibus contiguis: primo convexo, apertura anguſta, compreſſa ſubflexuoſa, labio utroque tridentato, exteriori acuto & inæquali.*

** Carinatæ, *anfractuum margine acuto.*

Lapicida. 2. H. teſta umbilicata utrinque convexa: apertura tranſverſali marginata ovata. *Fn. ſuec.* 2174. * *Muſ. Lud. Ulr. n.* 362. * *It. wgoth.* 27.
Müll. zool. dan. prodr. 2899. *hiſt. verm.* 2. *p.* 40. *n.* 240. Helix teſta umbilicata carinata depreſſa maculata, apertura tranſverſa alba.

Liſt. Conch. t. 69. f. 68.
anim. angl. t. 2. f. 14.
exerc. anat. p. 182. t. 5. f. 4.
Petiv. gazoph. t. 92. f. 11.
Geoffr. teſt. 10.
Schlotterb. act. helv. 5. t. 3. f. 15.
Martin. berl. Magaz. 2. t. 3. f. 36.
Schroet. Erdconch. p. 191. n. 64. 65. t. 2. f. 23.
Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1107.
Habitat in Europæ rupibus terreſtribus & arborum *truncis ut laura lignum, ſic calcem rodere perhibita, vegetabilibus victitans, teſta diametri ſemipollicaris, oculis armatis eleganter ſtriata, fuſco cornea, maculis ferrugineis, aut fuſca albo varia, rarius hyalina anfractibus 5, umbilico pervio.*

marginata. 3. H. teſta ſubumbilicata ſubdepreſſa oblique ſtriata alba: faſciis rufis, apertura tranſverſali. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 41. n. 241.*
Habitat - - - indiſcretæ affinis, teſta diametri 9 linearum, ſupra convexa, ſubtus planiuſcula, anfractibus 4 glabris, primo trifaſciato, reliquis bifaſciatis, apertura ſubtriangulari.

cicatricoſa. 4. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa ruguloſa flavicante: lineis concentricis rufis, anfractibus contrariis. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 42. n. 242.*
Argenv. Conch. app. t. 1. f. C.
Petiv. gaz. t. 76. f. 6?
Kaemmerer Cab. Rudolſt. t. 11. f. 6.
Chemn. Conch. 9. t. 109. f. 123. vign. 19. l. A.
Favann. Conch. t. 63. f. K.
Habitat rara - - - teſta tenera, pellucida, ſupra convexa, ſubtus gibba, anfractibus 5, extimo rufo faſciato, umbilico pervio, apertura ſubquadrata, intus alba.

Ægophthalmos. 5. H. teſta umbilica ſubdepreſſa virideſcente immaculata: anfractibus ſeptem. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 39. n. 239.*
Rumpf. muſ. 1. t. 27. f. P.
Petiv. gazoph. t. 21. f. 6.
Argenv. Conch. t. 6. f. E.
Brown jam. p. 450. t. 40. f. A. B.
Habitat in India, Barbaria & auſtrali America, *teſta diametri interdum pollicaris, cornea ex luteo vireſcente, expallescendo albida ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, anfractibus*

6-7, *in juniori ſubcarinatis, umbilico pervio, apertura lunata acuta, fauce alba.*

Oculus capri. 6. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa: apertura marginata. *Muſ. Lud. Ulr.* 664. *n.* 363.*
Rumpf muſ. t. 27. *f.* O?
Argenv. Conch. t. 8. *f.* F.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 10?
β) *Martyn. univ. Conch.* 1. *t.* 28.
Habitat in Aſiæ *arboribus, teſta albida, glabra, centro fuſca, anfractibus ſubdepreſſis ex fuſco luteis, apertura alba infra flava, umbilico pervio.*

Albella. 7. H. teſta umbilicata planiuſcula ſubtus gibba: apertura ſemicordata. *Fn. ſuec.* 2175.* *It oel.* 65.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 26. *n.* 228. Helix explanata.
Liſt. Conch. t. 64. *f.* 62. *t.* 80. *f.* 81. & *t.* 140. *f.* 46. 47.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* Z.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1105. 1106.
Habitat in Europæ rupibus, *teſta glabra, alba, immaculata, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, diametri* $5\frac{1}{2}$ *linearum, anfractibus* 5.

maculata. 8. H. teſta perforata planiuſcula ſubcarinata alba fuſco punctata ſubtus gibba: faſciis linearibus. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 25. *n.* 227.
Habitat - - - teſta alba, diametri $4\frac{1}{2}$ *linearum: faſciis* 2 *expunctis fuſcis; anfractibus* 3.

Albina. 9. H. teſta perforata planiuſcula alba ſubtus gibba: apertura quadrangulari. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 25. *n.* 226.
Liſt. Conch. t. 86. *f.* 86?
Habitat - - - Albellæ ſimilis, teſta immaculata diametri 3 *linearum anfractibus* 3; *an diſtincta ſpecies?*

ſtriatula. 10. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa ſtriata ſubtus gibboſiore: apertura ſubrotundo lunata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 33. *n.* 235? Helix polita.
Habitat Algiriæ & ? *in* ripis torrentum Lombardiæ, *teſta minuta, griſea vel candidiſſima glaberrima, oculo armato argute tranſverſim ſtriata, anfractibus* 4-5. E. Brander.

algira. 11. H. teſta ſubangulata umbilicata convexa: anfractibus ſenis, umbilico pervio.
Favann. Concl. t. 63. *f.* L.

Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1093. 1094.
β) *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 14. *f.* 3. 4 ?
Habitat in Mauritania, *ſtriatulæ affinis, at ſpiræ anfractibus* 6, *umbilico patentiſſimo, anfractuum angulo obſoleto diſtincta.*

Leucas. 12. H. teſta ſubcarinata umbilicata convexa lævi ſubtus gibboſa: umbilico minutiſſimo, apertura ſubrotundo-lunata.
Habitat in Africa, *teſta albida, ſupra faſcia, ſubtus lineis purpuraſcentibus.* E. Brander.

lævipes. 13. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſubcarinata ſiniſtrorſa pallida: faſcia rufa albæ adnata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 22. *n.* 222.
Chemn. Conch. 9. *t.* 108. *f.* 915. 916.
Habitat - - - exili aliquantum affinis, teſta pellucida, diametri $\frac{3}{4}$ *pollicis tenera, ſubtus magis convexa alba, anfractibus* 5 *ſubtiliſſime tranſverſim ſtriatis, apertura margine acuto.*

vermiculata. 253. H. teſta ſubgloboſa depreſſa ſcabra imperforata albo-punctata: faſciis quatuor fuſceſcentibus, labro reflexo candido. *Müll. hiſt. verm.* 2. p. 20. *n.* 219.
Petiv. gaz. t. 52. *f.* 11.
Favann. Conch. t. 64. *f.* K². K³.
Chemn. Conch. 9. *t*, 129. *f.* 1148. a. b. c.
Habitat in Italia & Luſitania.

exilis. 14. H. teſta perforata depreſſa ſubcarinata pallida: faſcia rufa albæ adnata, anfractibus ſtriatis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 22. *n.* 222. I–
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1149.
Habitat Tranquebariæ, *teſta diametri* 10 *linearum, pellucida, tenera, ſubtus convexa alba, anfractibus* 5, *aperturæ margine acuto.*

candida. 15. H. teſta umbilicata utrinque convexa; apertura non marginata. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 172. *n.* 45.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 423. *t.* 3. *f.* 22. 23.
Habitat - - - lapicidæ affinis, at teſta teneriore, 5 *lineas alta,* 10 *lata, umbilico anguſtiore.*

ſpadicea. 16. H. teſta perforata ſubdepreſſa umbilicata ſpadicea, anfractibus quinque. *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 172. *t.* 11. *f.* 2.
Habitat - - - incarnatæ affinis, teſta 7 *lineas alta* 11 *lata, ſpadicea, umbilico labiique margine albido*

incarnata. 17. H. teſta perforata ſubgloboſa ſubcarinata cornea : anfractibus ſex, labro incarnato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 63. *n.* 259.
Schroet Erdconch. p. 174. *n.* 52-54. *t.* 2. *f.* 18.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1206.
Habitat rara in Daniæ, Germaniæ *nemoribus, teſta immaculata, diametri 6 linearum, carina pallida, umbilico anguſtiſſimo.*

hiſpida? sericea. 18. H. teſta perforata ſubgloboſa ſubcarinata utrinque convexa tomentoſa. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 62. *n.* 258.
Habitat in Daniæ hortis, *hiſpidæ affinis, teſta diametri 3 linearum, cornea, tranſparente, carina pallida.*

crenulata. 19. H. teſta perforata globoſa ſubcarinata ſtriata alba : faſcia fuſca. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 68. *n.* 263.
Liſt. Conch. t. 85. *f.* 85.
Habitat in Gallia Lugdunenſi, *teſta alba, minutiſſime ſtriata, diametri $3\frac{1}{2}$ linearum, apice fuſco, labro acuto, anfractibus* 5.

Planorbis. 20. H. teſta ſubcarinata umbilicata plana ſupra concava : apertura oblique ovata utrinque acuta. *Fn. ſuec.* 2176.
Müll. zool. dan. prodr. 2879. *hiſt. verm.* 2. *p.* 157. *n.* 344. Planorbis (carinatus) teſta pallida pellucida ſupra umbilicata, carina marginali media.
Liſt. anim. angl. t. 2. *f.* 27.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* EE.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 5.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 8.
Martin. berl. Magaz. t. 8. *f.* 18.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 5. 6.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 13-15.
β) *Liſt. Conch. t.* 138. *f.* 42.
Pet. gaz. t. 10. *f.* 11. & *t.* 100. *f.* 216.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1102. *n.* 1. 2.
Habitat in Europæ & Barbariæ aquis ſtagnantibus & fluviis, *teſta diametri* 1 *lineæ ad* $\frac{1}{2}$ *pollicis, pellucida cornea, rarius opaca, tenuiſſime ſtriata, anfractibus* 4-5, *primo reliquis multo majori.*

complanata. 21. H. teſta deorſum carinata umbilicata convexa ſubtus plana : apertura ſemicordata. *Fn. ſuec.* 2177. *
Müll. zool. dan. prodr. 2881. *hiſt. verm.* 2. *p.* 160. *n.* 346. Planorbis (umbilicatus) teſta fuſca opaca utrinque ſubumbilicata, carina marginali infera.

Geoffr. teſt. 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1121-1123.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 22-25. & *t.* 11. *minor. C. f.* 4.
Einl. in Conch. 2. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 1.
β) *Martin. Conch.* 4. *t.* 8. *f.* 22?
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 27?
Habitat frequens in Europæ & Barbariæ *aquis ſtagnantibus & rivulis, incola nigro: tentaculis rufis, teſta diametri* 1-6½ *linearum, fuſca interdum pallida, ſubpellucida, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, anfractibus* 5-6.

ingens. 22. H. teſta ſubcarinata imperforata convexa: apertura reſupinata; labio poſterius quadruplicato.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 17. *n.* 216. Helix teſta imperforata ſubcarinata, apertura reſupinata utrinque dentata.
Liſt. Conch. t. 99. *f.* 100.
Bonnan. recr. 3. *f.* 330. 331.
muſ. Kircher. 3. *f.* 331. 332.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 13. 14.
Martin. berl. Magaz. 2. *t.* 4. *f.* 42. a. b.
Favann. Conch. t. 63. *f.* F 10.
Chemn. Conch. 9. *t.* 109. *f.* 919. 920.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 11. 12.
β) *Liſt. Conch. t.* 83. *f.* 87.
γ) *Liſt. Conch. t.* 84. *f.* 84.
δ) *Liſt. Conch. t.* 87. *f.* 88.
Habitat rara in India? *teſta diametri interdum* 1½ *pollicis, ex fuſco lutea, vel cinerea aureo maculata, vel alba maculis ſubfuſcis, anfractibus* 6, *apertura oblongo-ovali, plicis vel dentibus* 4, 5, 6, 8.

ſinuata. 23. H. teſta imperforata ſubcarinata brunnea: carina candida: apertura tranſverſa dentata poſterius triplicata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 18. *n.* 217.
Liſt. Conch. t. 97. *f.* 98. & *t.* 98. *f.* 99.
Klein oſtr. p. 11. *n.* 31. d. 1.
Argenv. Conch. t. 63. *f.* F. 8?
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1110-1112.
β) *Liſt. Conch. t.* 96. *f.* 97.
Argenv. Conch. t. 63. *f.* F. 4.
γ) *Liſt. Conch. t.* 93. *f.* 93. 94.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 22.
Habitat in America, *teſta ſcabriuſcula, diametri* 9 *linearum utrinque planiuſcula: anfractibus* 5 *teretibus, labro reflexo.*

ucerna. 24. H. teſta imperforata alba ſupra planiuſcula ſubtus gibba: apertura tranſverſa bidentata. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 13. n. 212.*

Chemn. Conch. 9. t. 126. f. 1108. 1109.

Habitat - - - facie placentæ, at teſta decuplo minore, diametri 13 linearum, albo, neutiquam ſtriata, anfractibus valde depreſſis.

mpas. 25. H. teſta imperforata ſupra planiuſcula ſubtus gibba: anfractibus cicatricoſis; extimo divaricato. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 12. n. 211.*

Habitat rariſſima - - - Carocollæ facie, at teſta diametri 31 linearum, ſubtilius ſtriata, fulva, carina ſubalbeſcente, fauce luteſcente, labro aurantio glabro valde reflexo; anfractibus 4 latis planiuſculis.

rocol- la. 26. H. teſta imperforata utrinque convexa. *Muſ. Lud. Ulr. 664. n. 364.**

Müll. hiſt. verm. 2. p. 77. n. 273. Helix teſta imperforata trochiformi carinata oblique ſtriata, labro tranſverſali albo.

Chemn. Conch. 9. t. 125. f. 1090-1092.

Favann. Conch. t. 63. f. 12.

α) *Liſt. Conch. t. 1055. f. 5.*

β) *Liſt. Conch. t. 63. f. 61.*

Argenv. Conch. t. 8. f. D.

Seb. muſ. 3. t. 40. f. 16. 17.

Knorr Vergn. 4. t. 5. f. 2. 3.

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. f. 9. 10.

Habitat terreſtris paulo rarior in India, *teſta utrinque ſtriata, diametri 18 linearum in α) brunnea, interdum ſubtus alba, vel ſupra pallide luteſcente ſubtus alba, carina interdum alba, nunc inferne nunc ſuperne faſcia cincta, anfractibus 6 ſubconvexis, labio albo, apertura triangulari; in β) teſta tota nigricante, præter faucem pallidam, labrumque album; anfractibus 5.*

chnu- chus. 27. H. teſta imperforata alba trochiformi faſciis fulvis: apertura tranſverſali bidentata. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 81. n. 278.*

Liſt. Conch. t. 90. f. 90.

Habitat - - - inter Lucernam & Lychnum media, ab utraque tamen faſcia in ſuperiore anfractus parte duplici, ab illa etiam vertice, non anfractibus depreſſis, diſtincta.

tra, 28. H. teſta ſubgloboſa umbilicata ſubcarinata luteſcente faſcia albida: apertura tranſverſa bidentata pone ſinuata. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 74. n. 269.*

Liſt. Conch. t. 88. f. 89.
Habitat - - - teſta diametri circiter pollicaris utrinque convexa, anfractibus 5 contiguis, apertura lunata, labro vix reflexo, labio reflexo craſſo.

Cornu militare. 29. H. teſta ſubcarinata imperforata convexa: apertura patulo-marginata. *Muſ. Lud. Ulr.* 665. *n.* 365.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* I.
Knorr Vergn. 6. *t.* 32. *f.* 2.
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1142. 1143?
Habitat terreſtris in India, *teſta glabra, ſatis magna, ſub epidermide fuſca alba, apertura fulva: limbo fuſco, anfractibus obtuſis.*

Pellis ſerpentis. 254. H. teſta ſubcarinata faſciis flammeis rubris albiſque picta, ſubtus punctis quadrifariam cincta, apertura fimbriata. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 79. *t.* 125. *f.* 1095. 1096.
Liſt. Conch. t. 66. *f.* 64.
Bonann. muſ. Kircher. 3. *n.* 349?
Petiv. gazoph. t. 156. *f.* 1.
Favann. Conch. t. 63. *f.* G3.
Habitat in America calidiore.

Vortex. 30. H. teſta ſupra concava: apertura ovali plana. *Fn. ſuec.* 2172.*
Müll. zool. dan. prodr. 2880. *hiſt. verm.* 2. *p.* 158. *n.* 345. Planorbis teſta flavo-fuſca ſubcarinata ſupra concava ſubtus plana.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 6.
Liſt. Conch. t. 138. *f.* 43.
anim. angl. t. 2. *f.* 28.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* GG.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 9.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 257. *t.* 8. *f.* 19.
Schroeter Fluſconch. t. 5. *f.* 16. 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1127. α. β.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus fluviiſque, *plantis aquaticis crebro adhærens, incola rufo, tentaculis albis, vitæ, etiam in ſicco, tenaciſſimo, teſta pellucida diametri* $1\frac{1}{2}$*-4 linearum, minutiſſime tranſverſim ſtriata, dum vacua, flava, anfractibus 5-7 ſupra convexiuſculis, aperturæ margine tenui acuto.*

ſcabra. 31. H. teſta ſubcarinata imperforata ovata acuminata ſtriata.

Habitat - - - teſta faſciis fuſcis diſſectis varia, in anfractu inferiore linea elevata.

lethica. 32. H. teſta utrinque convexa cornea: faſciis ſubferrugineis.
Habitat in Sueciæ *nemoribus.*

Gualteriana. 33. H. teſta imperforata depreſſa decuſſatim ſtriata: apertura utrinque acuta.*
Gualt. teſt. t. 68. *f.* E.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. t. 13. *f.* 12. 13.
Chemn. Conch. 5. *p.* 237. *vign.* 44. *f.* A. B. C.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 136. *t.* 4. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1100. 1101.
Habitat terreſtris in India, *rariſſima, teſta ſordide cinerea, infra convexa, apertura triangulari canaliculata: limbo albo.*

ticarinata. 34. H. teſta trochiformi ſubumbilicata acuminata: ſtriis convexis carinaque triplici ſpiralibus: apertura dilatata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 84. *n.* 282.
Chemn. Conch. 9. *t.* 126. *f.* 1103. 1104.
Habitat - - - teſta diametri 11 *linearum, pallida, ſtrigis tranſverſis ſtriiſque ſpiralibus obſolete luteis, anfractibus* 5, *apertura fere circulari, labro albo: margine acuto.*

iſognomoſtomus. 158. H. teſta ſubfuſca depreſſa: anfractu primo tereti, apertura coarctata ſubtriangulari tridentata marginata.
Liſt. Conch. t. 93. *f.* 93. 94.
Klein oſt. t. 1. *f.* 22.
Habitat in Virginia, Thuringia, Alſatia, *teſta ſubimperforata.*

Oculus communis. 159. H. teſta depreſſa umbilicata: anfractibus contiguis; primo maximo, apertura oblongo-ovata; limbo intus fulveſcente.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 3-5
Martin. Naturf. 2. *t.* 79. *f.* 1.
Habitat - - - teſta magna ſolida incarnata, cana, aut alternatim ſubfuſca, & lutea, faſciis utplurimum 6 *aut pluribus fuſcis, rarius cæruleſcentibus picta, anfractibus* 6, *extimis mucronatis, apertura compreſſa, operculo extrinſecus rubro, nodoſo nitido occluſa.*

affinis. 161. H. teſta umbilicata utrinque convexa albo ſpadiceoque varia: apertura alata ſubmarginata.

v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. f. 1. 2. Helix lapicida.
Habitat - - - lapicidæ accedens.

marginella. 162. H. teſta umbilicata oblique ſtriata ſupra convexa ſubtus depreſſiuſcula: anfractu primo carinato, apertura triangulari tranſverſa marginata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. f. 7. 8.
Chemn. Conch. 9. t. 125. f. 1097.
Habitat - - - teſta 5 lineas ultra pollicem lata, 8 lineas alta, alba: faſcia fuſca.

ſinuoſa. 163. H. teſta ſubcarinata imperforata utrinque convexa excavato-punctata: anfractibus ſubconvexis contiguis, apertura tranſverſa ſeptem dentata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. f. 13. 14. Helix ſinuata.
Habitat - - - ſpiræ anfractibus 6.

maculoſa. 164. H. teſta umbilicata ſubcarinata oblique ſtriata depreſſiuſcula ſubtus convexa: apertura lunata; labio marginato. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. f. 15. 16.*
Habitat - - - teſta alba fulvo maculata.

punctata. 165. H. teſta ſubumbilicata ſubcarinata depreſſiuſcula rotundata: anfractibus teretibus, apertura tranſverſa oblonga, labro marginato tridentato, columella incraſſata emarginata. *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. f. 17. 18.*
Habitat - - - teſta fuſca: faſcia dorſi anguſta tranſverſa radiiſque ſuturam verſus punctatis flavis, apertura rubella.

vitrea. 166. H. teſta ovata ſubumbilicata ſemipellucida glabra: anfractibus quinque, primo gibbo, reliquis carinatis, apertura oblongo-ovata. *v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. f. 15. 16.*
Habitat - - - teſta ultra 2 pollices alta ex luteſcente fuſca: faſciis longitudinalibus undulatis ſulphureis.

annulata. 167. H. teſta umbilicata depreſſiuſcula alba: anfractibus quatuor: primo gibbo bicarinato. *Schroet. Fluſconch. t. 5. f. 30.*
Habitat - - - teſta diametri 2 linearum, apertura ovata.

rhenana. 168. H. teſta umbilicata alba ſupra depreſſa: anfractibus carinatis conſperſim ſtriatis; ultimo fuſco. *Schroet. Fluſc. t. 5. f. 31. a. b.*
Habitat in Rheno.

ævia, 245. H. teſta ſubdepreſſa umbilicata alba ſupra longitudinaliter maculata: ſubtus faſciis quinque atris. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 152. *t.* 133. *f.* 1207.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* Q.
Habitat in inſula S. Crucis.

orrugata. 246. H. teſta umbilicata rugoſa cana oblique ſtriata: apertura lunata, labro incarnato intus reflexo. *Chem. Conch.* 9. *p.* 152. b. 133. *f.* 1208,
Liſt. Conch. t. 55. *f.* 51.
Habitat in Jamaica.

alba, 252. H. teſta imperforata lævi crocea, anfractuum margine baſique fuſcis, apertura cærulea. *Mart. univ. Conch.* 2. *t.* 67. *med.*
Habitat in Tahiti.

renata, 254. H. teſta rotundata fuſca: anfractibus carinatis, apertura ſinuoſa. *Martyn univ. Conchol.* 2. *t.* 69.
Habitat in nova Seelandia.

*** Rotundatæ *anfractibus & umbilicatæ.*

ornea, 35. H. teſta ſupra umbilicata plana nigricante: anfractibus quatuor teretibus. *Fn. ſuec.* 2179.* *Muſ. Lud. Ulr.* 665. *n.* 366.*
Müll. zool. dan. prodr. 2878. *hiſt. verm.* 2. *p.* 154. *n.* 343. Planorbis (Purpura) teſta opaca ſupra umbilicata immaculata.
Liſt. Conch. t. 137. *f.* 41.
exerc. anat. 2. *p.* 58. *t.* 3. *f.* 1-4.
anim. angl. p. 143. *t.* 2. *f.* 26.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 5.
Bonann. recr. 3. *f.* 316.
muſ. Kircher. 3. *f.* 312.
Leſſer teſtaceoth. p. 148. *f.* g.
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 3. 4.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* DD.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 50. *t.* 2. *f.* 12.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 2. *n.* 3. & *f.* 8.
zoomorph. t. 8. *f.* 7.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 17.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 6.
Geoffr. teſt. 1.
Geve Conch. p. 27. 29. *t.* 3. *f.* 18. 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1113-1120.

Martin. Berl. Mag. 4. t. 8. f. 17.
Schroet. Fluſconch. t. 5. f. 19-21. & t. 11. min. C. f.
β) *Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 268. n. 319?*
Habitat in Europæ & terræ Coromandel *aquis dulcibus, testa incola timidiſſimo nigro, tentaculis ſordide cinereis, testa pulla, fuſca, rufa, alba, ſublutea, vel cæruleſcente, diametri a lineari ad pollicarem fere glabra, nitida, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, anfractibus 4-5 rariſſime contrariis.*

Spirorbis. 36. H. teſta utrinque concava plana albida: anfractibus quinque teretibus. *Fn. ſuec.* 2180.*
Müll. zool. dan. prodr. 2882. hiſt. verm. 2. p. 161. n. 347. Planorbis teſta flaveſcente utrinque concava æquali: anfractibus teretibus.
Geoffr. teſt. 2.
Martin. berl. Mag. 4. p. 258. t. 8. f. 20.
Habitat in Galliæ, Germaniæ, Scandinaviæ *aquis ſtagnantibus, teſta pellucida vix ſtriata, diametri* $\frac{1}{2}$*-2 linearum, anfractibus 4-5, apertura ſublabiata.*

polygyra. 233. H. teſta planiuſcula orbiculari, apertura ovali, labro fimbriato. *Chemn. Conch. 9. t. 127. f. 1124. 1125.*
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 14. f. 19. 20.
Habitat - - -

contorta. 37. H. teſta ſubumbilicata plana utrinque æquali: apertura lineari arcuata. *Fn. ſuec.* 2181.*
Müll. zool. dan. prodr. 2883. hiſt. verm. 2. p. 162. n. 348. Planorbis teſta fuſca ſupra plana ſubtus umbilicata, apertura arcuata.
Petiv. gazoph. t. 92. f. 8.
Geoffr. teſt. 3.
Martin. berl. Mag. 4. p. 260. 261. t. 8. f. 21.
Schroet. Fluſconch. t. 5, f. 29.
Chemn. Conch. 9. t. 127. f. 1126.
Habitat in Europæ *ſtagnis, ſupra plantas, incola griſeo: tentaculorum margine albo, teſta opaca, diametri 1-2 linearum], fuſca, brunnea vel fuſca, centro pellucida, anfractibus 3-7 arctiſſime nexis.*

nitida. 38. H. teſta polita flaveſcente: ſupra convexa umbilicata, ſubtus plana perforata.
Müll. zool. dan. prodr. 2884. hiſt. verm. 2. p. 163. n. 349. Planorbis nitidus.

Martin. berl. Magaz. 4. p. 262. t. 8. f. 22.
Schroet. Fluſconch. t. 5. f. 27.
Habitat in foſſis aquarum Daniæ, *incola nigro, tentaculorum apice albo, juniori toto albo, teſta politiſſima, diametri ⅙-3 linearum, diaphana, interdum fuſca, anfractibus 3-5, extimo interioribus ſimul ſumtis duplo latiori, apertura cordata.*

lla. 39. H. teſta alba utrinque umbilicata: apertura dilatata.
Müll. zool. dan. prodr. 2885. *hiſt. verm.* 2. *p.* 164. *n.* 350. Planorbis albus.
Petiv. gaz. t. 92. *f.* 7.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 253. *t.* 8. *f.* 23.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 12.
Habitat in amnis Fridrichſdalenſis Daniæ *plantis aquaticis; incola griſeo; tentaculis albis oculiſque nigris, teſta pellucida, diametri* 1-2 *linearum, ſupra planiuſcula ſubtus convexa, anfractibus* 4 *teretibus ſubtiliſſime decuſſatim ſtriatis, extimo reliquis omnibus majore, apertura larga, obliqua.*

imilis. 40. H. teſta pellucida ſupra umbilicata punctis ſtriata.
Müll. zool. dan. prodr. 2887. *hiſt. verm.* 2. *p.* 166. *n.* 352. Planorbis ſimilis.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 265. *t.* 11. *f.* 64. B.
Habitat in foſſis Berolinenſibus & Daniæ Fridrichſdalenſibus, *juniori corneæ ſimillimus.*

Cornu itietis. 41. H. teſta umbilicata planiuſcula: apertura ovali. *Muſ. Lud. Ulr.* 666. *n.* 367.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 152. *n.* 342. Planorbis (contrarius) teſta ſiniſtrorſa ſupra umbilicata: faſciis diverſicoloribus.
Liſt. Conch. t. 136. *f.* 40. Cochlea marina compreſſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 14. 15.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 7.
Knorr Vergn. 1. *t.* 2. *f.* 4. 5. & 2. *t.* 13. *f.* 4.
Geve Conch. p. 23. 24. *t.* 3. *f.* 9. 11.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 13.
Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 952. 953.
Habitat in Sina, *teſta diametri* 12-16 *linearum, utplurimum alba, faſciis* 3, 4, 5, 7, *rubris nunc æqualibus nunc inæqualibus picta, dura, minutiſſime tranſverſim ſtriata, anfractibus* 4 *convexis, labio dilatato.*

hiſpida. 42. H. teſta umbilicata convexa hiſpida diaphana: anfractibus quinis, apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 2182.*

Müll. zool. dan. prodr. 2909. *hiſt. verm.* 2. *p.* 71. *n.* 268.
Helix teſta ſubgloboſa umbilicata hiſpidoſa.
Liſt. an. angl. p. 125. *t.* 2. *f.* 12.
Pet. gazoph. t. 93. *f.* 13.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 59. *t.* 3. *n.* 21.
Geoffr. teſt. 11.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 13.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 607. *t.* 3. *f.* 34.
Schroet. Erdconch. p. 186. *t.* 2. *f.* 21. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1057. 1558.
Habitat in Europæ *campis, hortis, incola nigro, teſta pellucida, ſetis deciduis obſita, cornea, fuſca, fulva, flava aut cineraſcente, anfractibus* 5-6.

ampullacea, 43. H. teſta ſubumbilicata ſubgloboſa glabra: anfractibus ſupra ventricoſioribus, umbilico ſubobtecto, apertura ovato-oblonga. *Muſ. Lud. Ulr.* 666. *n.* 368.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 172. *n.* 359. Nerita teſta perforata ventricoſa ſupra depreſſa: apice obtuſo, apertura larga.
Liſt. Conch. t. 130. *f.* 30.
Rumpf Conch. t. 27. *f.* Q.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* R.
Geve Conch. t. 27. *f.* 289. a. b. & *f.* 291.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 1-7. 58. 59.
Knorr Vergn. 5. *t.* 5. *f.* 2.
Favann. Conch. t. 61. *f.* D[8].
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 6. *f.* 68.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 2. & *t.* 9. *f.* 14.
Einl. in Verſt. 4. *t.* 9. *f.* 1.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1133-1135.
β) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 174. *n.* 360. Nerita (Urceus) teſta ſubumbilicata ventricoſa rugoſa fuſca, apertura effuſa alba.
Liſt. Conch. t. 125. *f.* 25.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128. *f.* 1136.
γ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 175. *n.* 361. Nerita (effuſa) teſta umbilicata ventricoſa faſciata ſupra depreſſa, apice acuto, apertura effuſa.
Liſt. Conch. t. 128. *f.* 28.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 3-5.
Geve Conch. t. 3. *f.* 20.
Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1144. 1145.
δ) *Argenv. Conch. t.* 17. *f.* B.

Habitat

Habitat in Aſiæ *auſtralis* inſularum*que obverſarum paludoſis, teſta nitida, diametri* 8-19 *linearum*, β) 5 *pollicum, incola eduli.*

piſcinalis. 44. H. teſta globoſa perforata rufo-fuſca.
Müll. zool. dan. prodr. 2949. *hiſt. verm.* 2. *p.* 172. *n.* 358. Nerita piſcinalis.
Habitat frequens in horti Fridrichsdalenſis Daniæ *piſcina, teſta duriuſcula, opaca, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, fauce albida, anfractibus* 4.

puſilla. 45. H. teſta globoſa vireſcente perforata: apertura circinata.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 171. *n.* 357. Nerita puſilla.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 268. *t.* 8. *f.* 26.
Habitat in lacu rupinenſi Marchiæ, *piſcinali affinis at teſta multo minore, diametri* 1 *lineæ, columellæ labio albido.*

ſphærica. 46. H. teſta globoſa cornea: vertice obtuſo.
Müll. zool. dan. prodr. 2948. *hiſt. verm.* 2. *p.* 170. *n.* 356. Nerita ſphærica.
Habitat minus frequens in Daniæ paludoſis, *tentaculatæ affinis, teſta alba vel cinerea immaculata glabra,* $\frac{2}{3}$ 2 *linearum: anfractibus* 4 *convexis; infimo ventricoſo.*

Pomatia. 47. H. teſta ſubumbilicata ſubovata obtuſa decolore: apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 1283.
Müll. zool. dan. prodr. 2901. *hiſt. verm.* 2. *p.* 43. *n.* 243. Helix teſta imperforata globoſa rufeſcente, faſciis obſoletis.
Geſn. aq. p. 244. 255. Pomatia.
Aldrov. exang. 389. Cochlea terreſtris gypſo obſerata.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 1. Pomatia.
zoomorph. t. 9. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 48. *f.* 46.
anim. angl. t. 2. *f.* 1.
exerc. anat. 1. *t.* 1. *f.* 1-6.
Bonann. recr. p. 221. *f.* 1. 2.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* A.
Swammerd. bibl. nat. t. 4.
Leeuwenh. contin. arc. nat. p. 25-32.
act. angl. 1697.
Geve Conch. t. 29. *f.* 330-342.
Schlotterb. act. Helv. 5. *p.* 276.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 530. *t.* 1. *f.* 1. & *t.* 2. *f.* 13.

Schroet. Erdconch. p. 145. *n.* 14. 15. *t.* 1. *f.* 10.
Chemn. Conch. 9. *t.* 128 *f.* 1138. a-c.
Schaeff. Verſ. mit Schneck. t. 3. *f.* 1-4. *t.* 5. *f.* 1-3. *t.* 6. *f.* 3. 4. & *t.* 7. *f.* 1. 4.
β) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* B.
γ) *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 45. *n.* 244. Helix (pomaria) teſta imperforata globoſa ſiniſtrorſa ruſeſcente, faſciis obſoletis.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 11.
Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 21. 22.
δ) *Liſt. Conch. t.* 45. *f.* 43.
ε) *Liſt. Conch. t.* 47. *f.* 45.
ζ) *Liſt. Conch. t.* 49. *f.* 47.
η) *Liſt. Conch. t.* 51. *f.* 49.
ϑ) *Liſt. Conch. t.* 52. *f.* 50.
ι) *Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 2.
κ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* D?
λ) *Martin. berl. Mag.* 2. *t.* 1. *f.* 7. 8.
μ) *Knorr Vergn.* 1. *t.* 21. *f.* 3?
ν) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 108. *f.* 908-910.
ξ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 108. *f.* 911. 912.
Habitat terreſtris in omni Europa, *incola hinc inde edulis, teſtam hiemen verſus operculo calcareo claudente, vita tenaciſſimo, oviparo, teſta diametri* $9\frac{1}{2}$-16, *in* γ) 18 *linearum, ſordida, rugoſa, apice glabra.*

glauca. 48. H. teſta umbilicata ſubrotunda acuminata: *labro marginato*, apertura ovali. *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 369.*
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 8?
Knorr Vergn. 5. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat - - - teſta dilute fuſca: faſciis 4 tranſverſis obſcurioribus, apertura flavicante.

citrina. 49. H. teſta ſubumbilicata convexa obtuſa *flaveſcente:* faſcia fuſca. *Muſ. Lud. Ulr.* 667. *n.* 370.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 63. *n.* 260. Helix *teſta perforata* (imperforata) ſubgloboſa lævi nitida: *faſcia diverſicolore.*
Liſt. Conch. t. 54. *f.* 50. & *t.* 60. *f.* 57.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* D. E.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 1. 2.
Knorr Vergn. 5. *t.* 22. *f.* 7.
Geve Conch. t. 26. *f.* 277-279. 281-283. 285.
Martin. berl. Mag. 2. *p.* 615. *t.* 4. *f.* 38.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 13. *f.* 14. 15. & *t.* 15. *f.* 1-10.

Favann. Conch. t. 6. f. F¹.
Murray teſtaceol. t. 1. f. 22.
Chemn. Conch. 9. t. 131. f. 1167-1175.
Habitat terreſtris in Jamaica & Sina, *teſta nitida diametri 12-18 linearum, nunc ſulphurea, faſcia 1-2 lacteis, vel faſcia lineave purpurea lacteæ ſuperne adnata vel innata, nunc lutea, faſcia baſique albis, linea inferne ſanguinea, nunc fulva, faſcia baſique albis, vel faſcia ſanguinea albæ innata, nunc ex rufo fuſca: faſcia alba vel faſcia ſanguinea albæ adnata, nunc ex atro fuſca, faſcia baſique albis, nunc pallide purpurea, faſcia ſulphurea, nunc pallide fuſca, faſcia baſique albis, nunc alba, faſcia 1 aut 2 ſanguineis, nunc ex luteo virente nigro punctata faſcia lineaque rufis, baſi alba, anfractibus 5, adultæ umbilico clauſo.*

Rapa. 50. H. teſta perforata ſubgloboſa punctis pertuſa: faſcia ſanguinea, anfractu majore ſuperne introrſum deflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 67. n. 261.*
Chemn. Conch. 9. t. 131. f. 1176.
Habitat - - - teſta diametri 18 linearum, alba; ſuperne luteſcente.

Caſtanea. 51. H. teſta perforata ſubgloboſa obſcure caſtanea: faſcia rufa albæ adnata, anfractibus ſtriatis. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 67. n. 262.*
Chemn. Conch 9. t. 131. f. 1177. 1178.
Habitat - - - teſta pellucida, dura, craſſa: anfractibus 7, apertura lunata ſine labio.

Globulus. 52. H. teſta globoſa ſubumbilicata alba: labro reflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 68. n. 264.*
Liſt. Conch. t. 44. f. 41.
Gualt. teſt. t. 2. f. C.
Chemn. Conch. 9. t. 130. f. 1159. 1160.
β) *Liſt. Conch. t. 46. f. 44.*
Habitat - - - lucanæ affinis, ac teſtæ umbilico non diſtincto & vertice non depreſſo diverſa, teſta immaculata, glabra, craſſiuſcula, diametri 12 linearum; ſæpe tranſverſim ſubcoſtata, anfractibus 5.

lactea. 237. H. teſta imperforata depreſſa griſea lacteo-punctata: apertura fuſco ſanguinea, labro concolore dentato. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 19. n. 218.*

Liſt. Conch. p. 95. n. 96.
Chemn. Conch. 9. t. 130. f. 1161.
Habitat in Jamaica & Luſitania.

incisa. 238. H. teſta depreſſa umbilicata alba margine inciſa. *Chemn. Conch. 9. p. 129. t. 130. f. 1166.*
Favann. Conch. t. 64. f. S.
Habitat – – –

arbuſtorum. 53. H. teſta umbilicata convexa acuminata: apertura ſuborbiculari bimarginata; anterius elongata. *Fn. ſuec.* 2184.* *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 371.*
Müll. zool. dan. prodr. 2904. *hiſt. verm.* 2. *p.* 55. *n.* 248. Helix teſta imperforata globoſa fuſcâ, lineolis luteis, labro albo.
Liſt. Conch. t. 56. f. 53.
an. angl. p. 119. t. 2. f. 4.
Seb. muſ. 3. t. 38. f. 68.
Geve Conch. t. 30. f. 345-356.
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 23.
Schloiterb. act. helv. 5. t. 3. f. 12?
Brit. zool. 4. t. 85. f. 130.
Da Coſta brit. Conch. t. 17. f. 6.
Chemn. Conch. 9. t. 133. f. 1202.
β) *Schranck Naturf. 18. p. 72.*
Habitat in Europæ *potiſſimum ſepibus & arbuſtis, teſta diametri* $9\frac{1}{2}$ *linearum, fuſca lineis minutiſſimis flaveſcentibus, faſciaque pulla picta, juniore pellucida, anfractibus* $5\frac{1}{2}$, *incola interdum lacertæ præda.*

fulva. 54. H. teſta ſubimperforata globoſa pellucida fulva labro albo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2905. *hiſt. verm.* 2. *p.* 56. *n.* 249.
Habitat rariſſima in palis humidulis & inter folia putrida fagina agri Fridrichſdalenſis Daniæ, *incola hyalino: tentaculis nigris, teſta glabra, diametri* $\frac{1}{2}$-3 *linearum, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, apertura arcuata, anguſta, anfractibus* 7.

Epiſtylium. 55. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa ſtriata candida: anfractibus ſeptem. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 57. *n.* 250.
Liſt. Conch. t. 62. f. 60.
Habitat – – – *teſta diametri* 12 *linearum, hyalina, ſubtus planiuſcula lævi, apertura lunata, labro reflexo polito.*

cincta 56. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa alba: faſciis labroque rufis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 58. *n.* 251.

Habitat - - - ligatæ affinis, at teſta majore diametri 18 linearum, ſtriis ſubtiliſſimis cum faſciis parallelis, anfractibus 5 diſtincta.

ligata. 57. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa alba: faſciis rufis; labro albo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 58. n. 252.*
Gualt. teſt. t. 1. f. E.
Chemn. Conch. 9. t. 128. f. 1137.
Habitat in Italia, *teſta diametri 14 linearum, faſciis 5, intus pellucentibus, anfractibus 4, apertura ſubovata.*

aſperſa. 58. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa lutea: fuſciis quatuor rufis maculis albis interruptis, labro candido. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 59. n. 253.*
Liſt. Conch. t. 49. f. 47.
Argenv. Conch. t. 28. f. XI.
Pet. gaz. t. 65. f. 4.
Knorr Vergn. t. 24. f. 3.
Geve Conch. t. 30. f. 344.
Martin. berl. Mag. 2. t. 2. f. 17.
Brit. zool. 4. t. 84. f. 129.
Coſta brit. Conchyl. t. 4. f. 1.
Favann. Conch. t. 63. f. D². D³. D⁴.
Chemn. Conch. 9. t. 130. f. 1156-1158.
Habitat in Italia, *teſta diametri 12-18 linearum, punctis minimis impreſſis ſubrugoſa, rarius alba, anfractibus 4, apertura elongata.*

extenſa. 59. H. teſta ſubimperforata ſubgloboſa pallida immaculata: apertura ampla. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 60. n. 254.*
Habitat - - - pomatiæ facie, at ſpira minus prominente, apertura repanda, anfractibus 4 diſtincta, teſta diametri 16 linearum.

piſana. 60. H. teſta perforata globoſa candida: faſciis ſubinterruptis rubris, labro roſeo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 60. n. 255.*
Pet. gaz. t. 52. f. 12.
Gualt. teſt. t. 2. f. E.
Schroet. Erdconch. p. 188. n. 63. t. 2. f. 22. a.
Chemn. Conch. 9. t. 132. f. 1186. 1187.
Habitat in Barbaria, Italia, & Thuringia, *teſta diametri 5-7½ linearum, faſciis 5-6.*

ſtrigata. 61. H. teſta perforata vertice depreſſo alba: faſciis lineiſque pluribus rufis, labro utrinque albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 61. *n.* 256.

Liſt. Conch. t. 58. *f.* 55?

Habitat in Italia, *facie h. ericetorum, teſta polita, ſtriis ſubarcuatis exarata, diametri* 10 *linearum, anfractu infimo convexo.*

nemorenſis. 62. H. teſta perforata globoſa nitida alba: faſciis fuſcis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 62. *n.* 257.

Chemn. Conch. 9. *t.* 129. *f.* 1146. 1147.

Habitat in India? *nemorali affinis, at teſta triplo majore, diametri* 15 *linearum, craſſiore, duriore, nitida, polita, pauliſper in ſulphureum vergente.*

zonaria. 63. H. teſta umbilicata convexa depreſſiuſcula: apertura oblongiuſcula marginata.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 35. *n.* 237. Helix teſta umbilicata depreſſa: apertura tranſverſali; labro candido reflexo.

Gualt. teſt. t. 3. *f.* LL.

Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 52. 53. 55.

Knorr Vergn. 5. *t.* 21. *f.* 3. 4.

da Coſta brit. Conch. t. 4. *f.* 7.

Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1188. 1189.

Habitat in Barbaria & Europa, *magis auſtrali, teſta diametri* 11-13 *linearum, nunc alba, faſciis* 1, 2, 3, 4, 5 *vel* 6 *rufis, maculis praeterea interdum lacteis varia, nunc cinerea faſciis* 3 *rufis, nunc ſupra pallide incarnata ſubtus alba, faſciis albis rufiſque alternis, nunc utrinque pallide incarnata, faſciis albis rufisque alternis, nunc lutea, aut faſcia rufa, aut maculis obſolete albidis lineiſque obſcuris inſignita.*

ſtriata. 64. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa ſtriata alba. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 38 *n.* 238.

Schroet. Erdconch. p. 183. *n.* 60. *t.* 2. *f.* 20.

Habitat in Thuringia, *teſta diametri* 6 *linearum, ſubtus convexa, anfractibus fere* 6 *rotundatis, apertura lunata.*

ericetorum. 65. H. teſta umbilicata depreſſa luteſcente: faſcia una vel pluribus fuſcis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 33. *n.* 236.

Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1193-1195.

α) *Gualt. teſt. t.* 3. *f.* O.

Geoffr. teſt. 13.

β) *Liſt. an. angl. t.* 2. *f.* 13.

Martin. berlin. Mag. 2. *p.* 613. *t.* 4. *f.* 46.
γ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* M.
δ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* L.
ε) *Gualt. teſt. t.* 3. *f.* P.
Habitat in Italia, *teſta diametri* δ) $4\frac{1}{2}$, γ) 5, β) 7, α) 11 *linearum*, *faſcia una*, 3-4, *rarius alba* δ) *faſciiſque* 9, *vel* 8.

nitens. 66. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa fulvo cornea pellucida ſubſtriata: apertura larga. *Müll. zool. dan. prodr.* 2898. *hiſt. verm.* 2. *p.* 32. *n.* 234.
Petiv. gazoph. t. 93. *f.* 14.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 3.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 4.
Geoffr. teſt. 7.
Stroem. act. nidroſ. 3. *p.* 435. *t.* 6. *f.* 16.
Schroet. Erdconch. p. 201. *n.* 71.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1130. 1131.
Habitat in Galliæ, Germaniæ, Daniæ, Norwegiæ *muſcoſis humidis*, *incola pallide cæruleo*, *teſta nitida*, *diametri* 1-4 *linearum*: *anfractibus* 4-5, *apertura lunata*: *margine acuto*.

coſtata. 67. H. teſta ſubdepreſſa umbilicata cinerea: anfractibus coſtatis, apertura circulari; labio albo reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2897. *hiſt. verm.* 2. *p.* 31. *n.* 233.
Habitat rariſſima in Dania, *prope* Fridrichſdal *in loco elevato*, *teſta convexiuſcula opaca*, *diametri* 1 *lineæ*, *anfractibus* 4 *tranſverſim plicatis*.

pulchella. 68. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa alba glabra: apertura circinata, labro tereti reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2896. *hiſt. verm.* 2. *p.* 30. *n.* 232.
Geoffr. teſt. 6.
Habitat in Galliæ & Daniæ *humidis muſcoſis frequens*, *incola lacteo*, *teſta ſubpellucida*, *diametri* 1 *lineæ*, *ſtriis vix armato oculo conſpicuis*, *anfractibus vix* 4.

rotundata. 69. H. teſta umbilicata ſubdepreſſa: lineis tranſverſis elevatis maculiſque ferrugineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2895. *hiſt. verm.* 2. *p.* 29. *n.* 231.
Argenv. zoomorph. t. 9. *f.* 10.
Geoffr. teſt. 9.
Schroet. Erdconch. p. 199. *n.* 68. 69. *t.* 2. *f.* 25.

Habitat in Gallia, Germania, Scandinavia, *in Daniæ palis putridis, truncis, muſcis, vulgaris, incola albo, ſupra obſcure punctato: capite cum tentaculis oculiſque nigro, teſta, alba, diametri* $2\frac{1}{4}$ *linearum, ſubtus convexa, maculis quadratis, interdum nullis, anfractibus 4-6, apertura arcuata: labio nullo.*

cellaria. 70. H. teſta umbilicata depreſſa luteſcente nitida ſubtus lactea: apertura larga. *Müll. zool. dan. prodr.* 2894. *hiſt. verm.* 2. *p.* 28. *n.* 230.
Schroet. Erdconch. p. 200. *n.* 70. *t.* 2. *f.* 26.
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1129. *n.* 1. 2.
Habitat in Thuringia, *& copioſa in* Hafniæ *cellis vinariis, incola albo, pellucido: oculo nigro, nervoque optico cæruleo, teſta glaberrima, pellucida, diametri* $3\frac{1}{2}$ *linearum, ſubtus convexa, anfractibus 5, apertura lunata.*

obvoluta. 71. H. teſta umbilicata utrinque depreſſa: anfractibus obvolutis. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 27. *n.* 229.
α) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* S.
Schlotterb. act. helv. 5. *p.* 280. *t.* 3. *f.* 16.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 37.
Schroet. Erdconch. p. 196. *n.* 67. *t.* 2. *f.* 24. a.
Favann. Conch. t. 63. *f.* F[2].
Chemn. Conch. 9. *t.* 127. *f.* 1128. a-c.
β) *Geoffr. teſt.* 12.
Schroet. Erdconch. p. 194. *n.* 66. *t.* 2. *f.* 24.
Habitat in Thuringia *&* Italia, *teſta diametri 4-5 linearum, labro reflexo, in α) albida, glabra, ſubtus convexa, ſubtiliſſime ſtriata, anfractibus 6-7, apertura triangulari; in β) fuſca, hiſpida, anfractibus 5-6, apertura lunari.*

ſtrigoſula. 72. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſtriata alba faſcia rufa. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 24. *n.* 225.
Habitat in Gallia, *teſta pellucida, diametri 5 linearum, ſubtus convexa læviuſcula, anfractibus fere 6, labio craſſiuſculo albo.*

radiata. 73. H. teſta perforata ſubdepreſſa ſtriata, ſubtus convexa radiata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 23. *n.* 224.
Liſt. Conch. t. 70. *f.* 69.
Petiv. gaz. t. 104. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* 3.
Gronov. zooph. 3. *p.* 331. *n.* 1541.

Habitat in Gallia meridionali, & Virginia, *teſta craſſa, albo ruſoque varia, intus tota alba, apertura lunata, ſine labio.*

ryſtal-lina. 74. H. teſta perforata depreſſa candida nitida diaphana. *Müll. zool. dan. prodr.* 2893. *hiſt. verm.* 2. *p.* 23. *n.* 223.
Habitat rara in Daniæ *muſcis, teſta diametri* 1 *lineæ, ſubtus convexa, ab incola ex fuſco lutea, anfractibus* 4-5.

ngulina. 75. H. teſta umbilicata convexa: apertura marginata ſuborbiculata ſupra elongata. *Muſ. Lud. Ulr.* 668. *n.* 372.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 69. *n.* 265. Helix teſta globoſa utrinque umbilicata luteo rufa, apertura lunata, labro reflexo albo.
Rumpf muſ. t. 27. *f.* R. Lapillus.
Pet. gazoph. t. 1. *f.* 6. Planorbis indica.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 11.
Seb. muſ. t. 40. *f.* 11.
Geve Beluſt. t. 3. *f.* 15.
Born Caeſ. muſ. Vind. ind. teſt. t. 15. *f.* 11. 12.
Chemn. Conch. 9. *t.* 125. *f.* 1098. 1099.
Habitat in India, *teſta ſigura pomi, diametri* 16 *linearum, glabra, nitida ſupra depreſſa, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, fauce ſubpurpurea, labio albo.*

atica. 76. H. teſta globoſa umbilicata flaveſcente albida: anfractibus contrariis, extimo divaricato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 70. *n.* 266.
Habitat - - - teſta dura, parum pellucida, diametri 19 *linearum, anfractibus* 5 *rotundatis, inſimo ventricoſo, aperturæ margine acuto.*

aticum. 77. H. teſta globoſa umbilicata: apertura elabiata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2908. *hiſt. verm.* 2. *p.* 71. *n.* 267.
Schroet. Erdconch. p. 178. *n.* 55-59. *t.* 2. *f.* 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1203.
Habitat in Thuringiæ, Daniæ *fruticetis, ſepibus, limace incola albo, pallido, maculato, nigricante, cineraſcente vel atro: tentaculis ſemper nigris, teſta ad nemoralem accedens, at fragiliori, diametri* $7\frac{1}{2}$ *linearum magis pellucente, anfractibus ſex, nunc pallide lutea, punctis ſparſis aureis, vel punctis maculiſque nigricantibus varia, nunc ſulphurea maculis punctiſque nigris, aut maculis rarioribus nigris faſciaque purpurea varia, nunc luteſcente punctis nigris confertis faſciaque purpurea,*

nunc fuſca punctis maculiſque nigris, nunc ſaturate rubra, punctis maculiſque nigris cum vel ſine faſciis purpurea.

Lucena. 78. H. teſta ſubglobofa umbilicata ſubtus gibba: labro reflexo candido. *Müll. hiſt. verm. p. 75. n. 270.*
Argenv. Conch. t. 28. f. 7?
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 253. t. 4. f. 9.
Chemn. Conch. 9. t. 130. f. 1155.
Habitat - - - nemorali affinis, teſta pellucida glabra, nunc tota candida, nunc ſupra lutea, anfractibus 5, infimo valde convexo, apertura lunata.

vittata. 79. H. teſta ſubglobofa ſubumbilicata alba: faſciis crebris brunneis, vertice cæruleo, labro reflexo albido. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 76. n. 271.*
Chemn. Conch. 9. t. 132. f. 1190-1192.
Habitat in littore Coromandel, *nemoralis facie, teſta diametri 9 linearum, lignum exſiccatum cum venis concentricis referente, opaca, anfractibus 5, apertura ex nigro fuſca labio acuto.*

roſacea. 80. H. teſta ſubglobofa ſubumbilicata incarnata tranſverſim ſtriata: labro reflexo fuſco. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 76. n. 272.*
Habitat - - - pomatiæ affinis, at teſta majore diametri 19 linearum, ventricoſa, anfractibus 5, apertura lunata, roſea.

itala. 81. H. teſta umbilicata convexa obtuſa: anfractibus quinque teretibus, umbilico patulo, apertura ſuborbiculata.
Habitat terreſtris in Europa auſtrali, *teſta avellanæ magnitudine, albida: faſcia fuſca.*

luſitanica. 82. H. teſta umbilicato-perforata convexa obtuſa: anfractibus quinque teretibus flaveſcenti-albidis, umbilico patulo.
Gualt. teſt. t. 2. f. T.
Murray teſtaceol. t. 1. f. 1.
Favan. Catal. t. 2. f. 107.
Chemn. Conch. 9. t. 108. f. 913. 914.
β) *Chemn. Conch. 10. t. 173. f. 1684. 1685.*
Habitat terreſtris in Europa auſtrali, *teſta magnitudine pomi minoris, unicolore.*

mammillaris. 83. H. teſta umbilica ovata: anfractibus tribus ſtriatis, apertura ovata apici adnata.

Argenv. Conch. t. 27. n. 6. f. 3.
Habitat in Africæ fluviis, *neritæ mammillæ affinis, at teſta transverſe confertim ſubtiliſſime, longitudinaliter remotius ſtriata, apertura magna.*

84. H. teſta umbilicata convexa: anfractibus quinque teretibus, umbilico tenui perforato, apertura ſuborbiculata.
Habitat in Europa auſtrali, *teſta coloris cornei.*

85. H. teſta umbilicata ovato-oblonga interne coloratiore: apertura ſubovata. *Muſ. Lud. Ulr. 669. n. 373.**
Habitat - - - teſta ex ovato conica, ſubtiliſſime ſtriata, umbilico obliquo, apertura intus alba.

86. H. teſtâ perforata ovato-ventricoſa ſtrigata: apice coſtato labroque roſeis, columella candida. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 85. n. 283.*
Chemn. Conch. 9. t. 119. f. 1020. 1021.
Habitat rariſſima in India, *oblongæ affinis, teſta craſſa, ultra 4 pollices longa, lutea: claviculis roſeis, anfractibus ſex, apertura ovali.*

87. H. teſta perforata ovato-oblonga ſtriata: labro columellaque roſeis. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 86. n. 284.*
Liſt. Conch. t. 23. f. 21.
Seb. muſ. 3. t. 71. f. 17-20.
Walch Naturf. 12. t. 1. f. 1-3.
Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. f. 21. 22.
Chemn. Conch. 9. t. 119. f. 1022. 1023.
Habitat - - - teſta craſſiuſcula pellucida, pallida vel ex albo luteſcente 3 pollices & 5 lineas longa, anfractibus 6, apertura ovali, fauce albida.

88. H. teſta perforata oblonga alba: faſciis longitudinalibus rufis, columella reflexa recta. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 87. n. 285.*
Adanſ. Seneg. 1. p. 14. t. 1. f. 1.
Martin. berl. Mag. 3. p. 119. t. 5. f. 49.
Chemn. Conch. 9. t. 119. f. 1024. 1025.
Habitat in Guinea, *teſta tenera, pellucida, glabra, undulatim faſciata, 18-28 lineas longa, anfractibu 8-9 æqualiter decreſcentibus, labro candido nitido, fauce cæruleſcente.*

89. H. teſta trochiformi alba: faſciis rufis, apertura tranſverſa ampla, labro ſubreflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 80. n. 277.*

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 1046-1048.
Habitat - - - teſta pellucida glabra, 15 lineas longa, faſciis 3-5, anfractibus 6 ſimiliter faſciatis numero variabili; an hujus tribus? an eadem cum pileata?

aculeata. 90. H. teſta trochiformi umbilicata utrinque convexa fuſca: coſtis aculeatis, labro albido. *Müll. zool. dan. prodr.* 2911. *hiſt. verm.* 2. *p.* 81. *n.* 279. *Naturf.* 19. *p.* 165. *t.* 2. *f.* I. II. III.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1209.
Habitat rara in Daniæ *ramuſculis faginis aridis, incola hyalino: capite cum tentaculis nigricante, teſta ſubpellucida, diametri ¾ lineæ, anfractibus 4 rotundatis: coſtis albidis in ſingulis 28-30, apertura ſubcircinata: labro ſubreflexo membranaceo.*

Volvulus. 91. H. teſta trochiformi umbilicata acuminata variegata: apertura circinata, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 82. *n.* 280.
Liſt. Conch. t. 50. *f.* 48.
Petiv. gazoph. t. 77. *f.* 6.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 18. 19.
Chemn. Conch. 9. *t.* 123. *f.* 1064-1066.
Habitat - - - teſta glabra ſubſtriata nitida, anfractibus 5½ maxime convexis protuberantibus, diametri 11-22 linearum, luteo rufoque varia ſubtus alba, lineis interdum concentricis obſoletis, aliquando rufo fuſcoque varia: faſcia lata ſaturatiori.

Involvulus. 92. H. teſta trochiformi umbilicata acuminata alba: ſtriis ſpiralibus convexis, apertura circinata, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 84. *n.* 281.
Liſt. Conch. t. 75. *f.* 75.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 56-58. 61. 63. 64.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 14. *f.* 23. 24.
Habitat - - - volvulo affinis, at teſta minus nitida, diametri 13. *linearum ſtriis ſubtiliſſimis longitudinalibus exarata, labro minus reflexo craſſoque, faſcia interdum maculiſque rufis varia.*

neritina. 93 H. teſta glabra duriuſcula umbilicata ſpadicea albo faſciata: anfractibus infra planis, apertura ovato-oblonga. *Kaemmerer Conch. Rudolſt. p.* 185. *n.* 2. *t.* 11. *f.* 7.
Habitat - - - teſta parum ultra pollicem longa, ampullaceæ affini.

turum. 169. H. teſta umbilicata rotundata tenui: apertura ſemilunari.
Liſt. an. angl. t. 2. f. 12.
Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. A. f. 13.
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 34.
Habitat in Helvetiæ, Germaniæ, Angliæ, *ſilvis, turturum eſca gratiſſima, nemorali affinis, ut mucrone teſtæ magis obtuſo, teſta griſea, achatina, rubella aut alba: limbo albo vel fuſco.*

veto-rum. 170. H. teſta umbilicata depreſſiuſcula flava: apertura compreſſa, anfractu primo ex terete planiuſculo.
Gualt. teſt. t. 3. f. G.
Habitat in Florentiæ olivetis.

idia. 171. H. teſta umbilicata ſubgloboſa lævi ſupra depreſſa: apertura lunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15. f. 11. 12. Helix ungulina.
Habitat – – – teſta ſpadicea, pollicem alta, & novem lineas ultra pollicem lata.

tacea. 172. H. teſta ſubumbilicata lævi albida fuſco-faſciata: anfractibus convexis, apertura lunata.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 16. f. 1. 2.
Habitat – – – teſta 10 lineas alta, & 2 lineas ultra pollicem lata.

ata. 173. H. teſta ſubumbilicata conica alba ſpadiceo faſciata: apertura ſemilunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. f. 11. 12. Helix Pileus.
Habitat – – – teſtæ apice obtuſo.

cel-lens. 174. H. teſta rotundata ſubumbilicata tenui: apertura ſemilunari. *Schroet Erdconch. t. 1. f. 11.*
β) *Schroet. Fluſconch. t. 6. f. 14?*
Habitat in Thuringia, *teſta ſubfuſca, alba, margaritacea aut cerea ſæpius faſciata.*

ſtris. 175. H. teſta umbilicata: ſpira obtuſe mucronata; anfractu primo maximo, reliquis ſenſim decreſcentibus, apertura ſemilunari marginata. *Schroet Erdconch. t. 2. f. 19.*
Habitat – – – teſta alba, incarnata, aut achatina: anfractibus 6.

ivea. 176. H. teſta rotundata umbilicata tenui nitida alba, apertura ſeminulari. *Schroet. Erdconch. t. 2. f. 20.*

*Habitat - - - terreſtri affinis, at teſta minore bre-
viore, magis rotundata.*

media. 177. H. teſta utrinque plana umbilicata: anfractibus ſex
primo tereti, apertura ſuborbiculari.
Schroet. Erdconch. t. 2. f. 22. 22. a.
Einl. in Conch. 2. p. 241. t. 4. f. 8.
Habitat in Germania, *teſta variæ magnitudinis, albæ
interdum fuſco faſciata.*

tenella. 178. H. teſta umbilicata tenerrima plana nitida ſupra con-
vexa: apertura ſemilunari compreſſa.
Schroet. Erdconch. t. 2. f. 26.
*Habitat - - - terreſtris, anfractibus 5 contiguis,
teſta alba, teſtacea, cornea, vel margaritacea.*

crepuſcu- 179. H. teſta umbilicata depreſſa alba: anfractibus ſex tere-
laris. tibus; tertio quartoque fuſcis, extimo apice rubello,
apertura ſeminulari lævi.
Martin. n. Mannigf. 4. p. 422. t. 3. f. 20. 21.
Habitat ad Guineæ *littora, teſta ſolida: ſpira ſubpyra-
midali.*

hyalina. 180. H. teſta umbilicata pellucida ſupra plana dilute fuſca
ſubtus hemiſphærice alba: anfractibus contrariis.
Martin. n. Mannigf. 4. p. 423. t. 3. f. 22. 23.
β) *Martin. n. Mannigf. 4. p. 424. t. 3. f. 24.*
Chemn. Conch. 9. t. 109. f. 921. 922.
Habitat terreſtris in Guineæ *littore, nonne potius ſecun-
dæ tribui accenſcenda?*

Avellana. 181. H. teſta ſubumbilicata obtuſe ſubtrigona aſpera plicata
intus argentea: apertura lævi auriculata, anfractu
primo circulo elevato.
Spengler Beſch. berl. Naturf. 1. p. 395. t. 9. f. 4. 5.
Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 1919. 1920.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta avellanæ magnitudine
& colore, labio tamen albo; nonne potius ad neritas
referenda?*

rufeſcens. 182. H. teſta inflata ſubumbilicata fragili: anfractibus quin-
que; primo maximo ſubcompreſſo, reliquis convexis,
apertura ſemilunari.
Schroet. Fluſconch. t. 5. f. 35.
Habitat Hamburgi *in fluviis, teſta diametri 6 linearum
rufeſcente: faſcia ſpadicea.*

pervia. 183. H. teſta umbilicata obtuſe ſubpyramidali: anfractibus
quatuor convexis, primo circulo elevato reliquis ſulco
cinctis, apertura ſemilunari.

Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 10.
Habitat in – – – *fluviis, teſta minuta.*

184. H. teſta umbilicata oblonga: anfractibus teretibus lævibus, apertura orbiculari.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 12.
Habitat in – – – *fluviis, perviæ affinis.*

185. H. teſta umbilicata pellucida: anfractibus tribus canaliculo diſcretis, apertura orbiculari non marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 6. *f.* 11.
Habitat rara Argentorati & Lutetiis *aquatica, incola præter* 2 *tentacula criſtam erigente, teſta latiſſima, minus alta, obſcura.*

186. H. teſta umbilicata depreſſa ſupra ſubconcava: anfractu primo villoſo plano, apertura triangulari marginata.
Gualt. teſt. t. 2. *f.* 5.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. A. *f.* 16.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 37.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 24. & 24. a.
Habitat in Gallia, Helvetia, Thuringia, *teſta diametri ſemipollicaris fuſca, anfractibus* 6, *aperturæ margine intus ruſeſcente vel albo.*

187. H. teſta tenui fragili alba umbilicata alba dilutius faſciata: anfractu primo tereti inflato, apertura ſuborbiculari non marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 28.
Habitat Hamburgi *in aquis, teſta diametri fere* $\frac{1}{4}$ *pollicis, faſciis* 8, *anfractibus* 6.

188. H. teſta umbilicata pellucida cornea tranſverſim ſtriata convexa: anfractibus ſex ſenſim decreſcentibus, apertura ſemilunari.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 32.
Habitat – – – *teſta diametri* 4-5 *linearum.*

226. H. teſta cartilagineo-cornea luteſcente ſubpellucida gibba: ſpira ſimplici ſtriis circularibus exarata.
Pall. nov. act. Petrop. 2. *p.* 243. *t.* 7. *f.* 31-33.
Habitat in inſulis Kurilibus, *ſpira intus calcarea cruſta obducta.*

227. H. teſta depreſſa profunde umbilicata labro vendidiſſimo.
Chemn. Conch. 9. *p.* 104. *t.* 127. *f.* 1132. 1133.
β) *Chemn. Conch.* 9. *p.* 85. *t.* 109. *f.* 317. 318.
Habitat in Senegalia, *ramis foliiſque arborum adhærens.*

elegans. 229. H. teſta pyramidali alba umbilicata: anfractibus ſex acutis planiuſculis marginatis. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1045. a-c.
Liſt. Conch. t. 61. *f.* 58.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 10.
Favann. Conch. t. 64. *f.* O.
Habitat terreſtris in Barbaria *&* *auſtrali* Europa.

Cookiana. 230. H. teſta pyramidali lævi alba obtuſa: baſi imperforata convexa. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1049. 1050.
Habitat in inſulis maris auſtralis.

bidentata. 231. H. teſta pyramidali ſubcarinata faſciata ſubtiliſſime ſtriata, labro bidentato reflexo. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1052. α. β.
Habitat in horto botanico Argentoratenſi.

Turbo. 232. H. teſta pyramidali ſubimperforata luteo ruſoque varia. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 122. *f.* 1059.
Habitat in Coromandel.

triſaſciata. 247. H. teſta conico-ovata alba: anfractu primo faſciis tribus fuſceſcentibus, apertura fimbriata: labro dilatato albo. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 155. *t.* 134. *f.* 1215.
Liſt. Conch. t. 33. *f.* 31.
Habitat terreſtris in Tranquebaria.

Bontia. 248. H. teſta conica ventricoſa perforata pellucida apice nigra: anfractu primo faſciis tribus flaveſcentibus, apertura ovata. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 156. *t.* 134. *f.* 1216. 1217.
Favann. Conch. t. 56. *f.* L?
Habitat in Bengala, *teſta fragiliſſima.*

trochoides. 249. H. teſta trochiformi perforata nitida, longitudinaliter ſtriata: anfractibus contrariis; primo carinato, apertura angulata, columella brunnea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 369. *t.* 173. *f.* 1686. 1687.
Habitat - - -

**** Rotundatæ *imperforatæ.*

perverſa. 94. H. teſta ſubumbilicata ovato-oblonga contraria ſulphurea. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 374.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 90. *n.* 288. Helix teſta conica ſulphurea ſiniſtrorſa: labro albo reflexo.
Argenv. Conch. 1. *t.* 9. *f.* G. Unique.
Grew. muſ. t. 10. *f.* 9.
Petiv.

Petiv. gaz. t. 76. f. 5.
Liſt. Conch. t. 9. f. 4. t. 34. f. 33. & t. 35. f. 34.
Bonann. recr. 3. f. 116?
muſ. Kircher. 3. f. 116? 401.
Gualt. teſt. t. 5. f. O. P.
Seb. muſ. 3. t. 40. f. 37.
Knorr delic. t. B. II. f. 6.
Knorr Vergn. 1. t. 16. f. 5. 4. t. 5. f. 1. & t. 28. f. 4. 5. & 5. t. 23. f. 4. 5.
Martin. berl. Mag. 3. t. 5. f. 50.
neue Mannigf. 4. p. 406. t. 1. f. 6-9. & t. 2. f. 10-13.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. A. f. 2. 3.
Einl. in Conch. 2. p. 153. t. 4. f. 4.
Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 928. 929.
β) *Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 930. 931. 934-935.*
γ) *Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 932. 933.*
δ) *Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 936. 937.*
ε) *Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 950. 951.*
ζ) *Kaemmerer Cab. Rudolſt. p. 125. t. 10. f. 3.*
Habitat terreſtris in India, *teſta 18-24 lineas longa; nunc tota ſulphurea, nunc maculis diverſicoloris & ambitus, nunc macula viridi faſciaque rufa, nunc ſtriga obliqua ſaturate fuſca varia, aliquando candida, macula rubra aut pluribus diverſi coloris notata, anfractibus 6-8, labro craſſo.*

dextra.

95. H. teſta conica flava: labro reflexo albo. *Müll hiſt. verm. 2. p. 89. n. 287.*
Petiv. gazoph. t. 44. f. 7.
Liſt. Conch. t. 10. f. 5?
Martin. berl. Mag. t. 5. f. 49?
Chemn. Conch. 9. t. 134. f. 1210-1212.
Habitat - - - ſpiræ anfractibus non contrariis a perverſa diſtincta, an diſtincta ſpecies? teſta glabra, anfractibus 6-7, apertura ovata, nunc citrina unicolore, fauce albiſſima, nunc ſulphurea, ſtriga obliqua ſaturate fuſca, fauce pariter nivea, nunc alba varie maculoſa, fauce cæruleſcente, 18½-22 lineas longa.

teſta.

96. H. teſta conica ſubacuminata albida: ſtrigis & facia rufis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 93. n. 289.*
Habitat - - - inverſæ ſimilis, at anfractibus non contrariis 7, ſtrigis paucioribus, teſta 2 pollices & 5 lineas longa.

inverſa. 97. H. teſta conico-acuminata contraria albida: ſtrigis & faſcia rufis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 93. n. 290.*
Gualt. Conch. t. 5. f. O.
Petiv. gaz. t. 76. f. 5.
Geve Conch. t. 10.
Liſt. Conch. t. 36. f. 35?
Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 925. 926.
Habitat ad inſulas S. Mauritii & Borboniam, *teſta 2 pollices & 4 lineas longa, anfractibus 8 oblique ſtrigoſis, apertura ovata labioque albis.*

interrupta. 98. H. teſta conico-acuminata alba: ſtrigis fulvis, labro albo reflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 94. n. 291.*
Chemn. Conch. 9. t. 134. f. 1213. 1214.
Habitat - - - dextræ ſimilis, at teſta longiore, 22 lineas longa, anguſtiore, anfractibus 7, lineis tranſverſis 15 ſupra fulvis, ſubtus rufis, medio obſoletis

contraria. 99. H. teſta conico-acuminata contraria alba: ſtrigis undulatis fuſcis interruptis, labro reflexo. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 95. n. 292.*
Swammerd. bibl. nat. t. 7. f. 11.
Chemn. Conch. 9. t. 111. f. 938. 939.
Habitat rariſſima - - - teſta nitida, 15 lineas longa, apice ſummo nigra, apertura ovata ſtrigis pellucentibus varia.

læva. 100. H. teſta ſubcylindrica glabra contraria faſciata; labro ſubreflexo, columella flava. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 95. n. 293.*
Liſt. Conch. t. 33. f. 31.
Gualt. teſt. t. 4. f. M?
Knorr Vergn. 6. t. 29. f. 3.
Favann. Conch. t. 65. I. A[3].
Chemn. Conch. 9. t. 111. f. 940-949.
Habitat rariſſima - - - teſta candida 12-16 lineas longa, faſciis 2-6 ex rufo fuſcis, aperturæ quoque inſcriptis.

arenaria. 228. H. teſta albida nitente ſtriis tenerrimis longitudinaliter exarata: ſpira contraria hemiſphærica.
Spengl. nov. act. ſoc. dan. 1. t. 1. f. 6.
Chemn. Conch. 9. t. 113. f. 972. 973.
Habitat in arena littoris Ariminenſis, *minima.*

jamaicenſis. 234. H. teſta globoſo-brunnea albo faſciata, labro fimbriato candido, vortice obtuſo. *Chemn. Conch. 9. t. 129. f. 1140. 1141.*

Liſt. Conch. t. 42. 43. *f.* 43.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 3.
Favann. Conch. t. 63. *f.* M.
Habitat in Jamaica.

hodia. 239. H. teſta ſubgloboſa depreſſa baſi concava: apertura lunata. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 136. *t.* 137. *f.* 1179. 1180.
Habitat in inſula Rhodo.

abioſa. 101. H. teſta oblonga polita candida: apertura edentula, labro dilatato. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 96. *n.* 294.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* R?
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1234?
Habitat in India, *teſta diaphana* 11 *lineas longa, anfractibus* 8, *apertura ovata, labri margine ſublacero.*

ndica. 102. H. teſta oblonga ruguloſa roſea: apertura edentula, labro dilatato candido. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 97. *n.* 295.
Chemn. Conch. 9. *t.* 121. *f.* 1042.
Habitat - - - teſta nitida, 20 *lineas longa: fauce alba, apertura ovato-oblonga, labro adnato ex roſeo flaveſcente, anfractibus vix* 6.

nthina. 103. H. teſta ſubimperforata ſubrotunda obtuſa diaphana fragiliſſima: apertura poſterius dilatata; labro emarginato. *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 375.*
Act. angl. 301. *p.* 2051. Cochlea colore ſpecioſior.
Brown jam. 399. *t.* 39. *f.* 1. Cochlea purpurea tenuis, ore ampliore.
Sloan. jam. t. 1. *f.* 4. & *t.* 572. *f.* 23.
Column. aq. 23. *t.* 22.
. . *purp. t.* 13. *f.* 2.
Liſt. Conch. t. 572. *f.* 24.
Rumpf. muſ. t. 20. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* O.
Argenv. Conch. t. 6. *f.* S.
Knorr Vergn. 2. *t.* 30. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 166. *f.* 1577. 1578.
Schroet. inn. Bau Conch. t. 5. *f.* 1.
Habitat in pelago, mari atlantico, mediterraneo, *aliiſque* Europæ, Aſiæ, Africæ, Americæ, *incola vivo ſanie violacea vel purpurea manum vel leviſſime contrectantem inficiente, noctu lucente, teſta violacea, ad pollicem uſque lata & alta, apertura ſubtriangulari.*

gigantea. 104. H. teſta imperforata ſubrotunda ſolida: ſpira depreſſa.
Scopol. del. inſubr. p. 66. t. 25. f. A.
Habitat - - teſta maxima, lævi, alba, intus fuſceſcente, ſpira flaveſcente, anfractibus 6 contiguis non ſtriatis; primo intus badio, labio marginato.

vivipara. 105. H. teſta imperforata ſubovata obtuſa cornea: cingulis fuſcatis, apertura ſuborbiculari. *Fn. ſuec.* 2185.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 182. *n.* 370. Nerita teſta ovato-ventricoſa vireſcente: faſciis tribus lividis obſcuris.
Liſt. Conch. t, 126. *f.* 26. & *tab. anat.* 6.
anim. angl. t. 2. *f.* 18.
exerc. anat. 2. *t.* 2. *f.* 5. 12.
Pet. gaz. t. 99. *f.* 16.
Swammerd. bibl. nat. p. 73-78. *t.* 9. *f.* 5-13.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* A.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 49. *t.* 2. *f.* 8.
Argenv. zoomorph. t. 8. *f.* 2.
Friſch inſ. 13. *t.* 1.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 12. & *t.* 39. *f.* 33. 34.
Knorr Vergn. 5. *t.* 17. *f.* 4.
Martin. berl. Mag. 4. *p.* 234-242. *t.* 7. *f.* 4-9. *min. C. f.* 6.
Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 1. 2. & *t.* 11.
β) *Liſt. Conch. t.* 1055. *f.* 6?
Brit. zool. t. 84. *f.* 132.
da Coſta brit. Conch. t. 5. *f.* 2.
Favann. Conchyl. t. 61. *f.* D⁹.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1182-1183.
Habitat in Europæ (*neque tamen in* Daniæ) *aquis dulcibus, potiſſimum ſtagnantibus, vivipara, teſta ad 1½ pollicem longa, tenera, pellucida, glabra, ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata, in juniori ſetis cryſtallinis obſita utplurimum faſciata, fauce albida vel cæruleſcente, anfractibus 5-6. valde convexis.*

faſciata. 106. H. teſta ovato-ventricoſa alba: faſciis tribus rubris ſplendidis.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 182. *n.* 369. Nerita faſciata.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* M.
Ginann. op. poſt. 2. *p.* 49. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Thuringia & Italia, *teſta pellucida, glabra, 9½-15 lineas longa: faſciis in primo anfractu 3, in altero 2, ſpira acuta, anfractibus 5, fauce ex albo cæruleſcente.*

diſſimilis. 107. H. teſta ſubovato-acuminata luteo-albeſcente : labro nigro.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 184. *n.* 371. Nerita diſſimilis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 253. *t.* 4. *f.* 10.
Habitat Tranquebariæ *inter viviparam & tentaculatam quaſi media, teſta pellucida, glabra, anfractibus* 6, *operculo pellucido, nitido, ex luteo fuſco.*

nemoralis. 108. H. teſta imperforata ſubrotunda lævi diaphana faſciata, apertura ſubrotundo-lunata. *Fn. ſuec.* 2186. *It. oel.* 127.
Müll. zool. dan. prodr. 2902. *hiſt. verm.* 2. *p.* 46. *n.* 246. Helix teſta imperforata globoſa, labro fuſco.
Liſt. Conch. t. 57. *f.* 54.
anim. angl. t. 2. *f.* 3.
exercit. anat. t. 5. *f.* 1-3.
Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 6.
Argenv. Conch. t. 28. *f.* 8.
zoomorph. t. 9. *f.* 5.
Leſſer teſtaceoth. p. 88. *n.* 1.
Geve Conch. t. 32. *f.* 391-411.
Geoffr. teſt. 3.
Schaeffer Verſ. m. Schneck. t. 2. *f.* 4-6. *t.* 4. *f.* 4. & *t.* 6. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 63. *f.* H.
Chemn. Conch. 9. *t.* 132. *f.* 1196-1198.
α) *Petiv. gazoph. t.* 92. *f.* 10.
β) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* A.
γ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* P.
δ) *Petiv. gazoph. t.* 92. *f.* 9.
ε) *Petiv. gazoph. t.* 91. *f.* 11.
ζ) *Petiv. gazoph. t.* 91. *f.* 12.
η) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 1. 2.
Pet. gazoph. t. 91. *f.* 9.
Geve Conch. t. 32. *f.* 399.
ϑ) *Gualt. teſt. t.* 2. *f.* D.
Liſt. anim. angl. p. 117. *n.* 3. 4.
Petiv. gazoph. t. 91. *f.* 10.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 18.
Geve Conch. t. 32. *f.* 403.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 13. & *t.* 2. *f.* 28.
ι) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 402.
κ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 401. & 411.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 14. & *t.* 2. *f.* 29.
λ) *Geve Conch. t.* 32. *f.* 410.
Schlotterb. act. Helv. 5. *t.* 3. *f.* 6.
Martin. berl. Mag. 2. *t.* 3. *f.* 25.

μ) *Liſt. an. angl. p. 117. n. 5. 6.*
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 19.
ν) *Geve Conch. t. 32. f. 397.*
Mart. berl. Mag. 2. t. 3. f. 26.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 15. & t. 2. f. 30.
ξ) *Geve Conch. t. 32. f. 409.*
ο) *Geve Conch. t. 32. f. 396.*
π) *Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. f. 2. 3.*
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 27-29.
ρ) *Liſt. an. angl. p. 117. n. 9.*
Geve Conch. t. 32. f. 408.
Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. f. 9.
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 30.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 16.
σ) *Liſt. anim. angl. p. 117. n. 7.*
Gualt. teſt. t. 2. f. F.
Seb. muſ. 3. t. 39. f. 12.
Schlotterb. act. Helv. 5. t. 3. f. 10.
Martin. berl. Mag. 2. t. 3. f. 31. 32.
Schroet. Erdconch. t. 1. f. 17.
τ) *Argenv. Conch. t. 28. f. 8.*
υ) *Liſt. Conch. t. 55. f. 51.*
Klein oſtr. t. 1. f. 28.
φ) *Liſt. Conch. t. 58. f. 55.*
χ) *Liſt. Conch. t. 71. f. AA?*
ψ) *Liſt. Conch. t. 574. f. 20.*
Klein oſtr. t. 1. f. 4.
ω) *Liſt. Conch. t. 574. f. 27.*
Klein oſtr. t. 1. f. 5.
αα) *Liſt. Conch. t. 1655. f. 3.*
ββ) *Gualt. teſt. t. 1. f. N.*
γγ) *Seb. muſ. 3. t. 40. f. 35.*
δδ) *Schroet. Erdconch. t. 1. f. 12.*
εε) *Schroet. Erdconch. t. 2. f. 18.*
ζζ) *Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 4. f. 12.*
ηη) *Chemn. Conch. 9. t. 109. f. 924.*

Habitat vulgatiſſima in Europæ *arboribus, varietate, ſive incolæ ſive teſtæ colorem & picturam ſpectes, innumera, incola hinc inde eduli albo, cinereo, nigro vel luteo, teſta diametri 9-11 linearum, rufa vel lutea, rarius badia, incarnata, vel albida, rariſſime unicolore, crebrius faſcia vel faſciis 2, 3, 4, 5 magis minuſve latis, æqualibus aut inæqualibus, pallidis, fuſcis, luteſcentibus, incarnatis, ſanguineis, rarius albis, anfractibus 5.*

hortenſis. 109. H. teſta imperforata globoſa: labro albo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2903. *hiſt. verm.* 2. *p.* 52. *n.* 247.
Chemn. Conch. 9. *t.* 133. *f.* 1199-1201.
Geve Conch. t. 30. *f.* 357-367 & *t.* 31. *f.* 368-390.
α) *Muſ. Lud. Ulr.* 670. *n.* 376.* Helix major magis griſea, labris albis.
It. wgoth. p. 84. Cochlea teſta pellucida.
Geve Conch. t. 31. *f.* 381. 382.
β) *Liſt. anim. angl. p.* 117. *n.* 1.
Geve Conch. t. 31. *f.* 368. 370.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 27.
γ) *Geve Conch. t.* 30. *f.* 367. & *t.* 31. *f.* 380.
δ) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 388.
ε) *Geve Conch. t.* 33. *f.* 366.
ζ) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 387.
η) *Geve Conch. t.* 31. *f.* 374.
θ) *Gualt. teſt. t.* 1. *f.* M?
Habitat in Europæ *hortis, nemorali tamen rarior, an vere diſtincta ab hac ſpecies? teſta minore diametri* 7½-8 *linearum diſcrepat, teſta nunc tota albida, nunc tota flava, nunc lutea, vel maculis linearibus obſcuris, vel maculis punctiſque nigris, vel faſcia faſciiſve* 2, 3, 4, 5 *fuſcis, utplurimum inæqualibus picta.*

lucorum. 110. H. teſta imperforata ſubrotunda lævi faſciata: apertura oblonga fuſca.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 46. *n.* 245? Helix teſta imperforata rotundata alba, faſciis ſtrigiſque rufis, labro fuſco.
Liſt. Conch. t. 1058. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* C.
Habitat in Europa, *potiſſimum auſtrali, nemorali affinis; at teſta majore alba.*

griſea. 111. H. teſta imperforata ſubovata obtuſa griſea: faſciis duabus pallidis, apertura oblongiuſcula.
Gualt. teſt. t. 1. *f.* B?
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 4. *f.* 7.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1156-1158.
Habitat terreſtris in Europa, *præſertim auſtrali, teſta in* Suecia *triplo minori, pomatiæ affinis.*

Hæmaſtoma. 112 H. teſta imperforata ſubrotunda fuſca: faſcia longitudinali alba, apertura purpurea. *Muſ. Lud. Ulr.* 671. *n.* 377.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 78. *n.* 274. Helix teſta imperforata trochiformi caſtanea: faſcia alba, apertura ovali, labro reflexo ſanguineo.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 364.
Seb. muſ. 3. *t.* 40. *f.* 6. 7.
Geve Conch. t. 28. *f.* 328. 329.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 160. *t.* 4. *f.* 5. 6.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1050-1054.
Habitat terreſtris in inſula Zeylon, *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem lata, & perinde fere alta, intus alba, obtuſa, anfractibus* 5 *teretibus, primo reliquis duplo majore, extimis rubellis.*

pulla. 113. H. teſta imperforata ſubovata fuſca faſciata: apertura obliqua marginata albicante.
Liſt. Conch. t. 42. 43.
Knorr Vergn. 1. *t.* 21. *f.* 3.
Habitat - - - pomatiæ affinis, at teſta majore 2 *pollices lata,* $1\frac{1}{2}$ *alta obtuſa, anfractibus* 4.

venuſta. 114. H. teſta imperforata ſubovata ſulphurea: faſcia alba rubro-marginata, labro reflexo marginato.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 176 *t.* 11. *f.* 4. 5.
Habitat - - - pullæ affinis, teſta 10 *lineas lata,* $8\frac{1}{2}$ *alta, tenui, levi, intus albida, anfractibus* 4.

picta. 189. H. teſta imperforata ſubgloboſa glabra: anfractibus quatuor teretibus; primo ventricoſo, reliquis depreſſis, apertura lunari.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 15. *f.* 17. 18. *ind.* 1. *p.* 397.
Chemn. Conch. 9. *t.* 130. *f.* 1162-1165.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 5.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in Italia, *teſta nunc dilute cinerea, columella lineaque tranſverſa ad ſuturam fuſcis, nunc roſea, columella lineaque ad ſuturam tranſverſa fuſcis, nunc ſulphurea; columella fuſca, lineiſque ad anfractuum marginem rubris.*

variegata. 190. H. teſta imperforata ſubovata ſubepidermide fuſceſcente faſciata apertura intus alba.
Knorr Vergn. 4. *t.* 27. *f.* 3.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 230. *t.* 4. *f* 7.
Habitat in Italia, *in horto medico* Argentinenſi *quoque reperta, teſta nunc fuſca albo radiata faſciiſque flaveſcentibus albo maculatis picta, nunc ex rufeſcente exalbida*

faſciis 4 fuſcis albo undulatis, aliiſque 2 ad anfractum ſecundum anguſtioribus albo maculatis.

ſolida. 191. H. teſta imperforata ſolida ovata lævi: anfractibus ſex teretibus contiguis, columella incraſſata.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. t. 13. f. 18. 19. ind. 1. p. 408.
Habitat - - - teſta 3 lineas ultra pollicem longa roſea lineis interruptis tenuiſſimis rubris albiſque picta.

aperta. 192. H. teſta imperforata ſubgloboſa longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriata; anfractibus tribus; primo ventricoſo, apertura lunari, columella ſpirali
Chemn. Conch. 9. t. p. 133 f. 1204. 1205.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 15 f. 19 20. ind. 1. p. 399.
Habitat - - - teſta fuſca.

verſicolor. 193. H. teſta imperforata ſubrotunda tranſverſim ſtriata: anfractibus teretibus; primo ventricoſo, apertura ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. f. 9. 10. ind. 1. p. 398. 399.
Habitat - - - teſta pomatiæ magnitudine, nivea, lineis tranſverſis parallelis fuſcis faſciiſque intermediis croceis roſeiſque, columella roſea.

afra. 194. H. teſta imperforata ovata: anfractibus ſex planiuſculis contiguis, apertura inæquali quinquedentata.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 1. Pietin.
Habitat in Senegal, *teſta 3 lineas longa, dilute fulva, aut exalbida; ſpiræ anfractu primo reliquis multo majore.*

Nucleus. 255. H. teſta imperforata ovata glauca tranſverſim ſtriata: cingulis atris, apertura ſinuoſa. *Martyn univ. Conch. 2. t. 67. fig. exter.*
Habitat in Tahiti.

coccinea. 256. H. teſta ovata imperforata lævi rubra: apertura lutea.
Martyn univ. Conch. 2. t. 68. f. ext.
Habitat in nova Seelandia.

* * * * * Turritæ.

decollata. 115. H. teſta imperforata turrita: ſpira mutilato-truncata, apertura obovata. *Muſ. Lud. Ulr. 671. n. 378.**
Müll. hiſt. verm. 2. p. 114. n. 314. Helix teſta turrita alba, vertice truncato, apertura edentula.
Liſt. Conch. t. 17. f. 12. & t. 18. f. 13.

Petiv. gazoph. t. 66. f. 1.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. f. 56.
Gualt. teſt. t. 4. f. O. P. Q.
Ginann. op. poſt. 2. p. 59. t. 3. n. 22.
Knorr Vergn. 6. t. 32. f. 3.
Martin. berl. Samml. 7. t. 1. f. 6. 7.
Murray teſtaceol. t. 1. f. 3.
Argenv. Conch. t. 27. f. 5.
Favann. Conch. t. 65. f. B⁸.
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1254. 1255.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 16. f. 13?* Helix calcarea.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1226.
Liſt. Conch. t. 14. f. 9.
Gualt. teſt. t. 6. f. I.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. A. f. 1.
γ) *Favann. Conch. t. 65. f. B¹⁰.*
Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1256. 1254.
δ) *Chemn. Conch. 9. t. 136. f. 1258.*
Habitat in Europa, Africa, Aſiaque *auſtrali, teſta exalbida, oblonga, nitente, ſubſtriata, 6–15½ lineas longa, anfractibus 4-6, in juniori 5–7 teretibus, primo altero fere duplo majore.*

ſcalaris. 116. H. teſta conico turrita imperforata: anfractibus remotis, apertura ovata. *Müll. hiſt. verm. 2. p. 113. n. 313.*
Chemn. Conch. 9. t. 128. f. 1130. n. 1–3.
Habitat - - - pomatiæ parumper affinis, at teſta oblique ſtriata, pallide ruſeſcente: faſciis 2 albidis, ſpira obtuſa: anfractibus 5. ventricoſis.

circinata. 117. H. teſta hyalina tranſverſim coſtata perforata ſubturrita: anfractibus diſtantibus, apertura circulari.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 182. t. 8. f. 4. 5.
Habitat - - - ſtructura ad turbinem ſcalarem quodammodo accedens, teſta 6 lineas alta, 7½ lata, labiis acutis; an hujus tribus?

ſubcylindrica. 118. H. teſta imperforata turrita ſubcylindrica obtuſa: anfractibus quatuor, apertura ovali.
Chemn. Conch. 9. t. 135. f. 1235.
Habitat in Europæ *borealis aquis dulcibus, teſta cornea, pallida, magnitudine grani ſecalini, apice obtuſiſſima, rotundata, aperturæ margine interiori reflexo.*

ſtagnorum. 119. H. teſta ſubperforata ſubturrita: anfractibus quinque, apertura ovata.

Baſt. op. ſubſ. p. 77. *t.* 7. *f.* 4. Turbo ſtagnalis.

Habitat in aquis dulcibus, *teſta cornea, pallida, ovato-oblonga, acutiuſcula; magnitudine vix grani ſecalini, umbilico minimo, apertura marginata.*

octona. 120. H. teſta ſubperforata turrita: anfractibus octo, apertura ſubrotunda.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 150. *n.* 340. Buccinum (Acicula) teſta turrita glabra alba, axi inflexo acuto.

Gualt. teſt. t. 6. *f.* BB.

Geoffr. teſt. t. 21.

Schroet. Fluſconch. t. 8. *f.* 6. a. b.

Schroet. Erdconch. p. 142.

β) *Chemn. Conch. t.* 136. *f.* 1264.

Habitat rara in Sueciæ, Thuringiæ, Galliæ, Americæ auſtralis *ſubpaludoſis & arena riparia, teſta glabra, fragiliſſima cornea vix* 4 *lineas longa, anfractibus interdum* 6, *planis, linea tenerrima disjunctis: primo altero duplo majore, umbilico inconſpicuo.*

tenera. 121. H. teſta turrita convexa ſtriata alba: ſtrigis raris fulvis, columella ſinuata inflexa.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 149. *n.* 339. Buccinum ſtriatum.

Chemn. Conch. 9. *t.* 120. *f.* 1028-1030.

Habitat - - - teſta tenera pellucida, 3-7 *lineas ultra* 2 *pollices longa, longitudinaliter ſtrigoſis, anfractibus* 7-8 *margine incumbentibus, apertura ovato-oblonga.*

Columna. 122. H. teſta turrita alba apice fulva: anfractibus maculatis contrariis, apertura oblonga.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 151. *n.* 341. Buccinum Columna.

Liſt. Conch. t. 38, *f.* 37. & *t.* 39.

Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 400.

Favann. Conch. t. 61. *f.* H[2]. H[13].

Chemn. Conch. 9. *t.* 112. *f.* 954. 955.

Habitat - - - teſta pellucida aluminis colore & nitore conſpicua, $27\frac{1}{2}$ *lineas longa maculis fulvis quaſi radiata, anfractibus* 7-8 *ſingulariter tortis, utrinque gibbis, longitudinaliter & ſpiraliter ſtriatis,* 4*to,* 5 & 6*to fulvis, margine ſupremo albo, apertura maculis pellucentibus varia non labiata: interiori margine fulvo.*

pella. 123. H. teſta imperforata ovata acuminata tranſverſe ſtriata fuſca: faſciis flavis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2916.
Habitat in Iſlandia, *teſta ex fuſco ferruginea, decumbente, faſcia ovato-oblonga, magnitudine ſeminis lithoſpermi, faſcia in primo anfractu duplici, in reliquis ſimplici, apertura ſemiovata.* Zoega.

plicaria. 195. H. teſta ſubulata ſemipellucida longitudinaliter plicata: anfractibus teretibus, apertura ovata. *v. Born Caeſ. Vindob. teſt. t.* 16. *f.* 14.
Habitat - - - anfractibus 10.

undulata. 196. H. teſta ſubulata lævi ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata: anfractibus teretibus, apertura ovata.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. t. 16. *f.* 15. Helix maculata.
Habitat - - - teſta pallida, longitudinaliter ſpadiceo undulata: anfractibus circiter 12, *columella glabra.*

fuſcata. 197. H. teſta ſubulata lævi ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata: anfractibus planiuſculis, apertura ovata. *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 16. *f.* 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1229.
Habitat - - - teſta exterius ex flavicante fuſca, fauce cinerea, anfractibus circiter 10, *columella lævi.*

Priapus. 198. H. teſta imperfotata turrita glabra: columella inflexa, anfractibus depreſſiuſculis. *Gronov. zooph.* 3. *t.* 19. *f.* 10. 11.
Habitat rariſſima - - - teſta tenui, pellucida, badia: faſciis 4 punctatis, anfractu primo reliquis triplo majore, apertura ovata.

Follicu-lus. 199. H. teſta turrita pellucida, glabra: columella ſubplicata, labro tenui. *Gronov. zooph.* 3. *t.* 19. *f.* 15. 16.
Habitat ad Barbariæ *littora, teſta grani avenæ magnitudine, unicolore, alba, anfractibus teretibus, omnibus æqualibus* 5-6, *apertura ovata.*

ſepium. 200. H. teſta turrita lactea longitudinaliter ſtriata, anfractibus ſeptem contiguis, apertura ovata.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 53.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 1.
Habitat in Thuringiæ *ſepibus montanis, teſta vix ultra ½ pollicem longa, lineis griſeis longitudinalibus interdum picta.*

ſplendidula. 201. H. teſta tenella nitida pellucida dilute fuſca: apertura oblonga.
Habitat in Gallia & Thuringia, *teſta vix* $\frac{1}{4}$ *pollicis longa, anfractibus* 6.

Mitra. 202. H. teſta turrita: anfractibus coſtatis diſtantibus; primo tereti, reliquis planiuſculis, apertura ovali.
Schroet. Fluſconch. t. 9. *f.* 12.
Habitat - - - teſta exalbida, tenui, ultra pollicem longa, anfractibus 8-9.

atra. 210. H. teſta turrita atra minutiſſime ſtriata: anfractibus convexiuſculis, apertura oblongo-ovali.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* GG.
Schroet. Fluſconch. t. 10. *min.* A. *f.* 5.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa, anfractibus* 7.

cuſpidata. 240. H. teſta turrita cornea tranſverſim ſubtiliſſime ſtriata longitudinaliter plicata: apertura ovali, labro acuto.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1228.
Liſt. Conch. t. 118. *f.* 13.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* H.
Habitat in Indiæ *fluviis.*

crenata. 241. H. teſta turrita alba tranſverſim ſubſtriata, penes ſuturam cingulo crenulato cincta. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1230.
Habitat in Indiæ *fluviis.*

Carinula. 242. H. teſta turrita ſubumbilicata alba: anfractu primo ſubcarinato; faſcia nigricante. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 190. *t.* 136. *f.* 1263. *n.* 1-4.
Habitat - - -

crocea. 243. H. teſta cylindrica glabra ex aurantio flaveſcente apice obtuſa. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 135. *f.* 1233.
Habitat rarior - - -

tanſchaurica. 244. H. teſta ſubturrita glaberrima brunnea obſcuris maculata: fauce albicante. *Chemn. Conch.* 9. *p.* 174. *t.* 135. *f.* 1243. a. b.
Habitat in Coromandel *aquis dulcibus.*

obtuſata. 250. H. teſta alba denſe ſtriata ſubcylindrica: anfractibus convexiuſculis, labro marginato. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 151. *n.* 9. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat - - - teſta 3 *fere pollices longa.*

purpurea. 257. H. teſta ovato-oblonga purpuraſcente purpureo teſſellata intus irideſcente. *Martyn univ. Conchol.* 2. t. 68. *f. med.*
Habitat in nova Seelandia.

****** Ovatæ *imperforatæ.*

Pupa. 124. H. teſta ſubimperforata ovato-oblonga rudi: anfractibus ſenis, apertura lunato-oblonga.
Habitat in Mauritania. E. Brander.

barbara. 125. H. teſta imperforata oblonga rudi: anfractibus octonis, apertura ſubrotundo-lunata.
Habitat Algiriæ, *teſta ad pupam accedens, dimidio tamen minori, vel hordei ſemine paulo majori: apertura infima ſubtus ſæpe faſcia griſea cincta.* Brander.

Amarula. 126. H. teſta imperforata oblonga: anfractibus ſpinoſo-dentatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 672. *n.* 379.*
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 137. *n.* 330. Buccinum teſta ſubovata nigra: anfractibus ſurſum muricatis.
Rumpf muſ. t. 33. *f.* FF. Voluta fluviatilis.
Liſt. Conch. t. 133. *f.* 33. & *t.* 1055. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 6. *f.* B.
Argenv. Conch. t. 27. *n.* 6. *f.* f.
Petiv. gaz. t. 4. *f.* 3.
Klein oſtr. p. 36. *n.* 13.
Seb. muſ. 3. *t.* 53. *f.* 24. 25.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 38. & *t.* 11. *f.* 64. C.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 21.
Schroet. Flüſconch. t. 9. *f.* 8. 11.
-inn. Bau Conch. t. 1. *f.* 4.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1218. 1219.
β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 134. *f.* 1220. 1221.
Habitat in Indiæ *fluviis, teſta nigra immaculata ſtriis ſpiralibus ſubconvexis exarata,* 9-19 *lineas longa, anfractibus* 5-6, *ſingulis in ſuperiori parte ſpinis* 10 *acutis armatis, apertura ampla hiante alba, labio exteriori acuto, interiori craſſo.*

nævia. 251. H. teſta tranſverſim ſulcata alba nigricante ſtriata: ſpira acuminata; anfractibus planiuſculis, primo majore tereti. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 146. *n.* 10. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat in Oceano auſtrali, *teſta parum ultra pollicem longa.*

aſpera. 127. H. teſta acuminata cinerea tranſverſim ſtriata: anfractibus muricato dentatis ſtrigiſque ſanguineis.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 136. *n.* 329. Buccinum ſcabrum.
Chemn. Conch. 9. *t.* 136. *f.* 1259. 1260.
Habitat in paludoſis littoris Coromandel, *teſta ovata pellucida* $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ *lineas longa, interdum ſqualida ex cinereo fuſca: ſtriis convexis ſpiralibus, ſtrigis undulatis longitudinalibus per anfractus tuberculatis, anſractibus* 7-8, *ſingulis* 12 *ſpinis armatis, apertura-ovata, labio exteriori acuto, interiori fuſco nitido, fauce pallida ſtrigis ſanguineis punctatis pellucentibus picta.*

ſtagnalis. 128. H. teſtą imperforata ovato-ſubulata ſubangulata: apertura ovata. *Fn. ſuec.* 2188.*
Müll. zool. dan. prodr. 2935. *hiſt. verm.* 2. *p.* 132. *n.* 327. Buccinum teſta oblonga ſubulata ventricoſa, apertura ovato-repanda.
Liſt. Conch. t. 123. *f.* 21.
anim. angl. t. 2. *f.* 21.
exerc. anat. t. 2. *f.* 3. 4.
Petiv. muſ. 82. *n.* 85.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 55.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* I. L.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* A. B. C.
Argenv. Conch. t. 27. *n.* 6. *f.* 1. 2.
zoomorph. t. 8. *f.* 5. b.
Klein oſtr. t. 3. *f.* 69.
Geoffr. teſt. 1.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 25. 26.
Leſſer teſtaceoth. p. 88. *n.* 11.
Friſch. inſ. 8. *t.* 7.
Seba muſ. 3. *t.* 39. *f.* 52. 53.
Swammerd. bibl. nat. p. 9. *f.* 4.
Hanov. Seltenh. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 33. a. b.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 16. *f.* 16.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 1-4. & *t.* 11. *min.* C. *f.* 1.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 136.
da Coſta Brit. Conch. t. 5. *f.* 11.
Favann. Conch. t. 61. *f.* 16.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1237-1240.
β) *Bonann. muſ. Kirch.* 3. *f.* 392?
Habitat in Europæ *ſtagnis, teſta ad* $2\frac{1}{2}$ *pollices longa, tenui, fragili, exalbida, flavicante aut cinerea, rarius cornea, alba aut nigra, nunc glaberrima, nunc tenuiter ſecundum longitudinem aut tranſverſim ſtriata, anfractibus*

6-7, primo turgido reliquis ſimul ſumtis æquali, apertura ampla, labro repando non marginato.

fragilis. 129. H. teſta imperforata ovato-ſubulata tereti pellucida apertura ovato-oblonga. *Fn. ſuec.* 2187.*
Liſt. Conch. t. 8. *f.* 3?
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 41-46.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 9. *f.* 35.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 8.
β) *Argenv. Conch. t.* 27. *n.* 6. *f.* 4.
Habitat in Europæ *aquis ſtagnantibus, ſtagnali ſimillima, utrum vere diſtincta, an ætate modo minore diverſa, teſta tamen duplo minore,* 11 *lineis utplurimum breviore, nunc alba, nunc aurea & interdum albo-fasciata, ſpira acuta, anfractibus 5-7 lineola diſcretis, primo ſubventricoſo, labio non marginato.*

glabra. 130. H. teſta cylindrica acuminata cornea: apertura ovata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2936. *hiſt. verm.* 2. *p.* 135. *n.* 328. Buccinum glabrum.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 15.
Habitat rara in Daniæ *pratis humidis, ubi aquæ ſtagnant, lubricæ affinis; at teſta longiore,* $4\frac{1}{2}$ *lineas longa pellucida, anfractibus fere 8 teretibus, ſat parum decreſcentibus, primo cingulo reniformi nigro tranſparente ornato: Incola niger, tentaculis albidis.*

paluſtris. 131. H. teſta oblonga acuminata fuſca: apertura ovata. *Müll. zool. dan. prodr.* 1934. *hiſt. verm* 1. *p.* 131. *n.* 326. Buccinum paluſtre.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* E.
Geoffr. teſt. 2.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 9. *f.* 37.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 9. 10.
β) *Schroet. Fluſconch. t.* 7. *f.* 7.
γ) *Schroet. Fluſconch. t.* 7. *f.* 11.
Habitat frequens in Europæ *paludoſis, ſtagnali affinis, et incola cinereo albido-punctato, teſta minus fragili, nec apice ſubulata, nec baſi ventricoſa, ſtriis ſubtiliſſimis confertis tranſverſis & ſpiralibus exarata, a prima ætate obſcure fuſca, 2-9 lineas longa, faſcia ad aperturam ſaturate ſanguinea, interdum duplici, labio reflexo albo, anfractibus 5-6.*

132. H.

truncatula. 132. H. teſta ovato-oblonga; anfractibus detruncatis, apertura ovata.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 130. *n.* 325. Buccinum truncatulum.

Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 13.

Habitat in Thuringia, *teſta* $1\frac{1}{3}$-5 *lineas longa, atra, ſubpellucida, anfractibus* 5 *ſurſum truncatis, labio incumbente ſqualido.*

peregra. 133. H. teſta cornea ſubconica: mucrone acuto, apertura ovata.

Mull. zool. dan. prodr. 2933. *hiſt. verm.* 2. *p.* 130. *n.* 324. Buccinum peregrum.

Gualt. teſt. t. 5. *f.* e. e.

Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1244. *n.* 1. 2.

Habitat in Thuringiæ, Daniæ *aquis ſtagnantibus, tempore brumali in tiliarum truncis & ramis, inter Auriculam & paluſtrem media, teſtæ forma non ventricoſa, anfractibus ſubabruptis & magis elongatis, ab illa, teſtæ forma ſubconica ab hac diſcernenda, teſta* 2-8 *lineas longa, nunc albida pellucida, nunc atra opaca.*

glutinoſa. 134. H. teſta ventricoſa diaphana: mucrone obtuſo, apertura ampla.

Müll. zool. dan. prodr. 2932. *hiſt. verm. p.* 129. *n.* 323. Buccinum glutinoſum.

Habitat rarior in Dania, *nymphææ præſertim luteæ foliis inſidens, limace incola albo cinereo-punctato, pallio gelatinoſo totam teſtam obvolvente. teſta tenerrima fragiliſſima flava,* $1\frac{1}{2}$-4 *lineas longa, anfractibus* 2-3, *apertura repanda rotundata.*

putris. 135. H. teſta imperforata ovata obtuſa flava; apertura ovata. *Fn. ſuec.* 2189.*

Müll. zool. dan. prodr. 2912. *hiſt. verm.* 2. *p.* 97. *n.* 296. Helix (ſuccinea) teſta oblonga fulva diaphana, anfractibus tribus, apertura ovata.

Tulp. obſ. 210. *t.* 201.

Liſt. Conch. t. 123. *f.* 23.

anim. angl. t. 2. *f.* 24.

Gualt. teſt. t. 5. *f.* H.

Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Swammerd. bibl. nat. t. 8. *f.* 4.

Klein oſtr. t. 3. *f.* 70.

Argenv. Conch. t. 27. *f. ult. n.* 6. & *t.* 28. *f.* 3.

Geoffr. teſt. 22.

Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 22.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 66. b. & 4. *t.* 11. *f.* 60.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 2. 3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1248.
Habitat frequens in Europæ plantis ripariis, *rarius aliis, incola nigerrimo, torpido prominente, Auguſti menſe medio coeunte, tentaculis 4 inſtructo, teſta pellucidiſſima 1-8 lineas longa, tenerrima, leviſſima, membranacea, fragiliſſima, ſtriis intus & extrinſecus confertis exaratis anfractibus 3 quaſi contortis, apertura non labiata.*

acuta. 136. H. teſta conico-acuminata alba: faſcia rubra, apertura edentula.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 100. *n.* 297.
Liſt. Conch. t. 19. *f.* 14.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* N.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1224. *n.* 1. 2.
Habita in Italia, *teſta 4 lineas longa, faſciis raro 2 in majori anfractu picta, anfractibus 7, apertura ovata.*

Papilla. 137. H. teſta conica perforata: ſtriis rugoſis, apertura tranſverſali; labro reflexo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 100. *n.* 298.
Chemn. Conch. 9. *t.* 122. *f.* 1053. 1054.
Habitat - - - teſta diametri $10\frac{1}{2}$ *linearum, rugis albis & ex rufo fuſcis varia, anfractibus convexis fere 6, apertura ovata, labro albo craſſo.*

minuta. 138. H. teſta ſubcylindrica: apertura ovali edentula. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 101. *n.* 299.
Habita in Thuringia, *turbini muſcorum parumper affinis, at teſta breviore, vix ultra* $\frac{2}{3}$ *lineæ longa, triplo anguſtiore & acuminata diſtincta, anfractibus 5.*

detrita. 139. H. teſta conica alba: lineis tranſverſis rufis, apertura ovata. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 101. *n.* 300.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* N.
Leſſer teſtaceoth. p. 224.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 53?
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 1?
Fluſconch. t. 19. *min.* A. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 37.
Chemn. Conch. 9. *t.* 134. *f.* 1225. a - d.
Habitat in Italia & Saxonia, *teſta polita, obſolete ſtrigoſa, 8*$\frac{1}{2}$ *lineas longa, anfractibus 6, labro ad columellam aliquantum reflexo.*

ventricoſa. 140. H. teſta conica pallida ſtriata: apertura edentula. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 102. *n.* 301.

Habitat rara in Thuringia, *teſta 2 lineas longa, helici trocho affini, at ventricoſiore, anfractibus* 7, *extimis* 4 *latitudine quam minime diverſis.*

obſcura. 141. H. teſta conica fuſca: apertura edentula; labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 103. *n.* 302. *zool. dan. prodr.* 2913.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 8.
Argenv. Conch. t. 18. *f.* 15.
Geoffr. teſt. 15.
Habitat in Europa, *in fagi truncis, incola albo, ſupra obſcuro: oculis ſolis nigris, teſta acuminata, oculo armato: tenuiſſime ſtriata, anfractibus* 6, *apertura ovali: margine acuto, labro candido nitido.*

lubrica. 142. H. teſta conica fulva nitida pellucida acuta: apertura edentula; labro rubente. *Müll. zool. dan. prodr.* 2914. *hiſt. verm.* 2. *p.* 104. *n.* 303.
Liſt. an. angl. t. 2. *f.* 7.
Geoffr. teſt. 17.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 59. a. b.
Schroet. Erdconch. t. 1. *f.* 9.
Habitat in Europæ *muſcis ac trabibus paliſque putreſcentibus, humidis, incola nigro, ſubtus albo, aquam ferente, teſta glaberrima, nitidiſſima, rarius candida,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa, anfractibus* 5–6, *apertura ovata.*

limoſa. 143. H. teſta imperforata oblongiuſcula pellucida acuta: apertura ovata. *Fn. ſuec.* 2190.
Brit. zool. t. 86. *f.* 137.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1246. 1247.
Habitat in Europæ *paludibus.*

contorta-plicata. 144. H. teſta turbinata cinerea ſubimperforata: vertice truncato.
Müll. zool. dan. prodr. 2951. *hiſt. verm.* 2. *p.* 187. *n.* 374. Nerita contorta.
Argenv. Conch. t. 8. *f.* 5.
Habitat rariſſima in Galliæ? Daniæ *foſſis limoſis, teſta pyramidali, ſqualida, opaca,* $2\frac{1}{3}$ *lineas longa, anfractibus vix* 5, *apertura circinata.*

angularis. 145. H. teſta imperforata vireſcente: anfractibus ſpiraliter angulatis, fauce alba.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 187. *n.* 373. Nerita angularis.

Liſt. Conch. t. 127. *f.* 27.
Gronov. zoophyl. 3. *p.* 331. *n.* 1547 ?
Chemn. Conch. 8. *t.* 134. *f.* 1222. 1223.
Habitat in flumine Sinenſi, *emporium* Canton *alluente, teſta conicâ; ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata,* 12 *lineas longa, anfractibus* 5 *fere perpendicularibus, apertura rotundata.*

tentacula-ta. 146. H. teſta imperforata ovata obtuſa impura: apertura ſubovata. *Fn. ſuec.* 2191.*
Müll. zool. dan. prodr. 2950. *hiſt. verm.* 2. *p.* 185. *n.* 372. Nerita (jaculator) teſta oblonga cornea, vertice acuto.
Liſt. Conch. t. 132. *f.* 32.
anim. angl. t. 2. *f.* 19.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* B.
Geoffr. teſt. 3.
Schlotterb. act. helv. 5. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 7. *f.* 12-14.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 19-22. b.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 140.
da Coſta brit. Conchol. t. 5. *f.* 12.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1245.
Habitat vulgaris in Europæ *aquis ſtagnantibus & rivis; teſta incola nigro aureo-punctato, globulos ejaculante, teſta* $\frac{1}{6}$-$4\frac{1}{4}$ *lineas longa, cornea, diaphana acuta glabra, ſæpius limo obducta fuſca aut brunnea; anfractibus* 4, 5, *rarius* 6, *teretibus convexis, operculo ovato, corneo, pellucido, albo.*

Auricula-ria. 147. H. teſta imperforata ovata obtuſa, ſpira acuta breviſſima, apertura ampliata. *Fn. ſuec.* 2192.
Müll. zool. dan. prodr. 2931. *hiſt. verm.* 2. *p.* 126. *n.* 322. Buccinum (Auricula) teſta ampullacea cornea, mucrone acuto brevi, apertura ampliſſima.
Liſt. Conch. t. 123. *f.* 22.
anim. angl. t. 2. *f.* 23.
exerc. anat. t. 2. *f.* 3. 4.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 54.
Ginann. op. poſt. 2. *t.* 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 5. *f.* F. G.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 7. & *t.* 28. *f.* 22.
zoomorph. t. 8. *f.* 6.
Geoffr. teſt. 3.
Schlotterb. act. Helvet. 5. *t.* 3. *f.* 27. 28.

Hoſmann act. Mogunt. 2. *p.* 1-15.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 4.
Martin. berl. Mag. 3. *t.* 5. *f.* 66. *f.* aa. & 4. *t.* 11. *f.* 59. A. B. *coll.*
v. Born muſ. Caeſ. vindob. teſt. t. 16. *f.* 20.
Schroet. Flußconch. t. 6. *f.* 3-6. & *t.* 11. *min.* C. *f.* 2.
Brit. zool. 4. *t.* 86. *f.* 138.
da Coſta brit. Conch. t. 5. *f.* 17.
Chemn. Conch. 9. *t.* 135. *f.* 1241. 1242.
β) *Schroet. Fluſconch. t.* 6. *f.* 7. & *t.* 11. *min.* c. *f.* 3.
γ) *Schroet. Fluſconch. t.* 7. *f.* 12?
Habitat vulgaris in Europæ *aquis ſtagnantibus & rivis, teſta tenui, fragili, pellucida a 2 ad 15 lineas longa, alba, interdum nitente, exalbida, cornea, cerea, cinerea aut ſubfuſca, rarius coſtata, anfractibus 3-5, primo ventricoſo turgido reliquis omnibus triplo majore, incola albo cinereo-punctato: oculis nigris.*

lævigata. 148. H. teſta imperforata obovata obtuſiſſima pellucida læviſſima.
Habitat - - - teſta cornea longitudinaliter obſolete ſtriata, piſi magnitudine, apertura magna ſublunata poſterius elongata, labio interiore albo.

balthica. 149. H. teſta imperforata ovata acuminata: rugis elevatis, apertura ovata ampliata. *Fn. ſuec.* 2193.* *It. goth.* 261.
Habitat ad maris balthici *littora, incola nigro: tentaculis 2, teſta pellucida: anfractibus 4.*

neritoidea. 150. H. teſta imperforata convexa longitudinaliter ſtriata: rima umbilicali, apertura ſubrotunda. *Muſ. Lud. Ulr.* 672. *n.* 380.*
Habitat - - - teſta livida, ſtriis pluribus quam 40 exarata.

Perſpicua. 151. H. teſta imperforata convexo ovata: labro nullo, apertura ad apicem uſque hiante. *Muſ. Lud. Ulr.* 673. *n.* 381.*
Habitat in mari mediterraneo, *inter bullas & helices intermedia, teſta lactea, ad apicem uſque perſpicua, fragiliſſima.*

haliotoidea. 152. H. teſta imperforata depreſſo-planiuſcula ſtriis undatis: apertura ovali dilatata uſque in apicem. *Muſ. Lud. Ulr.* 673. *n.* 382.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2900. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 390. *n.* 387.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 2. Sigaret.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 32. *t.* 101. *f.* 1-4. Bulla velutina.

Rumpf muſ. t. 40. *f.* R.
Petiv. gazoph. t. 12. *f.* 4.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* F.
Bonann. muſ. Kirch. 3. *f.* 404.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* C.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 114.
Knorr Vergn. 4. *t.* 17. *f.* 5? & 6. *t.* 39. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 16. *f.* 151-154.
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1598. 1599.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, mari mediterraneo, atlantico, indico, *nonne potius ad haliotides referenda, incola parvo albo; tentaculis 2 brevibus, operculo nullo, teſta plana, elliptica, tenui, pellucida, alba, aut rubella faſcia alba, aut aurantia faſciis 2 dilutioribus, extrinſecus ſubcancellata, anfractibus 4 lateralibus, labro acutiſſimo.*

muralis. 153. H. teſta imperforata ſubdepreſſa ſtriata albida: maculis fuſcis, labro albo. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 14. *n.* 213.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 1. *f.* 2. Pouchet.
Liſt. Conch. t. 74. *f.* 74.
Gualt. teſt. t. 3. *f.* F.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 18.
Habitat in Italia & Africa, *teſta diametri 7 linearum interdum fuſco punctata, frequentius ſupra albida ſtriis obliquis confertis profundis ſtrigiſque fuſcis inſignita, ſubtus alba, glabra, minus ſtriata, anfractibus 4, apertura fuſca, labro acuto ſubreflexo.*

Cartuſiana. 154. H. teſta imperforata, ſubdepreſſa alba: anfractibus ſex. *Müll. hiſt. verm.* 2. *p.* 15. *n.* 214.
Schroet. Erdconch. t. 2. *f.* 27?
Geoffr. teſt. 4.
Habitat in Thuringia? & Gallia, *teſta pellucida, diametri 6 linearum, utrinque convexa, labio candido craſſiuſculo, ore tenuiore.*

Vertigo. 155. H. teſta cylindrica glabra obſcure fulva: anfractibus teretibus contrariis, apertura ſubquadrata ſexdentata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2919. *hiſt. verm.* 2. *p.* 124. *n.* 320. Vertigo puſilla.
Habitat rara in Daniæ *truncis putridis, incola pellucido, ſupra cerulescente ſubtus albo, tentaculis modo 2 linearibus, apice oculatis, teſta lineam longa, anfractibus 4-5, aperturæ margine ſummo arcuato cum dentibus albo, ad anfractum oppoſitum tranſverſo.*

Carychium. 156. H. teſta hyalina ſubconica glabra: apertura ovata dentibus intus ſeſquitribus munita.
Müll. zool. dan. prodr. 2920. hiſt. verm. 2. p. 125. n. 321. Carychium minimum.
Habitat in Daniæ *aſſeribus humidis fagique foliis putreſcentibus, incola flavo: tentaculis modo 2 truncatis quaſi bulbigeris ad baſin poſterius oculatis, teſta ½-¾ lineam longa: anfractibus 5 teretibus.*

ambigua. 157. H. teſta ſubimperforata convexa: ſulcis remotis compreſſis, apertura ſemiorbiculari.
Adanſ. Seneg. 1. t. 13. f. 1? Foſſus.
Habitat in mari mediterraneo, *teſta parva, alba, neritam referente, ut tamen labium interius non reflexum ſit, umbilico in junioribus aperto, in adultis clauſo, ſpira laterali obtuſa, ſulcis 6 elevatis cincta.*

Corvus. 203. H. teſta imperforata ovata nigra: apertura ovata.
Martin. berl. Mag. 4. t. 9. f. 36.
Schroet. Fluſconch. t. 7. f. 3. 4.
Habitat in Thuringiæ *aquis ſtagnantibus, ſtagnali proxime aſſinis, at teſta duplo minore minus acuminata, anfractu primo minus convexo, labroque minus prominulo diſtincta.*

Pyrum. 204. H. teſta ſubcylindrica decuſſatim ſtriata hyalina ſpadiceo varia apice fuſca: anfractibus contrariis: tribus maximis medio impreſſis.
Martin. n. Mannigfalt. 4. p. 421. t. 2. f. 15. 16.
Habitat in Guinea, *ſpiræ anfractibus ſeptem.*

marmorata. 205. H. teſta albo-cinereo cæruleoque varia obtuſa: anfractibus teretibus; primo reliquis duplo longiori medio inflato longitudinaliter ſtriato, apertura ovata.
Schroet. Fluſconch. t. 6. f. 9.
Habitat Argentorati *in fluviis teſta ¼ pollicis longa, anfractibus 5.*

achatina. 206. H. teſta ſpadicea pellucida tenera: apertura ovata.
Schroet. Fluſconch. t. 6. f. 15. a. b.
Habitat - - - marmoratæ aſſinis, at teſta minori, anfractibus modo 4 anguſtioribus.

lugubris. 207. H. teſta ovato-acuminata pellucida tranſverſim ſtriata ſub epidermide nigra ochroleuca ſpadiceo undulata: anfractu primo reliquis duplo majore, apertura oblongo-ovata.

Schroet. Fluſconch. t. 6. f. 13.
Habitat - - - teſta vix 9 *lineas longa, anfractibus* 7.

minima. 208. H. teſta ovato-conica ſubimperforata: apertura orbiculari: anfractu primo reliquis duobus in centro ejus poſitis majore.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 18.
Habitat - - - teſta obtuſa, vix 1½ *lineæ longa.*

inflata. 209. H. teſta alba ſolida opaca: anfractu primo reliquis omnibus duplo majore, apertura ampla marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 5.
Habitat in Thuringiæ *fluvio* Unſtrut.

albicans. 210. H. teſta alba opaca acuminata: apertura ovali.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 6.
Habitat Hamburgi, *aquatica, inflata magis elongata.*

repanda. 211. H. teſta ovato-acuminata ſubimperforata: anfractu primo ventricoſo omnibus reliquis majore, apertura ſemicirculari.
Schroet. Fluſconch. t. 7. *f.* 16.
Habitat in Thuringiæ *aquis ſtagnantibus*, 6-7 *lineas longa.*

Difficillimi helicum *generis, ſive definitionem ſpecierum & varietatum omni numero abſolutam ſpectes, ſive limites, quibus a proximis generibus diſtat, multa adhuc occurrunt apud auctores, utrum ſpecies, an varietates, utrum huic, an alii tribui inſerendæ; ita e. g. apud* Liſterum *Conch. t.* 8. *f.* 1. 2. *t.* 11. *f.* 6. *t.* 13. *f.* 8. *t.* 22. *f.* 20. *t.* 24. *f.* 22. *t.* 28. *f.* 26. *t.* 33. *f.* 32. *t.* 44. *f.* 42. *t.* 59. *f.* 56. *t.* 61. *f.* 59. *t.* 65. *f.* 63. *t.* 66. *f.* 64. *t.* 67. *f.* 65. 66. *t.* 68. *f.* 67. *t.* 72. *f.* 70. *t.* 73. *f.* 71. 72. *t.* 74. *f.* 73. *t.* 76. *f.* 76. *t.* 77. *f.* 77. *t.* 78. *f.* 78. 79. *t.* 79. *f.* 80. 80. a. *t.* 81. *f.* 82. *t.* 82. *f.* 83. *t.* 84. *f.* 84. *t.* 85. *f.* 85. *t.* 87. *f.* 88. *t.* 91. *f.* 91. *t.* 92. *f.* 92. *t.* 94. *f.* 95. *t.* 95. *f.* 96. *t.* 108. *f.* 1. *t.* 109. *f.* 2. a. b. *t.* 110. *f.* 3. 4. *t.* 111. *f.* 5. *t.* 112. *f.* 6. *t.* 113. *f.* 7. *t.* 114. *f.* 8. 9. *t.* 115. *f.* 10. *t.* 116. *f.* 11. *t.* 117. *f.* 12. *t.* 119. *f.* 14. *t.* 129. *f.* 29. *t.* 131. *f.* 31. *t.* 135. *f.* 35. *t.* 109. *f.* 44. 45. *t.* 140. *f.* 46. 47. *t.* 576. *f.* 30. *t.* 581. *f.* 35. *t.* 582. *f.* 35. a. *t.* 1055. *f.* 4. 6. *t.* 1058. *f.* 2. 4. 7. 8. *t.* 1059. *f.* 4. 5. Klein *oſtrac. t.* 1. *f* 12. 16. 17. 18. 22. Bonanni *recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 44. 148. 333. 378. *recr.* 3. *f.* 358. 371. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 351. 364. 378 392. 393. 395. Gualtieri *teſt. t.* 1. *f* F. G. H. I. L. M. O. *t.* 2. *f.* AA. BB. CC. G. H. I. N. O. Q. R *t.* 3. *f.* A. B. C. H. L. M. N. O. R. FF. & *t.* 6. *f.* E. F. G. H. Argenville *Conch. t.* 8. *f.* E. *t.* 27. *n.* 2. *f.* 1. 2. 4 5. *n.* 6. *f.* 4. 5. *t.* 28. *f.* 2. 3. 6-9. 21. & *zoomorph.* 1-3. 6-8. *t.* 10. *f.* C. Sebantuſ. 3. *t.* 38. *f.* 25. 67. *t.* 39. *f.* 9-11. 31. 32. 35. 36. 39. 49. 50. 58. *t.* 40. *f.* 8-10. 20. 22-24. 26 29. 30. 31. 33. 35. 40. 43. 48. 59-61. 63. 64. 67. & *t.* 43. *f.* 3. Knorr *Vergn.* 4. *t.* 13. *f.* 4. & 5. *t.* 26. *f.* 5-7. Martini *berlin. Magaz.* 2. *t.* 1. *f.* 5. *t.* 2. *f.* 11. 12. 17. 35. *t.* 3. *f.* 35. *t.* 4. *f.* 41. 42-45. 47. 48. & 4. *t.* 7. *f.* 8-11. 15. 16. *t.* 8. *f.* 24-26. 32. *t.* 8. *f.* 51. *t.* 10. *f.* 46 51. 53. a. b. Adanſon *Seneg.* 1. *t.* G. III. Schroet. *Fluſconch. t.* 5. *f.* 33.

opaca. 212. H. teſta ovato-acuminata ſolida exalbida opaca: apertura ovato-oblonga, anfractu primo reliquis majore.
Schroet. Fluſconch. t. 7. f. 17.
Habitat - - - aquatica, anfractibus 5.

turgida. 213. H. teſta obtuſa: anfractibus quatuor medio inflatis diſtantibus, apertura orbiculari marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 8. f. 7. a. b.
Habitat - - - teſta 2 lineas longa.

cæruleſcens. 214. H. teſta cæruleſcente ovato-acuminata: anfractibus ſubventricoſis, apertura oblongo rotundata.
Schroet. Fluſconch. t. 8. f. 8. a. b.
Habitat frequens Francofurti *ad* Mœnum, *prope pontem* Sachſenhuſanum, *teſta 2 lineas longa, anfractibus 4.*

cinerea. 215. H. teſta inflata: anfractibus quatuor brevibus; duabus inferioribus diſtantibus, apertura orbiculari non marginata.
Schroet. Fluſconch. t. 8. f. 9. a. b.
Habitat in valle Alſatiæ Steinthal, *teſta 2 lineas longa.*

undata. 216. H. teſta imperforata oblonga alba longitudinaliter rubro undulata: ſpiræ anfractu primo altero triplo majore, apertura ovata.
Gualt. teſt. t. 5. f. N.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. A. *f. 4.*
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, anfractibus 6. 7.*

teres. 217. H. teſta imperforata oblonga tenui fuſca: anfractu primo altero triplo majore aperturaque ovatis.
Gualt. teſt. t. 5. f. NN.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. A. *f. 7.*
Habitat - - - anfractibus 4.

ſubſtriata. 218. H. teſta ſubimperforata oblonga minutiſſime ſtriata albo: anfractu primo altero duplo majore, apertura ovali marginata.
Gualt. teſt. t. 5. f. SS.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. A. *f. 6.*
Habitat - - - teſta $\frac{1}{4}$ *pallicis longa, anfractibus 5.*

trigonoſtoma. 220. H. teſta lævi fuſca: apertura triangulari marginata.
Gualt. teſt. t. 5. f. C.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. A. *f. 9.*
Habitat - - - teſta minuta.

tumida. 221. H. teſta ventricoſa acuminata cinerea: anfractu primo reliquos omnes ſuperante, apertura ovali ampla altero latere marginata.
Gualt teſt. t. 5. f. Q.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. B. f. 2.
Habitat - - -teſta 1¼ pollicis longa, faſcia ad columellam alba.

Acicula. 222. H. teſta oblonga acuminata longitudinaliter coſtata transverſim ſtriata: apertura ovali.
Schroet. Fluſconch. t. 8. f. 14.
Habitat in Coromandel, *teſta ¾ pollicis longa ſub epidermide nigra inter coſtas ſpadiceo virgata, anfractibus* 10 *æquabiliter decreſcentibus.*

peregrina. 223. H. teſta ovata imperforata: anfractibus teretibus diſtantibus æquabiliter decreſcentibus: apertura ovali.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 254. t. 4. f. 11.
Habitat in inſulis Americæ *obverſis, teſta dimidium pollicem longa hyalina, interdum teſtacea opaca, anfractibus 8-9.*

danubialis. 224. H. teſta oblonga imperforata: anfractibus ventricoſis diſtantibus, apertura orbiculari.
Marſigl. danub. 4. p. 91. t. 31. f. 1.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. B. f. 5.
Habitat in Danubio, *teſta 2½ pollices longa.*

turbinata. 225. H. teſta oblonga imperforata lævi acuminata: anfractibus inflatis; primo multo majore, reliquis æqualiter decreſcentibus, apertura ſubovali marginata.
Marſigl. danub. 4. p. 89. t. 31. f. 2.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. B. f. 1.
Habitat in Danubio, *teſta 3¼ pollicis longa, minus ventricoſa, quam in danubiali.*

curvata. 226. H. teſta oblonga curvata ſubimperforata: apertura ovali marginata.
Marſigl. danub. 4. p. 89. t. 31. f. 4.
Schroet. Fluſconch. t. 10. min. B. f. 3.
Habitat in Danubio, *teſta diametri* 2⅓ *pollicis, an ab origine curvata?*

exilis. 252. H. teſta tenui alba ſpadiceo faſciata lævi: ſpira obtuſa; anfractibus planiuſculis. *Kaemm. Cab. Rudolſt. p. 124. n. 7. t. 12. f. 3.*

β) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 124. *t.* 12. *f.* 2.
γ) *Kaemm. Cab. Rudolſt. p.* 125. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat - - - teſta 6-8 lineas, γ) pollicem longa.

329. NERITA. *Animal* Limax.
Teſta univalvis, ſpiralis, gibba; ſubtus planiuſcula.
Apertura ſemiorbicularis vel ſemilunaris: labio columellæ tranſverſo, truncato planiuſculo.

* *Umbilicatæ.*

Canrena. 1. N. teſta lævi: ſpira ſubcromonata, umbilico gibbo bifido. *Muſ. Lud. Ulr.* 674. *n.* 383. *
α) *Liſt. Conch. t.* 560. *f.* 4.
Bonnan. recr. 3. *f.* 372.
Bonnan. muſ. Kircher. 3. *f.* 365.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* V.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* A.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 27. 51. 52. & *t.* 40. *f.* 65. 66.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 4. & *t.* 20. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1860. 1861.
β) *Liſt. Conch. t.* 564. *f.* 11.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 228.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* S.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 60. 61.
Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 23.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 3. Fanel.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1862. 1863.
γ) *Liſt. Conch. t.* 559. *f.* 1.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 1. 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1864. 1865.
δ) *Liſt. Conch. t.* 560. *f.* 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 29. 64. 65.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1868-1871.
ε) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* Q.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1876. 1877.
ζ) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 224.

Gualt. teſt. t. 67. f. R.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1878-1880.
η) *Liſt. Conch. t.* 568. *f.* 19.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 2. Natice?
Chemn. Conch. t. 187. *f.* 1895. a. b.
ϑ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1921.
ι) *Liſt. Conch. t.* 563. *f.* 10.
κ) *Liſt. Conch. t.* 566. *f.* 16.
λ) *Liſt. Conch. t.* 572. *f.* 25.
μ) *Bonnann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 165.
ν) *Bonnann. recr. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 227.
ξ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* E.
ο) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* I.
π) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* X.
ρ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 28.
σ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 53.
τ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 40. *f.* 62?
υ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 14-15.
φ) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 10. *f.* 5?
χ) *Liſt. Conch. t.* 561. *f.* 7.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* O.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 26.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. 1885. 1886.
ψ) *Rumpf muſ. t.* 22. *f.* C.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 62. 63.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1887. 1891.
ω) *Liſt. Conch. t.* 560. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* N.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 70.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1892. 1893.
αα) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 57.
Habitat innumera coloris, picturæ, ipſius magnitudinis varietate in mari Indiam, Africam *undecunque,* Americam *alluente, teſta nivea, flavicante, cærulescente, punctis, maculis, lineis, aliquando punctis, nebulis, faſciis diverſi coloris picta, fauce ſæpius violacea.*

cancellata. 2. N. teſta decuſſatim ſtriata impreſſo punctata: ſpira ſubclavata, umbilico gibbo bifido. *Hermann Naturf.* 16. *p.* 55. *t.* 2. *f.* 8. 9.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1911-1914.

β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1596. 1597 ?
Habitat ad inſulas Americæ *mediæ obverſas , teſta alba , maculis obſoletis , interdum radiis fulvis faſciaque picta.*

Glaucina. 3. N. teſta lævi: ſpira obtuſiuſcula , umbilico ſemiclauſo , labio gibbo bicolore. *Fn. ſuec.* 2197.* *Muſ. Lud. Ulr.* 674. *n.* 384. *
Liſt. Conch. t. 562. *f.* 9 ?
Bonnann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 225.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* A. B.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* V.
Seb. muſ. 3. *t.* 39. *f.* 16.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 34.
Knorr Vergn. 2. *t.* 11. *f.* 1. & 6. *t.* 13. *f.* 7.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1856-1859.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 226 ?
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* P ?
δ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 31 ?
) *Schroet. Einl. in Verſt.* 4. *t.* 9. *f.* 5.
ζ) *v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 13. *f.* 20. 21 ?
Habitat frequens Tranquebariæ , & *in* Barbaria, *teſta ad* 2 *pollices longa , inflata nunc cinerea cæruleſcente obumbrata : faſcia ſupra cæruleſcente aut fuſca , ſubtus alba : umbilico fuſco alboque vario , nunc ſupra rufeſcente : faſcia ex luteo fuſca , ſubtus alba, umbilico & fauce ſpadiceis ſpiræ apice cæruleo aut ſpadiceo.*

Vitellus. 4. N. teſta ſubgloboſa : perforato æquali.
Liſt. Conch. t. 565. *f.* 12.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* A.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* I.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 30.
Knorr delic. t. B. II. *f.* 9.
Vergn. 1. *t.* 7. *f.* 2. & 2. *t.* 8. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 186. *f.* 1866. 1867.
Habitat paulo rarior in Oceano indico, *teſta vitellina hinc inde obumbrata maculiſque albis in ſeries digeſtis , ſuperne faſcia obſcuriori picta , intus & in ambitu umbilici alba.*

Albumen. 5. N. teſta convexa : umbilico ſubcordato ; lobo explanato. *Muſ. Lud. Ulr.* 675. *n.* 385. *
Rumpf muſ. t. 22. *f.* B. Vitellus compreſſus.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 9-11.
Knorr Vergn. 4. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1924. 1925.

β) *Argenv. Conch. t. 7. f.* T ?
Habitat rariſſima ad Caput Bonæ Spei, *ad* Barbariæ *littora inſulas* nicobaricas *&* moluccas, *teſta lævi lata, ſatis magna, hepatica vel lutea, ſubtus alba plana.*

Mammilla. 6. N. teſta ovata glabra: umbilico obtecto, apertura ovata. *Muſ. Lud. Ulr.* 675. *n.* 386.*
Column. aq. t. 52. *f. ult.* Cochlea nivea.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* F. Valvata 7: Albula.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* X. Uber tenue.
Liſt. Conch. t. 566. *f.* 14. *& t.* 571. *f.* 22.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 9. 10. 32. *& t.* 41. *f.* 22. *&* 6. *n.*
Knorr Vergn. 1. *t.* 6. *f.* 6. 7. *&* 4. *t.* 8. *f.* 4. 40. *f.* 2. 3.
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 85. *t.* 5. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1928-1933.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1922. 1923.
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* T.
δ) *Seb. Muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 12. 13.
Habitat in mari, Indiam, *& mediam auſtralemque* Americam *alluente, teſta ad* $2\frac{1}{4}$ *pollices longa nivea aut ochroleuca rarius fuſca, glaberrima, ſolida, anfractibus* 4-5 *extimis maxime approximatis.*

leucozonias. 7. N. teſta ſubgloboſa ſolida badia albo faſciata: ſpira depreſſiuſcula. *Kaemmer. Conch. Rudolſt. p.* 187. *t.* 12. *f.* 5. 6.
Habitat - - - vitello affinis, at lobo teſtæ evidentiori diſtincta, teſta ultra pollicem alta, at paulo latiori, anfractibus 4-5.

ſpadicea. 8. N. teſta ſubgloboſa ſolida ſpadicea ſubtus alba, apice cæruleſcente, faucis faſciis lateritiis, dorſi alba.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1872. 1873.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1896. a. b. 1897.
Habitat ad littora inſulæ S. Mauritii, *teſta ſolida ſatis magna.*

rufa. 9. N. teſta tenui rufa: umbilico obſcuriori: limbo, dorſi baſeoſque ſpiræ faſcia albis, faucis faſcia ruſeſcente, columellæ vitta fuſca.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* D.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 3. 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1874. 1875.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, *ſpadiceæ affinis.*

fulminea. 10. N. teſta ſubgloboſa lineis angulatis ſpadiceis picta; lobo explanato.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 13. *f.* 4. Gocher.
Liſt. Conch. t. 567. *f.* 17.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* M.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 33.
Knorr Vergn. 1. *t.* 10. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1881-1884.
β) *Liſt. Conch. t.* 567. *f.* 18?
γ) *Gualt. teſt. t.* 67. *f.* H?
Habitat ad Africæ *littora, rara, teſta alba aut flavicante.*

ercus muſcarum. 11. N. teſta lævi nivea maculis punctiſque ſubtiliſſimis rufis varia; umbilico gibbo bifido.
Chemn. Conch. 5. *t.* 187. *f.* 1894.
Habitat in mari mediterraneo & americano, *an vere diſtincta a canrena ſpecies?*

ientalis. 12. N. teſta ſubgloboſa nitida læviſſima: ſpiræ baſi ſubrugoſa, columella nivea.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1898-1899.
β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 188. *f.* 1904.
Habitat rara in maribus orientalibus, *teſta utrinque cervina: faſcia media anguſta alba; in* β) *tota teſta nivea.*

uentata. 13. N. teſta ſubgloboſa alba ſanguineo maculata & punctata apice obtuſo intuſque cæruleſcente: umbilico ſpirali.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1900. 1901.
Habitat - - -

goſa. 14. N. teſta rugoſa intus glaberrima dilute teſtacea: umbilici ambitu albo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1902. 1903.
Habitat ad inſulas Americæ mediæ *obverſas; teſtæ rugis oblongis conſertis.*

arochienſis. 15. N. teſta ſubgloboſa lævi praſina intus ſubfuſca apice livida, ad angulum anfractuum ſubrugoſa.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1905-1910.
Habitat ad Africæ, *præſertim* Marochii, Antillarum *quoque littora, teſta interdum faſciis plumoſis varia, juniore tenui & pellucida.*

lcata. 16. N. teſta ſubgloboſa oblique plicata: ſpira mucronata, umbilico bifido.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 5. 6.
Habitat - - - ſpiræ anfractibus 4.

arachnoidea. 17. N. teſta alba lineis rufeſcentibus reticulata apice nigricante: anfractibus convexis, umbilico ſubobtecto.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1915. 1916.
Habitat - - - an vere diſtincta ſpecies?

vittata. 18. N. teſta ſubgloboſa fuſca: vitta duplici alba medio reticulata utrinque denticulata.
Chemn. Conch. 5. *t.* 188. *f.* 1917. 1918.
Habitat ad Marochii *littora.*

melanoſtoma. 19. N. teſta tenui pellucida lævi oblonga: anfractu primo ventricoſo plano maximo reliquis compreſſis, umbilico ſemiclauſo.
Liſt. Conch. t. 142. *f.* 36. & *t.* 566. *f.* 15.
Gualt. teſt. t. 67. *f.* D.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 20. 21?
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 15. *f.* 13. 14.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1926. 1927.
Schroet. inn. Bau Schneck. t. 5. *f.* 3.
β) *Liſt. Conch. t.* 565. *f.* 13.
Knorr Vergn. 4. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 54.
Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1934. 1935.
γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1936. 1937.
δ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 189. *f.* 1938.
ε) *Liſt. Conch. t.* 559. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1940. 1941.
ζ) *Rumpf muſ. t.* 22. *f.* E.
Habitat in mari indico, *β, γ, & ε rara, magis adhuc δ, teſta ad 2 pollices longa, alba, aurantia vel fuſca, crebro faſciis vittiſve interdum interruptis, ſubfuſcis, ſpadiceis vel albis, in δ) canis venis lineiſque angulatis fuſcis pictis, utplurimum 2 exornata umbilici, ambitu columellaque nigris, aut obſcuris, hac in β) margine aurantia.*

Huic neritarum tribui videntur inſerendæ utrum vere diſtinctæ ſpecies, an potius varietate depictæ a Liſtero *Conch t.* 561. *f.* 8. *t.* 569. *f.* 20. *t.* 570. *f.* 21. *t.* 572. *f.* 23. & *t.* 573. *f.* 28. *a* Bonnani *recreat. & muſ. Kircher.* 3. *f.* 7. 8. 164. 168. 169. 198. 203. & 334. *recreat.* 3. *f.* 387. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 375. & 388. *a* Rumpf. *muſ. t.* 22. *f.* 1. *a* Valentyn. *Abb. t.* 8. *f.* 72. *a* Gualtieri *teſt. t.* 64. *f.* N. *t.* 66. *f.* A. & *t.* 67 *f.* F. G. *ab* Argenville *Conch. t.* 6. *f.* M. *t.* 7. *f.* D T. Y. Z. 1. 3. & *t.* 29. *f.* 3. & *zoomorph. t.* 3. *f.* B. & *t.* 10. *f.* E. Seba *muſ.* 3. *t.* 38. *f.* 54. 55. 66. & 69. *t.* 39. *f.* 21-24. *et* 30. *et t.* 41. *f.* 1. 7. 8. 16. *et* 17. *et* Knorr *Vergn.* 2. *t.* 13. *f.* 5.

Papilla. 20. N. teſta pellucida tenui oblonga decuſſatim ſtriata ſordide lutea: apertura ſubovali; columella alba, umbilico ſemiclauſo.

Chemn. Conch. 5. *t.* 189. *f.* 1939.

Habitat frequens ad Tranquebariæ *littora, anfractibus* 4.

clathrata. 21. N. teſta depreſſa ovata tranſverſim undulata longitudinaliter coſtata: coſtis planis obliquis ſemilunaribus; ſpira papillari.

Schroet Einl. in Conch. 2. *p.* 332. *t.* 4. *f.* 15.

Habitat - - - *foſſilis in* Campania Gallica.

Valvata. 22. N. teſta planiuſcula: apertura circinata.

Müll. zool. dan. prodr. 2891. Valvata criſtata.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus generis & tribus? incola tentaculis* 2 *ſetaceis, oculum ad angulum poſteriorem gerentibus gaudet.*

Islandica. 23. N. teſta globoſo-ſubacuta craſſiore: anfractibus quatuor per ſulcos profundiſſimos diſcretis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2955.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, *an hujus tribus?*

...nis. 24. N. teſta globoſa craſſiore: ſpira ſubmucronata; anfractibus tribus. *Müll. zool. dan. prodr.* 2956.

Habitat in Oceano ſeptentrionali; *an hujus tribus?*

Auſtralis. 25. N. teſta ſub epidermide ex flavicante, vireſcente & cæruleſcente varia lineis angulatis viridibus picta: ſpiræ anfractibus novem ſulco diſtinctis.

v. Zorn Naturf. 7. *p.* 160. *t.* 2. *f.* B. 1. & B. 2.

Habitat in nova Seelandia, *nonne potius ad trochos releganda? teſta mediæ magnitudinis; ochroleuca; apice aurantia, apertura ſubargentea.*

** Imperforatæ.

† *labiis edentulis.*

Corona. 26. N. teſtæ anfractibus ſpinis coronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 976. *n.* 387.*

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 197. *n.* 383. Nerita teſta dilatata convexa ſtriata fuſca: aculeis longis nigris.

Rumpf muſ. t. 22. *f.* O. Valvata ſpinoſa.

Petiv. amb. t. 3. *f.* 4.

Argenv. Conch. t. 7. *f.* 2.

Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 30.
Walch. Naturf. 4. *p.* 52. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Favann. Conch. t. 61 *f.* D⁷.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1083. 1084.
Habitat in Indiæ, *inſulæ* S. Mauritii, Americæ *auſtralis, inſularumque obverſarum fluviis, teſta minuta, interdum tota nigra ſpinis longioribus vel brevioribus armata extrinſecus tenuiter ſtriata: ſpiræ anfractu primo magno, reliquis convexis.*

Radula. 27. N. teſta ſulcata tuberculis æqualibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 676. *n.* 388.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* M.
Gualt. teſt. t. 64. *f.* I?
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 18. 19.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 7. 8.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1946. 1947.
Habitat rarior in India inſuliſ*que obverſis, teſta tenui pellucida juglandis magnitudine, nunc alba nunc cinerea, coſtata: coſtis tuberculatis, ſulcis ſtriatis, ſpira prominente acuta.*

cornea. 28. N. teſta obſolete ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 677. *n.* 389.*
Argenv. Conch. t. 7. *f.* M?
Habitat in mari indico & rubro? *teſta fragili, nunc fuſca, nunc alba, nunc ſubviolacea faſciis longitudinalibus albis vel teſtaceis picta, nunc violacea albo-punctata, interdum faſcia longitudinali alba exornata.*

fluviatilis. 29. N. teſta rugoſa. *Fn. ſuec* 2194.*
Müll. zool. dan. prodr. 2952. *hiſt. verm.* 2. *p.* 194. *n.* 481.
Nerita teſta dilatata convexa albis maculis reticulata.
Liſt. Conch. t. 141. *f.* 38.
anim. angl. t. 2. *f.* 20.
Pet. muſ. 67. *n.* 718.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* LL.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 3.
zoomorph. t. 8. *f.* 3.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 27. 28.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 5-10. *t.* 9. *f.* 4. 5. *a. b.*
& *t.* 11. *min.* C. *f.* 8.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. 1088. *α-γ*
Swammerd. bibl. nat. t. 10. *f.* 2.
Geoffr. teſt. 5.
Geve Conch. t. 24. *f.* 258-265.

β) *Liſter. Conch. t.* 607. *f.* 43.
γ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1086. 1087. a–l.
δ) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1080. 1081.
Habitat in Europæ & Barbariæ fluviis & rivis, *potiſſimum ad cataractas, & lacuum oſtia, teſta* 4 *circiter lineas longa, utplurimum maculis ſquamoſis varia, ovata, anfractibus* 3, *minoribus* 2 *lateralibus; columella alba.*

littoralis. N. teſta lævi: vertice carioſo. *Fn. ſuec.* 2195.* *It. ocl.* 261. *Müll. zool. dan. prodr.* 2953. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 402. *n.* 404.
Liſt. Conch. t. 607. *f.* 39. 40.
anim. angl. t. 3. *f.* 11. 12.
Petiv. muſ. 67. *n.* 717.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 25. 26.
Habitat innumera varietate in Europæ maribus, *an diverſa a fluviatili, aut turbine neritoide ſpecies? vertice fortuito carioſo.*

lacuſtris. 31. N. teſta læviuſcula cornea: apice exquiſito. *Fn. ſuec.* 2196.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* MM.
Habitat in Europæ *aquis ſtagnantibus fontibuſque calidis, littorali ſimilis, at teſta cornea aut nigricante, interdum albo-punctata.*

Magdalenæ. 32. N. teſta late ſulcata nigra intus alba: labio flavicante, operculo lævi bidentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 190. *t.* 13. *f.* 5. Kiſet.

Huic *alteri tribui adſcribendæ videntur cochleæ a* Liſter *Conch. t* 606. *f.* 31. *t.* 607. *f.* 44. *a* Bonanni *recr. & muſ. Kirch.* 3. *f.* 197. 200. 205 206. 217 219. *recr.* 3. *f.* 388. 389. 391. 392. 399 401. *a* Rumpf. *muſ. t.* 22. *f* 2 *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* E. M. N. & T. *ab* Argenville *Conch. t.* 7. *f.* 7. E. N. S & *t.* 29. *f.* 4. *nr.* 4. 1. *a* Klein *oſtr. t.* 7. *f.* 115. *a* Seba *muſ.* 3 *t* 40. *f.* 32. & 46. *t.* 41. *f.* 28–30. *t.* 59. *f.* 11. 12. 17. & 21 24. *a* Knorr *Vergn* 1. *t.* 13. *f.* 5. *a* Marſigli *Danub* 4. *t.* 31. *f.* 6. & *a* Schroeter *Fluſconch. t.* X. *fig. min.* 13. *f.* 4. *depictæ, primæ ejus familiæ cochleæ a* Bonanni *recr. & muſ.* Kircher. 3. *f.* 218. *recr.* 3. *f.* 402. *muſ. Kircher.* 3. *f.* 384. *a* Liſter *Conch. t.* 607. *f.* 41. 42. & *t.* 1056. *f.* 6. 7. *a* Klein. *oſtrac. t.* 2. *f.* 33. 34. *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* AA & *a* Knorr *Vergn.* 6. *t.* 17. *f.* 8. *alterius autem familiæ teſtæ a* Liſtero *Conch. t.* 595. *f.* 2. *t.* 596. *f.* 4. 6 & 8 *t.* 597. *f.* 9. & 10. *t* 598. *f.* 12–14. *t.* 601. *f.* 18. & 19. *t.* 603. *f.* 22. 23. *t.* 604. *f.* 28–30. *t.* 605. *f.* 31–33. & *t.* 606. *f.* 38. *a* Klein. *oſtr. t.* 2. *f.* 33. *a* Bonanni *recr. & muſ. Kircher* 3. *f.* 216. *a* Gualtieri *teſt. t.* 66. *f.* B. O. Q. R. S. *ab* Argenville *Conch. t.* 7 *f.* B. H. L. & *t.* 29. *f.* 4. *n.* 4. 2. & *zoomorph. t.* 3. *f.* C. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 19. & *a* Regenfus *Conch.* 1. *t.* 3. *f.* 26. & *t.* 10. *f.* 39. *depictæ.*

Habitat rarior circa inſulas Magdalenæ, teſta 6 lineas longa, ſpiræ anfractibus 3, operculi dentibus recurvis approximatis.

marginata. 33. N. teſta tenui decuſſatim ſtriata tuberculata nigra ochroleuco-maculata ſubgloboſa: apertura extrinſecus marginata.

Schroet Einl. in Conch. 2. *p.* 371. *t.* 4. *f.* 16.
Habitat - - - - teſta intus glaberrima, aperturæ margine externo cancellato, columella plana, rugoſa, tuberculata.

dubia. 34. N. teſtâ tenui pellucida ovata nitida obſcurius flava nigro varia: labio exteriori acuto, interiori glaberrimo.

Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2019. 2020.
Habitat rariſſima - - - vertice prominente.

†† *labiis dentatis.*

pulligera. 35. N. teſta lævi rudi: ſpirula excavato-oculata, labio interiori lævi crenulato.

Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 195. *n.* 382. Nerita (rubella) teſta dilatata convexa nigricante, labio interiore crenulato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* H. Valvata fluviatilis ſive rubella.
Petiv. gaz. t. 11. *f.* 4.
Liſt. Conch. t. 143. *f.* 37.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* HH.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *f.* 23-26.
Knorr Vergn. 6. *t.* 3. *f.* 3.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 8. *f.* 31.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 17. *f.* 9. 10.
Favann. Conch. t. 61. *f.* D18.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1078. 1079.
Habitat in Indiæ *fluviis, incolâ indis eduli, pullos ovales, convexos, exterius ochroleucos, intus albos, ad 235 in teſtæ dorſo gerente, teſta 14-16 lineas longa, dura, ſubtiliſſime tranſverſim ſtriata, pellucida, nigra vel fuſceſcente, anfractibus 2, altero maximo in dentem acutum terminato, fauce glabra nitida fundo læte cærulea vel albida, juxta marginem faſcia lata fulva cincta, labio interiori adſcendente nitido.*

undulata. 36. N. teſta tenui lævi undulata: vertice obtuſo, labio exteriori ſubſtriato edentulo, interiori ſubdenticulato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1970. 1971.
Habitat rara in India.

aterrima. 37. N. teſta craſſa opaca globoſa nigerrima lineis picta; intus alba: labio exteriore glabro, interiori tuberculato rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1985. 1986.
Habitat - - - teſta minutiſſime ſtriata.

Larva. 38. N. teſta lævi ſubgloboſa alba faſciis ex fuſco luteis varia: vertice obtuſo, labio ſubdenticulato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 6.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2017.
Habitat rariſſima ad Amboinam, *teſta mediæ magnitudinis.*

Pupa. 39. N. teſta lævi ſubrotunda lactea: anfractuum ſtriis tranſverſis nigris parallelis.
Habitat - - - inter virgineam & littoralem media, hujus magnitudine, labio plano læviſſime dentato.

bidens. 40. N. teſta lævi: labio interiori bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 677. *n.* 309.*
β) *Chemn. Conch.* 10. *t.* 165. *f.* 1594. 1595.
Habitat - - - teſta nigra aut rubella, obſolete ſtriata, unicolore, piſi magnitudine; β) lutea albido nebuloſa: faſciis tribus nigris.

viridis. 41. N. teſta lævi viridi: labio interiori medio crenulato.
Brown jam. 399. Nerita minima viridis.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 11. a. b.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1089. *α. β.*
Habitat ad Minorcam *&* Jamaicam, *fluviatili affinis, at teſta magis oblonga & ovali, plus quam duplo minori, cingulis interdum moniliformibus albis, aut lineis longitudinalibus undulatis fuſcis picta, apertura ovata ampla, labio interiori pallidiori, vertice vix conſpicuo laterali.*

virginea. 42. N. teſta lævi ovata: labio interiori denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 678. *n.* 391.*
Liſt. Conch. t. 606. *f.* 35-37.
Pet. gaz. t. 11. *f.* 3.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 204.
Bonann. recr. 3. *f.* 176-181?
muſ. Kircher. 3. *f.* 176-178. 180-182?
Argenv. Conch. t. 7. *f.* P.
Klein oſtr. t. 2. *f.* 32.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *utrinque ad n.* 1. 6. 5.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 292. *t.* 4. *f.* 14.
β) *Liſt. Conch. t.* 604. *f.* 24?

γ) *Liſt. Conch. t. 604. f. 25?*
δ) *Liſt. Conch. t. 604. f. 26?*
ε) *Liſt. Conch. t. 604. f. 27?*

Habitat in Indiæ *&* *auſtralis* Americæ *fluviis, teſta a piſi magnitudine ad pollicem uſque longa alba, cineraſcente aut flavicante, punctis, maculis, lineis angulatis vel undulatis faſciiſve nigris, fuſcis, cæruleſcentibus, violaceis aut rubellis varia, vertice obtuſiſſimo elongato, apertura ovata, labio interiori nonnunquam lævi.*

polita. 43. N. teſta lævi: vertice obliterato, labio utroque dentato. *Muſ. Lud. Url.* 678. *n.* 392.*
Liſt. Conch. t. 600. *f.* 17. *& t.* 602. *f.* 20.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 221?
Rumpf muſ. t. 22. *f.* I. K. Nerita alpina.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* D. F. G. H?
Argenv. Conch. t. 7. *f.* K.
Klein oſtr. t. 1. *f.* 29.
Seb. muſ. 3. *t.* 38. *f.* 56. *& t.* 59. *f.* 1-3.
Regenſ Conch. 1. *t.* 4. *f.* 43.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 11-16.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2001-2014.
β) *Liſt. Conch. t.* 603. *f.* 21?
γ) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* E?
δ) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* I?
ε) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* L?
ζ) *Gualt. teſt. t.* 66. *f.* M?
η) *Seb. muſ.* 3. *t.* 41. *f.* 27.
θ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 13.
ι) *Seb. muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 14.
κ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 15.
λ) *Seb. muſ.* 3. *t.* 59. *f.* 17.

Habitat in India, *in* Oceano *quoque auſtrali, teſta ovato ſolida, intus et exterius nitida, maculis, plumis, nebulis, faſciis cinereis, his quoque roſeis aut albis picta, vel ex albo nigroque varia, labio utroque eburneo, fauce utplurimum flava.*

Peloronta. 44. N. teſta ſtriata: labiis dentatis: interiore planiuſculo rugoſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 679. *n.* 393.*
Liſt. Conch. t. 595. *f.* 1.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 3. *f.* 214.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* Z.

Argenv. Conch. t. 7. f. G. O.
Knorr Vergn. 5. *t.* 3. *f.* 2.
Mauſch. Naturf. 13. *p.* 84. *t.* 5. *f.* 4. & 4. h.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1977-1984.
Schroet. Journ. 5. *p.* 462. *f.* 16.
Habitat ad inſulas Americæ *mediæ & auſtrali obverſas; groſſæ affinis, at teſtæ colore rubro, ſulcis minus profundis, labio exteriore non crenato, interiore non convexo facile diſtinguenda, teſta rotundata alba, flavicante vel ſanguinea, maculis radiiſve rubris, ſpadiceis, cæruleſcentibus vel nigris varia intus alba: apertura repanda, columella impreſſa: macula fauceque croceis.*

Albicilla. 45. N. teſta ſtriata: labiis ſubdentatis; interiore tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 679. *n.* 394.*
Liſt. Conch. t. 600. *f.* 16.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 8.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* F.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *ſupra f.* 23. & *t.* 59. *f.* 16.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2000. a-h.
Habitat ad Caput Bonæ Spei, & *in* mari indico, *teſta ſolida, oblonga, alba, rubella vel ſordide lutea, maculis nebuliſve interdum faſciis nigris, flavicantibus aut rubellis varia, vertice laterali plano, apertura ampliſſima: fauce anguſta.*

Hiſtrio. 46. N. teſta ſulcata transverſeque ſtriata: labio interiore dentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 680. *n.* 395.*
Liſt. Conch. t. 598. *f.* 11.
Knorr Vergn. 6. *t.* 13. *f.* 2.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1948. 1949. & *t.* 191. *f.* 1960. 1961.
Habitat - - - *teſta coſtis* 30 *inæquali, nunc pallide cinerea, faſciis* 3 *longitudinalibus fuſcis nunc rubicunda aut flaveſcente: faſciis tranſverſis flexuoſis albis, vertice obtuſiſſimo, labio exteriori glaberrimo.*

Plicata. 47. N. teſta ſulcata: labiis dentatis: exteriore utrinque dentibus acutis conicis *Muſ. Lud. Ulr.* 680. *n.* 396.*
Liſt. Conch. t. 595. *f.* 3.
Bonann. recr. 3. *f.* 386.
muſ. Kircher. 3. *f.* 371.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* V.
Klein oſtr. t. 5. *f.* 100.

Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 18.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 17. 18.
Schroet inn. Bau. Schneck. t. 1. *f.* 5.
β) *Mantiſſ. alt. p.* 551. Nerita lactaria.
Habitat in India, *teſta rotundata ſolida lactea interdum maculata, vertice utplurimum flavo, coſtis tranſverſis* 17-20, *apertura anguſta, labio exteriore intus dentibus* 5-6, *interiore convexo rugoſo tuberculato, dentibus præter aliquot minores* 3 *longis, validis.*

grossa. 48. N. teſta ſulcata: labiis dentatis, interiore convexo rugoſo. *Muſ. Lud. Ulr.* 681. *n.* 397.*
Rumpf muſ. t. 22. *f.* N.
Seb. muſ. 3. *t.* 41. *ad f.* 15.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1968. 1969.
Schroet. Journ. 5. *p.* 465. *f.* 17.
Habitat rara ad inſulas Moluccas, *teſta rotundata alba venis nigris cinereiſque varia, vertice prominulo, anfractu primo coſtis* 13-14, *labio exteriore exterius crenulato, intus dentato, interiore albo macula flava dentibus* 3-4.

Chamæleon. 49. N. teſta ſulcata ſulcis viginti: labiis dentatis; interiore rugoſo tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 681. *n.* 398.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* L. Nerita 3 undulata.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* X.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* Q.
Knorr Vergn. 5. *t.* 15 *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1988-1991.
Habitat in mari indico, *teſta mediæ magnitudinis, radiis undulatis nigris albiſque alternis varia, aut flavicante nigro alboque undulata, ſubgloboſa, lineis ſubtiliſſimis coſtas inæquales decuſſantibus, vertice depreſſo laterali.*

undata. 50. N. teſta ſulcata ſulcis triginta: labiis dentatis; interiore rugoſo tuberculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 682. *n.* 399.*
Liſt. Conch. t. 596. *f.* 7.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 215.
Gualt. teſt. t. 66. *f.* P.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190, *f.* 1950. 1951.
Habitat in mari indico, *Chamæleonti affinis, at teſtæ ſolidæ exalbidæ cinereæ aut rufeſcentis nigro cinereove maculatæ faſciis hinc inde interruptis latioribus, vertice magis acuminato prominulo, coſtis complanatis, circiter* 30 *cum ſulcis intermediis lævibus, columella alba.*

exuvia. 51. N. teſta ſulcata: labiis dentatis; interiori tuberculato.
Muſ. Lud. Ulr. 682. *n.* 400.*
Liſt. Conch t. 596. *f.* 5? & *t.* 599. *f.* 15.
Pet. gaz. t. 100. *f.* 6.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 3. *f.* 220?
Gualt. teſt. t. 66. *f.* CC.
Argenv. Conch. t. 7. *f.* 1?
Seb. muſ. 3. *t.* 59. *f.* 4. 6-10.
Knorr Vergn. 3. *t.* 1. *f.* 5.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1972. 1973.
Habitat rarior in India, *teſta dilatata, ſolida, magna alba, maculis nigris, interdum cæruleſcentibus varia, coſtis latis complanatis* 15-19 *apertura ampla, columella plana.*

maxima. 52. N. teſta ſolida craſſa glaberrima radiis undulatis atris & flavicantibus picta: labio exteriore edentulo, interiore ſubconcavo quadridentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1942. 1943.
Habitat - - - teſta inter congeneres maxima, intus & ad aperturam nivea, labio interiori lævi latiſſimo.

textilis. 53. N. teſta alba lineis angulatis nigris varia: coſtis ſulciſque ſedecim crenatis: labio exteriore exterius crenato intus dentato, interiore ſuperne rugoſo inferne tuberculato; palato dentato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 3.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1944. 1945.
Habitat rariſſima - - -

atrata. 54. N. teſta aterrima glabra ſupra tenuiſſime ſtriata: labio utroque albo, exteriore intus ſubtiliter ſulcato ſubdentato, interiore concavo rugoſo tuberculato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 190. *f.* 1954. 1955.
Habitat in mari atlantico, americano, auſtrali.

Aſcenſionis. 55. N. teſta ſulcis albis coſtiſque albo maculatis ſedecim, vertice prominulo, labio exteriore utrinque glabro, interiore ſubconcavo flavicante dentato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1956. 1957.
Habitat ad inſulam Aſcenſionis, *teſta ſatis magna, vertice utplurimum detrito, rarius nigro, operculo tenui pellucido.*

lineata. 56. N. teſta intus labioque utroque albis, anfractibus teretibus ſtriis nigris parallelis cinctis: interſtitiis ſtriarum violaceis, labio exteriore intus ſtriato.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. 1958. 1959.
Habitat rara in freto malaccenſi.

verſicolor. 57. N. teſta maculis quadratis nigricantibus, cæruleſcentibus, rubris albiſque & faſciis rubro alboque maculatis, varia: labio interiore intus ſtriato utrinque dentato.
Argenv. Conch. t. 7. f. & &c.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1962. 1963.
Habitat ad inſulas Antillas, *anfractibus teretibus, vertice prominulo, labio interiore ſuperne rugoſo, inferne quadridentato, dentibus mediis majoribus.*

Pica. 58. N. teſta alba exterius nigro radiata ſtriis tranſverſis rotundatis lævibus inæquali; labio interiore rugoſo quadridentato.
Rumpf muſ. t. 22. *f.* 4.
Chemn. Conch. 5. *t,* 191. 1964. 1965.
Habitat in mari indico, *vertice parum prominulo, labio exteriori extrinſecus crenato, intus ſtriato.*

Coſtata. 59. N. teſta intus flavicante ſubgloboſa ſtriis craſſioribus cincta: interſtitiis niveis, labio utroque dentato, exteriore exterius crenato, interiore ſubconvexo rugoſo tuberculato.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 17. *f.* 19. 20.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1966. 1967.
Habitat rara ad inſulas Indiæ nicobaricas, *teſta pulla aut picea: vertice obtuſiſſimo utplurimum detrito flavicante, aut albo, labiis albis.*

quadrico-lor. 60. N. teſta ſubviolacea apice flavicante intus alba ſtriis elevatis nigris: labio utroque dentato, exteriore intus ſulcato; interiore rugoſo.
Chemn. Conch. 5. *t.* 191. *f.* 1974. 1975.
Habitat in mari rubro, *teſta nonnunquam intus cum utroque labio flavicante.*

malaccen-ſis. 61. N. teſta ſulcata intus flavicante: vertice prominulo, labio exteriori inermi exterius crenulato, interiore flavicante lævi.
Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1976.
Habitat in freto malaccenſi.

ntilla-rum. 62. N. teſta ſubgloboſa nigra intus alba ſulcata ſtriataque: vertice obtuſo, labio utroque rugoſo denticulato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1987.

Habitat frequens ad inſulas Antillas.

mmea. 63. N. teſta ſubgloboſa confertim tranſverſe ſtriata alba: radiis undulatis purpuraſcentibus, labio utroque dentato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1992. 1993.

β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 192. *f.* 1994.

γ) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 192. *f.* 1995.

Habitat ad inſulas Americæ mediæ *obverſas, vertice prominulo, labio exteriori intus ſulcato, interiori ſuperne rugoſo, teſta in β) rubro obumbrata: radiis in atrum vergentibus, in γ) faſciata, ſaſciis partim lividis, partim rubro-punctatis.*

lgu-rans. 64. N. teſta ſubgloboſa confertim tranſverſe ſtriata nigerrima: radiis ochroleucis: labio utroque ſubdenticulato; interiore medio tuberculato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1996. 1997.

Habitat ad inſulas Americæ *obverſas, vertice vix prominulo, labio exteriore intus ſulcato; margine crenato albo nigroque vario, ad latus denticulato, altero ſubconcavo, medio tuberculato, inferne ſubdentato.*

ellata. 65. N. teſta obtuſa tranſverſim ſtriata: ſtriis maculis ſubquadratis albis nigriſque, labio utroque denticulato.

Adanſ. Seneg. 1. *p.* 190. *t.* 13. *f.* 2. Tadin?

Chemn. Conch. 5. *t.* 192. *f.* 1998. 1999.

Habitat ad inſulas *inter* Africam *& mediam* Americam *interſitas, teſta mediæ magnitudinis, labio exteriori intus vix ſtriato dentibus* 1-2, *interiore concava glabra inferne denticulata.*

fcia-ta. 66. N. teſta nigricante: faſciis duabus canis, vertice albo.

Rumpf muſ. t. 22. *f.* 7.

Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 1015.

Habitat in India, *an diſtincta hujus tribus ſpecies?*

erata. 67. N. teſta ſubgloboſa alba characteribus inſcripta: labio interiori crenulato dentato.

Chemn. Conch. 5. *t.* 193. *f.* 2016.

β) *Chemn. Conch.* 5. *t.* 193. *f.* 2018.

Habitat rara in India, *β) teſta faſciata, faſciis ex lineis parallelis conflatis.*

violacea. 68. N. teſta ovata violacea albo punctata ſolida lævi: labio interiori inferne denticulato.
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 81 *t.* 5. *f.* 2. 2. c. d. e. f.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 133. 134.
β) *Meuſch. Naturf.* 13. *p.* 84. *t.* 5. *f.* 3. 3. g.
Habitat rara - - - teſta rarius rubra vel exalbida, β) alba maculis ſpadiceis nigro variis, ſubtus obſcurior re, nonnunquam ex atro cinerea aut alba.

ſenegalenſis. 69. N. teſta ovata obtuſa ſolida nigerrima intus alba ſulcata: labio utroque dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 188. *t.* 13. *f.* 1. Dunar.
Habitat in Senegalia, *teſta pollicem lata, dimidio breviori, anfractibus tribus, primo turgido ſulcis* 25-30 *exarato,* 2 *reliquis minimis.*

promontorii. 70. N. teſta atra ovato acuminata: ſulcis triginta.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 191. *t.* 13. *f.* 3. Lagar.
Habitat rarior ad littus Africæ *inter promontoria Mannel & viride, teſta duplo latiori, quam longa, interdum albo varia, vertice anfractibus* 3 *conflato, labio ſiniſtro rugoſo.*

tricolor. 71. N. teſta rubro nigro albidoque varia: anfractu primo ſtriis quindecim elevatis, labio utroque dentato.
Adanſ. Seneg. 1. *p.* 191. 192. *t.* 13. *f.* 4. Selot.
Habitat ad Africæ *littus occidentale, teſta* 9 *lineas longa, labio dextro dentibus* 10, *ſiniſtro glabro magnis* 3 *emarginatis ſubbifidis exaſperata.*

perverſa. 72. N. teſta cingulata: ſpira contraria, apertura octodentata.
Walch Naturf. 6. *p.* 165.
Schmidel Verſt. v. Verſt. Fortſ. p. 41. *t.* 23. *f.* 1-3.
Chemn. Conch. 9. *t.* 114. *f.* 975. 976.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis.

turrita. 71. N. teſta alternatim albo nigroque faſciata intus alba: vertice valde elata, labro acuto. *Chemn. Conch.* 9. *t.* 124. *f.* 1085.
Habitat in inſularum antillarum *aquis dulcibus, anfractibus quatuor.*

aculeata. 72. N. teſta nigreſcente tranſverſim ſtriata: ſtriis ſpinoſis, labio planiuſculo lævi ſubdentato. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 305. *t.* 169. *f.* 1642.
Habitat in Indiæ *fluviis, pulligeræ affinis.*

330. **HALIOTIS.** *Animal* Limax.
Teſta auriformis, patens: ſpira occultata laterali; diſco longitudinaliter poris pertuſo.

nitida. 1. H. teſta ſubrotunda utrinque nitida. *Muſ. Lud. Ulr.* 683. *n.* 401.*
Liſt. Conch. t. 613. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* B.
Valent. Abh. t. 12. *f.* 102.
Knorr Vergn. 5. *t.* 20. *f.* 3?
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 136. & *t.* 15. *f.* 141.
Habitat in mari indico & *ad* Caput Bonæ Spei, *teſta ad* 7 & 9 *pollices longa craſſa intus eximie margaritacea, exterius dorſo longitudinaliter undulatim rugoſa, ſordide viridi, utplurimum ſordibus marinis obducta, poris* 8-10.

tuberculata. 2. H. teſta ſubovata: dorſo tranſverſim rugoſo tuberculato. *Fn. ſuec.* 2. 2198. *Müll. zool. dan. prodr.* 2876.
Fn. ſuec. 1. 1326. Haliotis ſtriata rugoſa.
Rondel. piſc. 5. Auris marina.
Geſn. aq. 807. 808. Patella major ſ. fera.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 1. Ormier.
Bellon. aq. 395.
Aldrov. exang. 551. *f.* 1. 2.
Liſt. Conch. t. 611. *f.* 2.
an. angl. t. 3. *f.* 16.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. *f.* 10. 11.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* H.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* I.
Ginanni. adr. 2. *t.* 3. *f.* 27.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* A. F.
zoomorph. t. 1. *f.* C.
Bytem. app. t. 11. *f.* 42.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 20.
Martin. Conch. 1. *p.* 174. *vign.* 6. & *t.* 15. 16. *f.* 145-149.
β) *Regenſ. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 42.
γ) *Argenv. zoomorph. t.* 1. *f.* D.
δ) *Argenv. Conch. t.* 3. *f.* D.
Habitat frequens in Oceano europæo, mari adriatico, atlantico, indico, *teſta* 4-5 *pollices longa, dorſi rugis un-*

dulatis, poris circiter 28, quorum 4 aut plures aperti, tuberculis inæqualibus, interdum obſoletis.

ſtriata. 3. H. teſta ovata ferruginea tranſverſim rugoſa longitudinaliter ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 684. *n.* 403.*
Knorr Vergn. 1. *t.* 17. *f.* 2. 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 138.
β) *Gualt. teſt. t.* 69. *f.* E.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 387. *t.* 4. *f.* 17.
Habitat in Aſia, & Barbaria *tuberculatæ affinis, at teſta utplurimum minore rugis non tuberculatis & magis regularibus exarata, albo maculata ferruginea, rubra, viridi, aut rubro viridique varia, poris circiter 38, elevatis, quorum 4-5 aperti.*

varia. 4. H. teſta ovata: ſtriis longitudinalibus; majoribus tuberculatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 684. *n.* 404.*
Liſt. Conch. t. 612. *f.* 4?
Rumpf muſ. t. 40. *f.* G.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* L. M.
Klein oſtr. t. 7. *f.* 113?
Martin. Conch. t. 15. *f.* 144.
Habitat rara in India, *teſta alba vel flaveſcente fuſco vel ſordide viridi-nebuloſa, ſtriis elevatis arcuatis parallelis ſpiram verſus majoribus inæquali, poris 20-30, 4-5 apertis, margine inæquali.*

marmorata. 5. H. teſta ovali: ſtriis longitudinalibus; tranſverſis obſoletis. *Muſ. Lud. Ulr.* 685. *n.* 405.*
Liſt. Conch. t. 614. *f.* 6.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* A. C.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* B.
Knorr Vergn. 2. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 139.
Habitat in mari africano & indico, *teſta utplurimum 2½ interdum 4 pollices longa infra poros circiter 30, quorum 4-5 aperti, excavata, fuſco alboque, vel fuſco albo viridique, vel fuſco albo viridi rubroque varia, ſtriis longitudinalibus ſemilunaribus ſubtilibus.*

aſinium. 6. H. teſta læviuſcula oblonga: margine ſubfalcato, dorſo nervis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 685. *n.* 406.*
Liſt. Conch. t. 610. *f.* 1.

Haliotides *ſibi valde ſimilis, hinc ſynonyma obſcuriora.*

Rumpf muſ. t. 40. *f.* E. F.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* E.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 29.
Knorr Vergn. 3. *t.* 15. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 16. *f.* 150.
Habitat rara in India, *teſta vix ultra 3 pollices longa, ſtriis longitudinalibus ſubtiliſſimis notata exterius viridi fuſco alboque varia, intus ex viridi margaritacea ſtriata, poris circiter 30 elevatis, quorum 5-7 aperti, ſtriis omnibus ſpiræ propinquis granulatis, ſæpius rubro-punctatis.*

rva, 7. H. teſta ovata rubra: ventre angulo elevato. *Muſ. Lud. Ulr.* 686. *n.* 407.*
Knorr Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 5.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 25?
Martin. Conch. 1. *t.* 14. *f.* 137? 140.
Habitat in mari africano & indico, *teſta interdum flavicante, decuſſatim ſtriata, poris 30 approximatis, 5-6 apertis, plicis tranſverſis rarioribus, planioribus, ſtriis obliquis crebrioribus magis elevatis.*

ſtriata. 8. H. teſta ovata vireſcente fuſco maculata: ſtriis tranſverſis elevatis duplicibus.
Liſt. Conch. t. 612. *f.* 3?
Martin. Conch. 1. *t.* 15. *f.* 142.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 15. *f.* 143.
Habitat rara in mari africano, *teſta intus argentea, exterius ſub ſpira macula dilute purpurea, ex qua radii quidam arcuati ejuſdem coloris per dorſum decurrunt, margine dextro acuto ſinuoſo, poris apertis 6.*

ſtralis. 9. H. teſta cano cæruleſcente rubroque varia ovata convexa cancellata; ſpira prominente inflata.
Spengl. Naturf. 9. *p.* 150. *t.* 5. *f.* 1. a. b.
Abh. n. danz. Geſ. 1. *p.* 264. *n.* 27.
Chemn. Conch. 10. *t.* 166. *f.* 1603. 1604.
Habitat ad novam Seelandiam, *teſta* $3\frac{1}{4}$ *pollicem longa,* $2\frac{1}{2}$ *lata, intus ex flavo rubroque margaritacea poris apertis 7-9 approximatis, orbicularibus, plicis tranſverſis elevatis.*

ineenſis. 10. H. teſta ovata ſubconvexa ſolida decuſſatim ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 388. *t.* 4. *f.* 18.
Habitat rara ad Guineæ littora, *teſta* $2\frac{1}{4}$-$2\frac{1}{4}$ *pollicis longa,* $1\frac{1}{2}$-2 *lata obſcure viridi albo maculata ad ſpiram ſpadicea,*

interdum viridi rubro alboque varia, intus ex rubro viridique margaritacea ſtriis longitudinalibus arcuatis æqualibus, tranſverſis binis terniſve parallelis margine acuto recto, poris complanatis, 6 apertis.

imperforata. 11. H. teſta ovata imperforata coſtata: coſtis aculeatis, ſpira exſerta.
Meuſchen Naturf. 18. *p.* 19. *t.* 2. *f.* 18. 18. e.
Helblins Abh. boehem Privatg. 4. *p.* 124. *t.* 2. *f.* 34. 35? Stomatia Phymotis.
Chemn. Conch. 10. *t.* 166. *f.* 1600. 1601.
Habitat rariſſima in India, *teſta ultra pollicem longa, & ultra dimidium lata, cinerea, coſtarum ſpinis mediis validioribus, margine ſatis tenui acuto.*

perverſa. 12. H. teſta ovata imperforata: margine ſuperne obliquo interius tuberculato, ſpira perverſa.
Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 404. *t.* 1. *f.* 3.
Gualt. teſt. t. 69. *f.* M?
Habitat - - - foſſilis, teſta ¾ *pollicis longa,* ½ *lata, minore ad latus acuta; an vere hujus generis & ordinis?*

plicata. 13. H. teſta dorſo tranſverſim plicato, margine lato craſſo longitudinaliter ſubtiliſſime ſtriato.
Schroet. Einl. in Verſtein 4. *p.* 278. *t.* 3. *f.* 9.
Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta prope Hildeſiam, *teſta violenter compreſſa,* ¼ *pollicis longa,* ½ *lata, ſpiræ anfractibus* 3-4.

glabra. 14. H. teſta ovata læviuſcula ſolida viridi alboque varia: ſpira humili. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 311. *t.* 166. *f.* 1602.
Habitat - - - teſta 5 *lineas ultra* 2 *pollices longa,* 9 *ultra pollicem lata, labio interiori latiſſimo, foraminibus perviis* 6, *ſtriis nonnullis tranſverſis prope ſpiram, aliiſque longitudinalibus pone poros.*

pulcherrima. 15. H. teſta ſubrotunda roſeo alboque varia: ſtriis granulatis, ſpira exſerta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 313. *t.* 166. *f.* 1605. 1606.
Martyn univ. Conch. 2. *t.* 62.
Habitat rariſſima ad inſulas Oceani auſtralis; *teſta ultra* 7 *lineas longa, intus argentea, margine interiori latiſſimo, labio exteriori crenato, poris* 30, *quorum* 6 *pervii.*

virginea. 16. H. teſta ovata decuſſatim undulato-ſtriata, obſcure viridi maculis faſciiſque albidis varia, intus coloribus iridis ſplendente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 314. *t.* 166. *f.* 1607. 1608.

Habitat

Habitat ad novam Seelandiam, *teſta pollicem lata, & 6 lineas longiore, poris perviis 6.*

vina. 17. H. teſta ſuborbiculari depreſſa rugoſa albo ſpadiceo & flavicante varia: medio poris pertuſo, ſpira aperta. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 315. *t.* 166. *f.* 1609.

Habitat - - - circulo triplici elevato, ſimilique tuberculis obſeſſo pone rugas, labio interiore lato.

gigantea. 18. H. teſta ovali rugoſa rubro alboque varia maculata intus margaritacea: ſpira depreſſa. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 315. *t.* 167. *f.* 1610. 1611.

Martyn Conchol 2. *f.* 63. Frechled Ear.

Habitat rariſſima ad novam Hollandiam, *teſta* $4\frac{1}{2}$-6 *pollices longa*, $3\frac{1}{2}$ *lata, plicis undulatis ſtriiſque longitudinalibus rugas tranſverſas decuſſantibus, vittis quaſi arcuatis albis varia, poris perviis* 3-7, *labii interni margine latiſſimo.*

Iris. 19. H. teſta ventricoſa ex fuſco fluvida rugis tranſverſis pliciſque tuberoſis longitudinalibus ſcabra, intus iridis coloribus coruſcante. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 317. *t.* 167. *f.* 1612. 1613.

Favanne Conchyl. 1. *p.* 585. *t.* 79. *f.* D. Oreille de mer de la nouvelle Zelande.

Martyn Conchol. 2. *t.* 61. Iris Ear.

Habitat ad novam Seelandiam, *pretioſa, teſta* $4\frac{1}{2}$ *pollices longa*, 3 *lata, intus coloribus pulcherrimis variantibus rutilante, poris perviis* 6.

331. PATELLA. *Animal* Limax.
Teſta univalvis ſubconica abſque ſpira.

* Labiatæ *ſ. labio interno inſtructæ, teſta integra.*

equeſtris. 1. P. teſta orbiculata exterius perfoliata: labio fornicali perpendiculari. *Muſ. Lud. Ulr.* 687. *n.* 408.*

Argenv. Conch. t. 2. *f.* K. Cabochon.

Liſt. Conch. t. 546. *f.* 38.

Rumpf muſ. t. 40. *f.* P. Q.

Gualt. teſt. t. 9. *f.* 7.

Knorr Vergn. 6. *t.* 22. *f.* 1. & *t.* 35. *f.* 4. 5.

Murray teſtaceol. t. 1. *f.* 5.

Spengl. Naturf. 9. *t.* 3. *f.* 1. 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 117-120. 125. 126.
β) *Chemn. Conch.* 10. *p.* 337. *t.* 168. *f.* 1630. 1631. Patella Tectum ſinenſe.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* 5.
da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 9.
Knorr Vergn. 6. *t.* 35. *f.* 4.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* B¹.
Habitat in mari indico & Americam mediam *alluente; teſta diametri rarius pollicem ſuperantis conica oblique quaſi truncata, hyalina, plicis, rugis, ſtriis huc illuc decurrentibus potiſſimum verſus marginem inferiorem inæquali, labio libero paulisper obliquo altera parte aperto in centro verticis poſito, altera ¼ pollicis longo, canalem referente.*

neritoidea. 2. P. teſta ovata apice ſubſpirali: labio laterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 688. *n.* 409.*
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 36?
Walch Naturf. 10. *p.* 75. *t.* 1. *f.* 1? 2?
Meuſchen Naturf. 13. *p.* 79. *t.* 5. *f.* 1? 1a? 1b?
Schroet. n. Litterat. 2. *p.* 301.
Habitat. - - - aliis teſtaceis adhærens incola rubro, teſta ceraſi magnitudine, utplurimum minore, exalbida, glabra, adultiori, rugis nonnullis transverſis inæquali, vertice valvulaque interna ſubrepanda lateralibus.

ſinenſis. 3. P. teſta ſubconica lævi: labio ſublaterali. *Muſ. Lud. Ulr.* 688. *n.* 410.*
Argenv. Conch. t. 2. *f.* F. Mitella chinenſis.
Liſt. Conch. t. 549. *f.* 39.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 1. *f.* 12.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* X.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. p. 414. *vign. f.* a. b.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 121-124.
β) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 22. *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *rarior; teſta tenuiſſima, pellucida, glabra, latiori quam alta, vertice acuto ſubflexuoſo, labio concavo depreſſo, teſta utplurimum alba: maculis, rarius radiis fuſcis, interdum ſpadicea, hinc inde quaſi cinere conſperſa.*

Porcellana. 4. P. teſta ovali apice recurva: labio poſteriori plano. *Muſ. Lud. Ulr.* 689. *n.* 411.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 8. Sulin.
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 34.

Rumpf. muſ. t. 40. *f.* O.
Martin. Conch. t. 13. *f.* 27. 28.
Chemn. Conch. 9. *t.* 124. *f.* 1082.
Habitat rara in India *& ad* inſulam Goream, *teſta convexa intus alba, exterius rubra maculis ſquamoſis albis & lineis tranſverſis undulatis cæruleis varia, nonne potius ad neritas amandanda?*

fornicata. 5. P. teſta ovali poſterius oblique recurva: labio poſteriori concavo.
Liſt. Conch. t. 545. *f.* 33. 35.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* N.
Muſ. Gottwald. t. 40. *f.* 275. a. b.
Knorr Vergn. 6. *t.* 21. *f.* 3.
Walch. Naturf. 10. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 129. 130.
β) *Kaemmer. Cab. Rudolſt. p.* 25. *t.* 2. *f.* 9.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 504. *t.* 6. *f.* 10.
δ) *Liſt. Conch. t.* 545. *f.* 37.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 8.
ε) *Knorr Vergn.* 6. *t.* 11. *f.* 5?
Habitat ad Barbados, Iliam *& alibi in* mari mediterraneo, *teſta ut plurimum alba margine ſpadicea, interdum exalbida: radiis dorſalibus maculiſque lateralibus ex luteo fuſcis, rarius unicolore rubella aut ſpadicea, margine acuto, labio prominente, anterius ſemilunari.*

aculeata. 6. P. teſta ovali fuſca ſtriis aculeatis exaſperata: vertice recurvo. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 334. *t.* 168. *f.* 1624. 1625.
Da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 1.
Elem. of. Conch. t. 2. *f.* 2.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 3.
Walch. Naturf. 10. *t.* 1. *f.* 5.
β) *Favann. Conch.* 1. *t.* 4. *f.* 2?
Habitat paulo rarior ad inſulas Americæ mediæ *obverſas, fornicatæ affinis, teſta utplurimum parva ſpadicea, aut alba, ſtriis per longitudinem decurrentibus, labio albo cavitatem internam in partes æquales diſpeſcente.*

trochiformis. 7. P. teſta conica longitudinaliter plicata: labio interno laterali. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 335. *t.* 168. *f.* 1626. 1627.
Da Coſta Conchol. t. 6. *f.* 2.
Knorr Vergn. 3. *t.* 29. *f.* 1. 2?
Favann. Conch. 1. *p.* 551. *t.* 4. *f.* A. 1.
Meuſch. Naturf. 18. *t.* 2. *f.* 16. 17.

β) *Argenv. Conch. t. 2. f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 135.
Habitat ad Tranquebar *&* inſulas Falkland, *teſta utrinque alba, tenui, ad baſin latiori quam alta, plicis obliquis.*

Auricula. 8. P. teſta ſubrotunda radiatim ſulcata & ſtriata apice recurva: cavitate interna auriculari. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 336. *t.* 168. *f.* 1628. 1629.
Pet. gaz. 1. *t.* 21. *f.* 11.
Da coſta Conchol. t. 6. *f.* 10.
Favann. Conch. 1. *p.* 559. *t.* 4. *f.* C. 2.
Habitat ad inſulas Borneo, S. Crucis *&* Thomæ, *teſta nivea, nunc circa verticem violacea, nunc nigro radiata, nunc intus fuſca, margine modo alba, vertice fuſco, limbo flavicante.*

inæqualis. 9. P. teſta ovata tenui hyalina obſolete tranſverſim rugoſa: margine inæquali: labio inæqualiter repando hyalino.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat ad Sinam, *buccino ſpirato innidularis, teſta ſiniſtrorſum ultra dimidium pollicem longa, vertice obſoleto.*

goreenſis. 10. P. teſta ovali plana tenui alba nitida, exterius lamelloſa.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 10. Jenac.
Martin. Conch. 1. *t.* 13. *f.* 131. 132.
Habitat rara ad rupes maritimas inſulæ Goreæ, *teſta diametri* 5–6 *linearum.*

contorta. 11. P. teſta albo-granulata ſubtiliſſime perpendiculariter oblique coſtata: labio tenuiſſimo dimidiato obliquo.
Walch. Naturf. 9. *p.* 199. *t.* 3. *f.* 3. 4.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 14.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 405. *t.* 1. *f.* 3. 4.
β) *Martin. neueſt. Mannigf.* 1. *p.* 406. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat rariſſima - - - teſta ex albo coriacea, intus nitide dilute fuſca.

depreſſa. 12. P. teſta alba ſubtiliſſime ſtriata pone verticem cernuum dilatatum depreſſa.
Meuſch. Natuf. 18. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 11 *&* 11. *c.*
Habitat - - - -

plicata. 13. P. teſta conica ochroleuca intus ferrugineo radiata: plicis longitudinalibus tranſverſim ſtriatis.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 15. *t. f.* 12. 12. *a.*
Habitat - - - vertice medio, margine tenui, acuto.

ſtriata. 14. P. teſta alba conica ſtriata undulatim ſulcata : vertice ſublaterali.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 16. *t.* 2. *f.* 13.
Habitat - - - plicatæ affinis.

Solea. 15. P. teſta ſubtortuoſa pellucida ferrugineo maculata tenuiter plicata ſupra tranſverſim ſulcata, labio undulatim repando.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 15. & 15. b.
Habitat - - - teſta dimidio pollice paulo longiore.

echinata. 16. P. teſta conica echinata intus glaberrima.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 407. *t.* 1. *f.* 7. 8.
Habitat - - - foſſilis hactenus modo prope Crignon *reperta, teſta calcarea albida, tota exterius aculeis horrida.*

** Dentatæ *baſi ſ. margine angulatæ.*

Crepidula. 17. P. teſta ovali planiuſcula lævi : labio poſterius plano. *Muſ. Lud. Ulr.* 689. *n.* 412.*
Gualt. teſt. t. 69. *f.* H. Crepidula Michelii.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 9? Garnot.
Habitat in mari mediterraneo, *potiſſimum ad* Barbariam, *fornicatæ affinis, teſta hyalina ſubdepreſſa, labio ſemilunari.*

laciniosa. 18. P. radiis elevatis inæqualibus : extrinſecus craſſioribus obtuſis.
Rumpf. muſ. t. 40. *f.* C.
Knorr Vergn. 6. *t.* 30. *f.* 2-4. 7. 8.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* O.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 81.
Habitat in mari indici *ſcopulis, teſta fuſca inter radios tranſverſim ſtriata : radiis ipſis albis, margine repando, vertice lato, oculos quaſi binos albos referente.*

ſaccharina. 19. P. teſta angulata : coſtis ſeptenis carinatis obtuſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 690. *n.* 413.*
Argenv. Conch. t. 2. *f.* M. Aſterolepas.
Liſt. Conch. t. 532. *f.* 10.
Rumpf muſ. t. 40. *f.* B.
Petiv. amb. t. 3. *f.* 3.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 4.
Murray teſtac. t. 1. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 70. 75? 76. 77.
Habitat ad inſulas Javam & Barbados, *teſta intus alba, ceterum nunc unicolore, nunc radiata, nunc maculata, nunc*

faſciata, ſolida, nunc magis, nunc minus depreſſa, vertice obtuſo ſublaterali, radiis utplurimum marginem ſuperantibus, inter majores ſeptem utplurimum 4 minoribus.

barbara. 20. P. teſta dentata: coſtis novemdecim elevatis fornicato-muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 690. *n.* 414.*
Knorr Vergn. 5. *t.* 13. *f.* 5.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 405. *t.* 5. *f.* 1.
Habitat ad inſulas Falkland, *teſta alba, extrinſecus interdum faſcia lata radiiſque fuſcis picta, convexa, inter coſtas* 19 *majores minoribus interſitis.*

granularis. 21. P. teſta dentata: ſtriis elevatis angulatis imbricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 415.*
Liſt. Conch. t. 536. *f.* 15.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 22.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* D.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* H.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 24.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 61.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 19-24. *n.* 42-50. 53.
Habitat ad littora Europæ *auſtralis, & ad promontorium* Bonæ Spei, *teſta ad* 2 *uſque pollices longa utplurimum lactea vertice fuſco, interdum fuſca radiis albis vertice dilutius fuſco ochroleuco marginato, rarius cæruleſcente faſciis* 2 *albis & vertice fuſco, teſta ceterum oblonga, convexa, antrorſum latiori, inter binas ſtrias læves tribus granulatis interſitis: granulis cinereis, fuſcis aut nigris.*

granatina. 22. P. teſta angulata: ſtriis numeroſis muricatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 416.*
Liſt. Conch. t. 533. *f.* 12. & *t.* 534. *f.* 13.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 27. 28. 30.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* F.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* G.
Knorr delic. t. B. V. *f.* 8.
Vergn. 1. *t.* 30. *f.* 2.
Regenſ. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 31.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 71-74.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 26-40. *n.* 54-78.
Habitat ad Jamaicæ & *auſtralis* Europæ *littora, teſta tenui extrinſecus alba, fuſceſcente, cornea, luteſcente maculis, lineis, ſquamis obſcurius vel dilutius fuſcis, rarius ſpadiceis, nunc confertis, nunc rarioribus, nunc ſparſis, nunc*

ordinatis picta, vertice fuſco, intus eburnea margine fuſco luteoque maculato vertice fulvo, ferrugineo vel fuſco flavicante marginato, aut variegata, $1\frac{1}{4}$-3 pollices longa, antrorſum latiore, ſtriis tenuiſſimis tranſverſis undulatis coſtis inæqualibus ad 60 uſque.

vulgata. 23. P. teſta ſubangulata: angulis quatuordecim obſoletis, margine dilatato acuto. *Fn. ſuec.* 2199.*
Liſt. anim. angl. t. 5. f. 40.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. f. 4.
Knorr Vergn. 6. t. 27. f. 8.
Gualt. teſt. t. 8. f. Q.
Ginann. adr. 2. t. 2. f. 17.
Martin. Conch. 1. t. 5. f. 38.
β) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 62. n. 117.*
γ) *Knorr Vergn. 6. t. 27. f. 8.*
Habitat in Oceani indici & europæi maris *quoque* mediterranei *ſcopulis, teſta cinerea aut nivea: faſciis 4 ferrugineis picta, fundo plumbeo vel ſanguineo-maculato, ultra 2 pollices alta, diametri 4 interdum pollices ſuperantis, coſtis numero & altitudine inæqualibus.*

cærulea. 24. P. teſta eroſo-ſubangulata: ſtriis numeroſis inæqualibus, ſubtus cærulea.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. f. 2?
Habitat in mari mediterraneo, *teſta ovata, convexa; exterius nigricante.*

tuberculata. 25. P. teſta ſubdentata conica tuberculata poſterius retuſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 692. *n.* 417.*
Habitat - - - teſta flaveſcente: tuberculis albis ſeriatis.

Lepas. 26. P. teſta ſubrotunda pectinata: radiis imbricatis tuberculatis tranſverſim ſtriatis, vertice incurvato.
Argenv. Conch. t. 2. f. D.
da Coſta Conchol. p. 12. t. 2. f. 7. & t. 5. f. 9.
Favann. Conchyl. 1. p. 543. t. 4. f. H².
Chemn. Conch. 10. p. 322. vign. 25. f. A. B.
β) *Bronze Limpet. Martyn univ. Conch. 1. t. 17.*
Habitat rariſſima ad Chili *littora, β) ad* inſulas Falkland, *teſta ſolida, exterius ex flavicante ſubſpadicea, ad 2 pollices 2 lineas longa, & 3 pollices 8 lineas lata, marginis altera parte lævi, altera tumida, inæqualiter dentata.*

tricoſtata. 27. P. teſta ovali tricoſtata alba ad latera ſtriata: margine interno planiuſculo ſublacero.
Chemn. Conch. 10. *p.* 333. *t.* 168. *f.* 1622. 1623.
β) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 6?
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 495. *n.* 130?
Habitat rara in mari indico, *tricarinatæ affinis, teſta ſolida: vertice mucronato, recurvo.*

mytilina. 28. P. teſta carinata antrorſum rotundata undulatim ſtriata fuſca intus margaritacea: margine poſteriori crenato.
Favart d'Herbign. dictionn. 2. *p.* 238. 239.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. *p.* 417. *t.* 2. *f.* 13. 14.
Helbling Abh. boehm. Privatgeſ. 4. *p.* 104 *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat ad Americæ *auſtralis littora, teſta* 2 *lineas ultra pollicem longa.*

depreſſa. 29. P. teſta dentata ovali compreſſo-conica coſtata alba inter coſtas fuſca intus ſulcis albis.
Helbling Abh. der. boehm. Privatgeſ. 4. *p.* 108. *t.* 1. *f.* 9. 10.
Habitat - - - teſta 9 *lineas longa*, 6 *lata, coſtis circiter* 40 *inæqualibus.*

ſtellata. 30. P. teſta angulata ovata depreſſa: radiis decem elevatis; intermediis coſtis brevioribus.
Helbling Abh. boehm. Privatg. 4. *p.* 109. *t.* 1. *f.* 11.
Habitat rarior - - - ſaccharinæ affinis, teſta tenui, 8 *lineas longa*, 6 *lata, fuſca coſtis albis, intus nivea, fundo fuſco.*

iſlandica. 31. P. teſta ſolida ovata gibba inæqualiter coſtata intus glabra radiis alternis cinereis & corneis picta margine crenata.
Kaemmer. Cabin. Rudolſt. p. 15. *t.* 3. *f.* 6.
Habitat ad Iſlandiæ *littora, teſta* 4 *lineas ultra pollicem longa, vertice fere medio intus cæruleo albo marginato, coſtis imbricatis.*

cypria. 32. P. teſta ovali ſubpellucida coſtata: coſtis hinc inde tuberculatis extrorſum foliaceis.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 1. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* H.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 79.
β) *Argenv. Conch. t.* 2. *f.* B.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 86.
Habitat ad Cypri *littora, barbaræ proxime affinis, teſta* 1¼-2¼ *pollicis longa, alba, margine interno cinereo*

aliquando faſcia lata alba, vertice annulo fuſco cincto, coſtis 16-20 & ultra.

coſtata. 33. P. teſta ovata ſubgibba alba coſtata: coſtis confertis inæqualibus tuberculato rugoſis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 12. *n.* 27.
β) *Schroet. n. Litter.* 3. *p.* 12. *n.* 28.
γ) *Schroet. n. Litter.* 3. *p.* 13. *n.* 29.
Habitat - - - teſta 1-2½ *pollices longa, coſtis elevatis carinatis* 20-40, *faſcia interdum interna fundo propinqua cana, aut luteſcente ferrum equinum referente, ſulcis inter coſtas intermediis in* γ) *fuſcis.*

leucopleura. 34. P. teſta ovata obſcura: coſtis confertis albis lævibus inæqualibus.
Liſt. Conch. t. 539. *f.* 22.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 9.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 56. 57.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 13. *n.* 30.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 15. *n.* 32.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 15. *n.* 33.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 15. *n.* 34.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 16. *n.* 35.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 17. *n.* 37.
Habitat - - - teſta minuta, ½-1 *pollicem longa, nigra, fuſca, ſubfuſca, rarius ſpadicea, interdum albo varia, vertice utplurimum fuſco.*

ſtriatula. 35. P. teſta ſubrugoſa alba ſtriis fuſcis flexuoſis extrorſum ramoſis varia, fundo maculis duabus fuſcis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 16. *n.* 36. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

octoradiata. 36. P. teſta convexa: coſtis tuberculatis præter minores majoribus octo.
v. Born. muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 62. Patella tricarinata.
β) *Liſt. Conch. t.* 532. *f.* 11.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 82. 83.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 18. *n.* 40.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 19. *n.* 41. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat ad inſulas Americæ mediæ *obverſas, teſta* ½-1¼ *pollicis longa, nunc utrinque tota alba, nunc extrinſecus cinerea, intus colore ardeſiæ macula ſpatulata cana albo-marginata, nunc ſubſpadicea, vertice coſtiſ-*

que, intuſque præter marginem fuſceſcentem alba, nunc ſubfuſca, intus, coſtis & vertice alba, hoc tamen faſcia fuſca cincto, nunc ex livido alba, intus coſtiſque albis, coſtis in β) 11, in γ) 16, in δ) 12.

rubra. 37. P. teſta dentata ſub epidermide cinerea rubra: ſtriis elevatis rotundatis; minoribus imbricatis, intus alba.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *n.* 112.
Habitat - - - granulari affinis, teſta ovali $1\frac{1}{2}$ *pollicem fere longa, vertice ſpadiceo, faſcia lata alba cincto, margine intus faſcia fundoque ſpadiceis.*

hepatica. 38. P. teſta ovata gibba tenui dentata hepatica: ſtriis elevatis obtuſe ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *t.* 5. *f.* 15.
Habitat rara - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, vertice ejuſque ambitu albo, fundo & margine interno ſubfuſcis.*

badia. 39. P. teſta ſubconvexa fuſca intus badia: radiis duodecim majoribus utrinque coſta cinctis totidemque minoribus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 484. *t.* 5. *f.* 9.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 41. *n.* 80.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 41. *n.* 81.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 42. *n.* 82.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 43. *n.* 83.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 43. *n.* 84.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 44. *n.* 85.
θ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 44. *n.* 86.
ι) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 45. *n.* 87.
κ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 45. *n.* 88.
λ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 46. *n.* 89.
μ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 47. *n.* 90.
ν) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 47. *n.* 91.
ξ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 48. *n.* 92.
ο) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 49. *n.* 93.
π) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 49. *n.* 94.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa nunc magis nunc minus plana, mediæ craſſitiei rarius pellucida, ſæpius punctis viridibus conſperſa nunc per totam ſuperficiem externam, nunc per radios, nunc per marginem externum diſperſis, rarius in ſeries digeſtis, rarius punctis cinereis varia, crebrius cinereo varia aut undulata, interdum in luteum aut hepaticum colorem vergente, vel nigro maculata, margine & vertice utplurimum, radiis ſæpe variis*

aut colore alieno tinctis, vertice nonnunquam quinqueſariam cæruleo punctato, fundi macula ſpatulata hepatica vel vireſcente: faſcia ſimplici aut duplici utraque diverſi utplurimum dilutioris coloris cincta, interna ſuperficie interdum in fuſcum, luteum, hepaticum, canum colorem vergente.

ſceſcens. 49. P. teſta planiuſcula fuceſcente: ſtriis elevatis decem, vertice diverſicolore, fundi macula ſpatulata dilutius hepatica glauco & aureo marginata, margine interno fuſco.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 50. *n.* 95.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 51. *n.* 96.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 51. *n.* 97.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 52. *n.* 98.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 53. *n.* 99.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 53. *n.* 100.
Habitat - - - teſta $2\frac{1}{2}$-$3\frac{1}{2}$ *pollices longa, nunc magis nunc minus convexa, ſæpius perpendiculariter ſtriata, utplurimum nigro-varia vel undulata, vel dilutius lineato-faſciata vertice nigro cano-marginato, vel hepatico lineis angulatis fuſceſcentibus nigriſque vario, albo-marginato, vel cinereo glaucoque vario exalbido marginato; nunc vireſcente exalbido marginato, radiis, præter interſitos minores, rarius in altero latere deficientes,* 10-11 *nunc acutioribus, nunc magis obtuſis, nunc magis complanatis, interdum aureis, margine externo nonnunquam exalbido, ſuperficie interna maculis interdum aureis fugacibus picta, fundi macula rarius vireſcente exalbido marginata.*

aculoſa. 41. P. teſta complanata anterius anguſta & rotundata flavicante fuſco-maculata: vertice albo, radiis planis rotundatis æqualibus.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 54. *n.* 101.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 54. *n.* 102.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$-1 *pollicem longa, ovali, intus alba fuſco maculata, radiis* 10-11, *fundi macula ſpatulata dilutius & obſcurius fuſca, varia.*

otundata. 42. P. teſta ſubovali complanata fuſca varia: coſtis rotundatis, planis, vertice fundoque diverſicoloribus.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 55. *n.* 103.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 55. *n.* 104.
Habitat - - - teſta $1\frac{3}{4}$-$2\frac{1}{4}$ *pollicis longa, dilutius fuſca luteo radiata, β) maculata, vertice ex fuſceſcente cinereo;*

limbo albo, in β) hepatico limbo lacteo, margine in β) cinereo fuſco-lineato fundo obſcure hepatico, ſupra albicante, corona calcarea alteraque candidiore cincta, in β) fundo cinereo fuſceſcente vario corona ex albida cincto.

Pecten. 43. P. teſta ovata obſcure marginata albo radiata: ſtriis diſtantibus extrorſum pectinatis, vertice griſeo, fundi macula ſubſpatulata corona alba cincta.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 56. *n.* 105.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 56. *n.* 106.
γ?) *Martyn univ. Conch.* I. *t.* 16.
Habitat ad littus occidentale Americæ borealis - *teſta* 1¼-1¾ *pollicis longa, cinerea hinc inde fuſceſcente varia, β) alba fuſco-radiata, margine fuſco, in β) nigro interiori cano fuſco radiato, fundo dilutius & obſcurius fuſco, in β) cano.*

corrugata. 44. P. teſta ovata rugoſa ſpadicea: verticis corona alba, intus cinerea albo radiata, fundo dilute fuſco albo marginato.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 57. *n.* 107.
Habitat - - - teſta ½ pollicem longa.

alboradiata. 45. P. teſta ovali utrinque fuſca albo-radiata: ſtriis elevatis pectinatis, fundo flavicante, vertice albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 57. *n.* 108
Habitat - - - teſta ¾ fere pollicis longa.

olivacea. 46. P. teſta ovata olivacea intus fuſca albo varia: ſtriis elevatis inæqualibus margine bifariam obtuſe ſpinoſis, vertice luteo, fundo argenteo, centro fuſco.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 490. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat - - - teſta ½ pollicem circiter longa, fundo corona albo cincto.

cerea. 47. P. teſta ovata utrinque cerea perpendiculariter ſtriata: coſtis tredecim complanatis, fundo albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 59. *f.* 110.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 59. *f.* 111.
Habitat - - - teſta ½ pollicem longa, in β) luteola vertice argenteo duplici punctorum nigrorum ferie cincto, margine punctis fuſcis ſeriatis notato, fundo argenteo in β) albo.

impreſſa. 48. P. teſta ovata: ſtriis elevatis dimidiatis tranſverſim ſtriatis fuſceſcentibus obſcurius alboque maculatis, verticis ambitu impreſſo albo.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 60. *n.* 112.
Habitat - - - teſta ¾ *pollicis longa, vertice maculis* 3 *fuſceſcentibus fundo exalbido, margine interno fuſceſcente.*

urantia. 49. P. teſta ovata ſolida citrina fuſco undulata: ſtriis elevatis confertis rugoſis, fundo albo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 60. *n.* 113.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

melanozonias. 50. P. teſta ovata denticulata cinerea cingulis tribus nigris varia intus lactea; ſtriis elevatis inæqualibus extrorſum noduloſis margine ſpinoſis.
Schroet. n. Litterat. p. 61. *n.* 114. *f.* 5.
β) *Schroet. n. Litterat. p.* 61. *n.* 115.
Habitat - - - teſta pollicem longa, in β) *cinerea albo varia vertice acuto ruſeſcente, in* β) *exalbido, margine interno cinereo ſuſceſcente vario, fundo luteo.*

oculata. 51. P. teſta ovata alba inter coſtas complanatas longitudine inæquales fuſceſcente: verticis cingulo fuſco.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 494. *n.* 127.
Habitat - - - teſta ½ *pollicem longa, vertice obtuſo.*

magellanica. 52. P. teſta tenui ovata alba margine noduloſa, intus margaritacea: ſtriis elevatis ſpadiceis, vertice acuminato fundoque fuſcis.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 40. a. b.
Habitat in freto Magellanico, *teſta* 1½ *pollicem longa, ultra pollicem alta, epidermide fuſca, flava, aut alba fuſco radiata veſtita.*

ochroleuca. 53. P. teſta ochroleuca faſciis tribus flavis picta: ſtriis elevatis acutis inæqualibus, vertice albo, fundo argenteo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 64. *n.* 120.
Habitat - - - teſta pollicem alta, 1¼ *pollicis longa.*

denticulata. 54. P. teſta alba denticulata: ſtriis elevatis acutis inæqualibus, vertice duplici punctorum cinereorum ſerie faſciaque ex atro cinerea cincto.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 64. *n.* 121.
Habitat - - - teſta pollicem longa, ¾ *fere lata & alta.*

nodulosa. 55. P. teſta flava fuſco radiata: ſtriis elevatis noduloſis inæqualibus, vertice fundoque albis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 65. *n.* 122.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 65. *n.* 123.
Habitat - - - *teſta ad* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa.*

cinerea. 56. P. teſta dentata cinerea inter ſtrias elevatas inæquales fuſca rugoſa; vertice acuminato lacteo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 66. *n.* 124.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 66. *n.* 125.
Habitat - - - *teſta ultra pollicem longa, vertice & fundo in* β) *argenteis, margine in* β) *citrino fuſceſcente radiato.*

exalbida. 57. P. teſta exalbida intus ochroleuca inter ſtrias elevatas rotundatas inæquales rugoſa: vertice obtuſo albo; faſcia lata interrupta alteraque marginali fuſca.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 67. *n.* 126.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

cancellata. 58. P. teſta cinerea fuſco varia decuſſatim ſtriata: callo bifariam tuberculato, vertice flavicante, fundi macula ſpatulata alba.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 67. *n.* 127.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 5. *f.* 37.
Habitat in Jamaica, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, exterius punctis ſparſis, intus radiis fuſcis varia, fundi margine ex cinereo argenteo,* β) *teſta cana obſcurius radiata, ſtriis nonnullis flavis, intus ſordide flava: fundo albo.*

lævis. 59. P. teſta rotundata lævi flavicante: margine faſcia lata alteraque anguſta citrina fuſco-maculata: margine dilatato acuto ſubrugoſo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 68. *n.* 129.
Habitat - - - *teſta ultra* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, intus annulis* 2 *obſcurioribus notata, vertice cæruleſcente cinereo alboque varia, fundo glauco.*

argentea. 60. P. teſta lævi craſſa ſubargentea: radiis undecim fuſcis, margine argentato, vertice luteolo, fundo eburneo duplici annulo albo cincta.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 69. *n.* 130.
Habitat rara - - - *teſta* 2 *fere pollices longa.*

cuprea. 61. P. teſta alba: coſtis validis rotundatis fuſcis: intus margaritacea, vertice fundoque cupreis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 488. *t.* 5. *f.* 14.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 70. *n.* 132.

Habitat - - - teſta 2 pollices longa; inter coſtas majores nigro limbatas minoribus hinc inde interſitis.

ſangui-nea. 62. P. teſta utrinque dilute hepatica: coſtis carinatis majoribus minoribuſque alternis, vertice plano albo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 71. n. 133.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis longa.

inæqua-lis. 63. P. teſta fuſca ſuperne glabra: infra ſtriis elevatis confertis albis, vertice obtuſo albo; nimbo fūndoque fulvis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 71. n. 134.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ pollicem longa: ſtriis vix $\frac{1}{3}$ altitudinis aſſequentibus.

flaveola. 64. P. teſta flavicante fuſco-varia: coſtis complanatis inæqualibus, vertice obtuſo, fundo albo ruſeſcente vario.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 72. n. 135.
Habitat - - - teſta pollicem longa.

Infundi-bulum. 65. P. teſta denticulata compreſſa utrinque rotundata flava perpendiculariter ſtriata; coſtis carinatis, fundo albo cinereoque varia.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 72. n. 136.
Habitat rara - - - teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis longa.

Cyathus. 66. P. teſta rotundata glaberrima alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 73. n. 137.
Habitat - - - teſta lentis magnitudine.

ſinica. 67. P. teſta ovata tota flava undulatim ſulcata intus perpendiculariter ſtriata: margine hinc inde repando.
Davil. Catal. t. 2. f. A.
Martin. Conch. 1. t. 6. f. 44.
Habitat in Sina, teſta 4 lineas ultra 3 pollices longa.

punctula-ta. 68. P. teſta alba ſubrotunda punctis multicoloribus conſperſa ad baſin radiata annuliſque duobus fuſcis cincta: margine ſubrepando.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 1. f. 7.
Martin. Conch. 1. t. 7. f. 55.
Habitat - - -

lugubris. 69. P. teſta ovata annulatim ſtriata nigra: ſtriis elevatis inæqualibus, margine crenato, vertice fundoque albis.
Martin. Conch. 1. t. 8. f. 60.
Habitat - - -

ulyſſiponenſis. 70. P. teſta ovata dentata flaveſcente: ſtriis elevatis complanatis, vertice acuminato aurantio.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 62.
Habitat prope Ulyſſiponem.

Umbella. 71. P. teſta oblonga rubra : ſtriis elevatis inæqualibus albis, margine crenato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 1. Libot.
Liſt. Conch. t. 538. *f.* 21.
Knorr Vergn. 1. *t.* 19. *f.* 2. 3. & 5. *t.* 19. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 63.
Schroet. Journ. 6. *p.* 453.
n. Litterat. 3. *p.* 109. *n.* 212-215.
Habitat ad Africæ *littora, varietate innumera, teſta ſatis ſpectabili, rarius ſtraminea, interdum maculata aut nebuloſa.*

crenata. 72. P. teſta tenui pellucida ſtriata nigricante olivaceo radiata intus glauca vel cinerea : vertice acuminato, margine crenato, fundo lacteo.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 16.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 25.
Gualt. teſt. t. 9. *f.* G.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 64. 65.
Habitat ad Africæ, Malagæ ; Ulyſſiponis *littora.*

ferruginea. 73. P. teſta ferruginea lineis pullis angulatis undulatiſve cinguliſque albis picta intus lactea ; ſtriis elevatis nodoſis, margine plicato.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 66.
Habitat - - - teſta ſatis magna, nunc magis ovali, nunc potius pyramidali, coſtis alternatim elevatis & depreſſis, vertice acuminato utplurimum albo lineis undulatis pullis cincto, fundo ex colore lacteo in pullum vergente.

melanogramma. 74. P. teſta ovali ochroleuca : ſtriis elevatis nigris, intus argentea maculata, vertice acuminato albo, fundi macula ſtraminea.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 67.
Habitat - - - vertice lævi, margine crenato.

Huic tribui inſerendæ videntur teſtæ a Liſtero *Conch. t.* 535. *f.* 14. & *t.* 540. *f.* 24. *a* Bonanui *muſ. Kircher.* 1. *f.* 24. & 26. *a* Gualtieri *teſt. t.* 8. *f.* G. H. I. O. *et* R. *et t.* 9. *f.* D. *et* L. *a* Knorr *Vergn.* 3. *t.* 29. *f.* 3. *et* 4. *et* 6. *t.* 27. *f.* 8. *et t.* 30. *f.* 2-4. *et* 7. *delineatæ.*

12. P.

repanda. 75. P. teſta ovali tenui intus argentea fuſceſcente-radiata: ſtriis teneris undulatis badio granulatis, margine repando.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 68.
Habitat in freto magellanico, *vertice acuminato.*

angulosa. 76. P. teſta ovali alba tenuiſſime ſtriata, maculis punctiſque rubris varia; margine octangulari.
Liſt. Conch. t. 538. *f.* 21. b.
Martin. Conch. 1. *t.* 8. *f.* 69.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 10. *f.* 88. 89.
Habitat - - - teſta in β) aurantia ſtriis punctiſque elevatis albis, fundo luteo: annulo centrali aurantio; marginali albo.

tigrina. 77. P. teſta ovali lævi nitida pellucida ex olivaceo cæruleſcente fuſco punctata ſtriata; coſtis ſeptem flavicantibus, margine ſeptangulari.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 78.
Habitat - - - teſta intus margaritacea, verticis acuminati fundique macula aurantia.

monopis. 78. P. teſta oblonga planiuſcula badia albo ſtriata intus lactea: ſtriis elevatis undecim inæqualibus, vertice rotundato albo.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 32.
Leſſer teſtaceoth. f. 86.
Martin. Conch. 1. *t.* 9. *f.* 80.
β) *Liſt. Conch. t.* 532. *f.* 11.
Klein oſtrac. t. 8. *f.* 5.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 82. 83.
Habitat ad inſulas Americæ mediæ *oppoſitas, teſta interdum fuſca albo varia, in β) alba vel ſpadicea, ſtriis nonnunquam albis & fuſcis alternis.*

chloroſticta. 79. P. teſta ovata dentata fuſca viridi punctata: ſtriis elevatis cavis undecim latioribus totidemque anguſtioribus inæquali; vertice albo.
Martin. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 74.
Habitat - - - fundi litura centrali flava vel fuſca.

margaritacea. 80. P. teſta tenui inæqualiter ſtriata alba intus margaritacea: verticis litura aurantia annulo flaveſcente cincta; margine crenato.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* L.
Mart. Conch. 1. *t.* 10. *f.* 85. A. B.

β) *Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 16. n. 11.*
Habitat ad Iſlandiam, teſta fulvo vel aurantio nebuloſa, margine radiis tranſlucentibus picta.

tenuis. 81. P. teſta ovali tenui ochroleuca lineis ſpadiceis angulatis varia: ſtriis elevatis obtuſis cavis inæqualibus.
Martin. Conch. 1. t. 10. f. 87.
Habitat - - - inter tenuiſſimas & maxime complanatas hujus generis, ſtriis 10-12.

Mitrula. 82. P. teſta ſolida ſubconica tranſverſim plicata: margine repando.
Liſt. Conch. t. 544. f. 31.
Klein oſtr. t. 8. f. 11. 12.
Martin. Conch. 1. t. 12. f. 11. 12.
Habitat ad inſulam Barbados, *utrum hujus generis & ordinis, an ad oſtreas releganda, teſta anguſta alba, varius fuſca, nunc magis nunc minus oblonga.*

plicaria. 83. P. teſta ovata dentata: ſtriis elevatis obtuſis triginta undulatis tranſverſim rugoſis.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. f. 1.
β) *Knorr Vergn. 3. t. 30. f. 1.*
Habitat ad freti magellanici *littora, rarior, vertice obtuſo, marginis dentibus 30-34.*

pentagona. 84. P. teſta albida obtuſe pentagona: margine dilatato crenato, vertice obtuſo, fundo rubello.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. f. 4. 5.
Habitat - - -

ænea. 85. P. teſta ovata tenera pellucida ſub epidermide albida argentea pullo-radiata elevato-ſtriata: vertice fundoque cupreis.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. p. 408. t. 1. f. 9.
Habitat in freto magellanico, *teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem circiter longa, vertice nitidiſſimo.*

conchacea. 86. P. teſta tenui oblongo-ovata tenuiſſime undulatim ſtriata ex cinereo flaveſcente: radiis elevatis obſcurioribus, vertice recurvo.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. p. 417. t. 2. f. 13. 14.
Habitat in mari Americam auſtralem *alluente, teſta, excepto cardine, conchæ v. g. mytilo eduli ſimillima, intus glabra margaritacea, vertice fuſco, margine repando.*

annea. 87. P. teſta ovata argentea: ſtriis elevatis complanatis, vertice obtuſo cupreo, fundi litura ovali badia, margine repando.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 489. *n.* 114.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, intus nitente.

candidiſſima. 88. P. teſta ſuborbiculata ſtriata alba: faſcia fuſceſcente fuſco punctata, intus cana: ſtriis inæqualibus, margine tranſverſim rugoſo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 130. *n.* 254.
Habitat - - - vertice obtuſo ſubcentrali, fundi macula ſpatulata cretacea.

*** Mucronatæ, *vertice acuminato recurvo.*

ngarica. 89. P. teſta integra conico-acuminata ſtriata: vertice hamoſo revoluto.
Liſt. Conch. t. 544. *f.* 32.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 23.
Gualt. teſt. t. 9. V. VV.
Ginann. adr. 2. *t.* 3. *f.* 24.
Leſſer teſtaceoth. f. 85.
Klein oſtrac. t. 8. *f.* 10.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* R.
zoomorph. t. 10. *f.* 8.
Knorr Vergn. 6. *t.* 16. *f.* 3.
Verſtein. 2. *t.* N. *f.* 3. 4.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 3. *f.* 8.
v. Born ind. muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 414. *vign. f.* d.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 107. 108.
Habitat in mari mediterraneo; adriatico, Americam *mediam alluente; teſta ad* 2 *pollices lata & alta, tenui, ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata, interdum tranſverſim plicata aut margine denticulata; utplurimum albida rubro nebuloſa, intus alba lævi: fundo roſeo; non raro foſſili.*

tiquata. 90. P. teſta integra oblonga imbricata: vertice poſteriori.
Habitat - - - teſta opaca lactea, apertura ovata.

ammillaris. 91. P. teſta integra conica ſtriata ſubdiaphana: vertice reflexo lævi.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 17.
Klein oſtr. t. 8. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 58. 59.
Habitat in mari mediterraneo *& ad* Africæ *littus occidentale, teſta ſolida mediæ magnitudinis pulla, albo*

ſtriata : faſciis interdum tranſverſis flavicantibus aut albis , vertice albo.

tricarinata. 92. P. teſta ſubſtriata anterius tricarinata.
Schroet. n. Litterat. 2. *p.* 170. *f.* 8. a. b.
Einl. in Conch. 2. *p.* 417. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat rara --- teſta ſubovata , ½ pollicem alta , ¾ longa, dilute viridi ſolida , margine ſubdenticulata intus lævi, inferne læte viridi , ſupra lactea , ſubdiaphana , inæqualiter ſtriata , ad verticem obtuſum poſteriorem cancellata.

pectinata. 93. P. teſta integra ovata : ſtriis rugoſis ſubramoſis , vertice ſubcentrali reflexo mucronato.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 9.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 418. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat in mari mediterraneo , *teſta ad* 2 *pollices longa, opaca , tenui , cinerea , ſtriis numeroſis longitudine inæqualibus exarata , intus lævi , ſpadiceo plumbeoque varia , fundo plumbeo , vertice ſpadiceo alboque vario.*

lutea. 94. P. teſta integra ovali convexa ſtriata : vertice ſubmarginali reflexo mucronato. *Muſ. Lud. Ulr.* 692. *n.* 418.*
Rumpf muſ. t. 40. *f.* I.
Martin. Conch. 1. *t.* 17. *f.* 154. 155.
Habitat in Italia , *teſta magnitudine ſeminis peponis fulva: vertice annulo ruſeſcente cincto.*

Unguis. 95. P. teſta integerrima oblonga margine anteriori retuſa, vertice mucronato carinato. *Muſ. Lud. Ulr.* 693. *n.* 419. *
Rumpf muſ. t. 40. *f.* L.
Pet. gaz. t. 32. *f.* 9.
da Coſta Conch. t. 2. *f.* 2.
Favann. Conch. 1. *t.* 4. *f.* G.
Humphr. Conch. t. 2. *f.* L.
Chem. Naturf. 22. *t.* 3. *f.* A-E. *Conch.* 10. *t.* 172. *f.* 1675-1677.
Habitat ad Amboinam, *teſta alba; an pinnæ potius ſpecies?*

criſtata. 96. P. teſta vertice revoluto , dorſo criſtato carinato.
Habitat --- teſta compreſſa tenuiſſima diaphana ſulcis numeroſis tranſverſis exarata , dorſi membrana duplici tenuiſſima in crenulas exciſa , limbo ſinuato , aperturæ angulo dorſali acuto.

lacuſtris. 97. P. teſta integerrima ovali membranacea ; vertice mucronato reflexo. *Fn. ſuec.* 2200.*

Müll. zool. dan. prodr. 2861. *hiſt. verm.* 2. *p.* 199. *n.* 385. Ancylus teſta membranacea, mucrone verticis ſubcentrali, apertura oblonga.
Geoffr. teſt. 1. Ancylus.
Argenv. Conch. t. 27. *f.* 1.
zoomorph. t. 8. *f.* 1.
Ginann. op. poſth. 2. *p.* 50. *t.* 2. *f.* 11.
Martin. berl. Magaz. 4. *t.* 7. *f.* 2. 3.
Habitat in Europæ *rivis & lacubus, plantis aquaticis adhærens, rarior in* mari balthico, *incola tentaculis 2 truncatis occultis, angulo interiori oculatis inſtructo, teſta* $1\frac{1}{2}$-$2\frac{1}{3}$ *lineas longa, tenerrima, pellucida alba, ſupra convexa, ſubtus concava, verticis mucrone minimo.*

fluviatilis. 98. P. teſta integerrima ovali ſubcornea: verticis mucrone marginali, apertura ovali.
Müll. hiſt. verm. 2. *p.* 201. *n.* 386. Ancylus. fluviatilis.
Liſt. Conch. t. 141. *f.* 39.
an. angl. t. 2. *f.* 32.
Gualt. teſt. t. 4. *f.* AA. & *f.* BB.
Argenv. Conch. 1. *t.* 27. *f.* 1.
Martin. berl. Mag. 4. *t.* 7. *f.* 1.
Schroet. Fluſconch. t. 5. *f.* 1. 2. 3. & *t.* X. *min.* A. *f.* 10.
Habitat in Europæ *fluviis, lacuſtri affinis, teſta tenui, fragili, minuta,* $2\frac{1}{2}$ *lineas longa, pellucida, præter raras ſtrias concentricas glabra, mucrone magis obtuſo.*

[...]eca. 99. P. teſta integra punctis elevatis ſtriata vertice acuto-recto. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 45. *t.* 12. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 25. *prodr.* 2866.
Habitat rara in ſinus Norwegiæ Droebacenſis *ſaxis, incola albo ovato, oculi veſtigiis nullis inſtructo teſta alba: ſtriis* 60 - 80.

virginea. 100. P. teſta integerrima alba: faſciis rubris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 43. *t.* 12. *f.* 4. 5. *rar.* 1. *p.* 26. *prodr.* 2867.
Habitat ad ſinum maris norwegici *fucos, minuta, teſta faſciis* 18, *ſtriisque ſubtiliſſimis concentricis varia, intus flavicante, incola albo: pallio ſpadiceo latiſſimo, oculis nigris.*

teſſellata. 101. P. teſta integerrima albida: teſſeris rubris. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 45. *t.* 12. *f.* 6-7. *rar.* 1. *p.* 27. *prodr.* 2868.
Olaff. it. isl. t. 11. *f.* 11.
Habitat ad Norwegiæ *fucos & ſaxa maritima, teſta ſubtiliſſime ſtriata, ſubtus ſordide flava, intus (ſi recens) lac-*

tea, vertice obtuſo, incola albo: oculis nigris pallioque obſcuro albo fimbriato.

fulva. 102. P. teſta integerrima aurantia: vertice mucronato ſubverticali. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 82. *t.* 24. *f.* 1-3. *rar.* 1. *p.* 49. *prodr.* 2869.
Habitat rarior in Norwegiæ ſinu Drocbacenſi, *fucis & teſtaceis affixa; teſta ſolida, lævi, immaculata, ſtriis vix armato oculo conſpicuis; incola albo: capite rotundato, anterius plano, utrinque ſubtus cuſpidato, pallio albido.*

ſubſpiralis. 103. P. teſta ovata: apice ſubſpirali obtuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2873.
Habitat in mari Norwegico.

ambigua. 104. P. teſta ovata margine ſubdentata: mucrone ſubacuto reflexo. *Müll. zool. dan. prodr.* 2874.
Habitat in mari Norwegico.

rubella. 105. P. teſta integerrima ſubconica læviuſcula rubicunda. *Fabr. Fn. groenl. p.* 386. *n.* 383.
Habitat rarior in maris Groenlandiam *circumfluentis profundis inter alvarum radices & teſtaceorum fiſſuras, incola rubicundo, teſta longitudine vix* $2\frac{1}{2}$ *lineas ſuperante, læviuſcula, ſtriis tamen ſubtiliſſimis longitudinalibus confertis extrinſecus exarata, vertice ſubcentrali antrorſum verſo, apertura oblongo-orbiculari.*

Borniana. 106. P. teſta ovata integerrima ſubtiliſſime longitudinaliter ſtriata alba: venis ſanguineis.
Helbling Abh. böh. Privatg. 4. *p.* 106. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat - - - *teſta* 6 *circiter lineas longa, intus glabra.*

Calyptra. 107. P. teſta integra: coſtis ſubimbricatis, vertice hamoſo, margine ſinuato.
Chemn. Conch. 10. *p.* 340. *n.* 169. *f.* 1643. 1644.
Martyn Conchol. 1. *f.* 18.
Habitat ad Americæ ſeptentrionalis *littus occidentale; teſta ex ſpadiceo dilute fuſca, intus alba, rubello & cæruleſcente obumbrata.*

Patellæ *ſcopulis, ſaxis, teſtaceis, fucis aliiſque aquaticis tenaciſſime adhærent, non niſi vi devellendæ: incola tentaculis duobus, excepta lacuſtri et forſan fluviatili, ſetaceis, et oculis binis inſtructus, in angulo tentaculorum exteriori, ſi utramque modo memoratam ſpeciem exceperis, poſitus, in ſola cæca, ut videtur, deficientibus, ut tamen incola anomalæ a reliquarum omnium multum diſcrepet.*

Melano-leuca. 108. P. teſta ſtriata alternatim nigra albaque integerrima.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 56. 57.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 74. *n.* 142.
Habitat - - - teſta ¼-1 *pollicem longa, vertice nunc fuſceſcente nunc albo, limbo interdum cæruleſcente, fundo albo.*

Pectunculus. 109. P. teſta oblonga convexa ſtriis elevatis noduloſis exaſperata ſubdenticulata intus nitida: vertice antrorſum curvato.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 115. 116.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 75. *n.* 144.
γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 145.
δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 146.
ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 76. *n.* 147.
ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 77. *n.* 148.
η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 77. *n.* 149.
ϑ) *Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t.* 18. *f.* 7.
Habitat - - - teſta ¼-1 *pollicem longa, ſtriis nonnunquam alterne minoribus nodulis non raro in ſpinas abeuntibus, colore & pictura quam maxime varias; teſta nunc tota nigra, nunc exterius nigra intus alba vel flavicante nigro radiata, nunc cinerea, ſtriis modo aliquando & vertice & radiis interioris ſuperficiei flavæ nigris, nunc nigra ſtriarum interſtitiis, faſcia tranſverſa, & vertice flavicantibus, nunc ochroleuca intus exalbida maculis obſoletis fuſceſcentibus varia, ſtriarum nodulis dilute fuſcis, nunc lutea maculis ex atro cinereis varia, nunc albo fuſcoque varia intus ex cinereo flaveſcente, ſtriarum nodulis nigris.*

faſciata. 110. P. teſta ovata alba: faſcia fuſca, ſtriis elevatis acutis, margine dilatato crenato intus cinereo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 77. *n.* 150.
Habitat - - - teſta ultra ¾ *pollicis longa, fundo albo & fuſceſcente vario.*

elegans. 111. P. teſta decuſſatim ſtriata alba rubro radiata denticulata: vertice cano.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 78. *n.* 151.
Habitat - - - teſta 2 *pollices longa, ſtriis inæqualibus, tranſverſis ſubtilioribus, fundi macula ſpatulata eburnea.*

ſquamoſa. 112. P. teſta ſtriis elevatis extrorſum tranſverſim undulatis aſpera fuſca, verticem verſus argentea, vertice ipſo æneo adunco.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 81. *n.* 155.

β) Knorr Vergn. 6. t. 9. f. 1. 2.
γ) Schroet. n. Litterat. 3. p. 82. n. 157.
Habitat - - - teſta $3\frac{1}{2}$ pollicem longa, intus argentea, margine dilute fuſco albo maculato extrinſecus cinereo repando, coſtis circiter 38, vertice obtuſo.

ſqualida. 113. P. teſta integra fuſca intus exalbida: fundo fuſceſcente, margine cæruleſcente fuſco radiato, vertice nodoſo, ſtriis elevatis obſoletis.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 83. n. 158.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ pollicem longa.

crocea. 114. P. teſta lævi ſubangulata flava fuſco radiata; vertice obtuſo albo, fundi macula ſpatulata albida.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 83. n. 159.
Habitat - - - teſta pollicem fere longa.

candida. 115. P. teſta ovata lævi utrinque candida: cingulo externo roſeo.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 494. t. 6. f. 6.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{2}$ pollicem longa, vertice laterali.

trigona. 116. P. teſta compreſſa medio convexa cancellata alba: faſcia exterius & margine intus fuſceſcente, vertice marginali obtuſo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 84. f. 6.
Habitat - - - teſta ſolida $\frac{1}{2}$ pollicem longa.

minima. 117. P. teſta rotundata convexa tenui lævi exalbida ruſeſcente maculato: vertice obtuſiſſimo albo marginali.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 85. n. 162.
Habitat ad inſulam Feroë, *zoophytis adhærens, teſta $\frac{1}{4}$ pollicis longa, integerrima.*

tranquebarica. 118. P. teſta ovata tenui pellucida confertim tenuiſſime ſtriata ſpadicea, ſquamis albis varia, intus lactea, verticis litura cyanea, fundi fuſca.
Liſt. Conch. t. 530. f. 8.
Martin. Conch. 1. t. 12. f. 114.
Habitat Tranquebariæ.

perverſa. 119. P. teſta oblonga cornea tenerrima pellucida glaberrima: baſi ferruginea.
Adanſ. Seneg. 1. t. 2. f. 2. Liri.
Martin. Conch. 1. t. 12. f. 114. A. B.

Habitat in Africæ *littore, teſtæ mucrone incolæ poſteriora verſus recurvo.*

ternua. 120. P. teſta decuſſatim ſulcata pallide incarnata tenui: apertura oblonga.

Meuſch. Naturf. 18. *p.* 13. *t.* 2. *f.* 9. & 9. a.

Habitat - - -

ncurva. 121. P. teſta tota alba plana: verticis mucrone tortuoſo.

Meuſch. Naturf. 18. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 10. & 10. b.

Habitat - - -

interrupta. 170. P. teſta ovali depreſſa glabra ſubfuſca: punctis viridibus in radios obliquos interruptos digeſtis, vertice adunco obtuſo.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 490. *n.* 116.

β) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 490. *n.* 117.

Habitat - - - teſta vix pollicem longa hepatica, in β) *ſubfuſca, punctis quoque nigris interſitis, intus ſordide cinerea, in* β) *ſubolivacea margine acuto, fundo hepatica, in* β) *faſcia cana cincto.*

**** Integerrimæ, *abſque vertice mucronato.*

afra. 122. P. teſta conica præter verticem album obtuſum medium & marginem ſtriata vireſcente aut dilute fuſca intus alba.

Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 4. Gadin.

Gualt. teſt. t. 9. *f.* 10.

Habitat frequens in inſula Gorea Africæ.

luſitanica. 123. P. teſta conica alba præter verticem acutum annulo ſpadiceo cinctum radiata: radiis fuſcis ſtriis nigro granulatis exaratis.

Gualt. teſt. t. 8. *f.* N. & *t.* 9. *f.* A.

Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 35. a. b.

β) *Gualt. teſt. t.* 8. *f.* M.

Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 36. a. b.

γ) *Gualt. teſt. t.* 8. *f.* P.

Martin. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 43. a. b.

Habitat frequens ad maris luſitanici *ſcopulos; teſta minuta, fundo utrinque flavo maculato, in* β) *immaculato, cui etiam radii alternatim albi & ſpadicei.*

jamaicenſis. 124. P. teſta rotundata convexa griſea decuſſatim ſtriata: vertice acuminato medio lineis duodecim aurantiis radiatim picto, fundo corneo.

Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 37.
Habitat in Jamaica.

areolata. 125. P. teſta pyramidali ex griſeo rubella: ſtriis tenerrimis circularibus longitudinales decuſſantibus, vertice violaceo.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* A.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 41.
Habitat - - - magellanicæ affinis, at teſta magis depreſſa: baſi latiore, per ſtriarum decuſſationes in areas triangulares diviſa, ſtriis longitudinalibus 21.

flammea. 126. P. teſta ovata ſubtiliſſime annulatim ſtriata ex rubello cinerea: radiis undulatis fuſcis, vertice acuto centrali medio albo.
Argenv. Conch. t. 2. *f.* Q.
Martin. Conch. 1. *t.* 5. *f.* 42.
Habitat - - - fundi litura fuſca.

indica. 127. P. teſta ex rubello griſea radiatim ſtriata glabra altero latere anguſtiori: vertice acuto lævi, annulo rubello cincto.
Gualt. teſt. t. 8. *f.* E.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 49.
Habitat in India, *ruſticæ affinis*, $3\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

ſurinamenſis. 128. P. teſta craſſa ſubovata flavicante atro-radiata: ſtriis longitudinalibus inæqualibus, cingulis nodoſis, vertice obtuſo, lævi albo.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 50.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 127. *n.* 247-250.
Habitat frequens ad Surinam.

vitellina. 126. P. teſta ovata flava: baſi inæqualiter ſtriata, vertice obtuſo albido.
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 51.
Knorr. Vergn. 1. *t.* 20. *f.* 2.
Habitat - - -

ſanguinolenta. 130. P. teſta ovata convexa alba ſolida: ſtriis longitudinalibus elevatis capillaribus & flexuoſis interſperſis, vertice annulo lato rubro punctato cincto.
Liſt. Conch. t. 537. *f.* 18?
Martin. Conch. 1. *t.* 7. *f.* 52.
β) *Martin. Conch.* 1. *t.* 7. *f.* 53.
Habitat in Africa, *vertice laterali, fundo interdum flavicante.*

lævigata. 131. P. teſta ovata flava intus ex cæruleſcente alba: ſtriis complanatis alternatim craſſioribus & tenuioribus obliquis, vertice albo lævi nitido.
Martin. Conch. 1. t. 7. f. 54.
Habitat - - - fundi litura flavo fuſcoque varia.

punctulata. 132. P. teſta rotundata alba punctis multicoloribus conſperſa baſin verſus radiata annuliſque duobus fuſcis cincta.
Bonann. recr. & muſ. Kirch. 1. f. 7.
Martin. Conch. 1. t. 7. f. 55.
Habitat - - - vertice lineis nonnullis fuſcis cincto.

pellucida. 133. P. teſta integerrima obovata gibba pellucida: radiis quatuor cæruleis. *Stroem act. Nidr. 4. p. 98. Müll. zool. dan. 3. p. 37. t. 104. f. 1-4. prodr. 2862.*
Liſt. Conch. t. 543. f. 27.
an. angl. app. t. 2. f. 10.
Petiv. gaz. t. 75. f. 3.
Borl. Cornu. t. 28. f. 1.
Walch Naturf. 10. p. 82. t. 1. f. 7.
Martin. neueſt. Mannigf. 1. p. 410. t. 1. f. 12.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. f. 9.
Brit. zool. 4. t. 90. f. 150.
Knorr Vergn. 6. t. 28. f. 6.
da Coſta Conchol. t. 4. f. 4.
brit. Conchol. t. 1. f. 5. 6.
Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1620. 1621.
β) *Helbling Abh. boehm. Privatg. 4. t. 1. f. 8.*
Habitat in mari mediterraneo *&* ſeptentrionali, *lacuſtri affinis, nonne ad priorem ordinem referenda, teſta avellanæ utplurimum magnitudine, forma ovi in medio diſſecti, glaberrima, ex olivaceo cornea, radiis* 2, 4, 6, 8, 12 *punctorum cæruleorum.*

testudinaria. 134. P. teſta integerrima acuta lævi glaberrima. *Muſ. Lud. Ulr. 693. n. 420.* Stroem. act. Nidr. 4. p. 99. Müll. zool. dan. prodr. 2871.*
Argenv. Conch. t. 2. f. P. Clypeus teſtudinarius.
Liſt. Conch. t. 531. f. 9.
Bonann. muſ. Kirch. 1. f. 31.
Rumpf muſ. t. 40. f. A.
Gualt. teſt. t. 8. f. B.
Knorr Vergn. 1. t. 21. f. 1. & 3. t. 30. 5-7. f.
Walch Naturf. 8. p. 161. t. 4. f. 2. 3.

Martin. Conch. 1. *t.* 6. *f.* 45-48.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 88. *n.* 169-179.
Habitat in mari indico & norwegico, *innumera colorum & picturæ varietate, teſta utplurimum ferruginea radiis maculiſque ſpadiceis & luteis picta, ſtriis ſubtilibus longitudinalibus circulares tenerrimas decuſſantibus exarata intus argentea, alias teſta alba maculis quadratis fuſcis vel cinereis radios ſimulantibus picta, intus præter fundum fuſcum marginemque fuſco maculatum lactea.*

teſtudinalis. 135. P. teſta integerrima ovata ſtriata. *Müll. zool. dan. prodr.* 2872. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 385. *n.* 382.
Chemn. Conch. 10. *t.* 168. *f.* 1614. 1615.
Favann. Conch. 1. *t.* 1. *f.* Q. 2.
Kaemmer. Rudolſt. Conch. t. 2. *f.* 4. 5.
β) *Müll. zool. dan. prodr.* 2875. Patella teſta ovato-conica, apice prope centrum obtuſo.
Habitat vulgatiſſima inter fucos ad Groenlandiæ *littora, an diverſa a teſtudinaria ſpecies? teſta ad* 14 *lineas longa, antrorſum anguſtiori vireſcente, ſub violaceo vel albo maculis quadratis vel undulatis brunneis varia, intus candida, incolæ diſco pauci læte viridi, limbo albido, ceterum verme albo.*

compreſſa. 136. P. teſta integerrima ovali oblonga ſtriata lævi: dorſo compreſſa.
Liſt. Conch. t. 541. *f.* 25.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 21.
Knorr Vergn. 6. *t.* 28. *f.* 1.
Walch. Naturf. 8. *p.* 159. *t.* 4. *f.* 1.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 106.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 93-98. *n.* 180-191.
β) *Knorr Vergn.* 2. *t.* 26. *f.* 4.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 492. *n.* 122.
Habitat in India, *teſta ad* 4 *pollices longa, tenui, flava, ſpadicea, cinerea aut albida, interdum maculata, ſtriis planiuſculis latis, tranſverſis vix conſpicuis.*

ruſtica. 137. P. teſta integerrima conica: ſtriis quinquaginta obtuſis.
Muſ. Lud. Ulr. 694. *n.* 421.*
Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 428. *t.* 5. *f.* 4. *n. Litterat.* 3. *p.* 108. *n.* 208-211.
Habitat - - - teſta magna, non raro ultra 3½ *pollices longa, poſterius anguſtiori exalbida, interdum fuſceſcenti aut ſpadiceo faſciata, vertice margini poſteriori propiore.*

fuſca. 138. P. teſta integerrima ovata obtuſa: ſtriis elevatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 691. *n.* 422.*

Habitat - - - teſta ſubconica ex nigricante cinerea: ſtriis cinereis filiformibus circiter 39, *vertice ſubcentrali, ſubobtuſo, ſæpius faſcia cincto.*

notata. 139. P. teſta integra ſtriata: vertice ſubmucronato erecto; intus alba: macula atra cordata medio alba.

da Coſta Conchol. t. 5. *f.* 1.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 431. *t.* 5. *f.* 5. *n. Litterat.* 3. *p.* 124. *n.* 242-244.

Kaemmer. Rudolſt. p. 13. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 3. 7.

Chemn. Conch. 10. *p.* 324. *vign.* 25. *f.* C. D.

Habitat in mari mediterraneo, *teſta minuta tenui, ovali, ſæpius cinerea: ſtriis tenerrimis, elevatis, fuſcis vel nigris ſubtiliſſime granulatis, inæqualibus vertice annulo nigricante cincto, margine interno ſubtiliſſime crenato fuſco vel nigro maculato, fundi macula interdum ſpatulata.*

cruciata. 140. P. teſta integerrima ovali ſubconvexa fuſca cruce alba picta. *Muſ. Lud. Ulr.* 695. *n.* 423.*

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 432. *t.* 5. *f.* 6.

Habitat - - - teſta pollicem longa, $\frac{3}{4}$ *lata, retrorſum anguſtiori tenui lævi, intus lactea, fundo fuſco, vertice diſcolore.*

reticulata. 141. P. teſta integra conica compreſſa venoſo-reticulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 695. *n.* 424.*

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 433. *t.* 5. *f.* 7.

Habitat - - - teſta tota lactea, poſterius multo anguſtiori, ſtriis elevatis confertis ſeſe decuſſantibus, vertice ſubcentrali obtuſo.

deaurata. 142. P. teſta ovali integra quaſi deaurata intus argentea ſtriata: ſtriis ſubimbricatis, margine plicato-dentato.

Chemn. Conch. 10. *p.* 327. *t.* 168. *f.* 1616. a. b. Scutum deauratum.

Martyn Conchol. 2. *t.* 65? Lepas denticulata.

N. Danz. Abh. 1. *p.* 253. *t.* 3. *f.* 11. A. B.

Favann. Conchyl. 1. *t.* 1. *f.* D. 1. & *t.* 3. *f.* D. 3.

Habitat in freto magellanico & *ad inſulas* Falkland, *teſta radiis albis exterius picta, ſtriis ſatis craſſis vertice quaſi deaurato.*

ſtellifera. 143. P. teſta ovali integra ex atro fuſca ſtriata albo radiata intus argentea. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 329. *t.* 168. *f.* 1617.

N. Danz. Abh. 1. *p.* 262. *n.* 56?
Habitat ad inſulas amicas & novam Seelandiam, *teſta decuſſatim ſtriata, vertice fundoque albis.*

radians. 144. P. teſta integra ovali pellucida depreſſa ſtriata cornea maculis nigris radiata.
Chemn. Conch. 10. *p.* 329. *t.* 168. *f.* 1618. Patella radiata novæ Zeelandiæ.
Habitat ad terram ignis & novam Seelandiam, *teſta intus ſubargentea, verticis margine flavicante.*

Rota. 145. P. teſta ſubrotunda intus ſubargentea exterius ſtrigis rufeſcentibus, limbo flaveſcente. *Chemn. Conch.* 10. *p.* 330. *t.* 168. *f.* 1619.
Habitat in mari indico & americano.

umbellata. 146. P. teſta integra ſubrotunda diaphana integra depreſſa intus radiata flaveſcente: vertice luteo, margine acutiſſimo.
Muſ. Teſſin. p. 116. *t.* 6. *f.* 5.
da Coſta Conchol. p. 4. *t.* 1. *f.* 5. & *t.* 5. *f.* 5.
Favann. Conch. 1. *t.* 3. *f.* H.
Chemn. Conch. 10. *p.* 341. *t.* 169. *f.* 1645. 1646.
Davil. catal. raiſ. p. 78. *n.* 1. *t.* 2. *f.* A.
Habitat in Oceano indico, *teſta ad 4 pollices & 3 lineas longa, intus punctis elevatis aſpera, rarius margine denticulata.*

puſtulata. 147. P. teſta tenui ovali depreſſa radiata alba ſanguineo-punctata intus lævi. *Helbling. Abh. Privatg. in Boehm.* 4. *p.* 110. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat - - - teſta 6 lineas longa.

ſymmetrica. 148. P. teſta ovato-conica ſolida fuſca per lineas perpendiculares albas in areolas partita intus lævi alba: margine arcuatim exciſo. *Helbling. Abh. der boehm. Privatg.* 4. *p.* 111. *t.* 1. *f.* 13. 14.
Habitat - - - teſta 6 lineas longa, lineis diverſæ & triplicis quidem magnitudinis, vertice centrali, margine interno punctis albis fuſciſque alternis vario.

citrina. 149. P. teſta ovata convexa tenerrime decuſſatim ſtriata alba: faſciis duabus latis flavis, intus exalbida: fundo lacteo vertice ſubfuſco.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 12. *t.* 2. *f.* 6.
Habitat - - - teſta ſolida, 10 lineas ultra pollicem longa.

capenſis. 150. P. teſta ovali decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus fuſcis albiſque alternis, intus ſubmargaritacea: fundo albo,

Argenv. Conch. t. 1. f. O.

Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 13. t. 2. f. 1. 2.

Habitat ad Caput Bonæ Spei, *raro teſta 7 lineas ultra pollicem longa intus lævi, ſtriis fuſcis 9-11 latioribus intus violaceis, albis intus flavis.*

nomala. 151. P. teſta rudi fuſca orbiculari: vertice ſubmarginali.

Müll. zool. dan. 1. p. 14. t. 5. f. 1-7. prodr. 2870.

Habitat in fundo maris Norwegici, *ſaxis teſtaceiſque emortuis affixa & quaſi continua, utrum hujus, an diſtincti generis, teſta minuta, punctis elevatis ſubtiliſſimis aſpera, interdum cinerea, ſubtus cærulea, incola ex maſſis 2 rubellis, tenacibus, intortis, per totam longitudinem fimbriatis conflato, fimbriis ex pilis confertis, flavis, rigidis quaſi criſpatis compoſitis, tendine cæruleo cum reliquo corpore cohærentibus, ovariis ramoſis aurantiis: ovis globoſis.*

trata. 152. P. teſta ſubtiliſſime ſtriata punctis diverſi coloris varia: fundo obſcuro.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 2. 3.

n. Litterat. 3. p. 98. n 192-197.

Habitat - - - compreſſæ affinis, teſta $\frac{1}{2}$-1 fere pollicem longa, utplurimum cinerea, interdum florum perſici more tincta, aut hepatica, albo variegata, punctis crebrius viridibus, quam albis aut cæſiis, rarius ſparſis, quam in radios aut ſeries digeſtis, faſciis ſæpe cinguliſve 2-3 utplurimum obſcurioribus picta, nonnunquam decuſſatim ſtriata.

Mytilifor-153. P. teſta glaberrima plumbea: faſcia intus alba figura mis. ferri equini.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 494. t. 6. f. 5.

Habitat ad inſulam Feroë, *zoophytis adhærens teſta paulo ultra $\frac{1}{4}$ pollicis longa, mytilum mentiente, a dorſo ad verticem obſcuriori: fundo dilutiori.*

Scutifor- 154. P. teſta ovali tenui atra: ſtriis perpendicularibus commis. planatis albis.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 103. n. 199-201.

Habitat - - - teſta $\frac{1}{2}$-$\frac{1}{4}$ pollicis longa, intus exalbida, rarius ſpadicea, vertice utplurimum cano, fundi macula ſubfuſca.

Cochlear. 155. P. teſta alba planiuſcula: altera parte anguſta intus canaliculata callo cæruleſcente ferri equini forma notata, altera rotundata.

Knorr Vergn. 2. *t.* 26. *f.* 3.

β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 105. *n.* 204.

γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 106. *n.* 206.

δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 107. *n.* 207.

ε) *v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 3.

Habitat - - - teſta 1, $1\frac{1}{2}$-2 *pollices longa, utplurimum ſolida, interdum tranſverſim faſciata & ſtriata: ſtriarum interſtitiis ſpadiceis; margine ſæpius extrinſecus ſtriato.*

craticulata. 156. P. teſta tenui ovali depreſſa cancellata radiata.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 111. *n.* 216-220.

Habitat - - - teſta 1-$1\frac{3}{4}$ *pollicis longa, ſæpius cana, intus alba, radiis nunc ſpadiceis, nunc ex cinereo rubris, nunc ex luteo fuſcis, nunc ſanguineis, nunc alternis rubris & albis, faſciis interdum 2 tranſverſis obſcurioribus, vertice cano, cinereo, ochroleuco, albo, ſæpius rubro guttato fundo utplurimum candido.*

cruentata. 157. P. teſta ovali convexiuſcula rubro varia ſubdentata: ſtriis elevatis inæqualibus aſperis.

Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 113. *n.* 221-225.

Habitat - - - teſta 1-2 *pollices longa rarius cinerea, quam alba, maculis guttiſve interdum etiam albis, cinereis fuſcis intermiſtis, rarius in coronæ ſpeciem digeſtis, fundo & vertice albis, hujus limbo interdum nigro maculato aut cinereo.*

papyracea. 158. P. teſta depreſſa tenui hyalina rubro punctata extrorſum ſpadiceo radiata: ſtriis confertis tenuioribus & granulatis craſſioribus.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 487. *t.* 5. *f.* 12.

Habitat - - - vertice obtuſo, teſta 1 *pollicem longa.*

cylindrica. 159. P. teſta ovali plana confertim longitudinaliter ſtriata: ſtriis craſſitie inæqualibus omnibus granulatis.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 488. *t.* 5. *f.* 13.

β) *Schroet. Einl. in Conch. p.* 487. *n.* 108.

γ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 118. *n.* 229.

δ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 118. *n.* 230.

ε) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 119. *n.* 232.

ζ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 120. *n.* 134 ?

η) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 122. *n.* 237 ?

Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$-1 *pollicem longa, diametri ſæpe æqualis, nunc ſanguineo alboque varia intus alba fundo cinereo, vertice ſpadiceo; nunc maculis radiiſque roſeis; intus*

intus quoque albo rubroque varia : vertice albo , nunc alba punctis , maculis radiiſque rubellis varia , fundo & vertice lacteis , hoc corona fuſco maculata cincto , nunc albo confertim rubello punctata , vertice corona quaſi floribunda fuſca cincto , nunc lutea ſpadiceo maculata vertice fundoque flavicantibus.

decuſſata. 160. P. teſta ſubconvexa alba confertim rubro maculata intus albo rubroque radiata decuſſatim ſtriata : ſtriis glabris ; longitudinalibus nonnullis craſſioribus albis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 119. *n.* 231.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis fere longa , vertice obtuſo albo , fundi macula ſpatulata albida.*

hæmatoſticta. 191. P. teſta tenui depreſſa alba rubro punctata ; intus fuſceſcente maculata ſtriata : vertice cinereo fuſceſcente vario.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 486. *t.* 5. *f.* 11.
Habitat - - - teſta ultra $\frac{1}{4}$ *pollicis longa , fundi macula ex teſtaceo cinerea.*

aſteroides. 162. P. teſta planiuſcula cancellata cinerea : ſtella radiiſque marginem verſus ſpadiceis , vertice lævi cano punctis fuſcis circumſcripto.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 121. *n.* 235.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa , tenui : fundo teſtaceo.

ovalis. 163. P. teſta ovali convexiuſcula tenui confertim ſtriata cana : radiis maculiſque nigricantibus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 406. *t.* 5. *f.* 10.
Habitat - - - teſta ultra $\frac{1}{4}$ *pollicis longa : vertice obtuſo flavicante faſcia punctorum lacteorum cincto , fundo cinereo faſcia lactea cincto.*

rubella. 164. P. teſta convexiuſcula ſtriata rubella : vertice rubro maculato fundoque albidis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 122. *n.* 238. 239.
Habitat - - - teſta ultra $\frac{1}{2}$ *pollicem longa , nunc craſſiore , nunc tenuiore.*

ſpectabilis. 165. P. teſta planiuſcula ſubrugoſa ex rufeſcente alba ſtriata : faſcia verſus verticem ſpadicea , altera marginis interni badia.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 124. *n.* 241

Habitat - - - teſta 3 pollices longa, ſtriis circiter 18 majoribus, tenerioribus pluribus interjectis, vertice plano cinereo, fundi litura ſpatulata alba limbo cinereo, alteroque rubello notata.

conſpurcata. 166. P. teſta ſolida planiuſcula ſtriata nigra cinereo-punctata intus cæruleſcente: vertice ſordide luteo.

Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 497. n. 133.

Habitat - - - teſta ultra $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, altero latere anguſtiori, ſtriis complanatis, margine interno argenteo, fundi macula ovali hepatica faſcia alba ferri equini forma cincta.*

melanoſticta. 167. P. teſta ſolida planiuſcula ſtriata exalbida, cinereo radiata nigro punctata, intus cæruleſcente: vertice ſubacuminato albido.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. 9.

Habitat - - - conſpurcatæ affinis, at teſta minore ſubpellucida, punctis nigris in 5-6 cingula digeſtis, fundo ſqualido, faſcia cana ferri equini forma cincto.

atra. 168. P. teſta nigra ſtriata: vertice dilutiore, fundi litura ſubfuſca, faſcia alba articulata ferri equini forma cincta.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 251.

Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, vertice nunc albo, nunc fuſceſcente ſtramineoque vario, margine interno nunc cinereo, nunc cæruleo, fundi litura ſpatula nunc alba & fuſceſcente varia, nunc fuſca.*

ſpecularis. 169. P. teſta ovali convexa ſolida glaberrima hepatica intus & vertice fuſceſcente, hoc limbo albo faſciaque interrupta fuſceſcente cincto.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 129. n. 252.

Habitat - - - fundi macula faſcia cretacea ferri equini forma cincta.

caneſcens. 170. P. teſta ovali nigra intus cæruleſcente ſtriata: ſtriis majoribus conplanatis canis, verticis obtuſi, ſubfuſci area exalbida.

Schroet. n. Litterat. 3. p. 131. n. 255.

Habitat - - - teſta ultra 2 pollices longa, fundi litura ovali fuſceſcente, margine ſubcrenato.

vireſcens. 171. P. teſta oblonga planiuſcula utrinque dilatata ſtriata olivacea albo radiata maculataque intus cærulea.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 496. *t.* 6. *f.* 8.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, altero latere anguſtiore, ſtriis longitudinalibus æqualibus, paucioribus tranſverſis, vertice obtuſo macula ex hepatico lutea notato, fundi macula ſpatulata aurantia: limbo albido.*

pulla. 172. P. teſtâ rotundata convexa longitudinaliter ſtriata tranſverſim rugoſa ſuſceſcente intus pulla albido & fuſceſcente radiata: faſciis ſupra duabus lacteis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 132. *n.* 257.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, ſtriis inæqualibus, vertice ſubacuminato exalbido fundi macula albo fuſcoque varia.*

revoluta. 173. P. teſta ſubovali crenata ſtriata ochroleuca rubro maculata radiataque altero latere latiore: margine revoluto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 496. *t.* 6. *f.* 7.
Habitat - - - teſta pollicem longa, intus alba, ſtriis inæqualibus, majoribus complanatis, vertice ſtramineo.

ſquamata. 174. P. teſta ovata convexa albo nigroque varia ſtriata: ſtriis ſquamoſis, vertice ſubcentrali cano.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 492. *t.* 6. *f.* 4.
Habitat - - - teſta fere pollicem longa, latere anguſtiore nigro radiata, ſtriis longitudinalibus ſubtilibus confertis, fundo ex albo hepatico.

teſtacea. 175. P. teſta ovata ſubtiliſſime ſtriata teſtacea: annulis tribus tranſverſis ſuſceſcentibus, intus lutea: fundo albido.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 135. *n.* 261.
Habitat - - - teſta ultra $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, vertice obtuſo.*

capillaris. 176. P. teſta ovata tenui fuſca obſcurius faſciata dilutius ſtriata, intus ſubfuſca, vertice fundoque albis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 136. *n.* 262.
Habitat - - - teſta fere $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, ſtriis perpendicularibus tenerrimis.*

glauca. 177. P. teſta ovata altero latere anguſtiore ſubtiliſſime ſtriata cæruleſcente faſcia marginem verſus alba, alteraque cæruleſcente, vertice & margine albis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 136. *n.* 263.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ *pollicis fere longa perpendiculariter ſtriata intus alba faſcia ex luteo fuſca alteraque propiore alba fundum luteum cingente.*

obſcura. 178. P. teſta ovata planiuſcula ſtriata fuſco & luteſcente varia viridi punctata intus fuſca: vertice badio.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 137. n. 264.
Habitat - - - teſta vix ½ pollicem longa.

exoleta. 179. P. teſta ovali ſubconvexa inæqualiter ſtriata exalbida: lineis nonnullis dimidiatis nigris, fundi macula ſpatulata ochroleuca.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 493. n. 124.
Habitat - - - teſta parum ultra ¾ pollicis longa, intus nitida alba.

affinis. 180. P. teſta ovali planiuſcula ſolida: radiis quibuſdam nigris dimidiatis, fundi macula ſpatulata alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 138. n. 266.
Habitat - - - teſta ¾ pollicis longa.

fuſcata. 181. P. teſta ovata convexa ſubtiliſſime ſtriata fuſco varia.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 493. n. 126.
β) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 138. n. 267.*
γ) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 139 n. 269.*
Habitat - - - teſta nonnullas lineas-½ pollicem longa, maculis, punctis, faſciis atris, ſpadiceis vel fuſcis varia.

mellea. 182. P. teſta rotundata ſolida glaberrima mellea intus alba: vertice fuſceſcente, margine fuſco maculato intus argenteo, fundi litura ſpatulata hepatica.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 403. n. 125.
Habitat - - - teſta ultra ¾ pollicis longa.

anceps. 183. P. teſta ſolida glaberrima ſubacuminata dilutius ſpadicea, intus ex incarnato alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 139. n. 271.
Habitat - - - an hujus generis!

guineenſis. 184. P. teſta ovata convexa læviſſima altero latere latiore ſpadiceo, altero cum vertice luteo: margine utrinque incarnato.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 140. n. 272.
Habitat rara in Guinea, teſta ¼ fere pollicis longa.

complanata. 185. P. teſta depreſſo hæmiſphærica obſolete cancellata albo & fuſceſcente varia.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 141. n. 274.
Habitat - - - teſta minuta, vertice complanato, fundo fuſceſcente, margine altero latere albo.

virgata. 186. P. teſta ovata longitudinaliter ſtriata albida: vertice radiiſque fuſcis intus margaritacea.

v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. I. *p.* 443. *t.* 18. *f.* 10.
Habitat - - -

nivea. 287. P. teſta ſubconica ſolida glabra tranſverſim concentrice annulata nivea.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 32. *t.* 2. *f.* 3. Soron.
Habitat in Africa, *teſta diametri* 4 *circiter linearum, annulis* 7-8, *vertice rotundato.*

griſea. 188. P. teſta ovali confertim radiatimque ſulcata intus nitida vertice ſubcentrali.
Adanſ. Seneg. I. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in Africa, *teſta pollicem fere longa, recente utplurimum griſea aut ex viridi cinerea, interdum albida aut vinacea fuſco faſciata: ſulcis fuſcis fundo albido.*

Navicula. 189. P. teſta anguſta decuſſatim ſtriata roſea: cingulo calloſo in altero latere medio & fundo exalbidis, margine utrinque revoluto.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 6.
β) *Meuſch. Naturf.* 18. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat - - - *teſta pollicem circiter longa: margine acutiſſimo.*

cingulata. 190. P. teſta ſubovali ferruginea obſolete ſtriata: cingulis duobus elevatis obſcure faſciatis, vertice ſubcentrali.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 7.
Habitat - - - *teſtæ margine utrinque revoluto.*

Scapha. 192. P. teſta candidiſſima undulatim ſtriata anguſta: latere latiore callo acuto obſeſſa, anguſtiore repanda.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat - - - *teſta* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, vertice verſus latus anguſtius verſo.*

Huic tribui *adſcribendæ videntur teſtæ a* Liſtero *Conch. t.* 537. *f.* 19. 20. *a* Kleinio *oſtr. t.* 8. *f.* 2. *a* Rumphio *muſ. t.* 40. *f.* M. *a* Gualtieri *teſt. t.* 8. *f.* A. C. F. *t.* 9. *f.* B. D. & L. *ab* Argenville *zoomorph. t.* 1. *f.* 1-3. *a* Knorrio *Vergn.* 3. *t.* 9. *f.* 1. 2. 4. *t.* 29. *f.* 3. & *t.* 30. *f.* 5. 5. *t.* 19. *f.* 2. & 6. *t.* 28. *f.* 6. *t.* 30. *f.* 5. 6. & *t.* 33. *f.* 7. *depictæ, tertiæ autem tribui teſtæ a* Liſtero *Conch. t.* 542. *f.* 26. & *t.* 544. *f.* 29. *a* Kleinio *Oſtrac. t.* 8. *f.* 6. 7. & *a* Bonanni *muſ. Kircher.* 1. *f.* 29. *delineatæ.*

***** Perforatæ *vertice.*

Fiſſura. 192. P. teſta ovali ſtriato-reticulata : vertice recurvo, anterius fiſſa.
Müll. zool. dan. 1. *p.* 83. *t.* 24. *f.* 7-9. *rar.* 1. *p.* 51. *prodr.* 2864. Patella teſta ſulcato-reticulata, vertice recurvo, margine antice ſurſum fiſſo.
Klein oſtr. p. 116. Patella reticulata exigua alba, fiſſura notabili in margine.
Liſt. Conch. t. 543. *f.* 28.
Pet. gaz. t. 75. *f.* 2.
Act. Nidroſ. 4. *p.* 471.
Brit. zool. t. 90. *f.* 151.
da Coſta brit. zool. p. 11. *t.* 1. *f.* 4.
v. Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t. 18. *f.* 12.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 109. 110.
Habitat ad Angliæ, Norwegiæ, Barbariæ *littora, ſaxis, madreporæ quoque pertuſæ adhærens, inter tertiam & hanc tribum media, incola albo: oculis magnis nigris pallioque cinereo albo fimbriato, teſta conica ſolida flaveſcente, intus alba lævi.*

Fiſſurella. 193. P. teſta ſulcata : vertice recurvo, anterius perforata.
Fabr. Fn. groenl. p. 384. *n.* 381. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 82. *t.* 24. *f.* 4-6. *rar.* 1. *f.* 50. *prodr.* 2865.
Habitat ad Iſlandiæ *littora in fundo maris lapidibus adhærens, fiſſuræ affinis, at incola flavicante, teſta minore non reticulata, cana, intus lævi, vix ultra* $3\frac{1}{4}$ *lineas longa.*

Puſtula. 194. P. teſta ovali gibboſo-convexa ſtriato-reticulata : margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 3.
Klein oſtr. p. 116. *n.* 5.
Pet. gaz. t. 3. *f.* 12.
da Coſta Conchol. t. 7. *f.* 12.
Chemn. Conch. 10. *p.* 338. *t.* 168. *f.* 1632. 1633.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *t.* 5. *f.* 8.
β) *Martin Beſch. berl. Naturf.* 2. *t.* 12. *f.* 4. 5. Patella Unguis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 173. *t.* 1. *f.* 9.
γ) *Meuſch. Naturf.* 18. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *teſta alba, prope marginem poſteriorem perforata, ſtriis inæqualibus radiatim decurrentibus decuſſatis.*

græca. 195. P. teſta ovata convexa : margine introrſum crenulato.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 2. *f.* 7. Gival.

Liſt. Conch. t. 527. f. 1. 2.
Tournef. it. 1. t. 94.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. f. 6.
Gualt. teſt. t. 9. f. N.
Argenv. Conch. t. 2. f. I.
Klein oſtr. t. 8. f. 3.
Knorr Vergn. 1. t. 30. f. 3.
Regenſ. Conch. 1. t. 2. f. 23.
Martin. Conch. 1. t. 11. f. 98-101. 104.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 143. n. 276-279.
Habitat in mari mediterraneo & atlantico. *teſta antrorſum latiore alba, cinerea vel lutea, frequentius maculata, radiata aut variegata, ſtriis elevatis decuſſatis, in ſectionis angulis tuberculatis.*

nimboſa. 196. P. teſta ovata ſtriata rugoſa fuſca: vertice oblongo perforato. *Muſ. Lud. Ulr. 696. n. 425.**
Adanſ. Seneg. 1. t. 2. f. 6. Daſan.
Liſt. Conch. t. 528. f. 4.
Columm. aq. 11. 12. f. 3.
Ginann. adr. 2. t. 2. f. 19.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. f. 3.
Gualt. teſt. t. 9. f. P? Q. R. S. T.
Argenv. Conch. t. 2. f. C.
Martin. Conch. 1. t. 11. f. 91. 92.
Habitat in mari mediterraneo & atlantico, *teſta ad 2 pollices longa alba, griſea vel ſanguinea, interdum violaceo radiata & fundum verſus viridi nebuloſa, ſtriis ſubtilibus nunc ſquamoſis, nunc noduloſis.*

Nubecula. 197. P. teſta ſubovata rugoſa, alba rubro radiata: vertice ovato-perforato.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *nimboſæ affinis, at teſta minore: fundo fuſco.*

picta. 198. P. teſta ovata ſolida albo & vireſcenti nebuloſa: radiis obliquis undulatis alternis violaceis & albis.
Davil. Catal. t. 3. f. C.
Martin. Conch. 1. t. 11. f. 90.
Habitat in freto magellanico, *teſta* $3\frac{1}{2}$ *pollices longa, annulis 6 duplicibus circumſcripta, verticis foramine rotundo.*

barbadenſis. 199. P. teſta oblonga inæqualiter ſtriata, intus lævi lactea vireſcente faſciata, margine crenulato.
Liſt. Conch. t. 528. f. 7.

Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 93. 96. 97.
Habitat ad inſulam Barbados, *teſta nunc griſea, nunc ex luteo vireſcente crebro maculata aut radiata, ſtriis granulatis aut ſquamoſis, verticis foramine circulari annulo ſpadiceo cincta.*

Jamaicenſis. 200. P. teſta albida tranſverſim annulata: ſtriis longitudinalibus tuberculis foliaceis extrorſum majoribus *obſeſſis.*
Liſt. Conch. t. 528. *f.* 6.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 94.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 146. *n.* 282.
Habitat ad inſularum Jamaicæ & Barbados *littora, verticis foramine oblongo.*

caffra. 201. P. teſta ovata compreſſa ſtriata ſubtiliſſime annulata nigro radiata: margine dentato intus nigro, fundo lacteo, verticis foramine ſubcentrali.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 95.
Habitat rara ad Caput Bonæ Spei, *teſta cinerea aut alba nonunquam verticem verſus viridi.*

perforata. 202. P. teſta convexiuſcula tranſverſim rugoſa fuſceſcento ſtramineo-radiata maculataque: ſtriis longitudinalibus alternatim majoribus ſquamoſis.
Martin. Conch. 1. *t.* 11. *f.* 97.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, fuſceſcente intus alternatim albo vireſcente faſciata, vertice dilutiore annulo ſtramineo cincto, margine ſubdenticulato intus crenato, fundo rubeſcente.*

porphyrozonias. 203. P. teſta oblonga compreſſa inæqualiter ſtriata alba: cingulis quinque purpureis interruptis, intus ex albo vireſcente.
Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 102. 103.
β) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 155. *n.* 299.
Habitat rarior in America *ſeptentrionali, foramine verticis minuto orbiculari, intus circulo ſanguineo cincto.*

roſea. 204. P. teſta tenerrime ſtriata, radiis alternis roſeiſque picta, verticis foramine ovali.
Liſt. Conch. t. 529. *f.* 22.

Ad hanc tribum pertinent teſtæ a Liſtero *Conch. t.* 528. *f.* 5. *ab* Argenvillo *Conch. t.* 2. *f.* E. *a* Knorrio *Vergn.* 4. *t.* 29. *f.* 4. *depictæ.*

Martin. Conch. 1. *t.* 12. *f.* 105.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 166. *n.* 316. 317. 384.
Habitat - - - teſta minuta alba faſcia interdum tranſverſa roſea picta intus nonnunquam vireſcente, nunc oblonga compreſſa, nunc rotundata convexa: verticis foramine intus annulo rubro circumſcripto.

Scutellum. 205. P. teſta utrinque repanda compreſſa: verticis foramine ſulcis radiato.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 3.
β) *Meuſch. Naturf.* 18. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 2.
γ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 512. *t.* 6. *f.* 11.
δ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 512. *n.* 167.
ε) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 511. *n.* 165.
ζ) *Schroet. Einl. in Conch.* 2. *p.* 511. *n.* 164.
η) *Schroet. n. Litterat* 3. *p.* 172. *n.* 325.
θ) *Schroet. n. Litterat.* 3. *p.* 173. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat - - - teſta 1-1½ *pollicem fere longa, interdum cingulis magis minuſve elevatis notata, crebrius longitudinaliter ſtriata, aut ſulcata, ex flaveſcente exalbida radiis undulatis anguſtis violaceis, aut cineraſcentibus picta, vel dimidiato alba & cærulea, vel cinereo alboque varia, vel alba ſulcis rubris radiata, aut extrorſum radiis roſeis picta, vel cinerea, intus utplurimum alba.*

Avellana. 206. P. teſta tenera alba tenerrime ſtriata: verticis foramine oblongo per ligamentum interjectum bipartito.
Meuſch. Naturf. 18. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 4.
β) *Argenv. Conch. t.* 2. *f.* E?
Habitat - - - rariſſima, teſtæ margine utrinque ſubrevoluto.

ſpinoſa. 207. P. teſta ovata convexa alba: ſtriis elevatis extrorſum craſſioribus quadrifariam tuberculatis; tuberculis exterioribus ſpinoſis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 513. *t.* 6. *f.* 12.
Habitat - - - teſta intus exalbida, vertice roſeo: apertura oblonga, margine interno crenato.

denticulata. 208. P. teſta ovata gibba exalbida fuſco radiata, intus viridi: ſtriis elevatis ſubrugoſis alternatim majoribus, margine denticulato intus crenato.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 513. *n.* 169.
Habitat - - - teſta pollicem circiter longa, verticis foramine parallelogrammo, fundo albo.

nodulosa. 209. P. teſta ovata convexiuſcula intus alba : ſtriis elevatis nodulosis tranſverſas teneriores decuſſantibus, vertice nigro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 514. n. 170.
β) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 160. n. 306.*
Habitat - - - teſta interdum cineraſcente : ſtriis albis, intus nonnunquam cineraſcenti-radiata, margine repando.

anguſta. 210. P. teſta depreſſa alba : ſtriis elevatis; quaternis majoribus, verticis ſoramine anguſtiſſimo, faſcia ſpadicea intus viridi cincto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 514. t. 6. f. 13.
Habitat - - - teſta ¾ circiter pollicis longa.

inæqualis. 211. P. teſta ovata convexa decuſſatim ſtriata alba latere latiore ſubtriangula : verticis foramine annulo elevato linea rubra circumſcripta cincto.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 145. n. 172.
Habitat - - - teſta pollicem longa, margine intus faſcia vireſcente.

minuta. 212. P. teſta ovali-pyramidata rubella : ſtriis elevatis duodecim fundoque albis, verticis medii foramine ovali, margine denticulato.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 173.
Habitat - - - teſta dimidium pollicem longa.

conſperſa. 213. P. teſta ovata convexa ſtriata flavicante rubro punctata : radiis tribus obliquis, intus lævi alba.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 174.
Habitat - - - teſta vix ¾ pollicis longa, vertice ſubcentrali, foramine lineari, margine integro.

rubeſcens. 214. P. teſta ovali ſtriata rubella : faſcia media intuſque alba : margine integro, verticis foramine lineari.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 515. n. 175.
Habitat - - - teſta parum ultra ½ pollicis longa, tenui, margine lateris latioris repando, ceterum integro.

ſanguinea. 215. P. teſta ovali tenera ſanguinea intus ex albo vireſcente : ſtriis longitudinalibus ſubtiliores tranſverſas extrorſum rugoſas decuſſantibus.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 516. n. 176.

Ad hanc tribum ſpectant, an diſtinctæ ſpecies? teſtæ a Liſtero *Conch. t.* 528. *f.* 5. *&* a Knorrio *Vergn.* 4. *t.* 29. *f.* 4. *depictæ.*

Habitat - - - teſta vix ½ pollicem longa, anguſta: margine integro, fundo rubello.

ventricoſa. 216. P. teſta ovali ventricoſa ſtriis decuſſatis rubris exarata, intus alba: verticis depreſſi foramine orbiculari, margine integro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 516. t. 6. f. 14.
Habitat - - - teſta fere pollicem longa.

triradiata. 217. P. teſta ovali planiuſcula ſtriata alba: radiis tribus fuſcis intus exalbida: verticis foramine lineari, margine integro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 517. t. 6. f. 15.
Habitat - - - teſta parum ultra ½ pollicem longa, vertice ſubcentrali.

tenuis. 218. P. teſta ovali convexiuſcula pellucida longitudinaliter ſtriata alba: radiis quinque dimidiato fuſcis, intus flavicante.
Schroet. Einl. in Conch. 2. p. 517. n. 179.
Habitat - - - teſta parum ultra ¼ pollicis longa, verticis foramine ambitu cinereo intus punctato.

melanozonias. 219. P. teſta convexa roſea: faſcia interrupta nigra ſtriiſque elevatis inæqualibus albis, intus alba lævi, margine denticulato.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 148. n. 286.
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, ſtriis majoribus ſquamoſis, vertice acuminato: foramine orbiculari, intus annulo elevato cineraſcente cincto.

effuſa. 220. P. teſta convexa roſea: ſtriis elevatis noduloſis alternatim majoribus albis, intus alba lævi, verticis foramine orbiculari amplo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 149. n. 287.
β) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 149. n. 288.*
γ) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 150. n. 289.*
Habitat - - - teſta 1¼ pollicis longa, margine ſubcrenato intus vireſcente.

punicea. 221. P. teſta convexa ſpadicea inæqualiter confertim & decuſſatim ſtriata, intus lævi faſciis alternis viridibus albiſque picta, verticis foramine orbiculari.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 150. n. 290.
β) *Schroet. n. Litterat. 3. p. 151. n. 291.*
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa, verticis foramine annulo ſpadiceo, intus albo elevato cincta, margine integro.

rufeſcens. 222. P. teſta convexa alba rubello obumbrata, hinc inde rubro ſtriata, ſtriis granulatis exarata, intus lævi alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 151. n. 292.
Habitat - - - margine integro tranſverſim ſtriato, verticis foramine ovali.

dimidiata. 223. P. teſta convexa ſupra candidiſſima cancellata, marginem verſus longitudinaliter ſtriata: faſcia roſea.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 152. n. 293.
Habitat - - - teſta pollicem longa, intus lævi alba, margine ſubintegro, verticis foramine orbiculari.

lactea. 224. P. teſta convexa alba, ſtriis inæqualibus acutis glabris exarata, intus lævi: vertice roſeo; foramine amplo orbiculari.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 152. n. 294.
Habitat - - - teſta ultra pollicem longa.

pyramidalis. 225. P. teſta convexa roſea ſtriatà: coſtis duodecim lævibus, intus lævi ex vireſcente alba.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 153. n. 295.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis fere longa.

bicolor. 226. P. teſta anguſta altenatim ſpadiceo alboque radiata; ſtriis inæqualibus craſſis denſe lamellatis, intus lævi alba, margine crenulato.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 155. n. 296.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, margine inflexo, verticis foramine oblongo.

erythrocephala. 227. P. teſta convexa alba exterius rubro lineata: ſtriis elevatis rugoſis contrariis: decem majoribus margine repando inflexo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 154. n. 297.
Habitat - - - teſta $1\frac{1}{4}$ pollicis longa, vertice rubello.

verrucoſa. 228. P. teſta ſupra fuſca ſtriata cingulo nodoſo terminata, infra rubro radiata, coſtis acutis noduloſis inæquali, margine denticulato repando.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 156. n. 300.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{4}$ pollicis longa convexiuſcula, intus lævi ex albo vireſcente, verticis foramine orbiculato.

contaminata. 229. P. teſta convexa coſtis noduloſis inæqualibus, majoribus ex luteo fuſcis aſpera, guttis atris in circulos interruptos digeſtis picta, intus ex vireſcente alba: vertice cinereo.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 156. t. 1. f. 7.

Habitat - - - margine teſtæ repando, intus integro gramineo, verticis foramine intus annulo elevato gramineo, alteroque circulo fuſco cincto.

atrata. 230. P. teſta convexiuſcula anguſta alba rubello lineata, extrorſum nigro maculata: ſtriis elevatis convexis inæqualibus: verticis foramine oblongo; ambitu ſpadiceo.
Schroet. n. Litterat. 3. 158. *n.* 103.
Habitat - - - teſta $\frac{3}{4}$ *fere pollicis longa, margine crenato, verticis foramen intus ambiente, annulo rubello.*

candicans. 231. P. teſta alba verſus marginem repandum ſpadicea: coſtis viginti alternatim majoribus, verticis rubelli foramine oblongo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 158. *n.* 304.
Habitat - - - teſta ultra $\frac{1}{4}$ *pollicis longa.*

ſuccincta. 232. P. teſta ovato-acuminata alba ſupra lævi cingulo medio elevato, verſus marginem denticulatum ferrugineo punctatum ſtriis elevatis inæqualibus lævibus.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 160. *n.* 307.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{4}$ *pollicis longa, verticis foramine anguſto orbiculato.*

puſilla. 233. P. teſta planiuſcula alba ſuborbiculata: ſtriis elevatis viginti: alternatim minoribus brevioribus, verticis foramine rotundo utrinque circulo rubello cincto.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 161. *n.* 308.
Habitat - - - teſta $\frac{1}{2}$ *pollicem longa lataque.*

flaveſcens. 234. P. teſta tenuiſſima effuſa acuminata ſubtiliter ſtriata flavicante: radiis ſex fuſcis margine denticulato, verticis cinerei foramine oblongo.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 165. *n.* 315.
Habitat - - - teſtæ longitudine $\frac{1}{2}$ *pollicem non aſſequente.*

antiquata. 235. P. teſta convexiuſcula, obſolete ſtriata alba: exterius radiis ſanguineis ſtriatis, verticis foramine oblongo inæquali.
Schroet. n. Litterat. 3. p. 167. *f.* 319.
Habitat - - - teſta pollicem longa, margine integro.

galeata. 236. P. teſta ſolida ovata compreſſa intus alba; verticis ſubrecurvi obtuſi foramine lineari, margine crenato.
Helbling. Abh. der boehm. Privatg. 4. *p.* 103. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Habitat - - - teſta 6 lineas longa ſtriata: margine intus ochroleuco.

perſonata. 237. P. teſta convexa decuſſatim lineata : radiis atris *Martyn univ. Conch.* 2. *t.* 64.
Habitat ad inſulas Falkland.

332. DENTALIUM. *Animal.* Terebella.

Teſta univalvis; tubuloſa; recta, monothalamia, utraque extremitate pervia.

elephantinum. 1. D. teſta decemangulata ſubarcuata ſtriata. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 426.*
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 1. Denticulus elephanti.
Argenv. Conch. t. 3. *f.* H. Dentalis.
zoomorph. t. 1. *f.* H.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 1.
Pet. amb. t. 16. *f.* 33.
gaz. t. 13. *f.* 9.
Bonann. recr. & muſ Kircher. 1. *f.* 8.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* 1.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 1.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 3.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. p. 430. *vign.*
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5. A.
β) *Argenv. Conch. t.* 3. *f.* I.
Habitat in mari indico, ſiculo *aliiſque* europæis, *teſta ad 4 fere pollices longa viridi, obſcurius externe annulata, apice alba, intus lævi.*

aprinum. 2. D. teſta decemangulata ſubarcuata lævi.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. B.
Habitat in mari indico, *nonne varietas elephantini? teſta alba, profundius ſulcata, ut plurimum anguſtiori, inter angulos, interdum 8-12, aut læviſſima, aut ſubtiliſſime ſtriata.*

Dentalis. 3. D. teſta viginti ſtriata ſubarcuata interrupta.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 6.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 13.
Habitat rarum in mari mediterraneo, *teſta aut tota; aut apice acuminato rubro.*

Entalis. 4. D. teſta tereti ſubarcuata continua lævi. *Fn. ſuec.* 2201. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 427.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2852.

Argenv. Conch. t. 3. *f.* K. & *t.* 29. *f.* 2. Antalis.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 2. & *t.* 1056. *f.* 4.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. *f.* 9.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* E.
Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 2.
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat ad Indiæ, Perſiæ, Europæ littora, *teſta ad* $1\frac{a}{2}$ *pollicem longa, alba, apice interdum rubella aut flavicante, nunc ſolidiore, nunc tenuiore, nunc anguſtiore, nunc ampliore, nunc acuminata, nunc obtuſa, quaſi polita; ſtriis tamen interdum nudo oculo vix conſpicuis exarata.*

arietinum. 5. D. teſta tereti arcuata continua lævi. *Müll. zool. dan. prodr.* 2853.
Habitat ad Scandinaviæ *littora, Entali proxime affine, teſta tamen magis arcuata octuplo minori.*

corneum. 6. D. teſta tereti ſubarcuata interrupta opaca.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 523. *t.* 6. *f.* 16.
Habitat rarum in Oceano africano, *Entàli affine, teſta ad* $1\frac{1}{4}$ *pollicis longa, lævi, cornea, aut ex luteo fuſca, apice obtuſa, rotundata.*

politum. 7. D. teſta tereti ſubarcuata continua: ſtriis annularibus confertiſſimis.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 5.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* F.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. A.
Habitat rarum in mari indico & ſiculo, *Entali affine, teſta* $1\frac{1}{2}$ *pollicem longa, polita, valde acuminata, lactea, rarius roſea: ſtriis annularibus albis aut viridibus.*

eburneum. 8. D. teſta tereti ſubarcuata continua: annulis remotis.
Habitat in India, *Entali ſimillimum, teſta candidiſſima læviſſima, nitida, ſtriis annularibus convexis numeroſis.*

minutum. 9. D. teſta tereti erectiuſcula lævi minuta.
Planc. Conch. t. 2. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, *at tam exile, ut niſi armatis oculis diſcerni non poſſit, ſetam potius aut echini aculeum referens.*

faſciatum. 10. D. teſta ſubtiliſſime ſtriata ſubarcuata griſea obſcurius faſciata.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 3. B.

Habitat in mari ſiculo, *teſta minuta ſolida, pennæ corvinæ craſſitie, faſciis 4-5 obſcure cinereis aut fuſcis.*

nebuloſum. 11. D. teſta arcuata læviſſima alba fulvo maculata nebuloſaque.
Habitat in mari ſiculo, *faſciato affine, at teſta magis arcuata, longiore & tenuiore.*

rectum. 12. D. teſta recta duplicato ſtriata annulata.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* H.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 4. A.
Schroet. Einl. in Verſt. t. 3. *f.* 5.
Habitat --- elephantino ſimile, at teſta minus acuta: apertura ampliore magis obtuſa, præter longitudinales rarius: triplicatas, annularibus quoque exarata, ex albo vireſcente annulis viridibus varia, aut alba, aut teſtacea.

ſtriatulum. 13. D. teſta octangulata octoſtriata acuminata viridi, apice alba.
Liſt. Conch. t. 547. *f.* 1. b.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 5. B.
Habitat rarius in mari ſiculo, *elephantino affine, at teſta longiore, anguſtiore, apertura altera angulata, altera anguſtiſſima orbiculata.*

foſſile. 14. D. teſta ſubtereti obtuſiuſcula ſtriata: ſtriis ſubtilibus æqualibus.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 3. *f.* 7.
Habitat --- hactenus modo foſſile prope Loretto *in Italia repertum, ſtriatulo affine, at teſta non angulata, minus acuminata, amplius aperta.*

annulatum. 15. D. teſta tereti oblique ſtriata.
Guettard mineral. Beluſtig. 4. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat --- hactenus modo foſſile repertum.

arcuatum. 16. D. teſta angulata arcuata ſubulata unicolore.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* G.
Habitat --- teſta vireſcente.

pellucidum. 17. D. teſta cornea flexili rectiuſcula terete lævi.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 529. *t.* 6. *f.* 17.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *teſta dilute mellea, anguſtiſſima, tenui, ad* $2\frac{1}{4}$ *pollicis longa, cum acidis non efferveſcente.*

Radula. 18. D. teſta ſubarcuata obtuſiuſcula decuſſatim ſtriata: ſtriis longitudinalibus granulatis.
Schroet.

Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 530. *n.* 9.
Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *inventum : teſta ad pollicem longa.*

interruptum. 19. D. teſta decuſſatim ſtriata : ſtriis omnibus lævibus ; longitudinalibus ſubtilioribus interruptis.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 530. *n.* 10.
Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *inventum.*

vitreum. 20. D. teſta hyalina glaberrima ſubarcuata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 531. *n.* 11.
Habitat - - - hactenus modo foſſile in Pedemontio *repertum, teſta ſolida,* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa, diametri* $\frac{1}{4}$ *pollicis, apicem verſus ſenſim decreſcentis.*

ſexangulum. 21. D. teſta ſexangulata ſtriata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 531. *n.* 12.
Habitat - - - hactenus modo foſſile prope Loretto *in* Italia *deprehenſum.*

333. SERPULA. *Animal* Terebella.

Teſta univalvis, tubuloſa, adhærens, (ſæpe iſthmis integris paſſim intercepta.)

nautiloides. 1. S. teſta planiuſcula minuta confluente verrucoſa ſpirali iſthmis intercepta : ſeptis ſemilunaribus tenerrimis.
Schroet. n. Litterat. 3. *p.* 283. *t.* 3. *f.* 22. 33.
Habitat in mari norwegico, *madreporæ proliferæ adhærens, teſta utplurimum ſeminis milii magnitudine, ut tamen interdum diameter* $\frac{1}{4}$ *pollicis æquet, fuſceſcente aut alba, figuræ inconſtantis, nunc magis oblonga, nunc magis orbiculari, ſeptis parallelis, apertura anguſtiſſima.*

ſeminulum. 2. S. teſta regulari ovali libera glabra. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 376. *n.* 370.
Gualt. teſt. t. X. *f.* S.
Planc. Conch. t. 2. *f.* 1?
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 22. a. b.
Habitat in mari adriatico & rubro *foſſilis in ſtrato conchaceo prope* Caſſellas *frequens, grani arenæ magnitudine;*

teſta alba vel flavicante, anfractibus ſibi appreſſis, apertura anguſta, compreſſa.

planorbis. 3. S. teſta orbiculata regulari plana æquali. *Fn. ſuec.* 2102.

Habitat in cónchis *pelagicis, teſta primo intuitu ſquamulam orbiculatam ante adnatam referente, ſpirarum rudimento externo nullo, et fracta horizontaliter diſcedente, intuſque oſtendente ſpiram peregrinæ teſtæ, cui inſidebat, inſculptam, tanquam circulos concentricos.*

Spirillum. 4. S. teſta regulari ſpirali orbiculata pellucida: anfractibus teretibus ſenſimque minoribus. *Fn. ſuec.* 2203. *Müll. zool. dan. prodr.* 2854. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 376. *n.* 371.

Planc. Conch. t. 1. *f.* 8.

Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 7.

Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 20. C. D.

Pallas nov. act. Petrop. 2. *p.* 236. *t.* 5. *f.* 21. *(animal)*

Habitat in Oceano, & mari mediterraneo, *ſertulariis aliiſque zoophytis, teſtaceis quoque inſidens, at teſta triplo minori, ſubtus & anfractuum latere centrum reſpiciente ſulcis oculo nudo non uſurpandis inæquali.*

Spirorbis. 5. S. teſta regulari ſpirali orbiculata: anfractibus ſupra introrſum ſubcanaliculatis ſenſimque minoribus. *Fn. ſuec.* 2204. *It. wgoth. t.* 170. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 8. *t.* 86. *f.* 1-6. *prodr.* 2855. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 377. *n.* 372.

Liſt. Conch. t. 553. *f.* 5.

Petiv. gaz. t. 35. *f.* 8.

Gualt. teſt. t. 10. *f.* O.

Ginann. adr. 2. *t.* 1. *f.* 8.

Klein tubul. t. 1. *f.* 8.

Baſter op. ſubſec. 1. *p.* 79. *t.* 9. *f.* 3.

Planc. Conch. 18. *n.* 3.

Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 21. A. B. & *f.* 21. O.

β) *Chemn. Conch.* 9. *t.* 116. *f.* 999.

Habitat in Oceani, *potiſſimum ſeptentrionalis, & pelagi fucis, zoophytis, teſta variæ magnitudinis, apertura fere circulari: limbo albo.*

triquetra. 6. S. teſta repente flexuoſa triquetra. *Fn. ſuec.* 2206.* *Muſ. Lud. Ulr.* 698. *n.* 428.* *It. wgoth.* 170. *Müll. zool. dan. prodr.* 2856. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 379. *n.* 374.

Gualt. teſt. t. 10. *f.* P.

Ephem. Ac. Nat. Curioſ. 1727. *p.* 315. *t.* 10.

Baſter. opuſc. ſubſ. 1. *t.* 9. *f.* 2. A. B. C.

Stroem. act. Nidroſ. 4. *p.* 53. *t.* 2. *f.* 14.
act. Havn. 10. *p.* 17. *t.* 6. *f.* 1-5.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 14.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 25.
Habitat in Oceano, mari *etiam* caſpio, *teſtaceis, fucis, lapidibus, navibus inſidens, teſta alba, pellucida; figuræ variabilis,* ½ ¼ *pollicis longa, non raro longiore, dorſo carinati, interdum denticulato, apertura anguſta circulari.*

ntricata. 7. S. teſta filiformi ſcabra tereti flexuoſa.
Guettard. mineral. Beluſt. 3. *t.* 6. *f.* 12. 13.
Habitat in mari mediterraneo, atlantico, indico, *pinnis aliiſque teſtaceis inſidens, teſta ex cineraſcente alba ſubrugoſa, oculo armato rudi & valde ſcabra, fili tenuioris inſtar flexa.*

filograna. 8. S. teſtis capillaribus faſciculatis ramoſo glomeratis cancellatiſque.
Raj. hiſt. 1. *p.* 65. Reticulatum tophaceum.
Bocc. muſ. 228. *t.* 2. *f.* 13. & *t.* 7. *f.* 2. Rete marinum.
Act. petrop. 7. *p.* 374. *t.* 16. *f.* 3. Tubipora.
Planc. Conch. add. ad p. 18. Tubularia filograna.
Pallas elench. zooph. p. 239. Serpula corallifica.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 8.
Guettard mineral. Beluſt. 4. *t.* 6. *f.* 14.
Schroet. Einl. in Verſt. 4. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat rara in mari mediterraneo, *teſta ad* 4 *pollices longa; ſingulis teretibus utrinque lævibus.*

granulata. 9. S. teſta tereti ſpirali glomerata: latere ſuperiore ſulcis tribus elevatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2857. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 380. *n.* 375.
Habitat in Oceano ſeptentrionali, *gregaria, lapidibus & teſtaceis adhærens, teſta alba, ſeminis coriandri magnitudine, ſubumbilicata.*

contortuplicata. 10. S. teſta ſemitereti rugoſa glomerata carinata. *Fn. ſuec.* 2205. *Muſ. Lud. Ulr.* 698. *n.* 429.* *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 381. *n.* 376.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. *f.* 20. G.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* B. C. D.
zoomorph. t. 1. *f.* L.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 24. A.
β) *Argenv. Conch. t.* 4. *f.* E.

Habitat frequens in mari adriatico & americano, *teſta alba, cinerea, aut ex luteo fuſca intus lævi, calami ſcriptorii craſſitiem interdum aſſequente, tranſverſim ſtriata, 3, 4 & plures pollices longa.*

glomerata. 11. S. teſta tereti decuſſato-rugoſa glomerata. *Fn. ſuec.* 2207. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 430.* *Müll. zool. dan. prodr.* 2858. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 381. *n.* 377.
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 2. Liſpe.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. *f.* 20. E.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* T.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* G.
Martin. Conch. 1. *t.* 3. *f.* 23.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali*, mari ſiculo, atlantico, caſpico, *teſta alba, fuſceſcente, cinerea, fuſca vel alba, intus lævi, ad* 23 *uſque libras interdum pondere æquante.*

lumbricalis. 12. S. teſta tereti flexuoſa: apice ſpirali acuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 699. *n.* 431.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 1. Vermet.
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 1.
Bonann. muſ. Kircher. 1. *f.* 20. M.
Rumpf. muſ. t. 41. *f.* 1.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* Q. V.
Ginann. adr. 2. *t.* 2. *f.* 14.
Argenv. Conch. t. 4. *f.* I.
Knorr Vergn. 2. *t.* 13. *f.* 1. & 4. *t.* 17. *f.* 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 12. B. & *t.* 3. *f.* 24. B.
β) *Bonann. recr. & muſ. Kircher.* 1. *f.* 20. A?
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 15.
γ) *Bonann. recr. & muſ. Kirch.* 1. *f.* 20. C?
Knorr Vergn. 1. *t.* 29. *f.* 5?
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 16?
Habitat rarior in mari adriatico, atlantico, indico, *ut plurimum gregaria, teſta tranſverſim coſtata, longitudinaliter rugoſa,* 3-4, *& plures pollices longa; an hujus generis? certe incola differre videtur.*

polythalamia. 13. S. teſta tereti diaphana lævi rectiuſcula polythalamia. *Rumpf muſ. t.* 41. *f.* D. E. Solen arenarius.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat rarior in mari mediterraneo & indico, *in arena latens, teſta exterius alba, tranſverſim rugoſa & annulata,*

finem latiorem verſus ſordidula, intus ſeptis tranſverſis hinc convexis inde concavis non perforatis diſtincta, ex pluribus quaſi coalitis tubulis conſlata.

arenaria. 14. S. teſta articulata integra diſtincta ſubtus planiuſcula. *Muſ. Lud. Ulr.* 700. *n.* 432.*
Adanſ. Seneg. 1. *t.* 11. *f.* 5. Muſier.
Bonann. recr. & muſ. Kircher. 1. *f.* 20. B.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* L. N.
Argenv. Conch. t. 4. *f* H.
Martin. Conch. t. 3. *f.* 19. A. B. C.
β) *Rumpf muſ. t.* 41. *f.* L?
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 10?
Habitat rara in mari Indiam *& occidentalem* Africam *alluente, teſta alba radiis undulatis dilute fuſcis picta, aut exalbida intus lævi, exterius cancellata: ſtriis interdum nodulaſis, circa centrum ſpiraliter contorta: an potius teredinis ſpecies?*

anguina. 15. S. teſta teretiuſcula ſubſpirali: fiſſura longitudinali ſubarticulata. *Muſ. Lud. Ulr.* 701. *n.* 433.*
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 2.
Bonann. recr. & muſ. Kircher 1. *f.* 20. F?
Rumpf muſ. t. 41. *f.* H. & 2.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* Z.
Guettard. miner. Beluſt. 4. *t.* 5. *f.* 36.
v. Born muſ. Caeſ. Vind. teſt. t. 18. *f.* 15.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 13. A. B. C. & *f.* 14.
β) *Liſt. Conch. t.* 1056. *f.* 3?
Klein tub. t. 1. *f.* 3?
Seb. muſ. 3. *t.* 94?
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 11?
γ) *Born muſ. Caeſ. Vindob. teſt. t.* 18. *f.* 16. Serpula muricata.
Habitat rarior in mari indico, *teſta polymorpha, nunc tereti, nunc angulata, nunc porrecta, nunc magis minuſve flexuoſa, nunc glabra, nunc ſcabra, fiſſuræ articulis interdum obſoletis; an hujus generis?*

vermicularis. 16. S. teſta tereti ſubulata curvata rugoſa. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 9. *t.* 86. *f.* 7-9.
Ellis corall. t. 38. *f.* 2. Turbus vermicularis.
Klein tubul. t. 1. *f.* 1?
Habitat in Oceano Europæo; *animalis inhabitantis proboſcide interiori efundo exterioris pro lubitu exſerenda, lichenem pyxidatum referente.* Skene.

Penis. 17. S. teſta tereti recta extremitate radiata : diſco poris cylindricis. *Muſ. Lud. Ulr.* 702. *n.* 434.*
Argenv. Conch. t. 3. *f.* G. Penicillus marinus.
Liſt. Conch. t. 548. *f.* 3.
Bonann. muſ. Kirch. 1. *f.* 38.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 7.
Valent. Abh. t. 10. *f.* 87.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* M.
Knorr Vergn. 4. *t.* 28. *f.* 1. & 6. *t.* 40. *f.* 1.
Muſ. Leeſſ. p. 3. *n.* 4. *f.* 1.
Muſ. Gronov. p. 136. *n.* 1447.
Mazéas act. pariſ. extrans. 9. *p.* 299. *t.* 1-3. & *p.* 317. *t.* 1. 2.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 7.
Beſch. berl. Naturf. 2. *t.* 11. *f.* 1-5.
Habitat pretioſa in mari indico., *teſta alba, aut cinerascente rubro obumbrata, læviuſcula, ſenſim attenuata, fine tenuiori aperta, ad* 6 *pollices longa, ſine convexo; nonne potius ad teredinem releganda?*

echinata. 18. S. teſta teretiuſcula flexuoſa roſea multifariam aculeata fine obtuſa.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* R.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 8.
Habitat. – – – *teſta pennæ corvinæ craſſitie, apertura marginata.*

Ocrea. 19. S. teſta teretiuſcula ſtriata fuſca.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* K.
Martin. Conch. 1. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in mari indico, *coralliis affixa.*

protenſa. 20. S. teſta nitida læviuſcula annulatim plicata finem verſus parum attenuata.
Rumpf muſ. t. 41. *f.* 3.
Martin. Conch. 1. *t.* 2. *f.* 12. A.
Habitat in mari indico & Americam *alluente, lactea, exalbida aut cæruleſcente, calami anſerini craſſitie aut tenuiori, tota porrecta, aut partim flexuoſa.*

Huic generi adnumerandæ videntur teſtaceæ a Bonanni *recr.* & *muſ. Kircher.* 1. *f.* 20. D *a* Gualtieri *teſt. t.* 10. *f.* W. & X. ab Argenville *Conch. t.* 4. *f.* F. *a* Seba *muſ.* 3. *t.* 9?. *f.* 3. 4. 6-9 *a* Knorr *Vergn.* 5. *t.* 22. *f.* 1. & *a* Guettard *mineral. Beluſtig.* 4. *p.* 306. *t.* 5. *f.* 37. *depictæ.*

decuſſata. 21. S. teſta tereti decuſſatim ſtriata ſubrugoſa flexuoſa ſanguinea, intus lævi alba.
Liſt. Conch. t. 547. f. 4.
Martin. Conch. I. *t.* 2. *f.* 17.
Habitat - - -

proboſcidea. 22. S. teſta lævi alba: latiori parte recta tranſverſim plicata.
Martin. Conch. I. *t.* 2. *f.* 18. B.
β) *Martin. Conch.* I. *t.* 2. *f.* 18. A.
Habitat - - - *teſta diametri ad finem latiorem vix* ½ *pollicem ſuperantis*, 4, *in* β) 2 *pollices longa, in hac extrinſecus quaſi infumata.*

afra. 23. S. teſta ſubſtriata ex luteo fuſca in tres anfractus contorta, terete: apice centrali.
Adanſ. Seneg. I. *t.* 11. *f.* A. B. Datin.
Martin. Conch. I. *t.* 3. *f.* 20. A. B.
Habitat ad inſulam Goream.

Cereolus. 24. S. teſta tereti lævi flavicante multoties contorta.
Davil. catal. raiſ. I. *t.* 4. *f.* E.
Martin. Conch. I. *t.* 3. *f.* 20. E.
Habitat ad Americæ littora, *teſta longa, anguſta ſupra 11es, ad latera 5ies contorta.*

Cornu copiæ. 25. S. teſta conica turrita flavicante fuſco faſciata bruſca; medium torta terete: apertura orbiculata.
v. Born. muſ. Caeſ. Vindob. teſt. vign. p. 163. & *t.* 13. *f.* 10. *ind.* I. *p.* 371. *f.* 1. 2.
Habitat - - - *teſta apice obtuſa.*

goreenſis. 26. S. teſta tereti cancellata flava intus cornea.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 164. *t.* 11. *f.* 3. Doſan.
Habitat ad inſulæ Goreæ *littora, teſtaceis lignique fruſtis affixa, teſta* 8-9 *pollices longa: ſtriis elevatis; longitudinalibus confertis.*

inteſtinalis. 27. S. teſta triquetra tortuoſa fragili, tuberculata excavato punctata.
Adanſ. Seneg. I. *p.* 166. *t.* 11. *f.* 6. Jelin.
Habitat rara ad promontorium Africæ Manuel, *teſta exalbida*, 8-9 *pollices longa, mira contorta, ſubumbilicata, intus glaberrima.*

Infundibulum. 28. S. teſta tereti alba tranſverſim ſtriata ter contorta: gyro primo ex quinque quaſi infundibulis ſeſe recipientibus conflato.

Martin. Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 357. *t.* 12. *f.* 1.
Habitat in mari indico, *topho aſſixa.*

pyramidalis. 29. S. teſta cinerea ſupra convexa ſubtus plana pyramidali multoties contorta: gyris introrſum decreſcentibus.
Spengl. Beſch. berl. Naturf. Fr. 2. *p.* 569. *t.* 9. A. *f.* 3-5. *catal. raiſ. t.* 5. *f.* 12-17.
Habitat in mari indico, *teſtaceis variis adhærens, aliaque includens, teſta fine anguſtiori aperta, ad pollicem usque longa, interdum porrecta aut ſubflexuoſa.*

denticulata. 30. S. teſta alba terete ſubulata ad latera dentata recta: coſta longitudinali media glabra: apice incurvulo glabro.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 569. *t.* 6. *f.* 18.
Habitat in lepade tintinnabulo, *teſta* $\frac{3}{4}$ *pollicis longa.*

melitenſis. 31. S. teſta teretiuſcula contorta umbilicata decuſſatim ſtriata: coſtis longitudinalibus noduloſis intus lævi polythalamia.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 570. *t.* 6. *f.* 19.
Habitat - - - foſſilis in Melita *inventa, gyris* 2 *primis recta ſibi impoſitis.*

norwegica. 32. S. teſta tereti lævi incurva: baſi anfractuoſa ſubobſoleta, ore oblique truncato. *Müll. zool. dan. prodr.* 2859. *Act. Nidr.* 4. *p.* 51. *t.* 2. *f.* 11-13.
Habitat in mari norwegico.

porrecta. 33. S. teſta tereti e baſi ſpirali flexuoſe adſcendente lævi nitente. *Müll. zool. dan. prodr.* 2860. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 378. *n.* 373.
Habitat cum ſpirillo, cui proxime affinis, in Oceano ſeptentrionali, *teſta tamen candidiore, pellucida, neutiquam rugoſa, verme inhabitante brevi, dorſo ſanguineo, ad latera pallidiore.*

vitrea. 34. S. teſta tereti regulari ſpirali orbiculata pellucida ſplendente rugoſa: apertura incraſſata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 382. *n.* 378.
Habitat rarior in maris Groenlandiam *alluentis ſertulariis, teſtaceis, fucis, lapidibus, glomeratæ affinis, teſta craſſa, umbilicata, diametri* $\frac{1}{3}$–1 *lineæ, interdum rubicunda.*

cancellata. 35. S. teſta ſpirali glomerata triſulcata: ſulco inferiore coſtis tranſverſis interrupto. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 383. *n.* 379.

Habitat ſatis frequens cum granulata, cui ſimilis, in mari Groenlandiam *alluente, teſta alba, cineraſcente aut vireſcente: apertura bidentata.*

stellaris. 36. S. teſta ſuborbiculari umbilicato-convexa rugis radiata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 383. *n.* 380.

Habitat in maris Groenlandiam *alluentis ſertulariis, rarius teſtaceis & lapidibus adhærens, teſta magnitudinem capituli acus minoris vix aſſequente, teſta violacea, brunnea vel flavicante, albo radiata, ſubtus plana, gyro ſolitario, apertura minutiſſima.*

gigantea. 37. S. teſta ſubtriquetra ſubflexuoſa lente attenuata violacea, intus lævi lutea: apertura alba undulatim ſtriata dente conico munita.

Pallas miſcell. zool. p. 139. *t.* 9. *f.* 2-10.

Seb. muſ. 1. *t.* 29. *f.* 1. 2? Urtica marina ſingularis.

Habitat in mari, Americam *mediam inter &* Africam *intermedio, rupibus coralliiſque affixa, teſta ſemipedali, digiti minimi craſſitie, incola albido.*

cinerea. 38. S. teſta filiformi glabra, conglomerata, perforata. *Forsk. Fn. arab. p.* 128. *n.* 77.

Habitat ad Maſſiliæ *littora, intricatæ affinis, at teſta glabra ex cinereo albida, ceterum flexuoſa.*

334. TEREDO. *Animal* Terebella: valvis duabus calcareis hemiſphæricis anterius exciſis, & duabus lanceolatis.

Teſta teres flexuoſa lignum penetrans.

navalis. 1. T. teſta tenuiſſima cylindrica lævi.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1267. *n.* 1. Teredo.

Valliſn. nat. 2. *t.* 4.

Rumpf muſ. t. 41. *f.* F. G.

Sellius hiſt. natur. tered. 1733. *Ultraj.* 4. *t.* 1.

Teredines *intra vegetabilia habitantes, quæ deſtruunt, vitæ genere, victu, & habitatione, navalis certe, ipſa valvarum vermi adhærentium fabrica, propius ad* Pholades *accedunt, quam ad ſerpulas.*

Planc. Conch. 17. *n.* 2.
Adanſ. Seneg. t. 19. *f.* 1.
β) *Slabber act. Vliſſing.* I. *p.* 387. *t.* 2.
Habitat intra lignum *navium & palorum marinorum, quod miſere deſtruit, fertiliſſima, calamitas navium ex India in* Europam *allata, arſenico cum oleo cocto domanda & arcenda, teſta mira, interdum parum flexuoſa, apice nunc magis nunc minus obtuſa,* 4-6, *nonnunquam plures pollices longa.*

Utriculus. 2. T. teſta ſolida cylindrica undulata.
Kaemmer. Conch. Rudolſt. p. 7. *t.* 1.
Habitat intra lignum - - - *teſta alba ſubpellucida, valde flexuoſa, toruloſa, ſenſim attenuata,* 7 *circiter pollices longa: apertura ovali ſepto medio bipartita.*

Clava. 3. T. teſta altero fine clavata, altero incurva anguſtiori obtuſa medio perforata.
Walch Naturf. 10. *p.* 38. *t.* 1. *f.* 9. 10.
Spengler Naturf. 13. *p.* 53. *t.* 1. *f.* 1-11. & *t.* 2. *f.* 12-14.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 574. *t.* 6. *f.* 20.
Habitat in Xylocarpi granati *pericarpiis, teſta exterius fibra fuſceſcente, ad* 2 *uſque pollices longa, vix dimidium ampla intus lævi, nunc magis nunc minus flexuoſa.*

335. SABELLA. *Animal* Nereis, ore ringente, tentaculis duobus craſſioribus pone caput.
Teſta tubuloſa contexta ex arenulis confertim membranæ vaginali inſertis.

ſcrupoſa. 1. S. teſta ſolitaria libera ſimplici curvata: granis lentiformibus nitidis.
Habitat in India, America *auſtrali inſuliſque obverſis, teſta ſubulata, apice tamen obtuſa, pennæ cygneæ craſſitie & ultra, arenæ granulis æqualibus albis.*

ſcabra. 2. S. teſta ſolitaria baſi fixa ſimplici curvata: granis radiato ſcabris.
Act. Petrop. 1766. *p.* 353. *t.* 9. *f.* 1. 2. Dentalium arcuatum ſpongioſum, ſuperficie tuberculis contiguis exaſperata.
Habitat in Oceano americano.

alveolata. 3. S. teſta compoſita concamerationibus numeroſis poro communicantibus.
Syſt. nat. X. 1. p. 790. Tubipora arenoſa.
Ellis corall. 90. *t.* 36. Tubularia arenoſa indica.
Habitat gregaria in Oceano britannico, *ex arenulis nidum communem ſtruens.*

Chryſodon. 4. S. teſta ſubcylindrica teſtaceo-papyracea.
Berg. act. Stockh. 1765. *p.* 228. *t.* 9. *f.* 1-3. Teredo Chryſodon.
Klein tub. t. 1. *f.* 4.
Baſt. op. ſubſ. t. 9. *f.* 4.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 29. 30.
Habitat in mari europæo, indico, *ad* Caput Bonæ Spei; *teſta pennæ anſerinæ craſſitie ad* ½ *pedem longa, acuminata, ex muco incolæ compacta, ſordide flava, dum humet, flexili, teſtaceorum ruderibus conſperſa.*

belgica. 5. S. teſta conica.
Klein tub. t. 1. *f.* 5.
echinod. t. 33. *f.* A. B.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 27.
Habitat ad Belgii *littora, teſta vix ad* 3 *pollices uſque longa.*

rectangula. 6. S. teſta fuſca annulis alternis albis nigriſque varia recta: fine rectangulo gibboſo.
Gualt. teſt. t. 10. *f.* D.
Martin. Conch. 1. *t.* 4. *f.* 31.
Habitat - - - teſta 9 *pollices longa, diametri vix* ½ *pollicis.*

capenſis. 7. S. teſta cylindrico conica utrinque aperta membranacea, aſpera tranſverſim interruptim ſtriata.
Müller Linn. Naturf. 6. *t.* 19. *f.* 6. 7.
Habitat ad promontorium Bonæ Spei.

nigra. 8. S. teſta cylindrica nigra extrinſecus læviuſcula: granis arenæ ſubtiliſſimis.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* D. *f.* 1.
Habitat in Thuringiæ *rivulo prope* Thangelſtedt, *teſta* ½ *pollicem longa, diametri* ½ *lineæ.*

Sabellæ *genus ambiguum, inter* Spiones, Amphitritas, Terebellas, Brachiones Serpulas, Teredines *quaſi medium; quæ præterea in aquis dulcibus repertæ huc referuntur teſtæ, inſectorum potius, potiſſimum larvarum phryganearum opera conſtructæ, quam vermium nativa eſſe habitacula videntur.*

ſtagnalis. 9. S. teſta recta utrinque aperta terete ſenſim attenuata lævi: apertura marginata, arenæ granis ſubtiliſſimis.
Schroet. Fluſconch. t. 11. min. C. f. 13. & t. 11. min. D. f. 9.
Habitat in Thuringiæ fluvio Sala *prope* Kahla, *nunc ſolitaria teſta nigra, nunc gregatim ranunculo aquatico adhærens teſta cinerea, hac ſemper ultra ¾ pollicis longa.*

conica. 10. S. teſta anguſta conica lævi recta cinerea apice nigricante aperto; granis ſubtiliſſimis.
Schroet. Fluſconch. t. 11. min. C. f. 14.
Habitat prope Jenam, *teſta vix ½ pollicem longa, apertura non marginata.*

uncinata. 11. S. teſta lævi terete ſenſim attenuata apice aperto adunco.
Schroet. Fluſconch. t. 11. min. D. f. 8.
Habitat ſolitaria in rivulo Thuringiæ *prope* Thangelſtedt, *teſta ad ¾ pollicis uſque longa ex arena ſubtiliſſima ſtructa, nunc cinerea, nunc nigra, nunc ſupra cinerea, infra nigra.*

ſabuloſa. 12. S. teſta cylindrica apice clauſo ſubclavata pertuſa: granis arenæ majoribus.
Schroet. Fluſconch. p. 416. n. 7. t. 11. min. D. f. 4.
Habitat in Thuringia & Belgio, *teſta vix pollicem longa, diametri fere ¼ pollicis, nunc recta, nunc medio ſubinflexa, nunc cinerea, nunc nigra, nunc ſupra cinerea infra nigra.*

vegetabilis. 13. S. teſta depreſſa ex ſurculis, caulibus, corticibus, & tellinis corneis compacta.
Schroet. Fluſconch. t. 11. min. C. f. 9.
Habitat in Thuringiæ aquis, *teſta pollicem longa.*

ammonita. 14. S. teſta polygono-cylindrica intus lævi ex cornubus ammonis ſtructa.
Schroet. Fluſconch. t. 11. min. C. f. 10.
Habitat in rivis Cellenſibus.

helicina. 15. S. teſta intus lævi tereti ex teſtis helicis puſillæ ſtructa.
Schroet. Fluſconch. t. 11. min. C. f. 11.
Habitat frequens in Thuringiæ *aquis ſtagnantibus prope* Thangelſtedt, *teſta vix pollicem longa, rarius longiore, diametri paulo ultra ¼ pollicis.*

dimidiata. 16. S. teſtæ altera parte ex arena ſabulove, altera craſſiore clavata ex teſtaceorum rudimentis compacta.

Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* D. *f.* 3.
Habitat frequens in Thuringiæ *aquis prope* Thangelſtedt.

bxa. 17. S. teſta ex lapillis majoribus minoribuſque conflata apicem verſus attenuata.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* C. *f.* 12.
Habitat prope Vinariam & Thangelſtedt Thuringiæ, *ſaxis ſubaquaticis affixa, gregaria, latere, quo affigitur, aperto, teſta ad pollicem uſque longa.*

clavata. 18. S. teſta e lapillis conflata: fine aperto clavato e lapillis majoribus compacto.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* D. *f.* 2.
Habitat ſolitaria in Thuringia, *prope* Vinariam.

corticalis. 19. S. teſta ex corticum fragmentis, ad finem ex caulibus conflata.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* D. *f.* 5.
Habitat frequens in rivulo Thuringiæ *prope* Thangelſtedt, *varietate innumera.*

arundinacea. 20. S. teſta ſubconica utrinque aperta ex fragmentis corticis arundinis ſibi impoſitis ſtructa.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* D. *f.* 6.
Habitat prope Vinariam, *teſta vix ultra pollicem longa.*

aculeata. 21. S. teſta teretiuſcula ex culmis cauliculiſque prominulis conflata.
Schroet. Fluſconch. t. 11. *min.* D. *f.* 7.
Habitat frequens prope Thangelſtedt *in* Thuringia, *teſta vix ultra pollicem longa, nunc magis conica, nunc magis cylindrica.*

marſupialis. 22. S. teſta nigra; fine aperto cylindrico anguſtiori, altera parte turgida ovata.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 591. *t.* 6. *f.* 21.
Habitat in mari, - - - *teſta ultra* 2 *pollices longa, ex arena nigra compoſita, intus lævi.*

norvegica. 23. S. teſta teretiuſcula utrinque aperta fragili membranacea exterius granulis arenæ minutiſſimis conſita.
Schroet. Einl. in Conch. 2. *p.* 591. *n.* 20.
Habitat in Norwegia, *teſta ultra* 4 *pollices longa, pennæ corvinæ craſſitie.*

lumbricalis. 24. S. teſta rudi repente fragili utrinque aperta, incolæ ore non tentaculato, corpore aculeato articulato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 369.

Habitat gregaria in maris Groenlandiam *alluentis profundo, lapidibus præſertim in fiſſuris adhærens, teſta griſea ex arenulis membranæ convexiuſculæ agglutinatis conflata, intus lubrica nitida; incola verme rufo albo annulato, ſubtus pallidiore, præter articulos 2 terminales inermes, 21 aliis, ſingulis in dorſo diacanthis conſtante.*

indica. 25. S. teſta cylindrica ex capillaribus ſubcylindricis quarti cryſtallis coagmentatis conflata. *Abildg. Schr. berl. Naturf.* 9. *p.* 144. *t.* 4.

Habitat in mari indico.

IV. ZOOPHYTA.

Animalia compoſita, animalium more efflorescentia.

336. TUBIPORA. *Animal* Nereis?
Corallium tubis cylindricis cavis erectis parallelis aggregatis.

musica. 1. T. tubis faſciculatis combinatis: diſſepimentis tranſverſis membranaceis diſtantibus.

Hort. Cliff. 481. Tubipora membranis tranſverſis tubos perpendiculares connectens.
Pallas zooph. 199. Tubipora purpurea.
Imper. nat. 821. Tubularia purpurea.
Aldrov. muſ. 291. Pſeudo-Corallium rubrum.
F. Bauh. hiſt. 3 *p.* 808. *f.* 2. Alcyonium fiſtulóſum rubrum.
Bonann. muſ. Kirch. t. 289. *f.* 14. Tubularia purpurea.
Beſl. muſ. Lochn. t. 23. Alcyonium maris rubri
Welſch hecaſt. t. 44. Tubularia coralloides.
Moriſ. hiſt. 3. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 22. Alcyonium fiſtuloſum rubrum.
Petiv. gaz. t. 67. *f.* 10. 11. Tubularia purpurea vulgaris.
Tournef. inſt. t. 342. Tubularia purpurea.
Valent. ind. litt. t. 8. *f.* 5. Tubularia coralloides.
Büttn. corall. p. 18. *t.* 1. *f.* 3. Tubularia coralloides.
Mercat. mettallóth. arm. 6. *c.* 9. *p.* 107. Alcyonium petroſum.
Shaw afr. app. p. 48. *n.* 37. Madrepora tubis eleganter coagmentatis ruberrima.
Rumpf amb. 6. *c.* 236. *t.* 85. *f.* 2. Alcyonium rubrum indicum.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 89.
Argenv. Conch. t. 26. *f.* A.
Ediw. av. t. 93.
Martin. Conch. 1. *p.* 21. *vign.* 2.
Knorr delic. t. A. *f.* 3.

β) *Pallas zooph. ed. belg. t.* 10. *f.* 2. Tubipora flexuoſa.

Habitat in mari americano, indico, rubro, *aliis coralliis rupibuſve affixa, purpurea, ab Indis contra ſtranguriam & vulnera a venenatis animalibus inflicta adhibita.*

catenulata. 2. T. tubis parallelis connatis in laminam contortu plicato-anaſtomozantem.

Amœn. acad. 1. *p.* 103. *t.* 4. *f.* 20. Millepora tubis ovatis longitudinaliter reticulatim concatenatis.
Bromel lithogr. ſp. 2. *t.* 23-27. Tubularia gothlandica.
Helv. lithogr. t. 5. *f.* 1-6. & *t.* 6. *f.* 1. Lapis albidus catenula corallina.
Büttn. coraliogr. t. 1. *f.* 2. Corallium catenulatum.
Volkam. ſileſ. ſubt. t. 58. *f.* 7. & *t.* 20. *f.* 3.
Habitat – – – frequens ad littora maris Balthici projecta, conſtans membrana erecta nullis ſeptis diſtincta, varie contortuplicata, conjuncta in maeandros margine faſtigiata pororum ſerie ſimplici, catenae more digeſtorum, tubuli enim plurimi paralleli, aequales, filiformes lateribus oppoſitis connexi, confecere parietes.

ſerpens. 3. T. tubulis cylindricis erectis breviſſimis diſtantibus axillaribus: baſi repente dichotoma divaricata. *O. Fabr. Fn. groenl.* 428.
Amœn. acad. 1. *p.* 105. *t.* 4. *f.* 26. Millepora dichotoma repens teres: poris axillaribus ſolitariis eminentibus.
Muſ. Teſſin. t. 3. *f.* 3. Millepora repens teres, poris ſolitariis eminentibus.
Pallas elench. zooph. p. 348. *n.* 152. Millepora liliacea.
Ellis corall. p. 74. *n.* 6. *t.* 27. *f.* e E.
Marſ. hiſt mar. p. 153. *t.* 134. *f.* 168.
Planc. Conch. t. 18. *f.* n N.
Habitat in mari mediterraneo, & Oceano ſeptentrionali, *ad littora* maris Balthici *ſæpe rejecta, alba, rarius rubens, proſtrata, laciniata, laciniis linearibus ſupra quaſi lamellatis criſtis tranſverſis duplici ordine, tubulis erectis quaſi pectinatis; an hujus generis?*

faſcicularis. 4. T. tubis filiformibus faſciculatis: lateribus paſſim anaſtomoſantibus. *O. Fabr. Fn. groenl.* 429.
Habitat – – – paſſim ad Gotlandiæ *littora obvia, in montibus quoque calcareis foſſilis, pennæ paſſerinæ craſſitie, alba minus recta, anaſtomoſibus tranſverſis anguſtioribus tubos ipſos connectentibus.*

ramoſa. 5. T. interſtitiis ſubrotundis diſtincta, tubulis ramorum confluentium ſimplicibus flexuoſis aggregatis conglutinatis. *Koelreuter act. Petrop.* 7. *p.* 374. *t.* 16. *f.* 3.

Lithophyta *animalcula materiam corallinam deponere & pro cellulis uti, & madreporarum animalcula ſtellis incumbentia ſibi continuo ſubſternendo materiam lapidem elevare & habitaculum ſuum augere rectè ſtatuit* Peyſſonel. *Habitat*

Habitat in mari albo, *acaulis, baſi anguſtiore, ramis undequaque diffuſis, fragiliſſima, exalbida, intus candida, teſtaceis ſucove adhærentibus ſæpe ornata.*

pinnata. 6. T. dichotoma erecta, tubulis pinnulatim digeſtis.
Pallas el. zooph. p. 247. *n.* 151. Millepora pinnata.
Marſ. hiſt. mar. p. 152. & 153. *t.* 34. *f.* 107. *n.* 1. 3. 4. & 2. 3. 5. & *f.* 168. *n.* 1-3. Madreporæ muſciformes.
Habitat in mari mediterraneo, *cineraſcens aut virideſcens, pollicem circiter alta, fragilis, fili groſſioris craſſitie, quaſi bipectinata, ramis æqualibus, patulis.*

penicillata. 7. T. cauleſcens, cacumine incraſſato ex tubulis baſin verſus connexis formato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 429. *n.* 430.
Habitat in mari Groenlandiam *alluente, teſtaceis affixa,* 3 *lineas longa,* $1\frac{1}{2}$ *lata, alba, erecta, faſciculari affinis.*

flabellaris. 8. T. depreſſa flabelliformis adnata tubulis parallelis connatis radiata. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 430. *n.* 431.
Habitat frequens in mari Groenlandiam *alluente, ulvæ maximæ folio ad paginam inferiorem adnata, cineraſcens,* $1\frac{1}{2}$ *lineam lata, ſubtus lævis, radiatim ſtriata, circuli ſegmentum referens.*

ſtellata. 9. T. tubis diſcretis tabulato-combinatis: tabulatis plurimis remotis horizontaliter tubuloſis ſuperficie ſtriato-radiatis. *Modeer n. act. Stockh.* 1788. 3. *n.* 10. *t.* 7. *f.* 1.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta.

Strues. 10. T. tubis diſtantibus divergentibus liberis poſterius ſæpius flexis: tubulis minoribus ſimplicibus horizontalibus combinatis. *Ad. Modeer n. act. Stockh.* 1788 4. *n.* 1.
Helwing. lithogr. p. 52. *t.* 5. *f.* 7.
Buttner coralliogr. p. 22. *t.* 2. *f.* 9. Corallium fiſtuloſum ac luridum.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta.

337. MADREPORA. *Animal* Meduſa. *Ellis corall. t.* 32. *Donat. mar. t.* 6. *f.* F.
Corallium cavitatibus lamelloſo-ſtellatis.

* Simplices *ſtella unica.*

verrucaria. 1. M. ſtella orbiculari planiuſcula ſeſſili: diſco cylindris floſculoſo, limbo radiato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 430. *n.* 432. *Forsk. ic. rer. nat. t.* 26. dD.
Pallas el. zooph. p. 280. *n.* 164. Madrepora ſimplex ſeſſilis ſubundulata marginataque, diſco poris inæqualibus pectinatis radiato.
Soland. & Ellis corall. p. 137. *n.* 13. Millepora limbo concavo tenui explanato ſubſtriato, diſco convexo tubulis confertis radiato.
Ginann. adr. 10. *t.* 4. *f.* 10. Fungus marinus.
Habitat in mari rubro, mediterraneo & ſeptentrionali, *inter algis marinis & zoophytis mollioribus adhærens, inter madreporas, tubiporas & milleporas quaſi media, piſi dimidiati magnitudine, alba vel flavicans, diſci tubis aggregatis, inſtar diſci florum compoſitorum, limbo explanato ſtriato, radium horum florum mentiente.*

turbinata. 2. M. turbinata lævis, ſtella hemiſphærico concava. *Amæn. acad.* 1. *p.* 87. *t.* 4. *f.* 1-4. 7.
Pallas el. zooph. p. 305. *n.* 176. *β.* Madrepora (trochiformis) ſimplex turbinata acaulis ſtriata, ſtellæ lamellis integris.
Bromel. lithogr. p. 32. 33. 36. 38. 40. *Lang lap. figur. p.* 52. *t.* 12. Fungites major orbicularis gothlandicus.
Helw. lithogr. t. 5. *f.* 9-11. 13. 15. 17. *Wolff-haſſ. t.* 10. *f.* 3. 4. Columellus turbinatus.
Habitat - - - *hactenus modo foſſilis inventa, copioſiſſime in* Gothlandia & Campania gallica.

Porpita. 3. M. acaulis, ſtella convexa: centro depreſſo orbiculari, ſubtus plana marginata lævi.
Amæn. acad. 1. *p.* 91. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 5. Madrepora ſimplex orbiculata plana, ſtella convexa.
Calceol. muſ. p. 228. Lapillus numiſmalis.
Scheuchz. lithogr. helv. f. 43. 44. Lens lapidea ſtriata utrinque convexa.
Buttn. corall. p. 24. *t.* 3. *f.* 5. Fungi marini capitulum.

Lhwyd lith. p. 151. Porpita minor numularis.
Brom. lith. ſp. 2. *p.* 33. *f.* a-h.
Habitat in mari indico & rubro, *frequens inter* Europæ *petrefacta, ſeminis lupini magnitudine, an mera fungitæ detriti varietas?*

Fungites. 4. M. acaulis orbiculata, ſtella convexa: lamellis ſimplicibus longitudinalibus, ſubtus concava. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 134. *n.* 10. *ic. rer. nat. t.* 42.
Hort. Cliff. 481. Madrepora ſimplex acaulis orbiculata convexa: lamellis denticulatis.
Pall. el. zooph. p. 281. *n.* 165. Madrepora ſimplex acaulis; ſtella convexa lamelloſa, lamellis inæqualibus crenatis.
Soland. & Ellis corall. p. 149. *n.* 2. *t.* 28. *f.* 5. 6. Madrepora ſimplex acaulis convexa, lamellis latere ſubaſperis indiviſis: alternis minoribus ſubincompletis.
Beſl. muſ. Lochn. t. 26. *f.* 3.
Cluſ. exot. l. 6. *p.* 125. *t.* 10. *f.* 1. Fungus lapideus major.
Valent. ind. litt. p. 568. *t.* 9. *f.* 2. Fungus lapidoſus.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 801. *f.* 1. 2. Fungus lapideus.
Bonann. muſ. Kircher. p. 289. *n.* 17. Fungus petrificatus.
Olear. muſ. p. 68. *n.* 2. *t.* 34. *f.* 2. Fungites quartus.
Boerh. ind. hort. lugdb. 1. *p.* 2. Fungus coralloides pileatus lamellatus.
Shaw afr. app. p. 47. *n.* 6. Fungus coralloides lamellatus maris rubri.
Rumpf amb. 6. *p.* 247. 249. *t.* 88. *f.* 1. 4. Fungus ſaxeus.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 6. b. *t.* 111. *f.* 1. 2. & *t.* 112 *f.* 28 30.
Knorr delic. t. A. III. *n.* 4.
β) *Pallas elench. zooph. p.* 284. *n.* 165. β. Madrepora echinata.
Habitat in mari rubro & indico, *utplurimum libera, centro concava, ſubtus ſcabra; lamellis acutis inæqualibus baſin verſus per iſthmos connexis.*

Patella. 5. M. acaulis, lamellis latere muricatis ſubtrichotomis: tertiis indiviſis majoribus. *Soland. & Ellis corall. p.* 148. *n.* 1. *t.* 28. *f.* 1-4.
Habitat in mari mediterraneo, $\frac{1}{4}$ *pollicis craſſa, diametri* $1\frac{1}{2}$ *pollicis, junior plana, adultior convexa, lamellis omnibus margine denticulatis.*

Cyathus. 6. M. clavato-turbinata baſi attenuata: ſtella obconica; centro prominulo exceſo duplicato. *Soland. & Ellis corall. p.* 150. *n.* 3. *t.* 28. *f.* 7.
Marſ. hiſt. mar. t. 28. *f.* 128. *n.* 11.

Planc. conch. ad 2. *p.* 128. *tab. app.* 18. *f.* M.
Habitat frequens in mari mediterraneo, *ad* Galliæ *&* Italiæ *littora, iſidi nobili utplurimum affixa, alba, duriſſima, 2 pollices longa, lamellis majoribus circiter* 40.

** Compoſitæ *ſtellis pluribus.*
† Concatenatæ, *ſtellis disjunctis: lamellis continuis.*

Pileus. 7. M. acaulis oblonga, ſtella convexa conglomerato-lamelloſa: lamellis abbreviatis ſubtus concava.
Pallas el. zooph. p. 285. *n.* 166. Madrepora concatenata acaulis gibba, ſtellis ſubpinnatis confertis concatenatis, lamellis inæqualibus.
Tournef. act. pariſ. 1700. *p.* 30. Mitra Neptuni.
Rumpf amb. 6. *p.* 248. *t.* 88. *f.* 2. 3. Mitra polonica.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 3. 5. Pileus Neptuni.
Soland. & Ellis corall. p. 159. *t.* 45.
β) *Rumpf amb.* 6. *p.* 248. Limax ſaxea.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 6. *& t.* 112. *f.* 31. Talpa marina.
Habitat in Oceano indico, *diſco compoſito e ſtellulis excavatis: radiis palmatis centrum & ambitum reſpicientibus, alternis humilioribus depreſſioribus, & altioribus; margine bifariam crenato, centro oblonge ſulcato.*

criſtata. 8. M. foliaceo-criſtata: ſtellis ſerialibus centro impreſſis, ambulacris explanatis planiuſculis. *Soland. & Ellis corall. p.* 158. *n.* 27. *t.* 31. *f.* 3. 4.
Pallas el. zooph. p. 288. *n.* 167. *β.*
Habitat in Oceano auſtrali *&* indico.

Lactuca. 9. M. ſeſſilis, ſtellis magnis confertis frondeſcentibus: frondibus laciniosis criſpatis. *Pall. el. zooph. p.* 289. *n.* 168. *Soland. & Ellis corall. p.* 158. *n.* 28. *t.* 44.
Seb. muſ. 3. *t.* 89. *f.* 10. Concha fungiformis.
Habitat rara in Oceano americano?

ficoides. 10. M. ſoliaceo-criſtata, ſtellis ſparſis: ambulacris lateralibus planiuſculis; marginalibus acute carinatis, lamellis foliaceis. *Soland. & Ellis corall. p.* 159. *n.* 29.
Habitat in Oceano auſtrali.

aceroſa. 11. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſparſis: ambulacris lateralibus planis; terminalibus ſubcarinatis, lamellis aceroſis.
Soland. & Ellis corall. p. 159. *n.* 30.
Habitat – – –

Lichen. 12. M. foliaceo-criſtata, ſtellis ſerialibus obconicis rotundatis, ambulacris carinato-foliaceis acutiſſimis ſubflexuoſis obliquatis. *Solander & Ellis corall. p.* 160. *n.* 33.
Habitat in Oceano auſtrali.

Agaricites. 13. M. acaulis ſulcata: ſulcis carinatis, ſtellis concatenatis.
Pall. el. zooph. p. 287. *n.* 167. Madrepora concatenata cruſtacea polymorpha tranſverſim ſulcata, ſtellis per ſulcos crebris concatenatis.
Soland. & Ellis corall. p. 159. *n.* 32. Madrepora foliaceo-criſtata concatenata, ſtellis flexuoſo ſubſerialibus obconicis ſubangulatis, ambulacris acute carinatis rectiuſculis hinc coaleſcentibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 6. CC.
Argenv. oryct. p. 367. *t.* 22. *f.* 7.
Knorr del. 1. *p.* 25. *t.* A. X. *f.* 1.
Habitat in mari inſulas Americæ obverſas *interfluente; cinerea, diametri ad* 5–6 *pollices aſſequentis, lamellis variis divergentibus ſemiorbiculatis conſtans, ſulcis plurimis repandis exarata, in quorum fundo ſtellæ.*

Elephantotus. 14. M. ſubturbinata, intus lamellis granuloſis parallelis ſtelliſque lacero-prominulis ſparſis. *Pallas el. zooph. p.* 290. *n.* 168. *β.*
Habitat in Oceano indico, *inter M. lactucam & agaricitem quaſi media laminam tenuem ſeſſilem undulato criſpam mentiens; ſtellis fere in quincunce poſitis.*

cruſtacea. 15. M. cruſtacea, ſuperficie plana ſtellata: radiis craſſis dentatis concatenatiſque. *Pallas el. zooph. p.* 291. *n.* 170.
Habitat in mari americano, *rarioris texturæ, obverſe conica, ſtellis minus ordinata in quincunces diſpoſitis.*

incruſtans. 16. M. inæqualis, ſtellis prominentibus conico truncatis cavis apice diſtantibus intus lamellatis. *Forsk. Fn. ægypt. arab. p.* 135. *n.* 16.
Habitat in mari rubro, *ſtellis diametro baſeos piſum, ſupra lentem æquantibus, an diſtincta ſpecies?*

exeſa. 17. M. cruſtacea, ſtellis anfractuoſis interſtitiis conicis. *Pallas el. zooph. p.* 290. *n.* 169. *Soland. & Ellis corall. p.* 101. *n.* 38. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico & auſtrali, *mytilo margaritifero ſuperinducta, alba, verrucis conicis vertice lævigatis, ceterum lamellis ſcabris inæqualibus undique porcatis aſpera.*

Filograna. 114. M. acaulis ſimplex, ſtella tenuiſſima repando labyrinthiformi: ſutura acuta, areolis planis perforatis. *Eſper Pflanzenh.* 3. *p.* 139. *n.* 20. *t.* 23. *f.* 1. 2.
Gualt. ind. teſt. t. 97.
Habitat in mari indico.

natans. 115. M. ſimplex acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi, pulvillis latiſſimis, ſutura obtuſa, corallio poroſo læviori. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 140. *n.* 21. *t.* 23.
Seb. muſ. 3. *p.* 201. *t.* 99. *f.* 9. 10.
Habitat in mari Indiam & Americam *alluente.*

Anthophyllum. 116. M. ſimplex caulescens, caule ovato ſtella terminali hemiſphærica concava: fundo lamellis craſſioribus radiatis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 143. *n.* 22. *t.* 24. *f.* 1-5.
Battarra hiſt. recr. nat. 1. *p.* 176. *t.* 44. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo.

†† Conglomeratæ, *ſtellis conjunctis.*

labyrinthica. 18. M. acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi: ſutura obtuſa.
Hort. Cliff. 481. Madrepora compoſita labyrinthiformis hemiſphærica, lamellis duplicato ordine integris obtuſis, ſinubus æqualibus.
Pallas el. zooph. p. 292. *n.* 171. Madrepora (mæandrites) conglomerata ſeſſilis, ſtellis anfractuoſis, lamellis denticulatis.
Soland. & Ellis corall. p. 160. *n.* 34. *t.* 46. *f.* 3. 4. Madrepora conglomerata, anfractibus baſi dilatatis longis, diſſepimentis exceſis æqualibus latis, ambulacris ſimplicibus.
Boet. gemm. l. 2. *c.* 146. *f.* B. *Sloane cat. p.* 2: *hiſt.* 1. *p.* 54. *n.* 7. Lapidis aſtroitidis ſive ſtellaris tertium genus.
Beſl. muſ. t. 26. *f.* 1. 2. Muſſa corallina alba poroſa, maris fluctus egregie repræſentans.
Valent. ind. litt. p. 509. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 1. Batu-purudan, fluctus lapidei.
Boccon. epiſt. 17. *tab. p.* 142. Aſtroites undulatus major & Fungus maritimus coralloides undulatus.
Petiv. gaz. t. 68. *n.* 11. Corallium cerebri facie.
Boerh. ind. hort. Lugdb. p. 1. *Shaw afr. app. p.* 47. *n.* 8. Fungus coralloides encephaloides, gyris in medio ſulcatis, lamellis ſerratis.
Mercat. metall. arm. 6. *t.* 16. *p.* 124. Lapis corallites.
Gualt. teſt. t. 10. 29. b. 97. b. Mæandrites.
Brown jam. p. 392. Mycedium. 1-3.

Olear. muſ. Gott. t. 34. *f.* 1. 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 111. *f.* 7. 8. & *t.* 112. *f.* 1. 4-7.
Knorr delic. t. A. IV. *n.* 1.
Habitat in mari Indiam, & *auſtralem* Americam *alluente, formæ quam maxime variabilis, & diametri aliquot pedes nonnunquam æquantis, in inſulis* Caribæis *calci urendæ adhibita.*

ſinuoſa. 19. M. anfractibus patulis flexuoſis brevibus, diſſepimentis inæqualibus exeſis, ambulacris ſubduplicatis, lamellis denticulatis.
Soland. & Ellis corall. p. 160. *n.* 35.
Habitat in Oceano, Americam *auſtralem alluente.*

mæandrites. 20. M. acaulis, ſtella repando-labyrinthiformi, ſutura acuta.
Pallas el. zooph. p. 297. *n.* 172. Madrepora (labyrinthica) conglomerata ſeſſilis, ſtellis anfractuoſis, lamellis craſſiuſculis integris.
Soland. & Ellis corall. p. 161. *n.* 37. *t.* 48. *f.* 1. Madrepora conglomerata, diſſepimentis ſimplicibus ſubſolutis, lamellis incraſſatis æqualibus remotis intus attenuatis ſubintegris.
Gualt. teſt. t. 51. b. Mæandrites coſtis planis amplioribus, acutis & rarioribus lamellis.
Hill plant. 2. Mycedium convexum, gyris ſulcatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 9. 10. *t.* 112. *f.* 2. 3. 4?
Knorr delic. t. A. III. *f.* 2.
Habitat in mari Americam auſtralem *alluente,* & mediterraneo, *anfractibus amplioribus & laxioribus, quam in labyrinthiformi, ſolidior & fere lapidea, ſtellarum centris ipſis radiatim lamellatis.*

Areola. 21. M. acaulis, ambulacris pinnatifidis, pulvillis anguſtis truncatis.
Pallas el. zooph. p. 295. *n.* 171. *β.* Madrepora ſimplex ſubpedunculata, ſtella criſpato laciniofa lamellis crenulatis.
Soland. & Ellis corall. p. 161. *n.* 36. *t.* 47. *f.* 4. 5. Madrepora (areolata) conglomerata, anfractibus dilatatis, diſſepimentis exeſis ſubinæqualibus, ambulacris duplicatis hinc dilatatis, lamellis denticulato crenulatis.
Cluſ. ex. l. 6. *c.* 10. *p.* 125. *Beſl. muſ. Lochn. p.* 87. *t.* 28. Fungus lapideus minor.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 16. Corallium album fungoides ovale.
Sloane catal. p. 2. *jam.* 1. *p.* 56. *n.* 10. 11. *t.* 18. *f.* 3. Fungus lapideus undulatus.

Shaw afr. app. p. 47. *n.* 7. Fungus coralloides roſaceus maris rubri.
Rumpf amb. 6. *p.* 244. *t.* 87. *f.* 1. *Lang. lap. fig. p.* 52. *t.* 12. *f.* 4. *Ephem. Nat. Curioſ. Dec.* II. *A.* 3. *obſ.* 24. *p.* 78. *t.* 2. Amaranthus ſaxeus.
Valent. ind. 3. *t.* 52. *f.* CC. Amaranthus marinus.
Molin. Cabin. p. 220. *t.* 45. *n.* 7. Morille.
Argenv. oryct. t. 22. *n.* 4. Cariophilloides.
Hill plant. p. 3. Mycedium cavatum undulatum.
Knorr delic. t. A. XI. *f.* 1. 2. Cerebrites.
Kundm. rar. p. 153. *t.* 9. *f.* 7.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 801. *f.* 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 3. 5. & *t.* 112. *f.* 23-27.
Turgot. mem. inſtr. t. 22. *f.* C.
Habitat in mari, Americam *auſtralem &* Indiam *alluentt, mæandritæ (ſubtus tamen lævis), propius adhuc labyrinthiformi affinis, calyce, quam utcunque refert, in lacinias criſpato, exterius porcis crenato-muricatis crebro, intus cavo lamelloſo, centro inter lamellas demerſo pinnato.*

abdita. 22. M. ſubconglomerata, anfractibus ſtelliformibus angulatis obconicis, ambulacris ſimplicibus: lamellis anguſtis crenulato-denticulatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 162. *n.* 39. *t.* 50. *f.* 2.
Habitat - - - *an forſan mera favoſæ varietas?*

phrygia. 23. M. anfractibus longiſſimis anguſtis, ambulacris perpendicularibus ſimplicibus, diſſepimentis ſimplicibus lamelloſis lobulatis, lamellis remotiuſculis. *Soland. & Ellis corall. p.* 162. *n.* 40. *t.* 48. *f.* 2.
Habitat in Oceano auſtrali, *ambulacris nunc rectis, nunc flexuoſis.*

repanda. 24. M. ambulacris incraſſatis, diſſepimentis ſimplicibus ſubſolutis, lamellis numeroſis: plurimis intus incraſſatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 162. *n.* 41.
Habitat - - -

ambigua. 25. M. anfractibus ſtelliformibus flexuoſiſque, ambulacris incraſſatis, diſſepimentis ſimplicibus craſſiuſculis, lamellis diſtantibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 162. *n.* 42.
Habitat - - -

dædalea. 26. M. anfractibus profundis brevibus, diſſepimentis ſubexeſis laceris, lamellis ſerrato-dentatis, ambulacris perpendicularibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 163. *n.* 43. *t.* 46. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico.

gyroſa. 27. M. cellulosa, ambulacris duplicatis foliaceis, diſſepimentis ſimplicibus, lamellis foliaceis æqualibus. *Soland. & Ellis corall. p. 163. t. 51.*

Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 9. 10.

Habitat - - - congeneribus magis lævis, cellulis numeroſis cavernoſa.

clivoſa. 28. M. anfractibus baſi anguſtatis, diſſepimentis ſubexeſis æqualibus, ambulacris ſimplicibus craſſiuſculis, lamellis alternis abbreviatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 163. *n.* 45.

Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, rotundata, nodulosa.*

Cerebrum. 29. M. anfractibus baſi ſubrotundatis tortuoſis longiſſimis; diſſepimentis exeſis æqualibus, ambulacris ſimplicibus anguſtis. *Soland. & Ellis corall. p.* 163. *n.* 46.

Habitat - - - rotundata æqualis.

involuta. 30. M. anfractibus baſi dilatatis lævibus, diſſepimentis exeſis ſubæqualibus anguſtis, ambulacris ſimplicibus. *Soland. & Ellis p.* 164. *n.* 47.

Habitat - - -

implicata. 31. M. anfractibus rotundatis ſubperpendicularibus, diſſepimentis exeſis æqualibus latis, ambulacris duplicatis latis. *Soland. & Ellis corall. p.* 164. *n.* 48.

Habitat - - -

Cochlea. 32. M. anfractu ſpirali, ſtella ſimplici aut duplici: centro punctato, radiis ſerrulatis. *Spengler nov. act. ſoc. dan. Hafn.* 1. *p.* 240. c. *ic.*

Habitat ad Tranquebariæ *littora, inter teſtacea & zoophyta, quaſi media, an hujus generis & familiæ?*

††† Aggregatæ, *indiviſæ, ſtellis diſtinctis, ambulacris poruloſis, tuberculoſis.*

favoſa. 33. M. ſtellis anguloſis concavis coadunatis. *Amœn. acad.* 1. *p.* 96. *t.* 4. *f.* XVI.

Pall. el. zooph. p. 319. *n.* 187. Madrepora (favites) corporibus brevibus coadunatis ſtellis anguloſis cavis intus lamelloſis.

Soland. & Ellis corall. p. 167. *n.* 61. *t.* 50. *f.* 1. Madrepora aggregata conglomerata, anfractibus ſubſtelliformibus angulatis patulis, parietibus ſimplicibus, lamellis dentatis margine connatis elevatis.

Bocc. muſ. 1. *t.* 5. *f.* 3. Aſtroites.
Forsk. Fn. ægypt. arab. p. 132. *n.* 2. 3.
Gualt. teſt. t. 19. *n.* 23.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 8. 10. 21. c.
Knorr delic. 1. *t.* A. IV. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, *alba, ad latera ſtriata, tranſverſim diſſecta rete groſſum monſtrans punctis pertuſum, maculaſque, alias extimum pollicem latitudine æquantes, alias piſo minores radiatas.*

cavata. 34. M. ſubconglomerata, anfractibus ſtelliformibus angulatis, parietibus ſimplicibus anguſtis, lamellis denticulatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 167. *n.* 62.
Habitat - - - an mera favoſæ varietas?

bulliens. 35. M. ſtellis diſtantibus teretibus oblongiſve inæqualibus margine elevatis, interſtitiis radiato-rugulosis concaviuſculis. *Soland. & Ellis corall. p.* 167. *n.* 63.
Habitat - - -

Ananas. 36. M. ſtellis angulosis convexis diſco concavis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 92. *t.* 4. *f.* VIII. 2. IX.
Pallas el. zooph. p. 321. *n.* 189. Madrepora aggregata, corporibus obverſe conicis coadunatis, ſtellis ſcabris convexis centro cavis.
Soland. & Ellis corall. p. 168. *n.* 64. *t.* 47. *f.* 6. Madrepora aggregata, ſtellis ſubangulatis inæqualibus multiradiatis: marginibus convexis lamelloſis, lamellis denticulato-crenatis, interſtitiis concavis.
Helw. lithogr. t. 5. *f.* 22. Corallium album ſuperne figuris aſteriformibus propemodum obliteratis.
Bocc. muſ. t. 9. *f.* 7.
Brom. lith. ſpec. 2. *n.* 20.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 11.
Wolf. Haſſ. t. 10. *f.* 3. 4.
Volkm. Sil. 1. *t.* 18. *f.* 5. & *t.* 19. *f.* 3. a. b.
Knorr delic. 1. *t.* A. VI. *f.* 1.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *t.* 7. *f.* 3? & *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in mari mediterraneo, & Americam *auſtralem alluente, frequens foſſilis, gibba, ramulis obovatis ſtella gibba radiata: diſco demerſo ſtriato terminatis, ad latera ſuturæ ope connexis compoſita, tranſverſe diſſecta, rete album, maculis ſexangularibus annulum album includentibus, inter rete & annulum ſtriatis varium referens.*

Hyades. 37. M. ſtellis ſubconfertis obconicis rotundis ſubangulatiſque: parietibus craſſis poroſis, centris planiuſculis convexiſque. *Soland. & Ellis corall. p. 168. n. 65.*
Habitat - - -

Siderea. 38. M. ſtellis confertis rotundis ſubangulatiſque: parietibus craſſis convexiuſculis, lamellis alternis margine ſubconnatis, centris ſimplicibus. *Soland. & Ellis corall. p. 168. n. 66. t. 49. f. 1.*
Habitat - - -

Galaxea. 39. M. ſtellis ſubconfertis impreſſis: parietibus craſſis planiuſculis ſubdiſtinctis, lamellis tenuiſſimis, centris ſubexeſis. *Soland. & Ellis corall. p. 168. n. 67. t. 47. f. 7.*
Habitat - - - lamellis quaternis ad centrum extenſis, tribus intermediis prope baſin conniventibus.

Plejades. 40. M. ſtellis ſubteretibus: marginibus acutis elevatis, interſtitiis concavis læviuſculis hinc cavernoſiuſculis. *Soland. & Ellis corall. p. 169. n. 68. t. 53. f. 7. 8.*
Habitat - - -

Papilloſa. 41. M. ſubaggregata, ſtellis cylindraceo papilloſis: marginibus incraſſatis rotundatis obliquis. *Soland. & Ellis corrall. p. 169. n. 70.*
Habitat - - - muricatæ affinis, & forte primordium, papillis tamen contiguis & ſimplici cardine diſpoſitis.

Radiata. 42. M. ſtellis cylindraceis margine elevatis, interſtitiis latis concavis ſulcato-radiatis. *Soland. & Ellis corall. p. 169. n. 71. t. 47. f. 8.*
Pallas el. zooph. p. 321. n. 188. β.
Habitat - - -

Latebroſa. 43. M. ſtellis ſubteretibus multiradiatis margine elevatis; interſtitiis radiato-ſulcatis ſubcoarctatis inæqualibus. *Soland. & Ellis corall. p. 170. n. 72.*
Sloan. jam. 1. t. 21. f. 4.
Habitat in mari Americam *auſtralem alluente.*

Polygama. 44. M. ſtellis minutis confertis: immixtis majoribus perforatis fundo concavo-cylindrico. *Amœn. acad. 4. p. 258. t. 3. f. 15.*
Habitat in mari indico, *mytili margaritiferi teſtam interdum obducens, cruſtam niveam, 2 policum craſſitie, re-*

ferens, ſtellis plurimis minutis obtuſiuſculis 12 *radiatis, paucioribus digiti minimi craſſitie, gibboſioribus, cavitate infra has ſtellas inani.*

arenoſa. 45. M. ſtellis contiguis planiuſculis ſubarenaceis.
Habitat in mari Algiriam *alluente, alba, ſtellis majuſculis ochraceis, interdum parum elevatis & verrucoſis.* Brandre.

interſtincta. 46. M. ſtellis immerſis teretibus diſtantibus: interſtitio punctato. *Müll. zool. dan. prodr.* 3037.
Soland. & Ellis corall. p. 167. *n.* 60. *t.* 56. Madrepora ſtellis cylindraceis profundis diſtinctis, interſtitiis poroſis, corallio ſubexplanato duplicato.
Pallas el. zooph. p. 256. *n.* 158. Millepora cærulea.
Petiv. gaz. t. 10. *f.* 12. Coralloides philippenſis cærulea.
Habitat in mari indico, Americam *auſtralem*, Norwegiam *alluente, extrinſecus cineraſcens, intus obſolete cinerea.*

ſpongioſa. 47. M. foliacea ſubexplanata, ambulacris confragoſis ſupra obtuſatis, ſubtus planis, ſtellis infundibuliformibus profundis inæqualibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 164. *n.* 49.
Habitat - - -

folioſa. 48. M. foliacea ſubexplanata, ambulacris ſuperne confragoſis verruculoſis inferne planiuſculis, ſtellis æqualibus parvis. *Soland. & Ellis corall. p.* 164. *n.* 50. *t.* 52.
Pallas el. zooph. p. 333. *n.* 196. Madrepora polymorpha laciniosa, laminis laceris ſcaberrimis, poris utrinque ſparſis minutis.
Rumpf muſ. 6. *t.* 87. *f.* 2.
Gualt. teſt. t. 42. *f.* b.
Seb. muſ. 3. *t.* 110. *f.* 7.
Turgot mem. inſtr. t. 22. A.
Muſ. Beſler. t. 27.
Baier mon. rer. petr. t. 2. *f.* 3. 4.
Habitat in Oceano indico, *rarior, roſam explanatam interdum referens.*

poculata. 49. M. ſtellis obconicis: marginibus acutis hinc inde remotis, interſtitiis lævibus; lamellis undique granuloſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 165. *n.* 51.
Pallas el. zooph. p. 319. *n.* 186. *β.*
Ellis corall. t. 32. *f.* A. 1. A. 3.
Habitat rariſſima - - - *ex griſeo alba.*

ellulata. 50. M. cylindris ſtellarum teretibus diſtantibus æqualibus margine elevatis, interſtitiis planiuſculis ſcabriuſculis. *Soland. & Ellis corall. p.* 165. *t.* 53. *f.* 3. 4.
Habitat - - -

ſtroites. 51. M. ſtellis confertiſſimis immerſis diſco concavo-cylindrico.
Pallas el. zooph. p. 322. *n.* 190. Madrepora (radians) aggregata ſolida, ſtellis confertis convexiuſculis, centri poro radiante, ſtriis ſcabriuſculis.
Soland. & Ellis corall. p. 165. *n.* 53. Madrepora ſtellis confertis impreſſis, interſtitiis poroſis, lamellis aceroſis ſcabriuſculis.
Brown jam. p. 392. Aſtrea aperturis cavernarum minimis, maſſa inæquali.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 12. 14.
Knorr delic. 1. *t.* A. X. *f.* 4.
Myl. ſax. ſubterr. 2. *t.* 2. *f.* 1.
Herm. marlogr. t. 11. *f.* 32.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 9-17.
Argenv. oryctol. t. 23. *f.* 4. 10. 19.
Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, frequens: ſatis inter foſſilia maſſis ingentibus ſæpe obvia, alba, ſolida extrinſecus pallide griſea.*

ellata. 52. M. ſolida exterius ſcabra, ſtellis ſparſis convexis medio impreſſis.
Pallas el. zooph. p. 323. *n.* 191.
Habitat rarior in Oceano indico, *rupibus ſuperinducta, tenerrimis punctis ſcabra, extrinſecus ex griſeo cineraſcens.*

odulosa. 53. M. ſtellis confertis obconicis, interſtitiis lamelliſque aceroſis ſcabriuſculis, corallio ſubnoduloſo. *Soland. & Ellis corall. p.* 165. *n.* 54.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 18.
Habitat in - - -

ropora. 54. M. ſtellis confertis annularibus prominulis crenatis.
Habitat - - - *hemiſphærica, ſtellis parvis, elevatis, fundo profundioribus.*

avernoſa. 55. M. ſtellis immerſis hypocrateriformibus: limbo ſtriato, interſtinctis ſutura elevata.
Pallas el. zooph. p. 320. *n.* 188. Madrepora (aſtroites) aggregata, cylindris coadunatis, ſtellis cavis lamelloſis ambitu radiatis.

Soland. & Ellis corall. p. 169. *n.* 69. *t.* 53. *f.* 1. 2. Madrepora (annularis) ſtellis teretibus æqualibus margine elevatis, interſtitiis plano-concavis radiatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 112. *f.* 15. 19. 22.
Bocc. muſ. t. IX. 5. *f.* 4.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 6.
Knorr delic. 1. *t.* A. IV. *f.* 3.
Volkm. Sileſ. ſubt. 1. *t.* 18. *f.* 1.
Bourg. petrif. t. 4. *f.* 26. & *t.* 7. *f.* 36.
Argenv. oryct. t. 23. *f.* 9. 16.
Knorr Petreſ. 2. *t.* F. V. *n.* 2. & *t.* F. VI. *f.* 3.
Habitat in mari Americam *auſtralem alluente & mediterraneo, ſuturis rete pentagonum, ſtellis elevatius, ad latera ſtriatum referentibus, an forte varietas minor radiatæ?*

punctata. 56. M. punctis ſtellaribus confertis conflatis e punctis denſis.
Habitat in Oceano europæo, & mari mediterraneo *rotunda, alba, friabilis, punctis ſtellaribus parvis inæqualibus.*

carycularis. 57. M. cylindris coadunatis, ſtellis excavatis, centro prominulo. *Spallanz. act. ſociet. ital.* 2.
Pallas el. zooph. p. 318. *n.* 186. Madrepora cylindris obconicis coadunatis, ſtellis crateriformibus lamelloſis, centro exeſo prominulo.
Brown. jam. p. 392. *n.* 2. Aſtrea aperturis cavernarum radiatis, centro ſpongioſo.
Cavolin. pol. rar. 1. *t.* 3. *f.* 1-5. & 3. *p.* 248.
β) *Cavolin. pol. mar.* 1. *p.* 57. *t.* 3. *f.* 6-8. Madrepora denudata.
Habitat in mari mediterraneo, *ſubrotunda fuſca, cylindris lateralibus ſæpe diſtinctis, exterius tranſverſim rugoſis, incola actinia, non meduſa, ſegnis, magna.*

truncata. 58. M. articulis turbinatis proliferis radio pluribus margine coadunatis, ſtellis truncatis: diſco concavo-cylindrico.
Amœn. acad. 1. *p.* 93. *t.* 4. *f.* X. 3.
Volkm. ſileſ. ſubt. 1. *p.* 121. *t.* 19. *f.* 1. a. b.
Knorr Petreſ. 2. 2. *t.* I**. *f.* 2. & *t.* G. I*. *f.* 2. & 3. *ſuppl. t.* VI. b. *f.* 3.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta, parum rugoſa, articulis longitudine & latitudine æqualibus ſummo margine coaleſcentibus.

ſtellaris. 59. M. articulis proliferis centralibus ſolitariis, ſtellis margine dilatato coadunatis.
Amœn. acad. 1. *p.* 94. *t.* 4. *f.* XI. 4.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis inventa, frequens ad Gothlandiæ *littora, caulibus ſimplicibus parallelis, erectis, digiti craſſitie, palmaribus, & longioribus, cortice obſolete ſtriato, articulis cyathiformibus, pollicem longis.*

Organum. 60. M. coralliis cylindricis lævibus diſtantibus combinatis: membranis deflexis.
Amœn. acad. 1. *p.* 96. *t.* 4. *f.* VI. 1.
Forsk. Fn. ægypt. ar. p. 134. *n.* 11.
Habitat in mari rubro, *frequentius foſſilis, potiſſimum ad littora* maris Balthici, *caulibus parallelis craſſitie culmi ſecalini, diaphragmatibus ſtellarum ſtriis radiatis, interdum deficientibus.*

divergens. 61. M. ſubglobofa, cylindris divergentibus duplo diametri ultra ſuperficiem exſtantibus. *Forſk. Fn. ægypt. arab. p.* 136. *n.* 19.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia obvia, nunc mera organi varietas?

muſicalis. 62. M. corallis cylindricis ſtriatis diſtantibus, combinatis membranis confertiſſimis tranſverſis.
Pallas el. zooph. p. 317. *n.* 185. Madrepora (Organum) aggregata, cylindris ſimplicibus anguloſis, ſtellis cruſta terminali connexis prominulis.
Soland. & Ellis corall. p. 165. *n.* 55. Madrepora aggregata, cylindris ſtellarum ſtriatis diſtantibus combinatis membranis tranſverſis.
Ellis act. angl. 53. *p.* 432. *t.* 20. *f.* 14.
Borlaſ. Cornub. p. 241. *t.* 27. *f.* 7.
Habitat in Oceano indico, *ad* Hiberniæ *littora aliquando rejecta, lactea, maſſa ſæpe ingenti.*

denticulata. 63. M. ſtellis inæqualibus: lamellis margine elevatis; majoribus baſi proceſſu acutis, interſtitiis ſulco exaratis. *Soland. & Ellis corall. p.* 166. *n.* 56. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat - - -

faveolata. 64. M. ſtellis ſubangulatis multiradiatis: parietibus hinc inde ſubduplicatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 166. *n.* 57. *t.* 53. *f.* 5. 6.
Habitat - - -

Retepora. 65. M. ſtellis angulatis, lamellis filamentoſis, parietibus reticularis denticulatis. *Soland. & Ellis corall. p. 166. n. 58. t. 54. f. 3-5.*
Habitat - - -

rotuloſa. 66. M. ſtellis cylindraceis pauciradiatis, lamellis circa marginem erectis acutis, baſi ſpinula erecta acutis. *Soland. & Ellis corall. p. 166. n. 59. t. 55.*
Habitat - - -

ceſpitoſa. 67. M. coralliis teretibus ſubramoſis ſtriatis approximatis, ſtellis turbinato concavis, reticulatis.
Pallas el. zooph. p. 315. n. 184. Madrepora (*flexuoſa*) aggregata, cylindris ſubramoſis linearibus ſtriatis apice truncatis ſtellatiſque.
Imper. hiſt. nat. 818. Porus matronalis.
Aldrov. muſ. metall. p. 292. Pſeudocorallium album fungoſum.
Worm. muſ. p. 235. Millepora Imperati.
Mercat. metall. p. 134. Juncus lapideus.
Gualt. teſt. t. 61. Acropora ceſpitoſa albida ramoſa.
Habitat in mari mediterraneo, *alba, lapidea, maximæ ſæpe molis, frequens ſatis inter foſſilia.*

flexuoſa. 68. M. coralliis cylindricis ſcabris flexuoſis approximatis, ſtellis convexis ſtriatis.
Amœn. acad. I. *p.* 96. *t.* 4. *f.* XXIII. 5.
Habitat - - - *ad maris* Balthici *littora rejecta, an forſan mera ceſpitoſæ varietas?*

faſciculаris. 69 M. coralliis rectis cylindricis glabris divergentibus.
Pallas el. zooph. p. 313. n. 183. Madrepora (*cariophyllites*) aggregata, ſtellis diſtinctis cylindraceis turbinatis lamelloſis.
Imperat. hiſt. nat. 817. Millepora.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 795. Corallio affinis Madrepora.
Rumpf muſ. 6. *p.* 245. *t.* 87. *f.* 3. Cariophyllum ſaxeum.
Gualt. teſt. t. 106. *f.* G. Balanorum cylindraceorum glomus.
Shaw afr. app. p. 48. *n.* 17. Fungus tubulatus & ſtellatus.
Seb. muſ. 3. *t.* 108. *n.* 9. Madrepora tubuloſa, Acropora aliis.
Bonann. muſ. Kircher. t. 5. *f.* I.
Boccon. muſ. t. 9. *n.* 5. *f.* I.
Knorr delic. t. A. IV. *n.* 4.
Argenv. oryctol. t. 22. *f.* 6.
Bourg. petr. t. 4. *f.* 25. & *t.* 10. *f.* 47.
Volkm. ſil. ſubt. t. 17. *f.* 4.

Herm.

Herm. marlogr. t. 12. f. 10.
Habitat in Oceano indico, *alba, lapidea, ſolida, inæqualis, frequens inter foſſilia europæa.*

pectinata. 70. M. ſtellis orbiculatis: margine tumido dilatato radiato; interſtitiis punctatis.
Volkm. ſileſ. ſubt. 1. p. 121. t. 19. f. 2.
Knorr Petref. ſuppl. t. VI. g. f. 2.
Guett. mem. 2. p. 425. & 3. p. 509. t. 51. f. 2. Heliolitha.
Walch Naturf. 5. p. 45. n. 5.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia, in Sileſia, *epiſcopatu* Baſileenſi, *& prope* Veſuntium *reperta, ſtellis planis: lamellis circiter 30 inæqualibus denticulatis.*

rotularis. 71. M. polymorpha, ſtellis ſolitariis orbiculatis planis æqualiter radiatis: margine lævi plano vix prominulo.
Forsk. Fn. aeg. amb. p. 135. n. 15. Madrepora Serailia.
Guett. mem. 2. p. 421. & 3. p. 502. t. 47. f. 7.
Knorr Petref. II. 2. t. F. V. f. 1.
Walch. Naturf. 5. p. 47. n. 6.
Habitat in mari rubro, *aliis interdum marinis adnata, alba, ſolida, nunc ſubgloboſa, nunc explanata, ſtellarum diametro lineam circiter æquante.*

tubularis. 72. M. tubis cylindricis integerrimis prominulis in ſtellam inæqualiter radiatam expanſis.
Walch Naturf. 5. p. 48. n. 7.
Habitat. - - - hactenus modo inter foſſilia occurrens tubis craſſitie pennæ corvinæ, ſtellis lamellis 6 craſſioribus, interjectis inter ſingulas 3 minoribus.

mammillaris. 73. M. ſtellis orbiculatis prominulis verruciformibus acuto excavatis.
Guett. mem. 3. p. 514. t. 54. f. 3.
Walch. Naturf. 5. p. 50.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. t. 6. f. 3.
Habitat - - - hactenus tantum foſſilis prope Trajectum *ad* Moſellam & Veſuntium *inventa, ſtellarum limbo nullo.*

patelloides. 74. M. glabra, ſtellis magnis multiradiatis elatiuſculis: centro exili.
Guett. mem. 3. p. 506. t. 48. f. 2-4.
Büttn. corall. ſubt. p. 24. t. 3. f. 2.
Knorr. Petref. II. 2. t. F. VI. f. 4.
Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia obvia, ſtellarum radiis craſſis, æqualibus, ſæpe ultra 35.

globularis. 75. M. ſtellis magnis rotundatis æqualiter radiatis: centro amplo pertuſo.
Kundm. rar. nat. t. 10. *f.* 7.
Walch Naturf. 5. *p.* 51.
Habitat - - -

Filum. 76. M. ſtellis rotundis magnis ſubconfertis explanatis: centro minimo vix excavato.
Scheuchz. lithogr. helv. p. 36. *t. n.* 49. Aſtroites majoribus ſtellis.
Walch Naturf. 5. *p.* 54.
Habitat - - - prope Baſileam *inter foſſilia reperta, ſtellarum diametro* 3-4 *linearum.*

perforata. 77. M. ſtellis confertis exilibus excavatis: lamellis perforatis.
Walch Naturf. 5. *p.* 54-58.
Habitat - - - *interdum hemiſphærica diametro pedali, ſuperficie inæquali, ſtellarum radiis* 12, *an forſan varietas poritæ?*

vermicularis. 78. M. ſtellarum radiis inæqualibus undulatis explanatis.
Lang. lap. fig. Helv. p. 60. *t.* 20.
Bourg. petref. t. 3. *f.* 19.
Volkm. ſileſ. ſubt. p. 119. *t.* 18. *f.* 4. & ? 5.
Walch Naturf. 5. *p.* 58.
Habitat - - - *hactenus modo inter foſſilia occurrens, ſtellarum diametro* 5-6 *lineis æquali, radiis principalibus* 8, *nonnullis bifurcis, centro exili.*

arachnoides. 79. M. ſtellis confertis exilibus explanatis: radiis ſubundulatis brevibus æqualibus.
Plot. nat. hiſt. Oxf. t. 2. *f.* 7.
Hill. hiſt. of. foſſ. t. 7.
Guett. mem. 2. *p.* 435. & 3. *p.* 508. *t.* 49. *f.* 2.
Walch Naturf. 5. *p.* 59.
Scheuchz. litthogr. helv. f. 54.
Volkm. ſileſ. ſubt. p. 120. *t.* 18. *f.* 11.
Schroet. Einl. in Verſt. 3. *p.* 461. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat - - - *hactenus modo inter foſſilia reperta, hemiſphærica, ſtellarum radiis* 12 *ſeſe contingentibus.*

undulata. 80. M. ſtellis magnis elevatis: radiis elongatis arcuatis.
Bourg. petrif. 3. *f.* 23.
Guett. mem. 2. *p.* 441. 3. 491. *t.* 40. *f.* 1.
Walch Naturf. 5. *p.* 60.
Knorr Petref. II. 2. *t.* F. VI. *f.* 1.

Habitat - - - hactenus modo inter foſſilia reperta, ſtellarum diametro, 5-6 lineas æquante, radiis ad 24.

ſolida. 81. M. ſtellis undique contiguis: marginibus coadunatis membranaceis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 131.

Habitat in mari rubro, *inſignes ſcopulos ſola conſtituens, dura, ad ædes ſtruendas calcemque urendam adhibita, ſtellis concavis, ſeminis ſinapi magnitudine, margine tenuiſſimo fragili, lamellis nunc radiatis, nunc marginem modo occupantibus, centro orbiculato, verrucarum ſerie aſpero.*

Monile. 82. M. ſtellis infundibuliformibus diſco vacuis lamellis & parietibus obtectis, lamellis æqualibus radiantibus denticularis in alteram ſtellam continuatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 133. *n.* 6.

Habitat - - - hactenus modo foſſilis prope Djiddam Arabiæ *reperta, M. Ananas proxime aſſinis, ſtellis piſi magnitudine, centro ſemine ſinapi minore.*

dædalica. 83. M. ſtellis ſubhexagonis: parietibus unitis reticulatis interne & margine dentatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 133. *n.* 7.

Habitat in mari rubro, *ſtellis magnitudine lentis, niveis, tenuiſſimis, intus dentatis.*

monoſtiata. 84. M. parietibus inter ſtellas antiquas in linguas lanceolatas ſcabras elatis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 133. *n.* 8.

Habitat in mari rubro, *ſpongioſa, tenax, nivea, ſtellarum diametro linguis duplo minori.*

Contignatio. 85. M. planiuſcula orbiculata, ſtellis ad ambitum linearibus verſus centrum ſpectantibus, mediis ovatis divaricatis ſubcontiguis. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 134. *n.* 9.

Habitat in mari rubro, *diametri interdum pedalis, an diſtincta hujus familiæ ſpecies?*

Rus. 86. M. inæqualis ſpongioſa-papilloſa, ſtellis ſuperficialibus planiuſculis diſtantibus. *Forsk. Fn. aeg. arab. p.* 135. *n.* 14.

Habitat in mari rubro, *ſtellis ſubobſoletis, ſeminis ſinapi magnitudine.*

criſtata. 117. M. coralliis ventricoſo-conicis lævibus apicem verſus ſcabris, ſtellis angulato-rotundatis labyrinthiformibus: lamellis alternatim brevioribus ſeriatis inſtructis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 150. *n.* 24. *t.* 26.

Habitat ad Sinæ *littora.*

cuſpidata. 118. M. coralliis conicis ſulcatis; ſtellis turbinatis: lamellis rectis elongatis acutis. *Eſper Pflanzenth.* 3. *p.* 145. *n.* 26. *t.* 28.
Habitat ad Sinæ *littora.*

†††† Ramoſæ, *ſtellis diſtinctis, ambulacris tuberculoſis poruloſis.*

porites. 87. M. ſubramoſa compoſita ſcabra, poris ſubſtellatis confertis.
Pallas el. zooph. p. 324. *n.* 192. Madrepora polymorpha ſubramoſa convexa, ſtellulis minutis impreſſis punctato-ſcabris.
Imper. hiſt. nat. 802. *t.* 814. Corallium ſtellatum.
J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 805. Corallium ſtellatum minus album.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallium album ſtellatum majus.
Moriſ. hiſt. plant. 3. *t.* 10. *n.* 12. Porus albus pumilus ramoſior creberrime ſtellatus.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 15. Corallium poroſum typhoides ſtellulatum.
Turnef. inſt. p. 573. Madrepora alba ſtellata major.
Gualt. teſt. t. 20. Madrepora alba braſſicam floridam referens.
Soland. & Ellis corall. p. 172. *n.* 77. *t.* 47. *f.* 1. Madrepora ramuloſa, ramis clavato complanatis, ſtellis contiguis (lamellarum loco) cuſpidato-tuberculatis.
Sloan. jam. p. 53. *t.* 18. *f.* 4.
Brown jam. p. 391. *n.* 3. 4.
Muſ. Gottw. p. 61. *t.* 47. *f.* 3.
Boccon. muſ. t. 9. *f.* 1. 4.
Knorr delic. t. A. I. *f.* 3.
Habitat in Oceano indico, *&* Americam *auſtralem alluente, albiſſima, extrinſecus ſæpe griſea vel ſordida, ramis patulis ſubdichotomis vel alternis, obtuſiſſimis, punctis prominentibus exaſperata.*

digitata. 88. M. ramis clavato-complanatis, ſtellis ſparſis ſexradiatis: margine ſuperiore porrecto fornicato. *Soland. & Ellis corall. p.* 170. *n.* 74.
Pallas el. zooph. p. 326. *n.* 193. Madrepora ramoſa ſcabra, ramis ſubclavato compreſſis, ſtellis creberrimis prominulis deorſum ſpectantibus.
Rumpf amb. 6. *p.* 240. *n.* 3. Lithodendrum digitatum.
Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 11.
Habitat in Oceano indico; *ad varietatem ramoſam poritæ accedens, & media inter hanc & muricatam, alba, extrinſecus ex griſeo flaveſcens.*

damicornis. 89. M. ramoſiſſima, ramis attenuatis ſubdiviſis, ſtellis paſſim crebris cæcis ciliatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 170. *n.* 73.

Pallas el. zooph. p. 334 *n.* 197. Madrepora polymorpho ramoſiſſima, ramis ſubdiviſis attenuatis, poris crebris cæcis crenatiſque.

Imper. nat. hiſt. 626. Species corallii.

Moriſ. hiſt. plant. 3. *t.* 10. *f.* 11. Porus ſ. corallium aſtroites humilius, ramis alias latis & compreſſis; alias incertæ figuræ.

Mercat. metalloth. 6. *c.* 16. *p.* 124. Truncus corallites.

Shaw afr. app. p. 48. *n.* 33. 34. *t. n.* 33. Madrepora aſtroites ceratiformis.

Gualt. teſt. t. 104. b. Madrepora candida ramoſa, damæ cornua referens, foraminibus rotundis in ſuperficie inſignita.

Rumpf amb. 6. *p.* 240. *t.* 86. *f.* 3. Lithodendrum littoreum.

Knorr delic. nat. t. A. I. *f.* 4.

Habitat in Oceano africano *&* indico, *verrucarum defectu a verrucoſa diſcernenda.*

verrucoſa. 90. M. ramoſiſſima, ramis obtuſatis; ramulis numeroſiſſimis ſimplicioribus verrucæformibus, ſtellis ſparſis crebris ciliatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 172. *n.* 78.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1279. *n.* 32. *& O. Fabr. Fn. groenl. p.* 31. *n.* 433. Madrepora (damicornis) ramoſa compoſita verrucoſa poris ſparſis confertis immerſis margine ſolo crenatis.

Syſt. nat. X. *p.* 791. *n.* 9. Millepora damicornis.

J. Bauh. hiſt. 3. *p.* 805. Corallium candidius verrucoſum punctatum.

C. Bauh. pin. p. 366. Corallium album verrucoſum punctatum.

Tournef. inſ. p. 373. Madrepora verrucoſa punctata.

Weinm. phytanth. 2. *p.* 426. *f.* 2. Coralloides fiſtuloſa.

Habitat in Oceano, africano *&* indico.

muricata. 91. M. compoſita ſubimbricata, ſtellis oblique truncatis prominentibus adſcendentibus.

Hort. Cliffort. 481. Millepora ramoſiſſima, punctis ſubtus ſemiovatis prominulis, ramis acutis.

Muſ. Teſſin. 118. Madrepora ſpinoſa.

Syſt. nat. X. *p.* 792. *n.* 14. Millepora muricata.

Pallas el. zooph. p. 327. *n.* 294. Madrepora polymorpho-ramoſa, ſtellis creberrimis cylindraceis prominulis.

Soland. & Ellis corall. p. 171. *n.* 76. *t.* 57. Madrepora

ramuloſa, ramulis attenuatis, ſtellis prominentibus cylindraceis oblique truncatis.

Theophr. hiſt. pl. l. 4. *c.* 8. Thymum lapideum.
Aldrov. muſ. met. p. 278. Saccus concretus ex aquis ſtillantibus.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 7. *p.* 123. Planta ſaxea abrotanoides.
Worm muſ. p. 233. Corallium tuberoſum punctatum.
Beſl. muſ. t. 26. *f.* 4. Truncus lapidoſus.
muſ. Lochn. t. 23. Planta ſaxea alba.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 807. Abrotanoides ſaxea planta.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 656. *f.* 15. *t.* 10. *n.* 3. & 9. Porus albus erectior ramoſus, tuberculis crebris ſurſum ſpectantibus, & porus albus cupreſſiformis.
Plukn. pilgr. l. 3. *c.* 1. *ſ.* 5. *p.* 135. & *l.* 4. *c.* 6. *ſ.* 2. *p.* 448. 449. Corallium album.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 7. & 18. Corallium poroſum muricatum, & Corallium poroſum typhoides muricatum.
Tournef. inſt. p. 573. Madrepora abrotanoides, & Madrepora erectior ramoſa, tuberculis crebris ſurſum ſpectantibus.
Shaw. afr. app. p. 48. *n.* 25-28. Madrepora abrotanoides.
Valent. ind. 4. *t.* 52. *f.* DD. Arbuſcula marina coralloides alba.
Rumpf amb. 6. *p.* 239. *t.* 86. *f.* 1. Lithodendrum calcareum.
Brown jam. p. 391. *n.* 5. Madrepora ramoſa major muricata & ſtellata, aperturis cavernarum minoribus depreſſis.
Eph. Nat. Cur. Dec. II. A. III. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 1. Carana.
Lang. lap. fig. Helv. p. 57. *t.* 17. *n.* 1. 2. Corallium marinum ſquameum.
Weinm. phytanthoz. 2. *p.* 234. *t.* 426. *f.* 9. Coralloides gypſea lapidoſa.
Hill plant. p. 8. Madrepora ramoſiſſima poris minimis.
Forsk. Fn. æg. arab. p. 137. *n.* 24. Millepora muricata.
Gualt. teſt. t. ante 20. Madrepora albida digitata.
Bonann. muſ. Kirch. p. 265. *ic. p.* 285. *n.* 8.
Sloan. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 53. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 116. *f.* 5.
Knorr delic. t. A. II. *f.* 1. 2.
Valent. muſ. 1. *p.* 104. *t.* 8. *f.* 8. 13.
Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 2. 3.

α) ramis longis acuminatis, abſque ullis ramulis parvis.
Sloan. jam. 1. *p.* 51. *t.* 18. *f.* 3. Corallium album poroſum maximum muricatum.
Seb. muſ. 3. *t.* 1-4. *f.* 1.

β) ramis divaricatis: ramulis ſparſis brevibus acuminatis divergentibus.

γ) ramis ramuliſque adſcendentibus rectis ſubæqualibus ceſpitoſis.

δ) ramis inferioribus decumbentibus anaſtomoſantibus: ramulis adſcendentibus acutis brevibus.

Muſ. Teſſin. p. 118. *n.* 1. Madrepora corymboſa.

Brown jam. p. 391. *n.* 6. Madrepora maxima compreſſa palmata & muricata.

Marſ. hiſt. mar. p. 154. *t.* 34. *n.* 169. *f.* 1. 2. & *t.* 35. *n.* 170. Madrepora conica, Abrotanoides Trionfatti.

Rumpf amb. 6. *p.* 240. *t.* 86. *f.* 2. Lithodendrum calcareum ſeſſile.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 657. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 10. *Tournef. inſt. p.* 573. Porus albidus compreſſus frondiporæ ad inſtar cribriformis.

Shaw afr. app. p. 48. *n.* 30. Madrepora abrotanoides ramoſior tuberculis horizontaliter diſpoſitis.

Klein dub. p. 18. *t.* II. *f.* 1. Madrepora alba.

Kundm. rar. p. 159. *t.* 9. *f.* 10. 11. Saxum abrotanoides Cluſii.

Calceol. muſ. p. 12.

Muſ. Moſcard. l. 3. *c.* 2.

ε) ramis baſi in palmam coalitis; ramulis divergentibus.

Sloan. jam. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 5. *t.* 17. *f.* 3. Corallium poroſum album latiſſimum.

Davil. catal. ſyſtem. p. 18. *n.* 44-46. Cornes de Daim, & Charde Neptune.

Martin. n. Mannigf. 4. *p.* 10. *t.* 1. *f.* 1.

ζ) ramis ramuliſque numeroſis divergentibus; cylindris ſtellarum turbinatis margine incraſſatis rotundatis.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 6.

Habitat in mari Indiam & *auſtralem* Americam *alluente, utplurimum alba,* γ) *ruſeſcens.*

faſtigiata. 92. M. rudis ſubdichotoma faſtigiata, ſtellis exterius decorticatis.

Pallas el. zooph. p. 301. *n.* 175. Madrepora dichotoma faſtigiata, ſtellis terminalibus ſubturbinatis: lamellis integerrimis.

Seb. muſ. 3. *t.* 109. *f.* 1. *t.* 110. *f.* 3. & *t.* 116. *f.* 4.

Habitat in mari, Americam *auſtralem alluente, alba, in fruticulos ſæpe fere pedales excreſcens.*

ramea. 93. M. pinnata undulato ſtriata, ſtellis terminalibus. *Fn. ſuec.* 2216. *Müll. zool. dan. prodr.* 3042.

Pallas el zooph. p. 302. *n.* 176. Madrepora ramoſo-ſub-pinnata ferruginea, ſtellis terminalibus cylindraceis.
Tournef. inſt. p. 573. *t.* 340. Madrepora maxima arborea.
Worm. muſ. p. 233. Madrepora ramoſa Imperati.
Donat. adriat. p. 53. *t.* 6. & *act. angl.* 47. *p.* 105. *t.* 4. Madrepora, Porus matronalis.
Ginann. adr. 1. *p.* 8. *t.* 11. *f.* 5. Madrepora ramoſa.
Lobel hiſt. p. 651. Coralloides ſ. Corallii albi varietas.
Imperat. hiſt. nat. p. 651. Porus matronalis ramoſus.
Beſl. muſ. t. 25. Corallium maximum truncatum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 807. & *Shaw afr. app. p.* 48. *n.* 36. *t.* 36. Porus magnus.
C. Bauh. pin. p. 367. & *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 656. *ſ.* 15. *t.* 10. *f.* 1. Corallio affinis Porus magnus.
Petiv. gazoph. t. 76. *n.* 7. Corallium flaveſcens ſtriatum nodoſum.
Rumpf amb. 6. *p.* 245. *t.* 87. *f.* 4. Anthophyllum ſaxeum.
Torrub. hiſt. nat. hiſp. t. 10. *f.* 13. Acropora alba.
Planc. Conch. m. not. t. 18, Fungites ſive Caryophyllus marinus.
D'Aubent. ic. miſc. t. 47. Porus magnus.
Bonann. muſ. Kirch. t. 285. *f.* 6.
Knorr del. 1. *t.* A. VII. *f.* 2.
Habitat in mari atlantico, mediterraneo, norwegico. *ferruginea, ſaxea, fruticulis ad ſummum ſeſquipedalibus.*

oculata. 94. M. tubuloſa glabra flexuoſa oblique ſubſtriata, ramis alternis, ſtellis immerſis bifariis.
Pallas el. zooph. p. 308. *n.* 179. Madrepora ramoſiſſima coaleſcens lævis, ramulis flexuoſis, ſtellis ad flexuras ramorum concavis margine ſtriatis.
Hill plant. p. 6. Madrepora glabra poris magnis.
Imper. hiſt. nat. 815. Corallium album fiſtuloſum.
Beſler. muſ. t. 25. Corallium album indicum.
Valent. muſ. 1. *p.* 104. *t.* 8. Corallium album pelagicum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Corallium album oculatum. officinarum.
Weinm. phytanthoz. 2. *p.* 233. *t.* 426. a. Corallium album.
Rumpf amb. 6. *p.* 233. Accabarium album verrucoſum.
Eph. nat. Cur. Dec. II. A. 3. *obſ.* 42. *p.* 78. *t.* 3.
Seb. muſ. 3. *t.* 116. *n.* 12.
Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 4. & *t.* 49. *f.* 1.
Turgot. mem. inſtr. t. 22. E.
Knorr delic. t. A. I. *n.* 2.

Blackwell. herb. ed. germ. t. 342.
Habitat in Oceano indico, *intus perforata, alba, corallium album officinarum, inter foſſilia europæa quoque obvium.*

irginea. 95. M. ſubdichotoma recta ſolida, ſtellis alternis, eminentibus.
Müll. zool. dan. prodr. 3041.
Hort. Cliff. p. 481. Madrepora ſimplex ramoſa, ramis teretibus lævibus ſolidiuſculis, lamellis integris.
Tournef. inſt. p. 573. Madrepora vulgaris.
Gualt. teſt. p. 24. *n.* 3. *(ante t.* I.*)* Acropora alba foraminibus ſtellaris amplioribus.
Geſn. lap. fig. p. 132. b. *n.* 2. Corallium verrucoſum.
Imper. hiſt. nat. p. 809. Corallium album.
Boccon. muſ. p. 256. *t.* 9. *n.* 5. *f.* 6. Corallium fiſtuloſum Imperati.
Petiv. gaz. t. 76. *n.* 8. Corallium album majus radiatum & ſtellatum.
Marſ. hiſt. mar. p. 139. *t.* 30. *n.* 140.
Argenv. oryctol. p. 324. *t.* 15.
Pontopp. Norw. I. *p.* 282. *t.* 14. *f.* G.
Stroem. ſundm. I. *p.* 144. *&.*
act. Nidroſ. 4. *p.* 49. *t.* 8. *f.* 2-4.
Martin. n. Mannigf. 3. *p.* 419. *f.* I. 2.
Habitat in mari mediterraneo, americano, norwegico; *lactea, digiti minimi craſſitie, ſpithamea, diffuſa.*

oſea. 96. M. ramoſiſſima roſea; ramis attenuatis, ſtellis minutis paſſim congeſtis efflorеſcentibus. *Pallas el. zooph. p.* 312. *n.* 181.
Habitat in mari inſulam S. Dominici *alluente, ſolida, interdum flaveſcens, fruticulis ſemipalmaribus, an diſtincta ſatis a virginea?*

hirtella. 97. M. ſtellis undique alternis prominentibus: lamellis exſertis acutis. *Pallas el. zooph. p.* 313. *n.* 182.
Habitat rara in Oceano indico, *alba, virgineæ affinis, magis tamen cavernoſa.*

limitata. 98. M. ramis ſubcomplanatis, ſtellis ſparſis ſexradiatis margine æqualibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 172. *n.* 79.
Habitat - - - interſtitiis ſcabris, lineis ſubreticulatis exaratis.

botryoides. 99. M. ramis coacervatis craſſis faſtigiatis obtuſis, ambulacris reticulato-confragoſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 172. *n.* 80.
Habitat - - -

granoſa. 100. M. ſubramuloſa criſtata ſubdigitata, ramis obtuſis, ambulacris omnibus acute carinatis undulatis, ſtellis aceroſis irregularibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 175. *n.* 81.

Habitat - - -

prolifera. 101. M. ſubdichotoma reticulato-coaleſcens, ſtellis latere proliferis terminalibus concavis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3040.

Pallas el. zooph. p. 307. *n.* 178. Madrepora ramoſiſſima coaleſcens, ſtellis turbinatis margine proliferis axillaribus terminalibuſve.

Beſt. muſ. Lochn. t. 25. Corallium immaturum cinereo colore.

Weinm. phytanthoz. 2. *p.* 234. *t.* 426. *f.* 1. Coralloides lapidoſa poroſa.

Seb. muſ. 3. *t.* 116. *f.* 3.

Muſ. Gotwald. t. 47. *f.* 7.

Edw. av. t. 94.

Pontopp. norw. 1. *p.* 282. *n.* 3. *t.* 14. *f.* A.

Stroem ſundm. 1. *p.* 144. C.

Act. nidroſ. 4. *p.* 34. *t.* 2. *f.* 1. 2.

Habitat in mari norwegico, *alba, ſolidiſſima, ſtellis infundibuliformibus; lamellis circiter octonis.*

feriata. 102. M. tereti-ſubulata, poris ſtellaribus longitudinaliter ſeriatis. *Pallas el. zooph. p.* 336. *n.* 198.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1283. *n.* 46. Millepora (lineata) cauleſcens dichotoma teres, poris multiplicatis ſeriatis.

Soland. & Ellis corall. p. 171. *n.* 75. *t.* 31. *f.* 1. 2. Madrepora ramuloſa, ramis attenuatis acuminatis, ſtellis longitudinaliter ſeriatis: margine ſuperiore porrecto fornicato ciliato.

Pallas el. zooph. p. 41. *n.* 8. β? Eſchara areolata.

Marſ. hiſt. mar. t. 32. *f.* 152.

Habitat in Oceano *orientali, alba, ſaxea, calami, rarius digiti craſſitie, diffuſa ſubpedalis.*

Cactus. 103. M. ramis compreſſis divergentibus intricatis dichotomis margine carinatis: lateribus contigue ſtellatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 134. *n.* 13.

Habitat - - - *hactenus modo foſſilis inventa, pedalis ramis erectiuſculis tranſverſim ſeriatis.*

corymboſa. 104. M. corymbi ramis apice craſſioribus ſtriato aculeatis, ſtellis terminalibus ſolitariis repando-lobatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 137. *n.* 20.

Habitat - - - - ramis digiti craſſitie, ſtellis pollicem amplis.

gemmaſcens. 105. M. ſtellis prominulis obconicis.
Müll. Linn. ſyſt. 6. p. 107. t. 23. f. 7.
Habitat in Oceano indico, *nivea, ſtellis gemmas referentibus.*

problematica. 106. M. ſtellis obliquis minutis immerſis diſtantibus: margine lato punctato.
Knorr delic. 1. t. A. X. f. 3.
Muſ. Gottw. t. 49. f. 5.
Habitat circa inſulas Antillas, *ſaxea, ſcabra, thalaſſina, brachii interdum craſſitie, & ad 5 pedes alta, ſtellarum interſtitiis lineatis.*

ſpuria. 107. M. ſubramoſa ſubdichotoma, tubis cylindricis trabeculis inordinatim diſpoſitis repletis.
Pallas el. zooph. ed. germ. p. 145. n. 35. kk.
Habitat - - - ochroleuca, an hujus generis?

infundibuliformis. 108. M. turbinata infundibuliformis ſubprolifera.
Pallas el. zooph. p. 332. n. 195. Madrepora (Crater) infundibuliformis ſtriata, intus ſparſa ſtellis prominulis antiquatis.
Hort. Cliffort. p. 480. Madrepora cyathiformis turbinata interius prolifera.
Syſt. nat. X. p. 789. Tubipora infundibuliformis.
Gualt. teſt. t. 42. Choana ſaxea criſpata rugoſa, minimis poris.
Tournef. inſt. p. 376. Eſchara magna pulla piliformis.
Habitat in Oceano indico, *muricatæ affinis, alba, ſolida, boletum ſenio infundibuliformem referens; an hujus familiæ?*

angulosa. 109. M. dichotoma faſtigiata, ſtellis terminalibus turbinato-anguloſis: lamellis dentatis. *Pallas el. zooph. p. 299. n. 174.*
Seb. muſ. 3. t. 109. f. 2. 3.
Knorr del. 1. t. A. IV. f. 5.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente, brevis, craſſa, celluloſa, lævis, alba.*

diſcoides. 110. M. diſciformis ſubpedunculata ſcabriuſcula: ſtellis marginalibus faſciculatis. *Pallas el. zooph. p. 306. n. 177.*
Habitat rariſſima in Oceano indico; *an hujus familiæ?*

Chalcidicum. 111. M. ſtellarum tubis prominentibus remotis cylindricis exterius & interius lamellatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 136. n. 17.*

Habitat in mari rubro, *ſcabriuſcula; an hujus familiæ?*

concamerata. 112. M. plana, ſtellis margine prominulis remotis: interſtitiis lamellatis. *Forsk. Fn. æg. arab. p. 136. n. 18.*

Habitat - - - hactenus modo foſſilis reperta, ſtellarum lamellis introrſum minoribus, vix hujus familiæ.

roſacea. 113. M. cauleſcens ramoſa, ramulis cylindricis adſcendentibus appreſſis: ſtellis terminalibus. *Eſper Pflanzenth. Lief. 3. p. 115. n. 13. t. 15. f. 2-4.*

Knorr del. nat. ſel. 1. t. A. 2. f. 2.

Habitat - - - roſea, alba vel cana.

338. MILLEPORA. *Animal* Hydra. *Corallium* (utplurimum) ramoſum, poris turbinatis teretibus.

alcicornis. 1. M. compreſſa recta, poris ſparſis obſoletis.

Roy. lugdb. p. 526. Millepora plana ramoſiſſima ramorum faſtigio digitata.

Pallas el. zooph. p. 260. n. 161. Millepora ſolida depreſſa polymorpha lævis, poris minutiſſimis obſoletis ſparſis.

Soland. & Ellis corall. p. 141. n. 19. Millepora ramoſa ſolida compreſſa erecta polymorpha, poris ſparſis obſoletis.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. p. 896. Corallium aſperum candicans adulterinum.

Worm. muſ. p. 232. Alis cornu figura corallium.

Moriſ. hiſt. pl. 3. p. 656. f. 15. t. 10. n. 24. & 27. Corallium album fragile polyſchides, ramuſculis contiguis dumoſum & Corallium album digitatum, ramis contiguis in latitudinem diſpoſitis.

Petiv. pterigr. t. 18. f. 13. Corallium poroſum latum planum.

Brown. jam. p. 390. n. 1. Corallium brachiatum maximum ramis ſubcompreſſis æqualibus.

Geſn. lap. ſig. p. 132. b. n. 1. Chabr. ſtirp. p. 573. Gypſum coralloides.

Rumpf amb. 6. p. 243. Lithodendrum ſaccharaceum album.

Lhwyd lithoph. p. 6. n. 92. 93. t. 3.

Seb. muſ. t. 106. n. 8. t. 114. n. 1. t. 116. n. 8.

Knorr del. I. *t.* A. II. *n.* 3.
Edw. av. t. 94.
Habitat in mari indico, & Americam auſtralem *alluente, ſæpe alia corpora* v. g. *gorgonias, lagenam vitream, nucleos nucis cocos incruſtans, aut ſaxorum fruſta includens, nivea, lævis, ſolida, ſaxea, interdum fragilis, poris minimis remotis vix conſpicuis.*

ærulea. 2. M. plana ſcabra laminis craſſis varie tortuoſis ſubdiviſa: apicibus ſæpe lobatis poriſque ſubſtellatis cylindricis utrinque inſtructis. *Solander & Ellis corall. p.* 142. *n.* 20. *t.* 12. *f.* 4.
Pallas el. zooph. p. 256. *n.* 158. Millepora plana laciniata irregularis ſcabra, poris utrinque cylindricis intus ſulcatis.
Pet. gaz. t. 10. *f.* 12. Coralloides philippenſis cærulea.
Habitat maſſis immenſis in Oceano indico, *milleporas madreporis nectens.*

ſpera. 3. M. ſubcompreſſa muricata, poris eminentibus hinc fiſſis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3045. *Act. Nidr.* 4. *p.* 64. *t.* 2. *f.* 20–22.
Gualt. teſt. t. 55. Madrepora ramis denſe ſurculoſis palmatis criſpis verrucoſe hirſutis.
Marſ. hiſt. mar. t. 32. *f.* 152–157.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *erecta, biſaria, teretiuſcula, poris ad ramos confertis latere inferiore fiſſis.*

olida. 4. M. turbinata, poris confertiſſimis angulatis.
Habitat – – – *ad* Gotlandiæ *littora rejecta, pororum tubis intus ſeptis tranſverſis.*

runcata. 5. M. dichotoma erecta, ramis truncatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3043.
Stroem. ſundm. I. *p.* 142. ♂. *Act. Havn.* 10. *p.* 258. *t.* 9. *f.* 10. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 432. *n.* 435.
Pallas el. zooph. p. 249. *n.* 153. Millepora teres dichotoma ramis divaricatis truncatis, poris undique crebris minutis.
Soland. & Ellis corall. p. 141. *n.* 18. *t.* 23. *f.* 1–8. Millepora cauleſcens dichotoma, ramis truncatis divaricatis, poris quincuncialibus operculatis.
Donat. adr. 55. *t.* 7. & *act. angl.* 57. *t.* 17. *f.* 1–8. Myriozoum.
Ginann. op. poſth. 2. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 3. Madrepora.
Marſ. hiſt. mar. p. 145. *t.* 32. *n.* 154. Madrepora piſcatoribus Denguoni dicta.
Beſl. muſ. Lochn. t. 23. Planta hirſuta forma corallii.

Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 9-11. 21. & 3. *t.* 9. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo, ſeptentrionali, *ex griſeo flaveſcens, & veluti vernice obducta, fragiliſſima, intus cineraſcens, ramis divaricatis ſubdichotomis, contiguis coaleſcentibus, poris quincuncialibus.*

miniacea. 6. M. minima, ſublobata rubra poris crebris minutis punctata.
Soland. & Ellis corall. p. 137. *n.* 12. Millepora rubra.
Pallas el. zooph. p. 251. *n.* 154. Millepora pumila ſubramoſa rubra, punctis crebris impreſſis minutis.
Brown. jam. p. 391. *n.* 1. Madrepora minima ſubverrucoſa rubra.
Habitat in mari mediterraneo, americano, indico *baſi latiore aliis coralliis, teſtaceis, ſcopulis adhærens, vix ultra ¼ pollicis alta, punctis minutis albis varia, apice poris exilibus marginatis pertuſa.*

cervicornis. 7. M. ſubcompreſſa dichotoma utrinque cellifera, oſculis tubuloſis prominulis. *Soland. & Ellis corall. p.* 134. *n.* 8.
Pallas el. zooph. p. 252. *n.* 155. Millepora plana dichotoma, poris utrinque ordinatis ſcabris.
Marſ. hiſt. mar. p. 144. *t.* 32. *f.* 152. 153. Madrepora ramis compreſſis miniacea.
Imper. hiſt. nat. p. 820. Porus cervinus.
Bonann. muſ. Kircher. t. 286. *n.* 13.
Ginann. op. poſth. 2. *t.* 5. *f.* 14.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 7.
Habitat in mari mediterraneo, *rariſſima ad* Cornubiæ *littora obvia, ex griſeo luteſcens, intus albida, exterius vernice quaſi obducta,* 5-6 *pollices alta.*

Skenei. 8. M. plana compreſſa ſubramoſa utrinque cellifera, cellulis ſeriatis alternis turbinatis galeatis: fauce hiante, labio inferiori denticulo unico prædito. *Soland. & Ellis corall. p.* 135. *n.* 9.
Habitat ad Scotiæ *littora prope* Aberdaen, *ſcopulis affixa alba, vernice quaſi argentea fucata.* Skene.

pumila. 9. M. depreſſa, ramis ſparſis inordinatis retuſis undique poroſis ſcabriuſculis. *Pallas el. zooph. p.* 253. *n.* 156.
Marſ. hiſt. mar. t. 36. *f.* 175.
Habitat in mari mediterraneo, *teſtaceis ſcopuliſque affixa,* 3 *pollices alta, ramoſiſſima, pallide griſea, intus alba, ſolida.*

compreſſa. 10. M. caulescens ſubdichotoma compreſſiuſcula, ramis diſtantibus, poris undique prominulis ſcabris.
Habitat in mari mediterraneo. D. Kaehler.

lichenoides. 11. M. caulescens decumbens bifarie dichotoma, ramis denticulatis binis poroſis ſcabris. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 432. *n.* 436. *Müll. zool. dan. prodr.* 3046. *Forsk. Fn. æg. arab. p.* 138.
Pallas el. zooph. p. 245. *n.* 150. Millepora in plano dichotoma, ramis ſubparallelis denticulatis, ſupra poroſa.
Soland. & Ellis corall. p. 139. *n.* 16. Millepora (tubipora) proclinans in plano dichotoma, ramulis flexuoſis ſubparallelis denticulatis, ſupra poris prominulis ſubtus ſtriatis.
Ellis corall. t. 35. *f.* b B.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 10.
Marſ. hiſt. mar. t. 33. *f.* 162-164.
Ginann. adr. 1. *t.* 1. *f.* 4.
Boddaert zooph. t. 8. *f.* 2.
Habitat in mari mediterraneo, norwegico, *aliis zoophytis, fucis, ſaxis adhærens, digiti circiter longitudine, lactea, fragiliſſima.*

violacea. 12. M. in plano ramoſa, ramulis adſcendentibus flexuoſis tereti-compreſſis: ſutura poroſa marginem ambiente. *Soland. & Ellis corall. p.* 140. *n.* 17.
Pallas el. zooph. 258. *n.* 159. Millèpora pumila ſubramoſa violaſcens, ſuturis longitudinalibus poroſis.
Rumpf amb. 6. *p.* 243. Lithodendrum ſaccharaceum rubrum.
Habitat in mari indico & auſtrali, *nitida violacea,* 3 *pollices circiter alta, punctis elevatis aſpera, hinc inde verrucoſa, poris ad utrumque latus longitudinaliter ſeriatis.*

tubulifera. 13. M. ſolida ramoſa, poris tubuloſis ſparſis, ramis confluentibus extrema attenuatis ſcabris. *Pallas el. zooph. p.* 259. *n.* 160.
Marſ. hiſt. mar. p. 147. *t.* 31. *f.* 147. 148. Madrepora ramis conicis.
Habitat in mari ſiculo, *palma vix altior, alba, ſolida, trunco ramiſque adultioribus lævibus.*

faſcialis. 14. M. membranacea ramoſa flexuoſa utrinque poroſa.
Pallas el. zooph. p. 42. *n.* 9. Eſchara lapidea lamelloſo-frondoſa: laminis conglomeratis, utrinque poris quincuncialibus.

Soland. & Ellis corrall. p. 133. *n.* 7. Millepora (tænialis) plana anguſta ramoſa utrinque poroſa, ramis flexuoſis coalitis.
Raj. ſyn. p. 31. Eſchara retiformis.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 809. Reticulum marinum.
Marſ. hiſt. mar. p. 148. *t.* 33. *f.* 160. *n.* 1-3.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 6.
Ellis corall. p. 72. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in mari mediterraneo.

foliacea. 15. M. lamelloſa flexuoſa utrinque poroſa. *Soland. & Ellis corall. p.* 133. *n.* 6.
Ellis corall. p. 71. *t.* 30. *f.* a. A. B. C.
Habitat in mari ſeptentrionali, *teſtacea & ſaxa incruſtans, 3 pollices ad pedem uſque longa.*

zeylanica. 16. M. membranis laciniofis concreſcentibus teneris, cellulis utrinque ſeriatis oblongis.
Pallas el. zooph. p. 44. *n.* 10. Eſchara zeylanica.
Habitat in Oceano indico, *alba.*

forniculoſa. 17. M. cruſtacea, cellullis ſeriatis fornicatis labiolo ringentibus, membrana prætenſa clauſis.
Pallas el. zooph. p. 47. *n.* 12. Eſchara forniculoſa.
Habitat in mari, Americam auſtralem *alluente; aliis coralliis adhærens, fluſtræ foliaceæ facie, nonne potius celleporis adnumeranda?*

cruſtulenta. 18. M. cruſtaceo ſubfrondeſcens polymorpha; cellulis ſeriatis oblongis membrana clauſis, ſeptis integerrimis.
Pallas el. zooph. p. 39. *n.* 8. Eſchara cruſtulenta.
Baſter. opuſc. ſubſ. 1. *l.* 2. *p.* 83. *t.* 7. *f.* 4. 5. Eſchara lapideſcens.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 2.
Habitat in Seelandiæ Belgii *foſſis ſalſis lacubuſque maritimis*, Mauritaniæ *littore &* Oceano atlantico, *ex cineraſcente alba, in glomeres ſubgloboſos compacta.*

eroſa. 19. M. cruſtacea, cellulis detectis margine laterali pectinatis.
Pallas el. zooph. p. 38. *n.* 7. Eſchara eroſa.
Habitat in mari americano, *rupibus agglutinata, cellularum dentibus erectis ſubulatis, utrinque circiter 4.*

reticulata. 20. M. membranacea, ramis anaſtomoſantibus depreſſis linearibus, hinc poris prominentibus aſperis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 433. *n.* 437.

Pallas

Pallas el. zooph. p. 241. *n.* 147. Millepora (frondipora) clathrata umbilicata undulato polymorpha, ramulis altero latere verrucoſis poroſiſſimis.

Soland. & Ellis corall. p. 138. *n.* 15. Millepora ramoſa in planum expanſa ramis dichotomis bifariam anaſtomoſantibus ſupra ſcabris poris aſperis ſubtus lævibus.

Imper. hiſt. nat. p. 821. Frondipora, Porus frondoſus, cruſta marinà.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 809. Frondipora.

Tournef. inſt. p. 576. Eſchara marina.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 10. *p.* 109. Alcyonium polyphillum.

Ginann. op. poſth. 1. *p.* 9. *t.* 4. *f.* 8. Frondepora; Eſchara marina.

Argenv. oryctol. p. 367. *t.* 22. *f.* 5. Retepora lapidea ſ. Eſchara marina.

Bonann. muſ. Kircher. p. 266. *n.* 14. *t.* 43. *n.* 12.

Marſ. hiſt. mar. t. 34. *f.* 165. 166.

Roques de Maum. polyp. p. 72. *t.* 15. *f.* C.

Forsk. Fn. æg. arab. p. 138. *n.* 29.

Habitat in mari mediterraneo, *rara in* mari Groenlandiam *alluente*, *levis*, *alba*, *fragiliſſima horizontalis*, *convoluta*, *ramoſiſſima*, *poris ſupra acuminatis confertis ſcabra.*

elluloſa. 21. M. membranacea reticulata umbilicata turbinato-undulata, hinc poroſa pubeſcens. *Müll. zool. dan. prodr.* 2047.

Pontopp. hiſt. nat. Norw. 1. *t.* 14. *f.* F. *Strocm. ſundm.* 1. *p.* 142. a.

Act. Nidroſ. 4. *p.* 77. *t.* 3. *f.* 1. d. f. & *f.* 3.

Pallas el. zooph. p. 243. *n.* 148. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2. Millepora (Retepora) reticulata umbilicata infundibuliformis criſpa, ſuperiore latere pubeſcens poroſaque.

Soland. & Ellis corall. p. 139. *n.* 14. Millepora (foraminoſa) reticulata infundibuliformis inordinate undulato-plicata, latere ſuperiori tantum poroſa.

Ellis corall. p. 72. *t.* 25. *f.* d. D. F. Retepora Eſchara marina.

Imper. hiſt. nat. p. 821. Retepora.

Raj. ſyn. p. 31. *n.* 1. Eſchara retiformis.

Rondel. aq. 2. *p.* 133. *Geſn. piſc.* 1575. *p.* 155.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 809. *Tournef. inſt. p.* 576. Eſchara.

Argenv. oryctogr. t. 22. *f.* 2.

Rumpf amb. 6. *p.* 247. *t.* 87. *f.* 5. Reticulum marinum.

d'Aubent. ic. miſc. t. 23. Manchette de Neptune.

Bonann. muſ. Kircher. t. 286. *f.* 10.

Chabr. ſtirp. ic. 577.
Kundm. rar. nat. t. 12. *f.* 3.
Marſ. hiſt. mar. p. 149. *t.* 33. *f.* 161. *n.* 12.
Ginann. adr. p. 9. *t.* 4. *f.* 9.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 11. & *t.* 101. *f.* 5. 6.
Knorr delic. t. A. III. *f.* 3.
Borlaſ. Cornw. t. 24. *f.* 10.
Walch Naturf. 3. *t.* 5. *f.* 2.
Muſ. Gottwald. t. 48. *f.* 5.
Roques de Maum. polyp. t. 15. *f.* A. B.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 12-15.
Habitat in mari mediterraneo, indico, norwegico, *fundo, rupibus, fucis, gorgoniis adhærens, ad* 3 *pollices alta, fragiliſſima, ſolidiuſcula, alba, extrinſecus griſea, incolis vivaciſſimis.*

clathrata. 22. M. umbilicata reticulata, ramulis planis dichotomis anaſtomoſantibus hinc poroſis. *Pallas el. zooph. p.* 145. *n.* 149.
Habitat in Oceano indico, *inter celluloſam & lichenoidem quaſi media, alba, centro ſolido ſeſſilis.*

Reticulum. 23. M. filis ramoſiſſimis anaſtomoſantibus cancellatis.
Habitat in mari mediterraneo, *concharum teſtis adhærens, filis capillaribus, telæ araneæ in modum reticulatis.*

ſpongites. 24. M. cauleſcens erecta, ramis angulatis imbricatis anaſtomoſantibus.
Muſ. Teſſin. 118. *t.* 11. *f.* 2. Corallium reticulatum.
Habitat - - - poris non conſpicuis, ſtatura ad ſpongiam accedens, pedem longa, ramis digitum craſſis.

coriacea. 25. M. ſubmembranacea ſemiorbicularis ſubhorizontalis, rarius poroſa.
Pallas el. zooph. p. 263. *n.* 162. Millepora alba ſolidiſſima folioſa, laminis ſeſſilibus ſemicircularibus congeſtis.
Imper. hiſt. nat. p. 840. Muſcus lapidoſus, nonnullis Halcyonium quintum Dioſcoridis.
Shaw afr. app. p. 47. *t. f.* 1. Alcyonium candidum cretaceum lamellatum maris numidici.
Bonann. muſ. Kircher. t. 289. *f.* 16.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 258. *t.* 9. *f.* 15.
Habitat in mari atlantico & numidico, *fucum cartilagineum ſæpe incruſtans, & in coralliis aliis concamerationum quaſi tecta efficiens, poris in pagina inferiori, ſed rarius ſparſis, vix hujus generis.*

calcarea. 26. M. ramoſa albiſſima ſolida dichotoma, ramulis attenuatis coaleſcentibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 129. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 13.

Habitat in mari mediterraneo, *lactea, 4 pollices alta.*

polymorpha. 27. M. cruſtacea polymorpha ſolida, poris nullis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3048. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 433. *n.* 438.

Pallas el. zooph. p. 265. *n.* 163. Millepora (calcarea) cruſtacea rameſcens ſolidiſſima albiſſima lævis.

Soland. & Ellis corall. p. 130. *n.* 2. Millepora faſciculata ſolida, ramulis difformibus tuberculatis.

Ellis corall. p. 76. *t.* 27. *f.* c. Corallium pumilum album fere lapideum ramoſum.

Raj. ſyn. p. 32. *Boerh. hort. lugdb. ind.* 2. *p.* 3. Corallium album pumilum noſtras.

Petiv. pterogr. t. 18. *f.* 5. Corallium album noduloſum.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. Corallium maritimum, calcareis rupibus adnaſcens.

Sloan. jam. 1. *t.* 18. *f.* 2. Corallium album pumilum.

Brown. jam. p. 390. *n.* 2. Corallium minimum ſubramoſum glabrum.

Royen prodr. lugdb. p. 521. *n.* 2. & 3. Iſis alba faſciculata ramis difformibus tuberculatis, & Iſis nuclei juglandis figura.

Beſl. muſ. Lochn. t. 23. Alcyonium album.

Planc. Conch. t. 10. *f.* e. b. & *t.* 13-17. Petrobryum.

Bonann. muſ. Kircher. t. 289. *f.* 15.

Ginann. op. poſth. 1. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 2.

Seb. muſ. 3. *t.* 108. *f.* 8. & *t.* 116. *f.* 6. 7.

Borleſ. Cornw. p. 239. *f.* 2-5.

Blackw. herb. (ed. germ.) 4. *t.* 343.

Habitat in omni oceano, *albiſſima, gypſo duriori, lævis, & cretaceo pulvere ſæpe conſperſa, palmi & quod excedit, altitudine, ramoſiſſima, Norwegis ad calcem coquendam adhibita.*

decuſſata. 28. M. cretacea lamellata, laminis varie decuſſantibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 131. *n.* 3. *t.* 23. *f.* 9.

Habitat ad Luſitaniæ *littora, maſſis 5-6 pollices diametro æquantibus.*

Alga. 29. M. laminis tenuibus ſemicircularibus horizontaliter folioſa.

Soland. & Ellis corall. p. 131. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 10-12. Millepora lichenoides.

Habitat ad Cornubiæ *littora, rubra, purpuraſcens, flava aut albicans.*

pumicoſa. 30. M. multiformis fragilis ſcaberrima e cellulis mucronatis ſubgloboſis compoſita. *Soland. & Ellis corall. p.* 135. *n.* 10.
Ellis corall. p. 75. *t.* 27. *f.* f. F.
Habitat in mari Britannico, *ſertularias ſæpius incruſtans, ramulis cylindricis, cellulis alternis, nonne potius madreporæ ſpecies?*

tubuloſa. 31. M. paraſitica, cellulis tubuliformibus: feriebus tranſverſe diſpoſitis. *Soland. & Ellis corall. p.* 136. *n.* 11.
Ellis corall. p. 74. *t.* 27. *f.* e. E.
Habitat in mari mediterraneo & ſeptentrionali, *ſertulariæ falcatæ adhærens, purpuraſcens.*

pinnata. 32. M. dichotoma erecta, poris tubuloſis pinnulatim digeſtis. *Pallas el. zooph. p.* 242. *n.* 151.
Marſ. hiſt. mar. p. 152. *t.* 31. *f.* 167. *n.* 1. 3. 4. & 2. 3. 5. & *p.* 153. *t.* 34. *f.* 158. *n.* 1-3.
Habitat in mari mediterraneo, *recens cineraſcens, interdum viridis, ad pollicem uſque alta, fragilis.*

liliacea. 33. M. reptans laciniata, poris ſupra tranſverſim feriatis tubuloſis. *Pallas el. zooph. p.* 248. *n.* 152.
Syſt. nat. X. *n.* 3. Tubularia ſerpens.
Planc. Conch. app. p. 112. *c.* 25. *t.* 18. *f.* n. N. Madrepora roſacea.
Marſ. hiſt. mar. p. 153. *t.* 34. *f.* 168. *n.* 4. 6.
Habitat in mari mediterraneo & Cornubiam *alluente, alba, proſtrata laciniis linearibus, obtuſis, criſtis tranſverſis quaſi pectinatis, an diſtincta ſatis a tubuloſa?*

Carduculus. 34. M. polymorpha membranacea concentrice rugoſa: tubulis centralibus trigono-pyramidalibus. *Cavolin. pol. mar.* 1. *p.* 71. *t.* 3. *f.* 19. 20.
Habitat in mari mediterraneo, *lentis magnitudine, alba, ſubpellucida cardui florem quodammodo referens, ſerpulis utplurimum adhærens.*

339. CELLEPORA. *Animal* Hydra.
Corallium foraminulis arceolatis ſubmembranaceis.

ramuloſa. 1. C. dichotomo faſciculata, ramulis teretibus obtuſis, tubis confertiſſimis cylindricis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3049.
Habitat in Oceano norwegico, *fragiliſſima, quaſi ex arena compoſita, ramoſiſſima.* Gunner.

ſpongites. 2. C. lamellis ſimplicibus undulato-turbinatis cumulatis, cellulis ſeriatis, oſculo marginato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 439.
Pallas el. zooph. p. 45. *n.* 11. Eſchara lapidea membranacea, lamellis ſimplicibus undulato-turbinatis cumulatis: cellulis ſeriatis.
Soland. & Ellis corall. p. 132. *n.* 5. Millepora fragiliſſima, cellulis ſeriatis, lamellis ſimplicibus tubuloſo-turbinatis varie coaleſcentibus.
Mercat. metalloth. 112. Adarce.
Imperat. hiſt. nat. 632. & *Gualt. teſt. t.* 70. 71. Porus anguinus.
Beſl. muſ. t. 28. Lapis ſpongiæ.
Bonann. muſ. Kircher t. 11. *f.* k.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 3. *f.* 16-18.
Habitat in mari mediterraneo, *etiam* boreali, Groenlandiam *alluente, lactea, griſea, vel rubra, ſtriata, nitida, cellularum oſculis calamorum organi muſici aperturas referentibus.*

Pumicoſa. 3. C. corallio dichotomo erectiuſculo ſubcompreſſo ſcabro.
Pallas el. zooph. p. 154. *n.* 157. Millepora multiformis fragiliſſima e cellulis gibbis mucronatis coacervata.
Ellis cor. p. 75. *n.* 7. *t.* 27. *f.* F. & *t.* 30. *f.* DD.
Bol. Cornw. t. 24. *f.* 8.
β) *Marſ. hiſt. mar. t.* 31. 32. *f.* 149-151.
Planc. Conch. t. 27. *f.* 1.
Habitat in mari indico, atlantico, mediterraneo, germanico, anglico, norwegico, *ad* Spitzbergen *uſque.*

verrucoſa. 4. C. cellulis ſubrotundo-glomeratis ovatis: ore ſubtridentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 434. *n.* 440.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 789. Tubipora verrucoſa.
Habitat in maris mediterranei & norwegici *fucis & teſtaceis, alba, punctis minutiſſimis poroſa.*

ciliata. 5. C. cellulis convexis : ore ſeptemdentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 434. n. 441.*
Pallas el. zooph. p. 38. n. 6. Eſchara cruſtacea lapideſcens, cellulis ore ciliato ſeptemſpinoſis.
Habitat in maris mediterranei & ſeptentrionalis *fucis, cana, ciliorum in oſculis numero inconſtanti.*

hyalina. 6. C. cellulis ſubgloboſis diaphanis : ore oblique ſimplici. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 435. n. 442.*
Cavolin. pol. mar. 3. p. 242. t. 9. f. 8. 9.
Habitat in Oceano, *frequens fucorum, teſtaceorum milleporarum cruſta alba verrucoſa.*

nitida. 7. C. cellulis ſubcylindricis pellucidis annulatis : ore ſimplici terminali. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 435. n. 443.*
Habitat in maris, Groenlandiam *alluentis, ulvis aliiſque algis minoribus, alba, nitidiſſima, pellucida.*

annulata. 8. C. cellulis ovalibus ventricoſis punctato-annulatis : oſculo ringente ſubquadridentato. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 436. n. 444.*
Pallas el. zooph. p. 48. n. 13? Eſchara (annularis) lapidea incruſtans, cellulis annulatim digeſtis cylindricis, oſculo biverrucoſo.
Habitat in Oceani *fucis, lepadibus, lapidibus, pulcherrimo, cellulis glabris rubentibus.*

340. ISIS.

Animal creſcens plantæ forma.
Stirps lapidea articulata : articulis longitudinaliter ſtriatis ſubſtantia ſpongioſa vel cornea connexis, carne molliori poroſa atque celluloſa obductis.
Oſcula hydris oviparis obſeſſa.

Hippuris. 1. I. ſtirpe corallina : articulis ſtriatis, geniculis attenuatis. *Fn. ſuec. 2220.*
Hort. Cliffort. 480. Sertularia ramoſiſſima articulis ſulcatis.
Muſ. Teſſin. 118. Sertularia eadem.
Pallas el. zooph. p. 233. n. 140. Iſis articulata diffuſa alterne ramoſa, cortice craſſo lævi poroſo.
Soland. & Ellis corall. p. 105. n. 2. t. 3. f. 1-5. Iſis ſtirpe articulata lapidea ramulis ſparſis oſſe articulis cylindricis.

lapideis albis ſulcatis, internodiis carneis nigris conſtrictis connexis, carne ſubalbida poroſa craſſa, oſculis in quincunces diſpoſitis, polypos octotentaculatos obtegentibus.

Cluſ. exot. 124. Hippuris ſaxea.
Rumpf amb. 6. *p.* 228. *t.* 84. Accabarium album.
Gualt. teſt. 118. *f.* 16. Lithophyton articulatum internodiis ſtriatis.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 788.
Aldrov. muſ. metall. p. 289. *n.* 2.
Olear. muſ. p. 69. *t.* 35. *f.* 4.
Beſl. muſ. p. 78. *t.* 23.
Bonann. muſ. Kircher. t. 42. *n.* 5.
Valent. ind. litt. t. 8. *f.* 2-4.
Valentyn ind. 3. *t.* 51. *f.* AAA.
Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 3. & *t.* 110. *n.* 12.
Knorr delic. t. A. I. *n.* 5.
Edw. av. t. 93.

β) Iſis elongata. *Eſper Thierpfl.* 1. *t.* 6.

Habitat in Oceano *omni, rupibus adhærens, teſtacea & alia marina includens, articulis utplurimum albidis.*

dichotoma. 2. I. ſtirpe corallina: articulis lævibus, geniculis decorticatis.

Pallas el. zooph. p. 229. *n.* 143. Iſis articulata filiformis dichotoma diffuſa, cortice fulvo verrucoſo.
Petiv. gazoph. t. 3. *f.* 10. Hippuris coralloides carnea capenſis.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 4.

Habitat in Oceano indico & æthiopico, *circiter ſemipedalis, ſubflexuoſa, articulis ſubpellucide carneis, cortice cinnabarico, papillis convexis, in ramis ſuperioribus confertiſſimis, obſeſſo.*

ochracea. 3. I. ſtirpe corallina: articulis decorticatis, geniculis nodoſis.

Hort. Cliffort. 480. Lithoxylon ramoſum erectum articulatum rigidum, ramis ſæpius liberis oppoſitis compreſſis, geniculis craſſiuſculis.
Pallas el. zooph. p. 230. *n.* 144. Iſis articulata paniculato-dichotoma ramoſiſſima explanata, cortice hinc papilloſo.
Soland. & Ellis corall. p. 105. *n.* 1. Iſis ſtirpe eroſo-ſtriata lapidea rubra dichotoma explanata ramoſiſſima articulata, geniculis nodoſis ſpongioſis fulvis, carne flaveſcente, oſculis ſtellatis, polypos octotentaculatos obducentibus.
Ellis act. angl. 50. *p.* 188. *t.* 3. Corallium rubrum indicum.
Rumpf amb. 6. *p.* 234. *t.* 85. *f.* 1. Accabarium rubrum.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 63. Pſeudocorallium croceum.

Boerh. ind. pl. 2. *p.* 4. Corallium geniculatum capillaceum, apice ramoſo, roſeum.
Moriſ. hiſt. pl. 1. *p.* 657. *n.* 14. Hippuris ſaxea fulvo-rubra Goncteniana.
Seb. muſ. 3. *t.* 140. *f.* 1. Accabaar ſ. Corallodendron vulgare rubrum.
Habitat in Oceano indico, *baſi rupibus adhærens, ſaturate rubra, rariſſime præter genicula ſpongioſa lutea, alba.*

Entrocha. 4. I. ſtirpe teſtacea tereti: articulis orbiculatis perforatis, ramis verticillatis dichotomis.
Habitat in pelago, ſtirpe *digiti craſſitie, confertiſſime articulata ex orbiculis planis centro perforato: foramine pentagono diſco utroque e centro ſubſtriato, ſuperficie exteriori ſ. corticali inæquali, ordine tuberculorum cincto, (quæ ramorum deciduorum cicatrices)*; ramis *tenuibus dichotomis, continuis nec articulatis, unde* Entrochi & Coralloides *ejuſdem ſpeciei petrificata.*

Aſteria. 5. I. ſtirpe teſtacea articulata pentagona, ramis verticillatis: ſtella terminali dichotoma.
Ellis encrin. 1764. 4. *t.* 13. *f.* 14. Encrinus capite ſtellato ramoſo dichotomo, ſtipite pentagono equiſetiformi.
Guettard act. Pariſ. 1761. Palma marina e Martinica.
Act. angl. 52. *t.* 14.
Habitat in Oceano, Barbados *alluente.*
Ex hac derivanda frequentiſſime illa montium europæorum petrefacta Aſteriæ *dicta.*

coccinea. 6. I. pumila varie ramoſa, ramulis divaricatis, oſſe articulato lineari ſubſtriato ruberrimo, internodiis brevibus ſpongioſis fulvis, carne intus pallide roſea, extus cellulis elevatis verruciformibus coccineis: oſculis minimis. *Soland. & Ellis corall. p.* 107. *n.* 3. *t.* 12. *f.* 5.
Habitat in Oceano indico, 2-3 *pollices alta, nitidiſſime coccinea, rarius alba.*

ANTIPATHES. *Animal* creſcens plantæ facie. *Stirps* intus cornea ſpinulis exiguis obſita, baſi explanata, extus carne gelatinoſa, verrucis polypiferis obducta.

ſpiralis. 1. A. ſimpliciſſima ſpiralis ſcabra. *Soland. & Ellis corall. p.* 99. *n.* 1. *t.* 19. *f.* 1-6.
Pallas el. zooph. p. 217. *n.* 141. Antipathes ſimpliciſſima attenuata flexuoſo-ſpiralis, ſpinulis ſeriatis ſcabra.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 4. *β.* Gorgonia ſpiralis.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallina nigra ſetacea circumvoluta.
Pon. bald. ital. p. 230. Antipathis vel Corallinæ quarta ſpecies.
Tournef. inſt. p. 574. Lithophyton nigrum ſetaceum circumvolutum.
Rumpf amb. 6. *p.* 202. *t.* 78. C. Palmjuncus anguinus.
Valentyn ind. 3. *t.* 52. *f.* BB. Tali aros ſ. funis aquatilis.
Ephem. Ac. Caeſ. Nat. Cur. Dec. 2. A. 3. *p.* 78. *t.* 4. *f.* 4.
Habitat in mari indico, mediterraneo, norwegico, *atra, rigidiſſima, fragilis, longiſſima, calami ſcriptorii craſſitie.*

Ulex. 2. A. ramoſiſſima ramis ſparſis patentibus hiſpidiſſimis attenuatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 100. *n.* 2. *t.* 19. *f.* 7. 8.
Habitat in mari indico, *ramis tuberculis ovatis cavis ex fuſceſcente luteis ſparſis, cornuum ad inſtar nunc ſurſum, nunc ad latera, nunc deorſum verſis, an ovariis? obſeſſis.*

ſubpinnata. 3. A. ramoſa pinnata hiſpida, pinnulis ſetaceis alternis, aliis rarioribus tranſverſim exeuntibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 101. *n.* 3. *t.* 19. *f.* 9. 10.
Habitat in mari mediterraneo, *cinerea, ſpinulis ſuccineis.*

Myriophylla. 4. A. incurva ramoſiſſima pinnata, pinnulis hinc ramoſis ſetaceis. *Soland. & Ellis corall. p.* 102. *n.* 4. *t.* 19. *f.* 11. 12.
Pallas el. zooph. p. 210. *n.* 135. Antipathes incurva ramoſiſſima pinnataque, ramis ſparſis divaricatis, pinnulis rariuſculis ſetaceis, hinc ramoſis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 5? Ericæ facie frutex marinus.
Petiv. gaz. t. 35. *f.* 12. Myriophyllum indicum ramoſiſſimum.
Breyn prodr. 2. *p.* 35. *ic. p.* 33. *t.* 29. Lithophytum fuſcum ſubhirſutum ramis tenuiſſime diviſis & ſubdiviſis.
Rumpf amb. 6. *p.* 209. Erica marina tenuis.

Habitat in Oceano indico, & mari mediterraneo, *interdum ſeſquipedalis, aſperrima ex flavicante fuſca, lepades teſtaceaſque affixa, ſibi ſæpius habens.*

alopecuroides. 5. A. ramoſa, ramis arcte paniculatis hiſpidis ſetaceis. *Soland. & Ellis corall. p.* 102. *n.* 5.
Habitat ad Carolinæ ſeptentrionalis *littora, ad 2 fere pedes alta, griſea, intus ſplendens, nigra, baſi dilatata, ramis altero latere explanatis, ſulco medio exaratis.*

Cupreſſus. 6. A. ſimplex ſcabra paniculata, ramis recurvatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 103. *n.* 6.
Pallas el. zooph. p. 213. *n.* 138. Antipathes (cupreſſina) trunco ſimplici longiſſimo flexuoſo ramulis confertis recurvis ramoſiſſimis paniculato.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 4. *α.* Gorgonia (Abies recta) ſimplex ſcabra paniculata, ramis recurvatis.
Syſt. nat. X. *n.* 7. Gorgonia (ænea) paniculata, ramis muricato-ſcabris.
Rumpf amb. 6. *p.* 207. *t.* 80. *f.* 2. Cupreſſus marina.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico, *ad 2 uſque pedes longa, trunco pennæ cygneæ craſſitie, tomento griſeo hiſpida, intus aterrima.*

orichalcea. 7. A. ænea lævis, trunco ſimplici rigidiſſimo ramis ſpiraliter ſparſis dichotomis paniculato. *Pallas el. zooph. p.* 215. *n.* 139.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1290. *n.* 5. Gorgonia (ænea) paniculata, culmo flexuoſo, ramis alternis confertis dichotomis.
Rumpf amb. 6. *p.* 227. *t.* 80. *f.* 2.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 17-19.
Valentyn ind. 3. 2. *p.* 545. *col.* 1.
Habitat in Oceano indico, *ſubpedalis, rigidiſſima, rarior.*

dichotoma. 8. A. longiſſima dichotoma erecta. *Pallas el. zooph. p.* 216. *n.* 140.
Marſ. hiſt. mar. p. 105. *t.* 21. 22. *f.* 101. *& p.* 68. *t.* 40. *f.* 179. *n.* 1. 2.
Habitat in mari mediterraneo, *ad 2 uſque pedes alta, teres, obſcura.*

clathrata. 9. A. ramoſiſſima intricata, ramulis confuſis ubique coaleſcentibus: junioribus ſetaceis. *Pallas el. zooph. p.* 212. *n.* 137.
Hort. Cliff. p. 479. *n.* 2. Iſis flexilis fruticoſa, caule ſubdiviſo, ramulis ſetaceis ſtrictis undique prominentibus.

Bocc. muſ. p. 259. *t.* 9. Antipathes ſpinoſa exilis reticulata arborea indica, aut Antipathes exilis aſpalatoides.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 652. *ſ.* 15. *t.* 10. *n.* 18. Fruticulus marinus aſperiuſculus; ramulis ferulaceis ſpinulis exeuntibus.
Habitat in Oceano indico, *lepadibus & milleporis ſæpe obſeſſa, ſemipedalis vel pedalis, intus atra.*

Flabellum. 10. A. explanata ramoſiſſima ſubdiviſa, ramulis bifariam ramoſis reticulatim cohærentibus *Pallas el. zooph. p.* 111. *n.* 136.
Rumpf amb. 6. *p.* 209. Ericæ marinæ affinis.
Habitat in Oceano indico, *undulato curvata, ſemipedalis fere diametri, atra, tenerrima ſcabritie hiſpida.*

Pennacea. 11. A. ramoſa ſubincurva, ramis pinnatis: pinnulis ſetaceis creberrimis hiſpidis. *Pallas el. zooph. p.* 209. *n.* 134.
Rumpf muſ. 6. *p.* 209. Accabaar rutturuttu ſ. Erica marina craſſa.
Aldrov. muſ. met. p. 848. *ic.* 1. Peucites priſma.
Habitat in Oceano indico, *griſeo-ſcabra, intus atra, pedem fere alta, truncis pedem craſſitie æquantibus.*

Ericoides. 12. A. ramoſiſſima hiſpidiſſima atra, ramis ſparſis, ramulis ubique crebris ſubulatis. *Pallas el. zooph. p.* 208. *n.* 133.
Rumpf amb. 6. *p.* 207. Cupreſſus marina prior.
Habitat in Oceano indico, *circiter pedalis, aterrima.*

Fœniculacea. 13. A. ramoſiſſima, ramis ſetaceis decompoſito pinnatis. *Pallas el. zooph. p.* 207. *n.* 132.
Rumpf amb. 6. *p.* 208. *t.* 80. *f.* 3. Fœnum marinum.
Habitat in mari mediterraneo, *pedem ſæpius excedens, atra.*

341. GORGONIA. *Animal* creſcens plantæ facie.
Stirps coriacea ſuberoſa, lignoſa, cornea, oſſea, teſtacea, fibris vitreis contexta vel lapidea, ſtriata, attenuata, baſi explanata, tecta carne molliori vaſculoſa & celluloſa, poſt exſiccationem ſpongioſa & friabili.
Oſcula polypifera, nutrimentum ſorbentia & ovipara.

lepadifera. 1. G. dichotoma, floribus ſparſis confertis reflexis campanulatis imbricatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3059. *Pontopp. Naturg. Norw.* I. *p.* 252. *t.* 13. *f.* 11.
Pallas el. zooph. p. 204. *n.* 131. Gorgonia (Reſeda) alterne ramoſa diffuſa, cortice calyculis recurvis calloſis confertis coagmentato.
Soland. & Ellis corall. p. 84. *n.* 8. *t.* 13. *f.* 1. 2. Gorgonia dichotoma, oſculis confertis reflexis campanulatis imbricatis, carne ſquamulis albis obducta, oſſe in ramulis majoribus teſtaceo, in minoribus corneo.
Gunner. act. Nidroſ. 2. *p.* 321. *t.* 9. Gorgonia reſediformis.
Cluſ. exot. 122. *t.* 123. Planta reſedæ facie.
Worm muſ. 329. Planta marina reſedæ facie.
Beſl. muſ. t. 24. Reſeda marina.
Baſt. op. ſubſ. 2. *p.* 130. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat in mari norwegico, $1\frac{1}{2}$-2 *pedes alta, pallida, cortice albo, baſi lapidea, ramis cartilagineis.*

verticillaris. 2. G. pinnata ramoſa, ramulis alternis parallelis, floribus verticillatis incurvis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3060.
Pallas el. zooph. p. 177. *n.* 109. Gorgonia teres longa pinnata, pinnis alternis ſetaceis ſubramoſis, poris corniculatis verticillatis.
Soland. & Ellis corall. p. 83. *n.* 7. Gorgonia teres pinnata ramoſa, ramulis alternis parallelis, oſculis verticillatis incurvatis, carne ſquamulis albidis vitreis obtecta, oſſe e laminis ſubteſtaceis nitidis compoſito.
Ellis corall. p. 60. *t.* 26. *f.* S. T. V. Sea-Feather.

Marſ. hiſt. mar. 101. *t.* 20. *f.* 94-96.
Habitat in mari norwegico, mediterraneo, 2-3 *pedes alta, alba, junior flava, ramis flexilibus.*

Placomus. 3. G. biſaria ramis flexuoſis rarius anaſtomoſantibus, floribus conicis eminentibus. *Fn. ſuec.* 2223. *Müll. zool. dan. prodr.* 3061.
Pallas el. zooph. p. 201. *n.* 129. Gorgonia teres lignoſa dichotoma, cortice calyculis cylindricis coronatis.
Soland. & Ellis corall. p. 86. *n.* 10. Gorgonia plana dichotoma, ramis flexuoſis rarius anaſtomoſantibus, oſculis conicis ſetaceis eminentibus, oſſe ſubſtantia fere lignoſa.
Ellis corall. p. 67. *t.* 27. *f.* aA. A 1. A 2. A 3. Warted Sea-Fan.
Gunner act. Nidr. 3. *p.* 1. *t.* 1. Gorgonia flabelliformis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 5. *p.* 122. Frutex marinus ericæ facie.
Breyn. prodr. 3. *t.* 29. Lithoxylon fuſcum ſubhirſutum.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 86. Corallina lignoſa ericæ facie Parkinſoni.
Raj. ſyn. p. 32. Keratophyton flabelliforme cortice verrucoſo obductum.
Borl. corn. p. 238. *t. f.* 1. Flabellum marinum.
Marſ. hiſt. mar. p. 93. *t.* 17. & *p.* 157. *t.* 35. *f.* 171.
Pontopp. hiſt. nat. norw. 1. *p.* 273. *t.* 11. *n.* 2. 3.
Stroem. ſundm. 1. *p.* 145. *n.* 11. 1.
Habitat in pelago Europæo, mari mediterraneo & indico, *erecta, 2 pluresve pedes alta, flava, punicea, rarius rubicunda vel cinerea, lignoſa.*

mollis. 4. G. coriacea dichotoma, corticis calyculis tubuloſis perpendicularibus. *Pallas el. zooph. p.* 203. *n.* 130.
Habitat in mari mediterraneo, *fere ſemipedalis ex fuſco violacea, ramis flagelliformibus, cortice fuſco.*

ſuccinea. 5. G. teres flavo-cornea dichotoma, cortice undique poris verruciformibus hiantibus. *Pallas el. zooph. p.* 200. *n.* 128.
Habitat - - - rariſſima, dimidium pedem ſuperans, rigidiſſima, cortice teſtaceo.

americana. 17. G. ramoſa pinnata, ramulis ſuboppoſitis, compreſſis, oſculis polypiferis in marginibus ſeriatim diſpoſitis, carne albido flaveſcente intus purpuraſcente, oſſe corneo.
Soland. & Ellis coral. p. 87. *n.* 11. *t.* 14. *f.* 3. Gorgonia pinnata.
Habitat in mari Americam *mediam alluente frequens, purpurea aut flava, ſetoſæ affinis.*

exſerta. 18. G. teres ſparſa ramoſa, ramulis alternis, polypis octotentaculatis exſertis, carne ſquamulis albis veſtita, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. & Ellis corall. p. 87. n. 12. t. 15. f. 1. 2.*

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, 2 circiter pedes alta, ramis albis.*

patula. 19. G. compreſſa tortuoſe ramoſa ſubpinnata ruberrima, oſculis diſtichis ſubrotundis haloni ſubalbido incluſis, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. & Ellis corall. p. 88. n. 13. t. 15. f. 3. 4.*

Habitat in mari mediterraneo.

ceratophyta. 6. G. ſubdichotoma, axillis divaricatis, ramis virgatis biſulcatis, cortice rubro, poris bifariis.

Muſ. Teſſ. 118. Lithophytum ramis virgatis atris, cortice albido poroſo.

Pallas el zooph. p. 185. n. 117. Gorgonia depreſſiuſcula dichotoma, ramis adſcendentibus, corticis purpuraſcentis poris diſtiche ſparſis ſimplicibus.

Soland. & Ellis corall. p. 81. n. 4. t. 12. f. 2. 3. Gorgonia dichotoma, axillis divaricatis, ramis virgatis adſcendentibus biſulcatis, carne purpurea, polypis niveis octotentaculatis diſtiche ſparſis, oſſe atro corneo ſuffulta.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. p. 806. Coralloides fruticoſa planta marina erectior.

C. Bauh. pin. 366. Corallina fruticoſa purpurea.

Geſn. lap. fig. p. 136. Lithophyton marinum rubri ſ. purpurei coloris.

Lobel hiſt. pl. p. 630. Corallina rubens antipathis facie, an Quercus marina foliis myricæ Theophraſti.

Pluken amalch. p. 102. *t.* 454. *f.* 13. Fucus teres ramoſus, pini ſetis ſurſum rigentibus, cinerea quadam cruſta, velut gypſo, creberrimis foraminibus referta obductis.

Bocc. muſ. t. p. 8. Corallina fruticoſa.

Petiv. Gaz. t. 31. *f.* 8. Coralloides epiſpongioſa, virgulis dilute purpureis.

Marſ. hiſt. mar. p. 99. *t.* 19. *n.* 83. Lithophytum quartum.

Catesb. Carol. 2. *t.* 13. Corallina fruticoſa erectior.

Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* B.

Seb. muſ. 3. *t.* 107. *n.* 3.

Ginann. adr. t. 8. *f.* 21?

Knorr delic. t. A. V. *n.* 2.

Muſ. Gottw. t. 46. *f.* 1.

Forsk. Fn. æg. ar. p. 128. *n.* 78.

Habitat in mari mediterraneo, atlantico, Americam *auſtralem alluente, pedem circiter alta, carne purpurea, polypis albis.*

Juncea. 20. G. ſimpliciſſima teres utrinque attenuata, oſſe corneo fuſco, carne ochracea biſulcata oſculis crebris linearibus notata. *Soland. & Ellis corall. p.* 81. *n.* 3.

Pallas el. zooph. p. 180. *n.* 112. Gorgonia ſimpliciſſima attenuata ſubflexuoſa, cortice craſſo rubro verrucoſo.

Plin. hiſt. m. t. 13. *c.* 25. Junci lapidei.

Rumpf amb. 6. *p.* 126. Palmjuncus albus.

Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 1. a.

Habitat in mari Americano, *teſtaceis adhærens, aurantia, 3 circiter pedes alta, dum viva, valde flexilis.*

Flammea. 21. G. compreſſa ramoſa ſubpinnata, oſſe complanato corneo, carne miniata oſculis creberrimis parvis notata. *Soland. & Ellis corall. p.* 80. *n.* 2. *t.* 11.

Habitat circa promontorium Bonæ Spei, *ignei coloris.*

Umbraculum. 22. G. flabelliformis ſubreticulata, ramis creberrimis teretibus divergentibus carne rubra verrucoſa obductis. *Soland. & Ellis corall. p.* 80. *n.* 1. *t.* 10.

Habitat in mari indico, *coloris lateritii, trunco brevi in 2-3 ramos ramoſos diviſo.*

Purpurea. 23. G. ſubdichotoma, ramis divaricatis virgatis, cortice violaceo ſubverrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 187. *n.* 118.

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, teres, lævis, nigra, extremis flagellis flava.*

Saſappo. 24. G. dichotoma teres, ramis divaricatis virgatis, cortice rubro, cellulis undique piloſo-muricatis. *Pallas el. zooph. p.* 188. *n.* 119.

Rumpf amb. 6. *p.* 223. *t.* 83. Accarbaar Saſappo ſ. Virga ſanguinea.

Habitat in Oceano indico, *pedem longa, & longior, nigra, cornea, lepades frequenter ſibi affixas gerens.*

Palma. 25. G. plana multifida, laciniis ſubſimplicibus longiſſimis, corticis lævigati poris ſparſis ſimplicibus. *Pallas el. zooph. p.* 189. *n.* 120.

Cluſ. exot. l. 4. *c.* 12. *p.* 85. Chamæripha peregrina.

Habitat in Oceano indico, 2 *interdum plures pedes longa, fuſca, cornea in extremis ramis flexiliſſima, cortice calcareo.*

radicata. 29. G. homogenea ſuberoſa, poris ſparſis minimis, baſi multifida. *Pallas el. zooph. p.* 190. *n.* 121.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *n.* 6.
Habitat in mari, Africam *meridionalem alluente, ramoſiſſima, ſubdichotoma, griſea, ſuberi ſimilis, trunco bipollicari ramoſo.*

ſuberoſa. 37. G. lignoſa dichotoma ramoſiſſima diffuſa, ramis compreſſis ſulco aratis, poris ſparſis ſubſtellatis. *Pallas el. zooph. p.* 191. *n.* 122.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. *n.* 24. Arbor marina ramoſa ſuber perfecte referens cinerea ubique eleganter & ordinata ſerie pertuſa.
Soland. & Ellis corall. p. 93. *n.* 19. Gorgonia ramoſa ſubdichotoma, ramis longioribus craſſis teretibus, adſcendentibus, carne miniacea ſpongioſa, oſculis ſubſtellatis in quincunces fere diſpoſitis, oſſe pallide rubro ſuberoſo.
Ellis corall. p. 64. *t.* 26. *f.* P. Q.
Turgot. mem. inſtr. t. 23. *f.* C.
Habitat in mari indico & Africam *meridionalem alluente, pallida, ſæpe tripedalis, cortice obſolete lateritio.*

coralloides. 28. G. lignea erecta ſubdichotoma difformis, cortice roſeo tuberoſo, poris verruciformibus ſtellatis. *Pallas el. zooph. p.* 192. *n.* 123.
Bocc. obſ. ep. 3. *t. p.* 15. Corallium lignum incruſtans.
Habitat in mari mediterraneo, *circiter ſubpedalis pallide griſea tenaciſſima, oſculis flavis.*

elongata. 7. G. dichotoma divaricata cortice rubro poris papuloſis ſparſis ſubimbricatis.
Soland. & Ellis corall. p. 96. *n.* 23. Gorgonia dichotoma divaricata, ramis longioribus adſcendentibus, carne tetragona rubra craſſa, oſculis erectis ſecundum angulos ſubimbricatis, oſſe tenui corneo flaveſcente.
Pallas el. zooph. p. 179. *n.* 111. Gorgonia longiſſima recta dichotoma, cortice rubeſcente, verruculis poriferis quincuncialibus.
Habitat in mari atlantico, *pallida, fragilis, ad* 4 *fere pedes longa.*

ſcirpea. 20. G. ſimpliciſſima recta, baſi decompoſita ſolioſa, cortice molli verrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 182. *n.* 113.
Habitat in mari indico, *fuſca, apice attenuata, cortice (ſicco) cinereo.*

30. G.

ſetacea. 30. G. ſimplex rigida, cortice calcareo-albo ſubverrucoſo.
Pallas el. zooph. p. 182. *n.* 114.
Habitat in mari, Americam *alluente*, *nigricans.*

viminalis. 31. G. longiſſima depreſſa ramoſo-ſubpinnata, ramis divaricatis ſetaceis, cortice flavo, poris prominulis diſtichis. *Pallas el. zooph. p.* 184. *n.* 116.
Soland. el. Ellis corall. p. 82. *n.* 5. *t.* 12. *f.* 1. Gorgonia ramis ſubteretibus divaricatis ſetaceis ſparſis erectis, carne flava, polypis albis octotentaculatis diſtichis.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 18. 19. *p.* 128. 129. Iſidis Plocamum II. & III.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipedalis*, *tenuiſſima*, *cornea*, *ex fuſco lutea.*

muricata. 32. G. teres ramoſo-dichotoma diffuſa cortice craſſo poris cylindricis arrectis muricato. *Pallas el. zooph. p.* 198. *n.* 127.
Soland. & Ellis corall. p. 82. *n.* 6. Gorgonia compreſſa ramoſa dichotoma, carne craſſa ſubalbida, oſculis cylindricis arrectis muricatis, oſſe ancipite corneo nigricante.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 9. 10. Epicorallum virgulis muricatis majoribus & minoribus.
Tournef. inſtr. 1. h. *p.* 574. Lithophyton americanum minus album tuberculis ſurſum ſpectantibus obſitum.
Tournef. act. Pariſ. 1700. *p.* 34. *ic.* 1. Lithophyton americanum maximum pullum, tuberculis ſurſum ſpectantibus obſitum.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. *n.* 12.
Catesb. carol. 3. *t.* 37.
Knorr delic. t. A. 6. *n.* 4.
Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* A.
Ginann. adr. 1. *p.* 16. *t.* 10. *f.* 23.
Habitat in archipelago americano, 2-3 *pedes alta*, *ex coriaceo cornea*, *nervo medullari albicante.*

verrucoſa. 8. G. bifaria, ramis flexuoſis, cortice calcareo albido: poris prominulis.
Pallas el. zooph. p. 196. *n.* 126. Gorgonia teres ſubdichotoma divaricata, cortice alba calcareo tuberculoſo.
Soland. & Ellis corall. p. 89. *n.* 14. Gorgonia in plano ramoſa flabelliformis, ramis teretibus flexuoſis, oſculis prominulis papilloſis albidis, oſſe tereti ſubſtantia lignoſo-cornea.
Geſn. lap. fig. ic. p. 135. b. & *p.* 137. Lythophyton marinum,

Lobel. hiſt p. 650. Corallinæ Antipathis facie varietas; corallina alba.
Imperat. hiſt. nat. p. 653. *c.* 14. Fucus veſtimento nodoſo.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallina alba nodoſa.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 808. f. *p.* 809. Coralloides granuloſa alba.
Worm. muſ. p. 234. Frutex verrucarius ſ. vermicularis.
Raj. hiſt. plant. 3. *p.* 7. Frutex marinus flabelliformis, cortice verrucoſo obductus.
Raj. ſyn. p. 32. Ceratophyton flabelliforme, cortice verrucoſo obductum.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 21. *p.* 132. Iſidis palma.
Petiv. muſ. 10. Erica marina alba fruteſcens. &
Tournef. inſt. 1. h. Lithophytum album nodoſum, Lithophytum cortice verrucoſo albo.
Sloan. jam. cat. p. 3. *hiſt.* 1. *p.* 56. Corallina fruticoſa humilior & craſſior, ramis quaquaverſum expanſis, ſuperficie tuberculata.
Sloan. act. angl. v. 44. *n.* 478. *p.* 51. *t.* 2.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 7. *n.* 4. 5.
Marſ. hiſt. mar. p. 91. 96. 104. *t.* 16. 18. 21.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *n.* 3.
Knorr delic. 1. *t.* A. V. *f.* 1.
Ginann. adr. 1. *p.* 14. *t.* 7. *f.* 20. 21.
Forſk. Fn. æg. arab. p. 129. *n.* 81.
Act. angl. 50. *t.* 34. *f.* 19. a.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 1.
Habitat in mari mediterraneo, & Americam *auſtralem* Cornubiamque *alluente, utplurimum ſaxo adhærens, rarius lepadem calceolum obducens, exſiccata ſordide alba aut cinerea, ſeſquipedalis & altior.*

Antipathes. 9. G. paniculato-ramoſa ligno exterius flexuoſe ſtriato.
Pallas el. zooph. p. 193. *n.* 124. Gorgonia fruticans ramoſiſſima erecta, ramis alternis divaricato-adſcendentibus, cortice craſſo lævi, poris magnis ſparſis.
Lobel. hiſt. p. 650. Antipathes ſ. Corallium nigrum Dioſcoridis.
C. Bauh. pin. p. 366. Corallium nigrum.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 804. Antipathes ſ. Corallium nigrum.
Tournef. inſt. p. 574. Lithophyton nigrum arboreum.
Boerh. ind. h. Lugd. 2. *p.* 6. *n.* 7. Keratophyton arboreum nigrum.
Valent. ind. litt. p. 501. *t.* 8. *f.* 1. a. Accabaar pohon.
Rumpf amb. 6. *p.* 196. *t.* 77. Accabaar item ſ. Corallium nigrum.

Seb. ephem. Ac. C. N. C. Dac. 2. *ann.* 3. *obſ.* 24. *p.* 77. *t.* 3. Corallium nigrum ramoſum.
Valentyn ind. 4. *t.* 52. *n.* 51. *epit. p.* 28. Accarbaarium nigrum.
Seb. muſ. 3. *t.* 104. *n.* 2. & *t.* 107. *n.* 4. Corallium nigrum.
Ginann. adr. 1. *p.* 17. *t.* 13. 14. *f.* 29.
Knorr delic. t. A. I. *f.* 1. & *t.* A. VI. *f.* 1.
Muſ. Gottwald. p. 63. *t.* 49. *f.* 4. 6.
Donat. monogr. t. 1. 2.
Habitat in Oceano indico, & mari mediterraneo, 2 & *plures pedes alta, cornea, aterrima, cortice ex griſeo cinereo,* Corallium nigrum *officinarum.*

anceps. 10. G. paniculata ſubdichotoma, cortice compreſſo calcareo margine poroſo.
Pallas el. zooph. p. 183. *n.* 115. Gorgonia teres ſubdichotoma diffuſa, cortice calcareo depreſſo-ancipiti marginibus poroſo.
Soland. & Ellis corall. p. 89. *n.* 15. Gorgonia ramoſa ſubdichotoma, carne depreſſo-ancipiti, marginibus oſculoſis, oſſe ſubtereti attenuato, ſubſtantia corneo ſubcoriacea.
Ellis corall. p. 68. *t.* 27. *f.* 9. *n.* 2. Sea-Willow.
Raj. ſyn. p. 32. Keratophyton dichotomum, caule & ramulis leviter compreſſis.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 12. Epicorallum virgulis alatis.
Sloan. jam. catal. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 56 *n.* 15. *t.* 22. *f.* 4. Corallina fruticoſa ramulis & caulibus compreſſis quaquaverſum expanſis purpureis elegantiſſimis.
Cateſb. Carol. 2. *t.* 34. Lithophytum compreſſum obſcure luteſcens, marginibus purpureis aſperis.
Habitat in mari Americam & magnam Britanniam *alluente, ad ſeſquipedem alta, recens eleganter violacea, poſt flava vel alba.*

nobilis. 33. G. in plano ramoſa dichotoma ſubattenuata, carne miniacea lubrica molli vaſculoſa, oſculis octovalvibus conicis ſubhiantibus ſparſis, polypos albidos octotentaculatos bifariam cirratos exſerentibus, oſſe lapideo ruberrimo extus ſtriato & foveolato. *Soland. & Ellis corall. p.* 90. *n.* 16. *t.* 13. *f.* 3. 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1288. *n.* 6. Iſis ſtirpe corallina æquali continua, ſtriis obſoletis obliquis, ramis vagis.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 797. Madrepora rubra.
Pallas el. zooph. p. 223. *n.* 142. Iſis continua dichotoma ſubattenuata, cortice cartilagineo ſparſim papilloſo;

Ellis corall. p. 93. *t.* 35. *f.* a. Red Coral.
Royen prodr. p. 521. *n.* 1. Iſis rubra, ramis patulis retiuſculis.
Donat. adr. p. 43. *t.* 5. Corallum rubrum.
Stapel in Theophr. p. 28.
Geſn. lap. fig. p. 132.
Aldrov. muſ. metall. p. 290.
J. Bauh. hiſt. pl. l. 39. *c.* 33.
C. Bauh. pin. p. 366.
Worm. muſ. p. 231.
Gans hiſt. corall. Froſt. 1669. *c. ic.*
Bonann. muſ. Kircher p. 265. *t. p.* 284. *n.* 1.
Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 60.
Calceol. muſ. p. 3. *ic.*
Boccon. obſ. 1674.
Tournef. hiſt. p. 572. *t.* 339.
Marſ. hiſt. mar. p. 108. *t.* 22-29. & *p.* 168. *t.* 40. *f.* 180.
Mercat. metalloth. p. 114.
Knorr delic. t. A. *n.* 1. 2. & *t.* A. II. *n.* 4.
Seb. muſ. 3. *t.* 115. *f.* 1-7.
Ginann. op. poſth. p. 7.
Blackw. herb. ed. germ. 4. *t.* 341. a. b.
Cavolin. pol. mar. 1. *t.* 2.

Habitat in mari mediterraneo & rubro, *a cujus accolis in calcem uritur, & in varias figuras elaboratur,* corallium rubrum *officinarum, iſidi affinis, pedalis, ad ſummum altitudinis.*

craſſa. 34. G. teres dichotoma, ramis craſſis virgatis divaricatis adſcendentibus, carne violacea craſſa, oſculis prominulis æquidiſtantibus, polypos octotentaculatos marginibus cirratis exſerentibus, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. & Ellis corall. p.* 91. *n.* 17.

Act. Pariſ. 1700. *p.* 34. *t.* 2. Lithophyton americanum maximum cinereum cortice punctato.
Hugh. barbad. t. 27. *f.* 1.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

pinnata. 11. G. compreſſiuſcula pinnata, ramis compreſſis ſimpliciſſimis, cortice rubro: poris oblongis. *Fn. ſuec.* 2224. *Müll. zool. dan. prodr.* 3062.

Hort. Cliffort. 489. Lithoxylon pinnato-ramoſum erectum compreſſum flexile, ramulis ſetaceis.
Pallas el. zooph. p. 174. *n.* 106. Gorgonia depreſſa ramoſa

pinnataque, pinnis ſuboppoſitis rigentibus, cortice miniato ſubverrucoſo.

Theophr. hiſt. pl. l. 4. c. 7. Palma pelagica.

Breyn. prodr. 3. p. 34. t. 30. Lithoxylon incruſtatum, ramis compreſſis ſetoſis pinnatis.

Seb. muſ. 3. t. 114. f. 3.

D'Aubent. ic. miſc. 48.

Habitat in mari, Africam meridionalem, Norwegiam *alluente*, $1\frac{1}{2}$-4 *pedes alta, cornea, fuſca, in ramulis lateſcens.*

ſanguinolenta. 35. G. depreſſa ramoſiſſima dichotomo-pinnata, corticis flavi poris diſtichis purpureis. *Pallas el. zooph. p. 175. n. 107.*

Tournef. inſt. I. h. *p.* 574. Lithophytum flavum punctatum.

Habitat in mari atlantico, americano, *pedem & ultra longa, cornea, an vere diſtincta ab abietina?*

violacea. 36. G. depreſſiuſcula ramoſo-pinnata, cortice violaceo poris prominulis ſubquadrangulo. *Pallas el. zooph. p. 176. n. 108.*

Cluſ. exot. l. 6. c. 4. p. 21. cur. poſt. p. 47. Quercus marina Theophraſti.

Habitat in mari americano, *ſubſeſquipedalis, cornea, lepadem calceolum ſæpe ſibi adhærentem habens.*

ſetoſa. 12. G. teres pinnata, ramulis ſparſis, cortice purpuraſcente.

Pallas el. zooph. p. 172. n. 105. Gorgonia (aceroſa) teres ramoſo-pinnata, pinnis ſetaceis confertis inordinatis diffuſis, cortice læviuſculo purpuraſcente, poris ſeriato-ſparſis.

Olear. muſ. t. 35. f. 1. Beſl. muſ. Lochn. t. 24. Quercus marina Theophraſti.

Pon. bald. ital. p. 221. 228. Antipathes hirſutum.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. p. 805. Antipathes hirſutum ſeu Corallium ſoliatum.

Raj. hiſt. pl. app. p. 1849. *Moriſ. hiſt. pl. 3. p. 652. t. 10. n. 10.* Pinus marina.

Sloan. jam. cat. p. 3. hiſt. 1. p. 57. n. 14. t. 22. f. 1-3. Corallina fruticoſa elatior, ramis quaquaverſum expanſis teretibus.

Tournef. inſt. I. h. *p.* 575. Lithophytum erectum elatius ad tamariſcum accedens.

Catesb. Car. 2. t. 35. Lithophyton pinnatum purpureum aſperum.

Habitat in mari mediterraneo, & Americam *alluente, recentiſſima, ſæpe bipedalis, cortice vetuſto ſæpe cineraſcente, vel flavente albove tartaro incruſtato.*

petechizans. 13. G. ſubdichotoma ramoſiſſima cortice flavo biſulcato poris rubris.

Pallas el. zooph. p. 196. *n.* 125. Gorgonia teres ramoſiſſima diffuſa, cortice flavo biſulcato verrucoſo, poris rubris.

Marſ. hiſt. mar. p. 103. *t.* 20. *f.* 89-93. Lithophyton ſeptimum.

Habitat - - - fere bipedalis, cornea, nigra, virgulis ſuccineis.

pectinata. 14. G. teres, ramis ſecundis parallelis ſimpliciſſimis, cortice rubro: poris gibbis ſparſis.

Pallas el. zooph. p. 179. *n.* 110. Gorgonia teres ſurculis ſecunde pectinatis, pinnis adſcendentibus parallelis longiſſimis acutis.

Soland. & Ellis corall, p. 85. *n.* 9. Gorgonia teres ramulis ſecundis parallelis adſcendentibus, carne rubra, oſculis creberrimis rotundis prominulis, oſſe duro albo fragili.

Seb. muſ. 3. *t.* 105. *f.* 1. 2.

Habitat in Oceano indico, *rariſſima, albida, cortice rubro.*

abietina. 37. G. ramoſa pinnata, carne flava, oſculis purpureis diſtichis, oſſe corneo flaveſcente. *Soland. & Ellis corall. p.* 95. *n.* 23. *t.* 16.

Plukn. amalth. t. 542. *f.* 3.

Habitat ad Africæ *occidentalis littora, pedem circiter alta, lepadibus interdum cooperta.*

calyculata. 38. G. dichotoma, ramulis craſſis arrectis, papillis truncatis, carne cineraſcente intus purpurea, oſculis majoribus calyciformibus confertis ſurſum ſpectantibus, hydris octotentaculatis cirratis, oſſe ſubfuſco corneo. *Soland. & Ellis corall. p.* 95. *n.* 21.

Habitat - - -

Briareus. 39. G. ſubramoſa teres craſſa baſi ſupra rupes late explanata, carne interne ſubalbida, externe cinerea, hydris majoribus octotentaculatis cirratis, oſſe ex aciculis vitreis purpureis inordinate ſed longitudinaliter compactis compoſito. *Soland. & Ellis corall. p.*93. *n.* 20. *t.* 14. *f.* 1. 2.

Habitat in mari Americam *auſtralem alluente, alcyoniis affinis, trunco ampliſſimo.*

ventalina. 15. G. reticulata, ramis lateribus externe compreſſis, cortice rubro.

Hort. Cliff. p. 480. Lithoxylon retiforme, ramulis oppoſitis compreſſis.

Pallas el. zooph. p. 165. *n.* 101. Gorgonia (Ventilabrum) reticulata, ramis compreſſis, cortice ruberrimo verrucoſo.
Rumpf amb. 6. *p.* 205. *t.* 89. *f.* 1. Flabella marina.
Habitat in Oceano indico, *nigra, junior fuſca.*

Reticulum. 40. G. reticulata, ramulis creberrimis teretibus cortice rubro verrucoſo. *Pallas el. zooph. p.* 167. *n.* 102.
Rumpf muſ. 6. *p.* 205. Flabellum multiplex.
Seb. muſ. 3. *t.* 105. *n.* 16. & *t.* 107. *n.* 6.
Habitat in Oceano indico, *ponderoſiſſima, ſpithama raro altior, griſea.*

Clathrus. 41. G. reticulata lignoſa, ramulis teretibus, cortice lævi poris ſimplicibus. *Pallas el. zooph. p.* 168. *n.* 103.
Habitat - - - 2 *fere palmorum altitudine, pallida cortice tenui ex griſeo rubente.*

Flabellum. 16. G. reticulata, ramis interne compreſſis, cortice flavo.
Müll. zool. dan. prodr. 3058.
Hort. Cliff. 480. Lithoxylon retiforme, ramis parallele compreſſis.
Pallas el. zooph. p. 169. *n.* 103. Gorgonia reticulata, ramis creberrimis compreſſis, cortice flaveſcente lævi poris ſimplicibus.
Soland. & Ellis corall. p. 92. *n.* 18. Gorgonia reticulata, ramis interne compreſſis, carne flava (interdum purpurea,) oſculis minutis ſparſis, polypis octotentaculatis, oſſe nigro corneo, in ramis majoribus tenuiter ſtriato.
Ellis corall. p. 61. *t.* 26. *f.* A. Flabellum Veneris.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 2. & 3. *p.* 120. 121. Frutex marinus elegantiſſimus & Planta marina retiformis.
Worm. muſ. p. 234. *Beſl. muſ. Lochn. t.* 24. *Olear. muſ. Gottorp. p.* 69. *t.* 35. *f.* 2. Frutex marinus elegantiſſimus Cluſii.
Bonann. muſ. Kirch. p. 266. *n.* 13. *fig. p.* 286. Frondipora.
Petiv. pterigr. t. 18. *f.* 8. Epicorallium reticulatum vulgare.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 20. *p.* 131. Iſidis Plocamum quartum.
Torrub. nat. hiſt. hiſp. t. 10. *f.* 12. Lithophytum arboreum nigrum.
Brown jam. p. 75. *n.* 1. 2. Keratophytum reticulatum.
Rochef. antill. c. 19. *art.* 13. *p.* 234. Arbre de mer.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 798.
Calceol. muſ. p. 16.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 6. *n.* 1. 4. 5. 6.

Marſ. hiſt. mar. p. 100. *t.* 19. *n.* 84.
Rumpf amb. 6. *p.* 224.
Turgot mem. inſtr. t. 23. *f.* D.
Knorr del. t. A. 12. *f.* 1. & *t.* A. 13. *f.* 1. 2.
Habitat in Oceano *omni, plures pedes interdum alta, & in magnam latitudinem expanſa, flexilis, cornea, nigra, cortice vetuſto, albicante, vel cinereo.*

342. ALCYONIUM. *Animal* plantæ forma creſcens.
Stirps fixa, carnoſa, gelatinoſa, ſpongioſa vel coriacea: epidermide celluloſa poris ſtellatis ſ. oſculis pertuſa, hydras tentaculatas oviparas exſerentibus.

arboreum. 1. A. ſtirpe arborea, ramis obtuſis, poris papularibus. *Fn. ſuec.* 2225. *Müll. zool. dan. prodr.* 3077. *Act. nidroſ.* 4. *p.* 87. *t.* 11. *f.* 1-8. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 274. 275. *t.* 12. *n.* 4. 5.
Muſ. Teſſin. 120. *t.* 10. Lithoxylon norwegicum.
Pallas el. zooph. p. 347. *n.* 202. Alcyonium ramoſum, poris papillaribus in tubera lateralia terminaliaque congeſtis.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 1. *p.* 119. Arbuſcula marina coralloides.
J. Bauh. hiſt. plant. 3. *p.* 797. Planta marina coralloides rubra.
Worm. muſ. p. 230. Planta marina coralloides.
Cupan. hort. cath. ſuppl. 1. *Tourf. inſt.* 1. *h. p.* 576. Alcyonium magnum durum arboreſcens.
Rumpf amb. 6. *p.* 222. Accabaar gabba-garbba ſ. Accarbaar boazagu, Amboynenſibus Hualupia.
Koelreuter nov. comm. Petrop. 7. *p.* 345. *t.* 13. 14. Corallium ſpongioſum leve, ramis tuberoſis nutantibus, tuberculis aggregatis.
Habitat in mari norwegico, albo, indico, *humanæ interdum altitudinis, poroſiſſimum ſuberoſum, ex cinereo ferrugineum, intus magis flavicans, medulla albicante.*

exos. 2. A. ſtirpe arboreſcente coriacea coccinea ſuperne ramoſa, papillis ſtellatis.

Pallas el. zooph. p. 349. *n.* 203. *Spallanzan. act. ſoc. ital.* 2. *p.* 603. *&c.* Alcyonium (palmatum) ſtipite ſimplici, extremo ſubramoſo papilloſoque.
Rondel. aq. 2. *Geſn. piſc. p.* 155. b. Manus marina.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 805. Palma ſ. manus marina quibuſdam.
Barrel. ic. 1293. *n.* 1. *&* 1294. Fungus amanita marinus gilvo luteus & purpuraſcens.
Tournef. inſt. 1. *h. p.* 596. Fucus manum referens.
Marſ. hiſt. mar. p. 85. 163. *t.* 11. *n.* 74. 75. *t.* 38. 39. Manus latronis aut leproſi.
Bohadſch mar. p. 114. *t.* 9. *f.* 6. 7. Penna ramoſa, pinnis carens, tentaculis in ramis poſitis.
Planc. act. Senenſ. 2. *p.* 222. *t.* 8. *f.* 6-8. Palma ſ. manus marina.
Petiv. pl. ital. t. 1. *f.* 2. 3.
Ginann. adr. 1. *p.* 45. *t.* 50.
Schaeffer Blumenpol. 1755. *t.* 3.
Habitat in maris mediterranei *fundo, teſtaceis ſcopuliſque ad dimidium uſque pedem excreſcens, digiti craſſitie, coriaceo-cartilagineum, læve, inferne album, oviparum.*

Epipatrum. 3. A. ſtirpe cavata carnoſa rufeſcente.
Pallas el. zooph. p. 373. *n.* 221. *& miſc. zool. t.* 13. *f.* 1-4. Pennatula (Cynomorium) ſimplex, rhachi cylindrica craſſa granuloſa undique polypifera.
Soland. & Ellis corall. p. 65. *n.* 7. Pennatula (Cynomorion) ſtirpe brevi rugoſa acuta, rhachi craſſa cylindrica granuloſa undique polypifera.
Ellis cat. angl. 53. *t.* 21. *f.* 3-5. Finger-ſhaped Sea-Pen.
Rondel. piſc. 2. *p.* 130. Malum inſanum marinum.
Geſn. paral 27. *Jonſton exang. t.* 20. Epipatrum.
Habitat in mari mediterraneo, *exalbidum, 4 circiter pollices longum, digiti virilis craſſitie; nonne cum agarico ad pennatulas relegandum?*

Agaricum. 4. A. ſtirpe filiformi, pileo reniformi.
Pallas el. zooph. p. 374. *n.* 222. Pennatula (reniformis) altero latere polypifera, ſtipite lumbriciformi.
Soland. & Ellis corall. p. 65. *n.* 8. Pennatula reniformis, ſtirpe lumbrici facie, altero latere polypifera.
Ellis act. angl. 53. *t.* 19. *f.* 6-10. Kidney-ſhaped purple Sea-Pen.
Habitat in mari Carolinam *alluente, purpureum, poris flavis.*

Digitatum. 5. A. acaule oblongum coriaceum rugoſum. *Fn. ſuec.* 2226. *Müll. prodr. zool. dan.* 3078. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 447. *n.* 462.
Pallas el. zooph. p. 351. *n.* 205. Alcyonium (lobatum) gryſeum cruſtaceo-tuberoſum lobatum, poris creberrimis impreſſis.
Soland. & Ellis corall. p. 175. *n.* 1. Alcyonium albidum carnoſo-ſpongioſum lobatum, oſculis ſtellatis undique notatum.
Ellis corall. p. 83. *t.* 32. *f.* aA. A. 2. Dead Man's Hand, or Dead Man's Toés.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 10-13. Alcyonium Manus marina.
Raj. ſyn. 37. *n.* 2. *Breyn eph.* N. C. *cent.* 7. 8. *obſ.* 159. Alcyonium ramoſo digitatum, aſteriſcis undique notatum.
Rumpf muſ. p. 46. Tethya.
C. Bauh. pin. p. 366. Fucus Palma marinus.
Barrel. ic. 1293. 1294.
Juſſieu act. Pariſ. 1742. *p.* 294. *t.* 9. *f.* 1.
Baſter op. ſubſ. 1. *p.* 24. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat in Oceano europæo, *teſtacea lapideſque incruſtans, extrinſecus e griſeo rubellum, pallidum, intus albidum.*

Schloſſeri. 6. A. ſubrotundum ſtupoſum, ſtellis radio pertuſis.
Pallas el. zooph. p. 355. *n.* 208. *ſpic. zool.* 10. *p.* 35. 37. Alcyonium cruſtaceum pulpoſum fuſcum, floſculis fulvis adnatis, petalis pertuſis.
Soland. & Ellis corall. p. 177. *n.* 4. Alcyonium carnoſum lividum, aſteriſcis luteis radiis obtuſis ornatum.
Schloſſer act. angl. 49. 2. *p.* 449 *n.* 61. Alcyonium carnoſum aſteriſcis radiis obtuſis ornatum.
Rondel. aquat. 2. *p.* 130.
Geſn. piſc. p. 155. Uva marina.
Gaertner ap. Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 37. *t.* 4. *f.* 1-5. Botryllus ſtellatus.
Borlaſ. cornub. p. 254. *t.* 25. *f.* 1-4.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, fuſcum, vel cineraſcens, alia corpora obducens, ſtellarum radiis 6-10 æqualibus baſi concurrentibus, & ad baſin poro pertuſis.*

Lyncurium. 7. A. globoſum fibroſum flavum verrucoſum. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 5. *t.* 85. *f.* 1.
Pallas el. zooph. p. 357. *n.* 210. Alcyonium (Aurantium) globoſum fulvum, ſtellis extus verrucoſum intus fibris oſſeis faſcicularibus radiatum.

Marſ. hiſt. mar. p. 82. *t.* 14. *n.* 72. 73. Alcyones.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 44. *app.* 2. *p.* 114. *n.* 3. Alcyonium flavum durius.
Planc. act. Senenſ. 2. *p.* 218. *t.* 8. *f.* 1. 2. Tethyum plerumque ſphæricum, malum aurantium luſitanicum forma & colore referens, quod horizontaliter diſſectum fibras radiatim oſſeas oſtendit.
Donat. adr. p. 60. 64. *n.* 1. 2. *t.* 10. Tethya ſphærica.
Habitat in mari mediterraneo, *& ad* promontorium Bonæ Spei, *pomi aurantii magnitudine cartilagineum.*

Burſa. 8. A. ſubgloboſum pulpoſum viride.
Pallas el. zooph. p. 352. *n.* 206. Alcyonium ſubgloboſum cavum viridiſſimum molle, papillis creberrimis hyalinis.
Imper. hiſt. nat. p. 633. Arantium marinum viride.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 795. Alga pomum monſpelienſium.
C. Bauh. pin. p. 368. *Raj. hiſt.* 1. *p.* 38. *ſyn. p.* 31. Burſa marina.
Marſ. hiſt. mar. p. 80. *t.* 13. *n.* 69. Aurantium marinum.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 44. Asrantia marina, C. Bauh.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 261. *t.* 9. *f.* 17.
Habitat in mari anglico & mediterraneo, *pomi mediocris magnitudine, coriaceum.*

Cydonium. 9. A. ſubrotundum ſpongioſum flavum læve. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 464. *Müll. zool. dan.* 3. *t.* 81. *f.* 3-5.
Pallas el. zooph. p. 359. *n.* 211. Alcyonium (Cotoneum) informe ſubgloboſum flavum intus rubrum fibroſo-ſpongioſum cavernoſumque.
Dioſcr. ὑλ. ιατρ. 5. *c.* 136. Αλκυονιον 1.
Imper. hiſt. nat. p. 833. Halcyonium durum ſ. primum Dioſcoridis.
Rumpf amb. 6. *p.* 259. Veſpetum marinum.
Donat. adr. p. 56. *n.* 1. *t.* 9. Alcyonium primum Dioſcoridis.
Planc. Conch. ed. 2. *app. p.* 113. *c.* 18. *n.* 1. 2. *t.* 10. *f.* B-D. H.
Seb. muſ. 3. *t.* 99. *f.* 4.
Habitat in mari africano, mediterraneo, ſeptentrionali; *rupibus & coralliis affixum, a fluctibus agitatum demum liberum, in cavernis ſæpe nereidem hoſpitio excipiens.*

Ficus. 10. A. obovatum pulpoſum livens.
Pallas el. zooph. p. 356. *n.* 209. Alcyonium tuberiforme pulpoſum, papillis crebris ſtellatis.

Soland. & Ellis corall. p. 175. *n.* 2. Alcyonium (Pulmonana) pulpoſum lividum lobato-compreſſum, oſculis ſtellatis minimis obductum.
Ellis corall. p. 82. *t.* 17. *f* b. B. Sea-Fig.
Imper. hiſt. nat. p. 839. Alcyonium tuberoſum forma ficus.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 813. Alcyonium tuberoſum.
Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 6. *p.* 102. Alcyonium quintum antiquorum.
Raj. ſyn. p. 31. *n.* 3. Pulmo marinus alter Rondeletii.
Marſ. hiſt. mar. p. 87. *t.* 16. *f.* 79. Ficus ſubſtantiæ inter ſpongiam & Alcyonium mediæ.
Mineralog. Beluſt. 4. *p.* 137. *tab. f.* 1-3.
Habitat in mari mediterraneo, & anglico, *rarior inter foſſilia, olivacei coloris, intus granuloſum.*

gelatinoſum. 11. A. polymorphum gelatinoſum. *Fn. ſuec.* 2228. *Müll. zool. dan. prodr.* 3082.
Pallas el. zooph. p. 353. *n.* 207. Alcyonium cineraſcente-hyalinum ramoſiſſimum, ramis teretibus ſubacutis.
Fabr. Fn. groenl. p. 447. *n.* 464. Alcyonium cineraſcente-hyalinum polymorphum.
Soland. & Ellis corall. p. 176. *n.* 3. Alcyonium luteum gelatinoſum polymorphum.
Ellis corall. p. 87. *t.* 32. *f.* D. & *Baſter op. ſubſ.* 1. *t.* 1. *f.* 5. s. Alcyonium ramoſum molle.
Planc. Conch. ed. 2. *p.* 115. *c.* 29. *t.* 10. *f.* A. Alcyonium digitatum gelatinoſum molle.
Parkinſ. theatr. 1304. Spongia ramoſa altera anglica.
Hudſ. flor. angl. p. 471. *n.* 26. Fucus gelatinoſus.
Johnſ. it. cantebr. p. 3. *f.* 3. *Gerard. ernac. p.* 157. *Merret. pin. p.* 40.
Raj. ſyn. p. 49. *n.* 42. Fucus nodoſus & ſpongioſus.
Seb. muſ. 3. *t.* 98. *f.* 4.
Habitat in Oceano europæo, mari *quoque* glaciali, *algis, lapidibus, ſertulariis, teſtaceis frequenter adhærens.*

Manus Diaboli. 12. A. polymorphum protuberantiis obtuſis perforatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3079.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 3?
Habitat in Iſlandia, *lycopendi pulpam ſiccatam referens, extrinſecus lævis, ſupra protuberans digitis aliquot brevibus obtuſis perforatis apice tanquam penna, ad medium uſque rami.*

Maſſa. 13. A. informe fulvum ſpongioſum patulum ſtellulis quinque radiatis; centro nigro. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 1. *t.* 81. *f.* 1. 2. *prodr.* 3083.
Habitat in mari norwegico.

Cranium. 14. A. tuberiforme album ſetoſum. *Müll. zool. dan. prodr.* 3080.
Pontopp. Nat. Norw. 1. *p.* 252. *t.* 13. *f.* 10.
Stroem. ſondm. 1. *p.* 148. *n.* 7.
Habitat in mari norwegico.

rubrum. 15. A. cruſtaceum molle miniatum punctis ſparſis ſaturatioribus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 2. *t.* 82. *f.* 1-4. *prodr.* 3081. *Fabr. Fn. groenl. p.* 447. *n.* 463.
Habitat in mari norwegico.

mammilloſum. 16. A. albidum coriaceum, mammillis convexis: centro cavo ſubſtellato, coadunatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 179. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 4. 5.
Sloan. jam. 1. *t.* 21. *f.* 1-3. Lapidis aſtroitidis ſive ſtellaris primordia.
Habitat in mari Americam *mediam alluente.*

ocellatum. 17. A. ferrugineum coriaceum, cellulis ſubcylindricis rugoſis, apicibus radiatis & ocellatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 180. *n.* 6. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat ad inſulam S. Dominici, *rupibus adhærens, ſtellarum radiis* 12.

tuberoſum. 18. A. flaveſcens tuberoſum, apicibus ſæpe ſubdiviſis, poris tubuloſis confertis. *Soland. & Ellis corall. p.* 180. *n.* 7.
Habitat ad inſulam S. Mauritii, *rupibus cohærens*, $2\frac{1}{2}$ *pollices longum*, $1\frac{1}{2}$ *altum.*

gorgonoides. 19. A. cinereum arenoſo-carnoſum, cellulis radiatis verruciformibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 181. *n.* 8. *t.* 9. *f.* 1. 2.
Pallas el. zooph. p. 158. *n.* 100. Sertularia (Gorgonia) lignoſa ramoſa pinnata, pinnis pinnatis denticuliferis, cortice ramorum verrucoſo.
Habitat ad Curaſſao *inſulam, coralliis rupibuſque adhærens, cellularum radiis* 12.

asbeſtinum. 20. A. ſtirpe ſubſimplici teretiuſcula, poris undique ſparſis majuſculis oblongis. *Pallas el. zooph. p.* 344. *n.* 200.
Bocc. obſ. ep. 24. *ic. p.* 273. Alcyonium ſtuppoſum perforatum rubrum.

Petiv. gaz. t. 23. f. 2. 2. Porus ſpongioides, americana.
Habitat in mari, Americam *alluente, poroſiſſimum, albidum, intus roſeum.*

Alburnum. 21. A. album ramoſiſſimum attenuatum ſubdiviſum, poris tubuloſis terminalibus. *Pallas el. zooph. p. 346. n. 201.*
Habitat in mari indico, *ex lacteo pallidum, truncis digitum minimum craſſitie æquantibus, & dimidii fere pedis altitudinem aſſequentibus.*

papilloſum. 22. A. cruſtaceum, papillis magnis confertis convexis obſitum. *Pallas el. zooph. p. 350. n. 204.*
Marſ. hiſt. mar. p. 86. t. 15. f. 76-78. Boletus marinus.
Habitat - - - ex griſeo ferrugineum, corio ſiccato ſimile.

conglomeratum. 23. A. gelatinoſum convexum, dactylis conglomeratis; oſculis edentulis terminalibus.
Gaertn. ap. Pallas ſpic. zool. 10. p. 39. t. 4. f. 6. Botryllus conglomeratus.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, rarior, fucis, præſertim nodoſo & ſerrato adhærens, albicans, cavitate centrali infundibuliformi, ovulis globoſis.*

aſcidioides. 24. A. cruſtaceum coriaceum, papillis ſparſis; oſculis duobus ſubdentatis.
Gaertn. apud Pallas ſpic. zool. 10. p. 40. n. 3. t. 4. f. 7. Diſtomus varioloſus.
Habitat in mari Cornubiam *alluente, fuco palmato adhærens, dilute rubellum, vel ex croceo albicans, verrucis ſingulis orificio duplici minimo coccineo pertuſis.*

Synoicum. 25. A. ſtirpibus pluribus cylindricis carnoſo-ſtupoſis: orificio ad apicem ſtellato.
Phipps it. p. 199. t. 13. f. 3. Synoicum turgens.
Habitat ad Spitzbergæ *littus ſeptentrionale.*

vermiculare. 26. A. viride ramoſum, ramis cylindricis obtuſis faſtigiatis.
Cavol. pol. mar. 3. p. 264. t. 9. f. 16.
Habitat in rupibus inſulæ Niſitæ, *Neapoli obverſæ.*

ſtellatum. 27. A. oſculis binis ſtellatis terminalibus. *Bommé act. Vliſſ. 3. p. 306. f. 5.* A. B.
Habitat in mari - - - *infundibuliforme, ſacco pellucido incluſum; an hujus generis?*

corniculatum. 28. A. oſculis quatuor ſtellatis, papillam mediam cingentibus corniculiſque quatuor erectis terminalibus. *Bommé act. Vliſſing.* 3. *p.* 307. *f.* 6.
Habitat in mari belgico, *an hujus generis?*

343 SPONGIA. *Animal* fixum flexile polymorphum, torpidiſſimum contextum vel e fibris reticulatis, vel e ſpinulis gelatina viva veſtitis oſculis vel foraminibus ſuperficiei aquam reſpirans.

Ventilabra. 1. Sp. flabelliformis conformis ſtupoſa, venis lignoſis reticulatis, obtectis poris favagineis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3084. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 251. *t.* 13. *f.* 8. *Stroem. ſundm.* 1. *p.* 146. *n.* 4. *Soland. & Ellis corall. p.* 188. *n.* 8.
Pallas el. zooph. p. 397. *n.* 247? Spongia (ſtrigoſa) ſuberoſa mollis, fronde plana lacinioſa, utroque latere poris clathrata.
Gunner act. nidr. 4. *p.* 74. *t.* 3. *f.* 1. 2. & *t.* 4. *f.* 3. 4. Spongia Ventilabrum.
Rumpf amb. 6. *p.* 253. *t.* 89? Baſtia marina.
Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 8. Planta marina foliacea & ſpongioſa, ſingulari modo ramoſa.
Ellis act. angl. 55. *p.* 289. *t.* 11. *f.* H. Sea-Fan Sponga.
Habitat in mari americano? norwegico, *figura & ramiſicatione Gorgoniæ Flabelli, cortice ſpongiæ.*

flabelliformis. 2. Sp. flabelliformis conformis orbiculata, fibris cartilagineis dente reticulatis.
Hort. Cliffort. 480. Spongia flabelliformis, caule teretiuſculo, diſco compreſſo-plano vix diviſo.
Pallas el. zooph. p. 380. *n.* 226. Spongia rigida rara ſubatra flabelliformis plana rotundataque.
v. Royen prodr. h. lugdb. p. 522. *n.* 6. Spongia flabelliformis rigidiuſcula, fibris capillaribus denſiſſime reticulata.
Boerh. ind. h. lugdb. 1. *p.* 6. Keratophyton majus nigrum fibris tenuioribus denſiſſime reticulatum.
Rumpf amb. 6. *t.* 80. *f.* 1. Flabellum Arnenſe.
Petiv. gaz. t. 32. *f.* 1. Rete philippenſe nigrum, telis quadrangulis.
Seb. muſ. 3. *p.* 183. *t.* 95. *f.* 2. 4. Alcyonium irregulare rigidum membranaceum & celluloſum.

Habitat in mari indico & rubro, *lepades aliquando immerſas habens, ambarum manuum amplitudine, aliquot linearum craſſitie.*

infundibuliformis. 3. Sp. infundibuliformis turbinata flexilis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3085.
Pallas el. zooph. p. 395. *n.* 246. Spongia (foliaſcens) foliacea laciniata tenax, altero latere exeſo-ſcabra.
Gunner act. Nidroſ. 4. *p.* 78. *t.* 4. *f.* 5. Spongia infundibuliformis.
Rumpf amb. 6. *p.* 254. *t.* 90. *f.* 1. Spongia infundibuli forma.
Cluſ. exot. l. 6. *c.* 11. *p.* 125. *Worm. muſ. p.* 236. Spongia elegans.
Petiv. pterigr. t. 9. *f.* 4. 6. Spongia foliata aſpera & Spongia infundibuliformis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongia forma infundibuli.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 802.
Muſ. Richt. p. 384. *t.* 14. *f.* F.
β) *Pallas el. zooph. p.* 386. *n.* 233. Spongia (crateriformis) infundibuliformis molliuſcula, membranaceo-celluloſa, extus villoſa, craſſior.
Mercat. metall. arm. 6. *c.* 2. *p.* 97. *ic. p.* 96. Alcyonium primum antiquorum.
Habitat in mari indico? mediterraneo, norwegico, *pedis latitudine, pallide griſea, officinali minus tenax, adultior ſæpe bifariam rupta & plana.*

fiſtularis. 4. Sp. tubuloſa ſimplex fragilis ſenſim ampliata.
Hort. Cliffort. 480. Spongia tubuloſa ſimplex cavernoſa.
Pallas el. zooph. p. 385. *n.* 232. Spongia tubuloſa ſimplex attenuata rigida extus tuberculoſa.
Sloan. jam. cat. p. 6. *hiſt.* 1. *p.* 62. *t.* 24. *f.* 1. Spongia dura ſ. ſpuria maxima ramoſa fiſtuloſa.
Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 1. 7.
Habitat in Oceano indico, *brachii amplitudine, 3-4 pedes longa, ſiccata e fulvo nigricans.*

aculeata. 5. Sp. tubuloſa ramoſa tenax foraminulata ſubaculeata.
v. Royen prodr. h. Lugdb. 522. Spongia tubuloſa cavernoſa extus aculeata.
Pallas el. zooph. p. 392. *n.* 242. Spongia (villoſa) tenaciſſima cava extus muricata; intus lævis.
Sloan. jam. cat. p. 7. *hiſt.* 1. *p.* 63. *t.* 25. *f.* 4. Spongia dura ſ. ſpuria, apicibus acutis exſtantibus, intus cavernoſa.

Pluram.

Pluckn. phyt. t. 112. *f.* 4. Spongia marina fiſtuloſa maxima muricata.
Brown jam. p. 74. *n.* 5. Spongia fiſtuloſa major flexilis poroſa & prominulata.
β) *Petiv. pterigr. t.* 19. *f.* 9. Spongia typhoides.
Rumpf amb. 6. *p.* 255 *t.* 55. *f.* 2. Chirotheca marina.
Habitat in mari, Indicum *&* *auſtralem* Americam *alluente, pallide griſea, tenaciſſima.*

tubuloſa. 6. Sp. tubuloſa ramoſiſſima faſtigiata tenax.
Royen prodr. h. Lugdb. 522. Spongia tubuloſa ramoſiſſima tenax faſtigiata.
Pallas el. zooph. p. 392. *n.* 241. Spongia (faſtigiata) tenera duriuſcula tenax tubuloſo-ramoſiſſima, ramis faſtigiatis truncatis.
Soland. & Ellis corall. p. 188. *n.* 9. *t.* 58. *f.* 7. Spongia tubuloſa ramoſa tenax, tubulis ſecundis arrectis, apicibus attenuatis.
Boerh. ind. h. Lugdb. 1. *p.* 9. Spongia ramoſa fiſtuloſa millepora.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, 4-6. *pollices alta, ex luteo aurantia.*

coronata. 17. Sp. tubuloſa ſimplex minima apice ſpinulis radiatis coronata. *Soland. & Ellis corall. p.* 190. *n.* 13. *t.* 58. *f.* 8. 9.
Habitat ad Angliæ *littora, flaveſcens, corona apicis margaritacea.*

ciliata. 18. Sp. ſimplex tubuloſa conico-flexuoſa, ſurſum attenuata in apicem ciliatum. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 466.
Habitat in Groenlandiæ *littore, ulvis majoribus potiſſimum inhærens,* 8 *lineas longa, alba, ſericea, exterius tomentoſa, rarius gemella.*

cancellata. 7. Sp. tubuloſa foraminulata, fibris cancellatis.
Habitat in Oceano, *ferruginea rarioris texturæ, quam congeneres, ſuperficie muricata, tubo digiti craſſitie, foraminibus lateralibus raris, latitudine pennæ anſerinæ.*

rubra. 19. Sp. tenax ſimplex carioſa obſcure rubra depreſſa ſubrotunda, tuberculis elevatis, poris æqualibus.
Habitat in mari rubro, *prope* Sues *lapidibus affixa.* Forskähl.

nigra. 20. Sp. tenax globoſa æqualis farcta exterius nigra intus cinerea.
Habitat in mari rubro, *prope* Sues. Forskähl.

officinalis. 8. Sp. foraminulata difformis ſubramoſa tenax tomentoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 3087. *Stroem ſondm.* 1. *p.* 128.
Mat. mad. 527. Spongia tenax ſubramoſa, ramis difformibus pertuſis.
Pallas el. zooph. p. 387. *n.* 234. Spongia polymorpho-compreſſa ſublobata tomentoſa poruleuta.
Soland. & Ellis corall. p. 183. *n.* 1. Spongia multiformis tenax poroſiſſima lobata tomentoſa.
Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* D. E. Common officinal Sponge.
Imperat. hiſt. nat. p. 828. *C. Bauh. pin. p.* 392. *Sloan. jam. cat. p.* 6. *hiſt.* 1. *p.* 62. *n.* 35. Spongia globoſa.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 818. Spongiæ compreſſæ ſchiacratæ.
Tournef. inſt. 1. h. *p.* 575. Spongia ad uſum præſtantiſſima, foraminibus exiguis pervia.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 266.
Habitat in Archipelago, mari mediterraneo, rubro, indico? americano? norwegico? *cavernoſiſſima, ex fulvo griſea, teſtaceis, coralliis, arenæ granulis interdum referta, intus tubuloſa.*

oculata. 9. Sp. foraminulata, ramoſiſſima erecta tenax, ramis teretiuſculis obtuſis. *Hort. Cliff.* 480.
Pallas el. zooph. p. 390. *n.* 239. Spongia ramoſiſſima mollis tenera flaveſcens, ramis teretiuſculis, poris ſparſis prominulis.
Soland. & Ellis corall. p. 184. *n.* 2. Spongia ramoſiſſima, mollis, ramis compreſſiuſculis adſcendentibus ſæpe confluentibus, poris prominulis bifarie diſpoſitis.
Ellis corall. p. 80. *t.* 32. *f.* f. F. *& act. angl.* 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* B. Branched engliſh Sponge.
Parkinſ. theatr. 1304. *Raj. ſyn. p.* 29. *n.* 1. Spongia ramoſa anglica.
Bocc. muſ. p. 258. *t.* 116. Spongia ramoſa oculata viridis fruticoſa.
Boerh. ind. h. Lugdb. 2. *p.* 8. Spongia ramoſiſſima oculata.
Seb. muſ. 3. *t.* 97. *f.* 5-7. Spongia erecta ramoſa mollis & ſubtilis.
C. Bauh. pin. p. 369. Spongioſus fucus.
Ruyſch theſ. an. 1. *t.* 5. Spongioides ramoſiſſima marina oculata.
Pontopp. nat. norw. 1. *p.* 276. *t.* 12.
Habitat frequens in mari britannico, *flaveſcens,* 5-10 *pollices alta.*

muricata. 10. Sp. foraminulata ramoſiſſima angulata tenax: poris cylindricis ſubulatis prominentibus æqualibus multifidis hiſpidis. *Muſ. Teſſin. p.* 118. *t.* 11. *f.* 1.*

Pallas el. zooph. p. 389. *n.* 237. Spongia ſuberoſa ramoſa, ramis divaricatis cylindricis undique villis crebèrrimis muricatis.

Soland. & Ellis corall. p. 185. *n.* 3. Spongia ſtirpe ſuberoſa ramoſa, ramulis cylindricis faſciculis villoſis undique muricatis.

Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 11. *f.* F. Branched tuberculated Sponge.

Seb. muſ. 3. *p.* 188. *t.* 99. *f.* 7. Spongia ramis craſſiuſculis tenax, tota ſuperficie apiculis tenuibus mollibus denſe conſita.

Habitat ad Guineæ littora, frequens ibi in rupibus, griſea; trunco digitum, ramis calamum ſcriptorium craſſitie æquantibus.

nodoſa. 11. Sp. foraminulata ſubramoſa difformis ſcabra tenaciſſima ramis nodoſa cavernoſa. *Royen. prodr. h. Lugdb.* 522.

Pallas el. zooph. p. 389. *n.* 238. Spongia (rubens) ſubramoſa difformis mollis, poris majuſculis ſparſis.

Sloan. jam. cat. p. 7. *hiſt.* 1. *p.* 63. *t.* 23. *f.* 5. Spongia minor & mollior medullæ panis ſimilis, fibris tenuiſſimis.

Imperat. hiſt. nat. p. 838. Alcyonium foraminoſum f. quartum Dioſcoridis.

Mercat. metalloth. arm. 6. *c.* 8. *p.* 106. Tertium quinti generis Alcyonium.

Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 2.

Habitat in Oceano americano, *ex griſeo rubens vel albida, digiti craſſitie.*

tomentoſa. 12. Sp. poroſa ſubaculeata tomentoſa.

Soland. & Ellis corall. p. 187. *n.* 7. Spongia (urens) multiformis poroſa ſpinulis intertexta tenerrima mollis.

Ellis corall. p. 80. *t.* 16. *f.* d. d 1. D 1. *act. angl.* 55. *p.* 288. *t.* 10. *f.* A. Sponge like Crumb of breed.

Habitat ad magnæ Britanniæ, Americæ *borealis*, Africæ, Indiæ *littora, Zoſteræ aliiſque plantis marinis adhærens, oculatæ ſimilis, recens aurantius molliſſima, ſiccata albida & urens tanto magis, ſi in clibano exſiccata ſit, intus micam panis referens; extrinſecus plena papillis poro pertuſis.*

bacillaris. 13. Sp. conformis caulescens erecta, ramis appreſſis poruloſis. *O. Fr. Müll. zool. dan. prodr.* 3086.
Habitat in Oceano norwegico, *ſeſquipedalis, teres, pollicis craſſitie, officinalis conſiſtentia, magis tamen compacta, poris conſertiſſimis, quaſi acicula minima pertuſis.*

dichotoma. 14. Sp. conformis dichotoma erecta diſticha bifaria cylindrica flexilis tomentoſa. *Müll. zool. dan. prodr.* 3088. *Pontopp. Nat. Norw.* 1. *p.* 251. *t.* 12. *f.* 7. *Stroem. ſondm.* 1. *p.* 146. *n.* 3. *Gunner. act. Nidroſ.* 4. *p.* 79. *t.* 5. *f.* 1. & *t.* 6. *f.* 1.
Pallas el. zooph. p. 388. *n.* 236. Spongia (cervicornis) ramoſiſſima tenax, ramis teretibus ſolidis ſubvilloſis.
Soland. & Ellis corall. p. 187. *n.* 6. Spongia ramoſa tenax, ramis dichotomis erectis teretibus ſuberoſis ſubvilloſis.
Ellis act. angl. 55. *p.* 289. *t.* 11. *f.* I. Dichotomous branched Sponge.
Rumpf amb. 6. *t.* 86. *f.* 3? Lithodendrum littoreum.
Habitat in mari mediterraneo? indico? norwegico, *flaveſcens,* 5-6 *pollices alta, poris minutiſſimis referta.*

ſtupoſa. 21. Sp. ramoſa teres ſtupoſa atque villoſa. *Soland. & Ellis corall. p.* 186. *n.* 5.
Ellis act. angl. 55. *p.* 188. *t.* 10. *f.* C. Downy branched engliſh Sponge.
Habitat ad Angliæ *littora flaveſcens,* 3 *pollices alta.*

criſtata. 22. Sp. plana compreſſa erecta mollis, poris prominulis ſuperne ſeriatim diſpoſitis. *Soland. & Ellis corall. p.* 186. *n.* 4.
Ellis act. angl. 55. *p.* 288. *t.* 11. *f.* G. Cock's Comb Sponge.
Habitat ad Angliæ *littora, rupibus adhærens, flavicans, utplurimum* 3 *pollices longa, &* 2 *alta.*

palmata. 23. Sp. palmata, digitis apice ſubdiviſis: poris prominulis inordinate diſpoſitis. *Soland. & Ellis corall. p.* 189. *n.* 10. *t.* 58. *f.* 6.
Habitat ad Angliæ *littus, ex flavo rubella, mollis.*

prolifera. 24. Sp. multoties ramoſo-palmata, digitis diſtinctis. *Soland. & Ellis corall. p.* 189. *n.* 11. *t.* 58. *f.* 5.
Habitat ad Americæ *borealis littus,* 5-6 *pollices alta, poris numeroſis minimis, intus reticulata, exterius ſpinuloſa.*

botryoides. 25. Sp. tenerrima ramoſa, quaſi racemoſa, racemis cavis neriformibus: apicibus apertis. *Soland. & Ellis corall. p.* 190. *n.* 12. *t.* 58. *f.* 1-4

Habitat ad Angliæ *littus, candida, nitens.*

panicea. 26. Sp. amorpha albida mollis tenerrima ſubtiliſſime poroſa. *Pallas el. zooph. p.* 388. *n.* 235.

Raj. ſyn. p. 31. Alcyonium ramoſum molle, medullæ panis intus ſimile.

Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 4. & *t.* 99. *n.* 3.

Habitat in mari, *inter* Angliam, & Belgium *intermedio, fucis, tubulariis, ſertulariis intertexta; an diſtincta a tomentoſa.*

fulva. 27. Sp. amorpho-ſubramoſa rigidiſſima fulva. *Pallas el. zooph. p.* 383. *n.* 230.

Seb. muſ. 3. *t.* 95. *f.* 9. & *t.* 96. *f.* 1. Spongia rigida ſimplex ramoſa.

Habitat in mari americano, *gelatina inter febras fuſca.*

tubularia. 28. Sp. compreſſa ſeſſilis rigidula flaveſcens, tubulis longitudinalibus poroſa.

Pallas el. zooph. p. 383. *n.* 229. Spongia tubuloſa.

Habitat in mari americano, *ad rupes ſeſſilis, intus ſæpe nigricans.*

fibrilloſa. 29. Sp. polymorpha ſubcomplanata tenera, fibris divergentibus confertiſſimis contextis, poris ſparſis dentatis. *Pallas el. zooph. p.* 382. *n.* 228.

Habitat in Oceano indico, *griſea mollis, nunc flabelliformis, nunc lacinioſa, nunc cauleſcens.*

faſciculata. 30. Sp. rigida ſubgloboſa, faſciculis fibroſis priſmaticis ramoſis faſtigiatis contexta. *Pallas el. zooph. p.* 381. *n.* 227.

Planc. Conch. ed. 2. *app.* 2. *p.* 117. *c.* 34. *t.* 15. E. Spongia hircina globoſa.

Habitat in mari mediterraneo, *fulveſcens, vel ex griſeo lutea.*

Baſta. 31. Sp. rigidiuſcula rara ſubatra undulato-lacinioſa, ſtipite tereti. *Pallas el. zooph. p.* 379. *n.* 225.

Rumpf amb. 6. *p.* 253. *t.* 89. Baſta marina, Baſta-laut.

Habitat in Oceano indico, *trunco ſaxis inſidente, craſſitie digiti.*

floribunda. 32. Sp. amorpha faſciculis ramoſis confluentibus paleaceo-tomentoſis apice craſſioribus obtuſis. *Pallas el. zooph. p. 378. n. 224.*
Habitat in Oceano indico, *palmaris & majoris adhuc altitudinis, braſſicæ cauliflora facie, griſea, rubris paleolis interſperſis.*

lichenoides. 33. Sp. amorpha, fibris mollibus rameſcentibus rariuſculis ſubconnexis. *Pallas el. zooph. p. 378. n. 223.*
Habitat in Oceano indico, *lichenis fruticuloſi habitu, alcyonii gelatinoſi facie.*

papillaris. 34. cruſtacea tenera mollis papilloſa: papillis perforatis. *Pallas el. zooph. p. 391. n. 240.*
Seb. muſ. 3. t. 97. f. 3.
Habitat in mari americano, *ex griſeo alba, gelatina fuſca.*

ſinuoſa. 35. Sp. cruſtacea tenera tenax, ſuperficie ſinubus creberrimis cavernoſa. *Pallas el. zooph. p. 394. n. 243.*
Habitat in Oceano indico? *varia corpora incruſtans, ex griſeo flaveſcens.*

cavernoſa. 36. Sp. amorpha ſeſſilis tenaciſſima cavernoſa, ſuperficie crebris papillis prominulis. *Pallas el. zooph. p. 394. n. 244.*
Habitat in mari americano, *pugni magnitudine & ultra, ex flaveſcente albida, intus interdum fulva.*

frondoſa. 37. Sp. frondoſo lacera tenax ſubreticulata altero latere laciniosa. *Pallas el. zooph. p. 395. n. 245.*
Turgot mem. inſtr. t. 24. f. A.
Habitat in Oceano indico, *griſea.*

agaricina. 38. Sp. compreſſa lobata ſeſſilis tomentoſo-reticulata exterius villis muricata. *Pallas el. zooph. p. 397. n. 248.*
Habitat in Oceano indico, *ex fuſco lutea.*

Tupha. 39. Sp. ramoſa rara mollis, ramis adſcendentibus ſubacutis undique villoſo muricatis. *Pallas el. zooph. p. 398. n. 249.*
Imper. hiſt. nat. p. 830. 831. Spongia forma arborea ſ. Tapha.
Marſ. hiſt. mar. p. 81. t. 14. n. 71. Typha marina.
Habitat in mari mediterraneo, *lanuginea.*

membranoſa. 40. Sp. amorpho-ſubramoſa membranis celluloſa exterius muricata purpuraſcente nigra. *Pallas el. zooph. p. 398. n. 250.*
Seb. muſ. 3. t. 95. f. 3.
Habitat in Oceano indico.

compreſ-ſa. 41. Sp. ſimplex compreſſo-conica interne rima longitudinali fiſſa. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 448. *n.* 467.
Habitat in maris Groenlandiam *alluentis locis profundis, erecta, pollicem longa, helvola.*

Pocillum. 42. Sp. cylindrica pedicellata, vertice pertuſo. *Müll. zool. dan. prodr.* 3091. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 449. *n.* 468.
Habitat in mari norwegico, *albida*, $1\frac{1}{2}$ *lineæ longa, pocillum referens.*

coalita. 43. Sp. ramoſiſſima mollis tenera flava, ramis compreſſiuſculis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 71. *t.* 120. *prodr.* 3090.
Habitat in mari norwegico.

plana. 44. Sp. expanſa cruſtacea flabelliformis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3092.
Habitat in mari norwegico, *an diſtincta ſatis a reliquis, ſpecies?*

cruciata. 45. Sp. alba pinnatifido-ramoſa compreſſa, ramis obtuſis villoſo muricatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3093.
Habitat in mari norwegico.

oſſiformis. 46. Sp. alba ſubramoſa, apice incraſſato lacunoſo. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 149. *ic. t.* 40. *rar. deſcr.* 1. *p.* 103. *prodr.* 3094.
Habitat in mari norwegico.

macida. 47. Sp. alba cruſtacea in aculeos producta. *Müll. zool. dan. prodr.* 2095.
Habitat in mari norwegico.

ficiformis. 48. Sp. foraminulenta rigida turbinata, apice perforata. *Poiret voyag. en Barbar.* 2. *p.* 61.
Habitat ad Barbariæ *littora.*

lacuſtris. 15. Sp. conformis repens fragilis, ramis erectis teretibus obtuſis. *Fl. ſuec.* 1190.
Fl. lapp. 535. Spongia ramis teretibus obtuſis.
Raj. hiſt. 81. Spongia ramoſa fluviatilis.
Habitat in Sueciæ, Angliæ *lacubus, orygæ & majori profunditate ſub aqua latens, in hujus poris ſparſis auctumno globulos cæruleſcentes ſeminum thymi magnitudine nitidos, in candelæ flamma fulgurantes, an corpora peregrina? obſervavit* Cl. Blom, *Med. dr.*

fluviatilis. 16. Sp. conformis erecta fragilis polymorpha. *Fl. ſuec.* 1191. *Müll. zool. dan. prodr.* 3089.

Pallas el. zooph. p. 384. *n.* 231. Spongia ramoſa filiformis viridiſſima fragilis.
Plukn almag. p. 356. *t.* 112. *f.* 3. Spongia fluviatilis anfractuoſa perfragilis ramoſiſſima.
Rupp fl. jan. p. 308. *t.* 3. *f.* 1. Spongia fluviatilis ad confervam accedens.
Loeſ. fl. pruſſ. p. 172. *t.* 52. Muſcus aquaticus ceratoïdes.
Habitat in Europæ, *etiam auſtraliores* Ruſſiæ *aquis dulcibus, obſcure viridis, vix vitæ animalis veſtigia exhibens, odoris piſculenti, granulis viridibus gelatinoſis poros interdum replentibus, vix ſatis diſtincta a lacuſtri.*

friabilis. 49. Sp. cinerea friabilis ſeſſilis amorpha, ſubramoſa. *Wartmann & Girtanner Naturf.* 22.
Habitat in lacu Bodamico, *piſcium eſca.*

canalium. 50. Sp. ramis dichotomis teretibus incurvatis. *Schroeter Naturf.* 23. *p.* 149. *t.* 2.
Habitat in aquæductu Vinarienſi, *an hujus generis, & regni ?*

344. FLUSTRA.

Animal affixum raro tubulis radicalibus.

Stirps membranacea foliacea, ex ſeriebus cellularum multifidis & divergentibus coalita, quaſi contexta.

Cellulæ ringentes capitula hydrarum æmula fundo adnata exſerentes.

Ovaria bullulæ ſupra cellulas.

foliacea. 1. Fl. foliacea ramoſa: laciniis cuneiformibus rotundatis. *Fn. ſuec.* 2231. *Müll. zool. dan. prodr.* 3051. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 436. *n.* 445. *Soland. & Ellis corall. p.* 12. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 8.
Hort. Cliff. 480. Millepora membranacea flexilis ramoſiſſima, ramis diſtinctis planis obtuſis.
Pallas el. zooph. p. 52. *n.* 16. Eſchara cruſtaceo-frondeſcens ſpongioſa, fronde cuneiformi multifida retuſa, cellulis ringentibus arcuatis utrinque ſpinula auritis.

Ellis corall. p. 70. *n.* 29. *f.* a. A. B. C. E. Broad-leaved Horn-wrack.

C. Bauh. pin. p. 367. Porus cervinus Imperati.

J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 799. Alga marina platyceratos poroſa.

Plukn. almag. p. 119. Corallinæ affinis platyphyllos telam ſericeam textura ſimilans.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 16. Muſcus marinus ſcrupoſus albidus telam ſericeam textura ſua æmulans.

Raj. ſyn. p. 42. *n.* 9. *Tournef. inſt.* 1. *h. p.* 568. *t.* 334. Fucus telam lineam ſericeamve textura æmulans.

Juſſieu act. Pariſ. 1742. *p.* 298. *t.* 10. *f.* 3.

Habitat in Oceano ſeptentrionali, & *mari mediterraneo ad dimidium pedem uſque longa*, *digitum minimum lata*, *ſubgriſea*, *utplurimum albeſcens*, *utrinque poroſa.*

truncata. 2. Fl. foliacea ſubdichotoma: laciniis linearibus truncatis. *Müll. zool. dan. prodr.* 3052.

Soland. & *Ellis corall. p.* 11. *n.* 1. Fluſtra foliacea dichotoma: laciniis linearibus truncatis, tubulis radicalibus inſtructa.

Pallas el. zooph. p. 56. *n.* 19. Eſchara (ſecurifrons) fronde radicata dichotoma margine prolifera, laciniis cuneiformibus bipartitis truncatis, cellulis longiſſimis ringentibus.

Ellis corall. p. 69. *t.* 28. *f.* a. A. B. Narrow-leaved Hornwrack.

Raj. ſyn. p. 43. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 17. Fucus marinus ſcrupoſus albidus anguſtior compreſſus, extremitatibus quaſi abſciſſis.

Habitat in Oceano europæo, & *mari mediterraneo*, 5 *circiter pollices longa*, *utrinque poroſa*, *fragilis*, *flaveſcens*, *vel ex flavicante fuſca*, *vel mediæ tincturæ*, *cellulis ex oblongo quadratis.*

piloſa. 3. Fl. foliacea varie ramoſa: poris infimo dente ſetaceo. *Fn. ſuec.* 2233. *Müll. zool. dan. prodr.* 3053.

Soland. & *Ellis corall. p.* 13. *n.* 3. Fluſtra foliacea varie ramoſa, poris ſetaceis.

Pallas el. zooph. p. 50. *n.* 15. Eſchara cruſtaceo-frondeſcens ſpongioſa, cellulis obconicis novemdentatis piliferiſque.

Ellis corall. p. 73. *t.* 31. Irregular ſpongy foliaceus Coralline.

Amœn. acad. 1. *p.* 105. *n.* 20. *f.* 19. Millepora membranacea plana, punctis quincuncialibus.

Reaum. act. Pariſ. 1712. *p.* 42. *t.* 5. *f.* Corallina.
Loefling act. Stockh. 1752. *p.* 118. *t.* 3. *f.* 1-4. Millepora cruſtacea plana adnata punctis quincuncialibus.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 10.
Habitat in Oceano *ſeptentrionali*, & mari mediterraneo, *fucos, ſertularias incruſtans, utrinque poroſa, albida, madida per integras noctes manu tractata egregie ſcintillans.*

charta-cea. 7. Fl. papyracea utrinque cellifera: ſummitatibus ſecuris aciei inſtar truncatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 13. *n.* 4.
Habitat ad Angliæ *littora, tenuis, ſubpellucida, dilute ſtraminea, interdum ſubdigitata, cellulis prominulis ex oblonga quadratis.*

carbaſea. 8. Fl. foliacea dichotoma, cellulis uno ſtrato diſpoſitis. *Soland. & Ellis corall. p.* 14. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 6. 7.
Habitat ad Scotiæ *littora, ex fuſceſcente lutea, cellulis majoribus medio ſubpellucidis, ſupra ovatis, medio anguſtatis, infra truncatis.*

bombyci-na. 9. Fl. frondeſcens, frondibus obtuſis dichotomis & trichotomis confertis radicantibus uno tantum ſtrato celluloſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 14. *n.* 6. *t.* 4. *f.* b. B. B. 1.
Habitat in Oceano Americam *mediam &* Indiam *alluente.*

verticil-lata. 10. Fl. adnata, ſæpe frondeſcens, frondibus linearibus ſubcompreſſis baſi attenuatis, cellulis turbinatis ciliatis, ſeriebus altera ſuper alteram diſpoſitis. *Soland. & Ellis corall. p.* 15. *n.* 7. *t.* 4. *f.* a. A.
Habitat in mari mediterraneo, *fucis adhærens, cellulis ſemipellucidis punctulatis.*

dentata. 11. Fl. plano-foliacea adnata hinc cellulis ſubovalibus nitidis, oſculis dentatis inclinatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 15. *n.* 8.
Ellis corall. p. 73. *t.* 29. *f.* D. D 1. & *act. angl.* 48. *n.* 630. *t.* 22. *f.* 4. D.
Habitat ad magnæ Britanniæ *littora, fucis teſtaceiſque adhærens, alba, ſemipellucida.*

bullata. 12. Fl. adnata, cellulis ovatis exſtantibus albis, oſculis rotundis ſpinulis armatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 16. *n.* 9.
Ellis corall. t. 30. *f.* d. D.
Habitat ad Angliæ *littora, fucos incruſtans.*

arenoſa. 13. Fl. cruſtacea arenoſa lutoſa, poris ſimplicibus ſubquincuncialibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 17. *n.* 10.
Pallas el. zooph. p. 37. *n.* 5. Eſchara (lutoſa) cruſtacea arenaceo-lutoſa, poris ſimpliciſſimis ſubquincuncialibus.
Ellis corall. p. 74. *t.* 25. *f.* e. Engliſh ſandes Millepora.
Raj. ſyn. p. 31. Eſchara millepora arenoſa anglica.
Habitat ad Angliæ *littora*, & in mari mediterraneo, *ſicca perquam friabilis, an hujus generis; an lorica marina imperati?*

tomentoſa. 14. Fl. incruſtans mollis tomentoſa, cellulis inconſpicuis. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 24. *t.* 95. *f.* 1. 2.
Habitat in maris balthici & ſeptentrionalis *fucis & ſertulariis.*

dentata. 15. Fl. incruſtans, cellulis diſcretis ovalibus: marginibus oppoſitis tridentatis, ore marginato. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 24. *t.* 95. *f.* 1. 2.
Habitat in maris ſeptentrionalis *fucis, buccinis.*

tubuloſa. 16. Fl. adnata membranacea, cellulis ſimplicibus ovato-oblongis, oſculis tubuloſis erectis. *Soland. & Ellis corall. p.* 17. *n.* 11.
Habitat ad littora inſulæ S. Dominici, *fucis adhærens, ſemipellucida, obſcure flavicans.*

hiſpida. 17. Fl. frondeſcens ſpongioſa, frondibus ramoſis hinc muricatis, cingulis hiſpidiſſimis. *Pallas el. zooph. p.* 49. *n.* 14.
Habitat rariſſima in mari mediterraneo *ſubpollicaris, pallide griſea.*

frondiculoſa. 18. Fl. frondeſcens, frondibus obtuſis trichotomis confertis uno tantum ſtrato celluloſis. *Pallas el. zooph. p.* 55. *n.* 17.
Seb. muſ. 3. *t.* 96. *f.* 6.
Habitat in Oceano indico, *dimidii pugni magnitudine, albida, bullis griſeis.*

papyracea. 4. Fl. cruſtaceo frondeſcens, fronde cuneiformi multifida uni-lamellata, cellulis oblongo-rhombeis ſummitate ringentibus. *Pallas el. zooph. p.* 56. *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1301. *n.* 4. Fluſtra plano-foliacea ramoſa adnata hinc cellulis rhombeis.
Marſ. hiſt. mar. t. 6. *f.* 25. 26. Porus cervinus Imperati.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 347. *t.* 9. *f.* 10.
Habitat in mari mediterraneo, *lichenis umbilicati ſtatura, flaveſcens, altera pagina ſcabriuſcula.*

hirta. 19. Fl. plana coriacea adnata, hinc cellulis coarctatis diſtantibus ciliatis.
O. Fabr. Fn. groenl. p. 438. n. 448. Fluſtra hiſpida.
Habitat frequens in maris Groenlandiam *alluentis fucis nodoſis, fulva, cellulis anguſtis, ſicca, fragilis.*

membranacea. 5. Fl. plano-foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis quadrangulis oblongis. *Müll. zool. dan. 3. p. 163. t. 117. f. 1. 2. prodr. 3054. O. Fabr. Fn. groenl. p. 337. n. 446. Soland. & Ellis corall. p. 18. n. 12.* Fluſtra plano-foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis quadrangulis oblongis, ad angulos ſuperiores prominulis mucronatis.
Habitat in mari anglico, balthico, *maxime* ſeptentrionali, *lapidibus, teſtaceis, fucis adhærens, tenuiſſima, cinerea, vel albicans.*

lineata. 6. Fl. plano foliacea indiviſa adnata, hinc cellulis ovalibus. *Müll. zool. dan. prodr. 3055. O. Fabr. Fn. groenl. p. 437. n. 447.*
Habitat in Oceani *fucis, membranaceæ ſimillima, at cellulis ovalibus, approximatis, octodentatis tranſverſim ſeriatis, ſpatio inter ſingulas ſeries latitudine cellularum vacuo.*

345. TUBULARIA. *Animal* vegetans radicatum, capite tentaculis criſtato, ovula generans.

Stirps tubuloſa cornea ſimpliciſſima vel ramoſa, imo affixa, apice animal exſerens.

cornucopiæ. 9. T. tubo ſimplici inferne attenuato flexuoſo rugoſoque. *Pallas el. zooph. p. 80. n. 37.*
Cavol. pol. mar. 3. p. 250. t. 9. f. 11. 12.
Habitat in maris americani & mediterranei *coralliis, lutea, per totam longitudinem rugis annulata, ſparſa vel agregata.*

indiviſa. 1. T. culmis ſimpliciſſimis geniculis contortis.
Pallas el. zooph. p. 81. n. 38. Tubularia (calamaris) tubu-

lis aggregatis ſimplicibus læviuſculis infra implexis ſubproliferis.

Soland. & Ellis corall. p. 31. *n.* 1. Tubularia tubulis ſimpliciſſimis aggregatis, ſurſum leviter dilatatis, baſi attenuatis implexis.

Ellis corall. p. 31. *n.* 2. *t.* 16. *f.* C. & *act. angl.* 48. *t.* 17. *f.* D? Corallina tubularia calamos avenaceos referens.

Bocc. muſ. p. 258. *t.* 6. *f.* 5. Fucus vermiculatus.

Raj. ſyn. p. 31. *n.* 4. Adianti aurei minimi facie planta marina.

Lhwyd act. angl. 28. *p.* 275. *t.* 6. *f.* 7. Adiantum aureum marinum.

Juſſieu act. pariſ. 1742. *p.* 296. *t.* 10. *f.* 2.

Baſter op. ſubſ. 1. *t.* 2. *f.* 3. 4.

Habitat in mari europæo, & mari mediterraneo, *tubulis culmorum avenaceorum craſſitie*, 2–2½ *pollices longis, corneis, rigidulis, ex luteo griſeis, lævibus.*

ramoſa. 2. T. culmis ramoſis, geniculis contortis. *Fn. ſuec.* 2229.

Pallas el. zooph. p. 84. *n.* 41. Tubularia (trichoides) tubulis ſimplicibus longis tenuiſſimis alterne ramoſis paſſimque annulatis.

Soland. & Ellis corral. p. 31. *n.* 2. Tubularia tubulis ramoſis, axillis ramulorum contortis.

Müll. zool. dan. prodr. 3067. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 441. *n.* 451. Fiſtularia ramoſa.

Ellis corall. p. 31. *n.* 3. *t.* 16. *f.* A. & *t.* 17. *f.* A. Corallina tubularia gracilis & ramoſa, axillis ramulorum contortis.

Habitat in Oceano europæo, *tubulorum mollium ſordide griſeorum aliquot pollices interdum longitudine æquantium ſegetibus denſiſſimis.*

camea. 10. T. tubis compoſitis ramoſis: ramis ramuliſque alternis.

Pallas el. zooph. p. 83. *n.* 40.

Habitat in mari mediterraneo, *tubulis rigido-corneis ex fuſco griſeis.*

fiſtuloſa. 3. T. culmis dichotomis articulatis: impreſſionibus rhombeis.

Fn. ſuec. 2232. Fluſtra fiſtuloſa.

Pallas el. zooph. p. 61. *n.* 21. Cellularia (Salicornia) geniculata dichotoma, articulis oblongo-cylindricis, cellulis undique rhombeis.

Soland. & Ellis corall. p. 26. *n.* 13. Cellaria farciminoides.

Ellis corall. p. 46. *t.* 23. Bugle Coralline.
Raj. hiſt. p. 65. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 811. *Tournef. inſtit. h. p.* 570. Corallina fiſtuloſa fragilis craſſior.
Pluckn. phytogr. t. 26. *f.* 3. Corallina fiſtuloſa, fragilis, internodiis prælongis lævibus albis, farciminum modo concatenatis.
Barrel. pl. ic. 1275. *n.* 7. Muſcus polygonoides ſalicorniæ forma, ſ. bifidus major.
Ellis corall. p. 46. *n.* 1, *t.* 23. *f.* A.
β) *Raj. hiſt. p.* 66. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 811. *Tournef. inſt.* 1. *h. p.* 570.
Petiv. pl. ital. t. 2. *f.* 9. Corallina fiſtuloſa fragilis ſubtilior.
Boccon. muſ. p. 255. Muſcus corallinus rotundus exilis articulatus ramoſus italicus.
Barrel. p. 1275. *n.* 8. Muſcus polygonoides tenuior.
Habitat in mari europæo, mediterraneo, atlantico, 3 *circiter pollices alta, fili groſſioris craſſitie, interdum tripla, pallide griſea.*

fragilis. 4. T. culmis dichotomis, articulis compreſſis.
Pallas el. zooph. p. 430. *n.* 12. Corallina (tubuloſa) tubuloſa ſubannulata dichotoma divaricata.
Pluckn. almag. p. 118. *phytogr. t.* 168. *f.* 4. Corallina fiſtuloſa flexilis geniculata mollis americana, ſegmentis latis & compreſſis.
Sloan. jam. cat. p. 5. *hiſt.* 1. *p.* 61. *n.* 28. *t.* 30. *f.* 10. Fucus marinus coralloides minor fungoſus albidus teres, ſegmentis in ſummitate planis.
Habitat in mari americano, *corallinæ facie, tubulis culmi graminei craſſitie, albis vel viridulis, fragiliſſimis, papyraceo-calcareis.*

muſcoides. 5. T. culmis ſubdichotomis totis annuloſo-rugoſis. *Fn. ſuec.* 2230.*
Pallas el. zooph. p. 82. *n.* 39. Tubularia tubulis aggregatis ſimplicibus radiatis hinc inde annuloſis.
Soland. & Ellis corall. p. 31. *n.* 2. Tubullaria (Larynx) tubulis ſimplicibus aggregatis, hinc inde annuloſo-rugoſis inferne attenuatis.
Müll. zool. dan. prodr. 3068. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 441. *n.* 451. Fiſtularia ramoſa.
Ellis corall. p. 30. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 6. *act. angl.* 48. *t.* 17. *f.* C. *Baſter op. ſubſ.* 1. *p.* 28. *t.* 2. *f.* 3. *f.* 4. & *t.* 3. *f.* 2-3. 4. Corallina tubularia laryngi ſimilis.
Seb. muſ. 3. *t.* 106. *f.* 7.

Habitat in mari europæo & mediterraneo; *ab oniſco phthiſico ſæpe devaſtata, pallide griſea, tubulis pollice vix longioribus, filo vix craſſioribus.*

Papyracea. 11. T. tubulo papyraceo maximo, alternatim ramoſo. *Pallas el. zooph. p. 88. n. 45.*
Habitat in Oceano indico, *erecta, intus albiſſima, craſſitie æquali calami anatini; an hujus generis?*

Penicillus. 12. T. tubulis aggregatis ſimplicibus radicatis apice proliferis penicillatiſque. *Pallas el. zooph. p. 87. n. 44.*
Habitat in mari americano, *tubulis albis, ſemipellucidis, pollice fere longioribus, craſſitie calami avenacei, totis annuloſis, an hujus generis?*

Acetabulum. 6. T. culmis filiformibus, pelta terminali ſtriata radiata calcarea.
Syſt. nat. X. 1. p. 793. n. 17. Madrepora Acetabulum
Hort. Cliff. p. 480. Sertularia caule ſimplici, umbraculo orbiculato peltato.
Pallas el. zooph. p. 430. n. 13. Corallina (Androſace) tubuloſa ſimplex pelta terminali radiata.
Lobel ic. p. 387. Androſaces, Cotyledon folioſum marinum.
C. Bauh. pin. p. 367. Androſaces petræ innaſcens.
Beſl. muſ. t. 27. Herba marina androſaces.
Tourneſ. inſt. 1. h. p. 569. t. 338. Acetabulum marinum.
Mercat. metalloth. arm. 6. c. 23. 24. p. 135. 136. Plantula lapidea ſcutulata.
Donat. adr. p. 28. n. 2. t. 3. Callopilophorum Matthioli.
Cavol. pol. mar. 3. p. 254. t. 9. f. 14.
β) *Brown. jam. 74. t. 40. f. A.* Acetabulum caule ſimplici, cyatho ſtriato & quaſi ſubcalyculato.
Habitat in mari mediterraneo, americano, *alba, mollis, ſiccitate fragiliſſima, lapidibus, teſtaceiſque adnata, tubulis ſimpliciſſimis, fili craſſitie, ſubbipollicaribus; nonne potius corallinis adſcribenda?*

Splachnea. 7. T. culmis capillaribus ſimpliciſſimis, pelta terminali lævi membranacea.
Habitat in mari mediterraneo, *cornei coloris, tubulis pluribus ex eadem radice ſetæ equinæ craſſitie, 2 pollices altis, flexilibus, pelta flexili.*

Huic generi inſerendum quoque videtur ens organicum, a Wartmanno a Girtannero *in ſpongia friabili notatum.*

Coryna. 13. T. ſubramoſa filiformis papyracea geniculata capſulis ovato-acuminatis ore dilatabili pertuſis & tentaculis cylindricis armatis terminata.

Gaertn. apud Pallas ſpic. zool. 10. *p.* 40. *t.* 4. *f.* 8. Coryne puſilla.

Habitat ad Belgii *&* Angliæ *littora, ſine radiculis fucis & ſertulariis adhærens, arenacea vel ſaturate rubra, baſi anguſtior, neque capite neque tentaculis retractilibus, capſulis per omnem ſuperficiem perforatis pro tentaculis hyalinis apice globoſis, ad baſin oviferis.*

affinis. 14. T. ſimplex ſubannulata mollis: tentaculis oris papillam retractilem cingentibus attenuatis. *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 36. 41. *t.* 4. *f.* 9.

Habitat ad Angliæ Holſatiæ*que littora, fucis gregatim adhærens, Corynæ affinis, capſulis tentaculis muricatis, ad baſin ſæpe ovigeris.*

Fabricia. 15. T. ſtellata, cirris pinnatis, ſex radiis os cingentibus. *Müll. zool dan. prodr.* 3066. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 440. *n.* 450. *f.* 12.

Habitat in Norwegiæ *&* Groenlandiæ *littore, ſæpius in fiſſuris rupium, extra tubulum ingredi neſcia, ſub fluxu maris cirros ſupra tubulum expandens, vix 6 lineis longior, tubulo erecto, verme triplo longiore, griſeo, viridi vel albo, verme ſordide viridi, cauda tamen pallida cirriſque albis, tranſverſim ſulcato tereti medio craſſiore.*

longicornis. 16. T. cirris duobus ſetaceis tubulo decuplo longioribus. *Müll. zool. dan. prodr. p.* 3070. Fiſtularia longicornis.

Habitat - - -

multicornis. 17 T. cirris ultra viginti centro candido, corpore tereti hyalino, tubulo macido.

Müll. zool. dan. 3. *p.* 15. *t.* 90. *f.* 1-3. *prodr.* 3071. Fiſtularia multicornis.

Habitat - - -

campanulata. 8. T. criſta lunata, orificiis vaginæ annulatis, corpore intra vaginam abſcondito. *Blumenb. Naturg. p.* 441. *n.* 2.

Syſt. nat. X. *p.* 817. Hydra campanulata.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1303. *n.* 8. Tubularia reptans, tubis campanulatis.

Pallas el. zooph. p. 85. *n.* 43. Tubularia (gelatinoſa) mollis griſea linearis alterne ramoſa. *Roeſel.*

Roeſel Inſ. 3. *polyp. p.* 447. *t.*73-75. Federbuſch-polypen.
Habitat in Europæ *aquis ſtagnantibus, cirris fere* 60.

repens. 18. T. criſtata, cirris utrinque radiatis, vagina porrecta, tubulo opaco procumbente. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 16 *n.* 150. *zool. dan. prodr.* 3064.
Fn. ſuec. 2219. Tubipora corallio repente filiformi dichotomo, tubis flexilibus cylindricis erectis diſtantibus.
Schaeff. Armpol. 1754. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Habitat in Europæ *magis borealis aquis ſtagnantibus, nymphææ folia cauleſque ſæpe obſidens, gelatinam album ſimulans, tubulis ſubcylindricis fuſcis, baſi anguſtatis, apice craſſioribus, verme ipſo hyalino.*

reptans. 19. T. criſta lunata, corpore extra vaginam tractili. *Blumenb. Naturg. p.* 440. *n.* 1.
Pallas el. zooph. p. 85. *n.* 42. Tubularia (cryſtallina) mollis hyalina multifido palmata, laciniis polypiferis.
Trembl. polyp. 3. *p.* 209. *t.* 10. *f.* 8. 9. Polypi criſtati.
Baker micrcgr. p. 308. *t.* 12.
Back act. Stockh. 8. *p.* 203. *t.* 6. *f.* 5. 6.
Habitat in aquis Europæ *ſtagnantibus, hyalina, mollis, ciliis circiter* 60.

Sultana. 20. T. criſta infundibuliformi ad baſin ciliata. *Blumenb. Naturg. p.* 441. *n.* 3.
Habitat in Goettingæ *ſtagnis, cirris circiter* 20 *faſtigiatis.*

ſtellaris. 21. T. criſtata, cirris pectinatis, tubulo fuſco annulato erecto. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 18. *zool. dan. prodr.* 3065.
Habitat in maris balthici *fuco, minimo aquæ motu territa cirros ſubtiliſſimos candidos pro lubitu flexiles & extenſiles in tubulo duplo longiori recondens.*

ſimplex. 22. T. cirris octo linearibus, tubulo conico hyalino. *Müll. verm.* I. 2. *p.* 19. *von Würm. p.* 153.
Müll. zool. dan. prodr. 3069. Fiſtularia ſimplex.
Habitat frequens in maris norwegici *fuco nodoſo, tubulis erectis ſolitariis, verme hyalino, cirris albis, aqua leviſſime mota in vaginam, ea fortius mota vagina in tubulum retracta.*

Spallanzani. 23. T. cirris quinis plumoſis utrinque pectinatis, tubulo cylindrico corneo inferne incurvo. *Spallanz. act. ſoc. ital.* 2.
Habitat in maris mediterranei *locis paccatioribus.*

membranacea. 24. T. tentaculorum fiſtuloſorum ordine duplici concentrico, tubulo membranaceo contractili viſcido cylindrico incolam ſuperante. *Spallanz. act. ſoc. ital.* 2.
Habitat in maris mediterranei *locis magis pacatis ; utrum hujus , an diſtincti generis ?*

346. CORALLINA. *Animal* creſcens habitu plantæ.
Stirps fixa e tubis capillaribus per cruſtam calcaream poroſam ſeſe exſerentibus compoſita.
Rami ſæpe articulati ſemper ramuloſi vel divaricati , liberi vel conglutinati & connexi.

ridens. 9. C. trichotoma articulata : articulis compreſſis planis trilobis. *Soland. & Ellis corall. p.* 109. *n.* 1. *t.* 20. *f.* a.
Habitat in mari Americam *alluente.* Greg.

Opuntia. 1. C. trichotoma , articulis compreſſis ſubreniformibus.
Hort. Cliff. 480. Sertularia ramoſiſſima , articulis reniformibus.
Pallas el. zooph. p. 420. *n.* 2. Corallina trichotoma articulata , articulis planis reniformibus concatenatis.
Soland. & Ellis corall. p. 110. *n.* 2. *t.* 20. *f.* b. Corallina trichotoma articulata , articulis compreſſis undulatis reniformibus.
Ellis corall. p: 53. *t.* 25. *f.* b. B. B. 1. Articulated Coralline of Jamaica.
Plukn. alm. p. 118. *phytogr. t.* 26. *f.* 1. Corallina latifolia f. opuntia marina Cortuſi.
Petiv. pterigr. t. 20. *f.* 19. Corallina opuntioides minor.
Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 57. *n.* 16. *t.* 20. *f.* 2. Corallina opuntioides , ramulis denſioribus & foliis magis ſinuatis atque corrugatis.
Bocc. muſ. 1. *p.* 219. Muſcus marinus candidus denticulatus.
C. Bauh. pin. p. 364. Fucus folio ſubrotundo.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 862. Scutellaria f. opuntia marina.
Imper. hiſt. nat. p. 854. Sertolaria.
Cluſ. hiſt. plant. 2. *p.* 250.

Habitat in mari americano, mediterraneo, *alba, in illo ramoſiſſima articulis minoribus, in hoc minus ramoſa articulis majoribus.*

Monile. 10. C. trichotoma articulata, articulis inferioribus compreſſis convexis cuneiformibus oblongis, ſuperioribus ſubcylindricis. *Soland. & Ellis corall. p.* 110. *n.* 3. *t.* 20. *f.* C.
Habitat ad Jamaicæ *littora.*

incraſſata. 11. C. trichotoma articulata, articulis compreſſis convexo-planis cuneiformibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 111. *n.* 4. *t.* 20. *f.* d. d 1-3. D 1-6.
Ellis corall. p. 53. *t.* 25. *f.* A. a.
Habitat ad Jamaicæ *inſularumque vicinarum littora.*

Tuna. 12. C. trichotoma articulata, articulis compreſſis planis ſubrotundis. *Soland. & Ellis corall. p.* 111. *n.* 5. *t.* 20. *f.* e.
Parkinſ. theatr. p. 1294. *f.* 12. *Marſ. hiſt. mar. p.* 65. *t.* 7. *f.* 31. Opuntia marina.
Habitat in mari mediterraneo.

Nodularia. 13. C. trichotoma ramoſiſſima, articulis craſſis cuneiformibus, diviſurarum latioribus, terminalibus tricuſpidatis ovatiſve. *Pallas el. zooph. p.* 421. *n.* 3.
Imper. hiſt. nat. p. 652. Nodularia alba.
C. Bauh. pin. p. 364. Muſcus coralloides, ſquamulis loricatus.
Habitat in mari mediterraneo, *ſeſquipedalis, craſſiſſima, lapidoſa, alba.*

ſquamata. 14. C. trichotoma, articulis ſtirpium rotundato-compreſſis cuneiformibus, ramulorum compreſſis planis, ultimis complanatis ancipitibus acutis. *Soland. & Ellis corall. p.* 117. *n.* 18.
Fn. ſuec. 2235. Corallina bipinnata, articulis obovatis compreſſis.
Ellis corall. p. 49. *t.* 24. *n.* 4. *f.* c. C. Upright engliſh Coralline with Spear-like Heads and flat Joints.
Habitat ad Cornubiæ *littora, coloris thalaſſini.*

loricata. 15. C trichotoma articulis compreſſis convexiuſculis cuneiformibus: lateribus angulatis, ultimis ſublobatis: lobis parvis obtuſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 117. *n.* 19.
Habitat in mari mediterraneo, *officinali major & quadruplo craſſior.*

palmata. 16. C. trichotoma, articulis compreſſis convexiuſculis cuneiformibus apice ſubcorniculatis: ultimis latis lobis digitiformibus inſtructis. *Soland. & Ellis corall. p.* 118. *n.* 20. *t.* 21. *f.* a. A.

Habitat in mari Americam *alluente, nitens, nivea.*

elongata. 17. C. trichotoma, articulis ſtirpium ſubtereti-cuneiformibus, ramorum cylindricis, ſummis obtuſiuſculis, nonnullis capitatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 119. *n.* 22.

Ellis corall. p. 49. *t.* 24. *f.* 3. Slender trailing engliſh Coralline.

Habitat ad Cornubiæ littora, *rubella vel purpuraſcens; officinali gracilior.*

ſubulata. 18. C. trichotoma, articulis ſtirpium ancipitibus cuneiformibus ex apice utriuſque lateris proliferis, ramulis brevibus ſubulatis: articulis teretibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 119. *n.* 23. *t.* 21. *f.* b. B.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente, alba, anguſtiſſima, tenerrima, complanata.*

granifera. 19. C. trichotoma, articulis ſtirpium compreſſis cuneiformibus, ramulorum ſubteretibus, ovariis ovalibus pedunculatis oppoſitis, interdum proliferis. *Soland. & Ellis corall. p.* 120. *n.* 24. *t.* 21. *f.* c. C.

Habitat in mari mediterraneo, *ad* Africæ *littora, tenera, coloris thalaſſini.*

officinalis. 2. C. ſubbipinnata, articulis ſubturbinatis. *Fn. ſuec.* 2234. *Müll. zool. dan. prodr.* 3056. *act. Havn.* 10. *t.* e. *f.* 7.

Pallas el. zooph. p. 422. *n.* 4. Corallina bipinnata articulis ovatis, ſuperioribus compreſſis, terminalibus ovato-lanceolatis planis.

Soland. & Ellis corall. p. 118. *n.* 21. *t.* 23. *f.* 14. 15. Corallina trichotoma articulis ſtirpium ſubcompreſſis ſubcuneiformibus, ramulorum cylindricis, terminalibus nonnullis capitatis.

Ellis corall. p. 48. *t.* 24. *n.* 2. *f.* a. A. A. 1. A. 2. B. B. 1. B. 2. Coralline of the shops.

Lobel ic. 2. *p.* 240. *Chabr. ſtirp. p.* 577. *J. Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 818. *Raj. hiſt. p.* 65. *ſyn. p.* 33. *n.* 1. *Tournef. inſt.* 1. h. *p.* 577. *t.* 338. A. *Dale harvic.* 338. *pharmac. p.* 112. *Ruſſel. aq. mar. tit. f.* 3. Corallina.

Tobernaem. herb. p. 813. Corallina altera.

Parkinſ. theatr. 1296. Corallina alba officinarum.

Johnſ. merc. bot. p. 30. *it. cantabr.* 2. *p.* 3. *Merret. pin. p.* 30. Corallina pennata longior.
Pluckn. alm. p. 118. *phytogr. t.* 48. *f.* 4. Corallina magis erecta pennata eburneo nitore candicans.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. *ſect.* 15. *t.* 9. Corallina ſ. muſcus marinus tenui capillo, ſpermophoros.
C. Bauh. p. 363. Muſcus maritimus ſ. Corallina officinarum.
Barrel. ic. 1276. *n.* 1. Muſcus corallinus filicinus.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 13-15.
Habitat in Oceano europæo, & mari mediterraneo, 4 & *plures pollices longa, fili groſſioris craſſitie, alba, virescens, flavicans, vel rubella, inter vermifuga relata.*

pinnata. 20. C. ramis pinnatis continuis furfuraceis. *Soland. & Ellis corall. p.* 117. *n.* 17.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

rubens. 3. C. dichotoma capillaris faſtigiata: articulis ſuperioribus elevatis. *Fn. ſuec.* 2238.
Pallas el. zooph. p. 426. *n.* 7. Corallina filiformis dichotoma faſtigiata, articulis omnibus cylindricis.
Soland. & Ellis corall. p. 123. *n.* 28. Corallina dichotoma filiformis, articulis ſtirpium teretibus, dichotomiæ claviformibus, inferioribus nonnullis bicornibus.
Ellis corall. p. 50. *t.* 24. *n.* 5. *f.* e. E. Reddiſh Hair-like Coralline.
Cavol. pol. mar. 3. *p.* 257. *t.* 9. *f.* 16.
Habitat in mari, Angliam *alluente* & mediterraneo, *ad* 2 *pollices longa, rubra.*

criſtata. 21. C. filiformis dichotoma faſtigiata, articulis teretiunculis diviſurarum ſuperiorum clavatis. *Pallas el. zooph. p.* 425. *n.* 6. *Müll. zool. dan. prodr.* 3057.
Soland. & Ellis corall. p. 121. *n.* 26. Corallina dichotoma capillaris, articulis teretibus, ramulis faſciculatis criſtatis, diviſuris penultimis & extremis ovariferis.
Ellis corall. p. 51. *t.* 24. *n.* 7. *f.* f. F. Creſted or Cock's Comb Coralline.
Pluckn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 168. *f.* 3. *Sloan. jam. cat. p.* 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 19. *t.* 20. *f.* 5. Corallina marina capillacea.
J. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 811. Corallinis affinis ſ. muſcus marinus tenui capillo.
C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus capillaceus, multifido folio, albidus.

Imper. hiſt. nat. p. 652. Villus petræus ſ. Muſcus marinus.
Barrel. ic. 1296. *f.* 2. Muſcus coralloides cruſtatus.
Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, americano, *dimidium ad ſeſquipollicem longa, utplurimum rubens aut purpuraſcens, ſæpe alba, interdum viridis aut flaveſcens.*

ſpermophoros. 22. C. dichotoma capillaris inferne pinuata, articulis cylindricis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 807.
Soland. & Ellis corall. p. 122. *n.* 27. Corallina dichotoma capillaris, articulis ſubteretibus, diviſuris penultimis & ultimis ovariferis, corniculis terminalibus ſetaceis.
Ellis corall. p. 51. *t.* 24. *n.* 8. *f.* g. G. Seed-bearing Coralline.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 651. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 9. Corallina muſcoſa.
β) *Ellis corall. t.* 24. *n.* 9. *f.* h. H. H 1.
Habitat ad Cornubiæ *littora, utplurimum lactea, vix ultra pollicem longa.*

corniculata. 4. C. dichotoma inferne pinnata, articulis bicornibus. *Fn. ſuec.* 2236.
Pallas el. zooph. p. 424. *n.* 5. Corallina inferne pinnata, extremitate dichotoma.
Soland. & Ellis corall. p. 121. *n.* 25. Corallina dichotoma, articulis ſtirpium bicornibus, ramulorum teretibus.
Ellis corall. p. 50. *t.* 24. *n.* 6. *f.* d. D. White ſlender jointed Coralline.
Habitat ad Cornubiæ *littora, & (articulis omnibus bicornibus) in* mari Americam *mediam alluente, in diviſuris extremis interdum ovarifera.*

fragiliſſima. 5. C. dichotoma, articulis filiformibus divaricatis apice baſique latioribus.
Pallas el. zooph. p. 429. *n.* 11. Corallina dichotoma rigida erecta, articulis longis cylindricis coarticulatis.
Soland. & Ellis corall. p. 123. *n.* 29. *t.* 21. *f.* d. Corallina dichotoma, articulis cylindricis æqualibus lævibus, ramis erectis.
Sloan. jam. cat. p. 2. *hiſt.* 1. *p.* 53. *t.* 20. *f.* 1. Corallium minimum capillaceum.
Habitat in mari indico, mediterraneo & Americam mediam *alluente, lactea, fragiliſſima, bipollicaris & longior.*

fruticuloſa. 23. C. dichotoma, ramis teretibus continuis furfuraceis: apicibus attenuatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 116. *n.* 16. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

indurata. 24. C. dichotoma, ramis ſubcontinuis teretibus lævibus divaricatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 116. *n.* 15. *t.* 22. *f.* 7.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora.*

lichenoides. 25. C. dichotoma, ramis continuis rugoſiuſculis ſuperne complanatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 116. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 8.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora, coloris thalaſſini.*

rugoſa. 26. C. dichotoma, articulis annulato-ruguloſis ſubcontinuis cylindricis: apicibus compreſſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 115. *n.* 13. *t.* 22. *f.* 3.

Pluckn. phytogr. t. 168. *f.* 4. Corallina geniculata mollis americana, ſegmentis latis & compreſſis.

Sloan. jam. hiſt. 1. *p.* 61. *t.* 20. *f.* 10. Fucus marinus coralloides minor fungoſus albidus teres, ſegmentis in ſummitate planis.

Habitat ad Jamaicæ *littora.*

marginata. 27. C. dichotoma, ramis ſubcontinuis lævibus complanatis: marginibus ſubinflexis. *Soland. & Ellis corall. p.* 115. *n.* 12. *t.* 22. *f.* 6.

Habitat ad inſulæ Bahamenſis, *littus, fibris tenerrimis.*

cylindrica. 28. C. dichotoma, articulis cylindricis ſubæqualibus lævibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 114. *n.* 11. *t.* 22. *f.* 4.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente.* Greg.

oblongata. 29. C. dichotoma, articulis oblongis ſubcompreſſo-cylindricis. *Soland. & Ellis corall. p.* 114. *n.* 10. *t.* 22. *f.* 1.

Habitat in mari, Americam *mediam alluente, inter obtuſatam & cylindricam media.*

obtuſata. 30. C. dichotoma, articulis oblongo-ovatis utrinque rotundatis ſubcompreſſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 113. *n.* 9. *t.* 22. *f.* 2.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus.*

lapideſcens. 31. C. dichotoma, articulis cylindricis villoſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 112. *n.* 8. *t.* 21. *f. g. & t.* 22. *f.* 9.

Habitat - - - villis ſubtilibus, brevibus, rubellis, verticillatim ex poris corticis calcarei progerminantibus.

barbata. 6. C. dichotoma, articulis cylindricis, ramulis apice barbatis. *Pallas el. zooph. p.* 428. *n.* 9. *Soland. & Ellis corall. p.* 112. *n.* 7.

Ellis corall. p. 54. *t.* 25. c. C. Roſary or Bead-Coralline of Jamaica.

Pluckn. almag. p. 118. Corallina fiſtuloſa jamaicenſis candida cum internodiis breviſſimis, noſtratibus Bead-bandſtring.

Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 17. *t.* 20. *f.* 3. Corallina major, nervo craſſiori fuciformi intermedia breviora nectente.

Habitat ad Jamaicæ *littus, tripollicaris & longior, fili groſſio.is craſſitie.*

Roſarium. 32. C. dichotoma, articulis ſubmoniliformibus inferioribus cylindricis. *Soland. & Ellis corall. p.* 111. *n.* 6. *t.* 21. *f.* h. H. H. 1-3.

Sloan. jam. cat. p. 4. *hiſt.* 1. *p.* 58. *n.* 18. *t.* 20. *f.* 4. Corallina nervo tenuiori fragiliorique internodia longiora nectente.

Brown. jam. p. 390. *n.* 3. Corallium brachiatum & articulatum, articulis cylindraceis, nervo tenuiore connexis.

Habitat ad Jamaicæ *& vicinarum* inſularum *littus, barbatæ affinis.*

cuſpidata. 33. C. ſubtetrachotoma, articulis cylindricis: geniculis tendinaceo glutinoſis, ramulis acutis. *Soland. & Ellis corall. p.* 124. *n.* 30. *t.* 21. *f.* f.

Habitat in mari Americam *mediam alluente, nitidiſſima, alba, 3 circiter pollices alta.*

Tribulus. 34. C. ſubpentachotoma, articulis ancipitibus: geniculis tendinaceo-glutinoſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 124. *n.* 31. *t.* 21. *f.* e.

Habitat in mari Americam *mediam alluente, albida, cuſpidata craſſior & latior.*

Flabellum. 35. C. ſtipite ſimplici incruſtato, ramis omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi incruſtata ſubundulata. *Soland. & Ellis corall. p.* 124. *n.* 32. *t.* 24.

Habitat in mari Americam *mediam alluente, figura & colore a vireſcente fuſco ad lacteum varians, nunc folium reniforme pollicem altum, petiolo dilatato referens, nunc lobata & undulata 1-5 pollices alta & lata.*

Dubiam, et vexatam a multis animalem corallinæ indolem probabilem reddit conſtans, quo obducitur, cortex calcarius poroſus, et ſumma ſpecierum nonnullarum cum milleporis affinitas.

conglutinata. 36. C. ſtipite ſimplici ſubincruſtato, ramis dichotomis omnibus conglutinatis, fronde flabelliformi nuda. *Soland. & Ellis corall. p.* 125. *n.* 33. *t.* 25. *f.* 7.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus*, $1\frac{1}{2}$ *pollicem alta, coloris thalaſſini.*

Phœnix. 37. C. ſtipite ſimplici incruſtato, fronde oblonga, ramis undique faſciculatis erumpentibus complanato-connatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 126. *n.* 34. *t.* 25. *f.* 2. 3.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littus*, *lactea*, $3\frac{1}{2}$ *pollices alta.*

Penicillus. 7. C. culmo ſimplici, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis flexilibus continuis.

Amœn. ac. 4. *p.* 257. *t.* 3. *f.* 1. Hydra glomerata.

Pallas el. zooph. p. 428. *n.* 10. Corallina culmo ſtupposo ſimplici, apice penicillato, ramulis confertis dichotomis filiformibus.

Soland. & Ellis corall. p. 126. *n.* 35. *t.* 25. *f.* 4-6. Corallina ſtipite ſimplici incruſtato, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis filiformibus articulatis.

Seb. muſ. 1. *t.* 1. *f.* 10.

Habitat in mari Americam *mediam alluente*, 1-4 *pollices longa, utplurimum alba, filamentorum tubularium ope teſtaceis adhærens.*

Peniculum. 38. C. ſtipite ſimplici membranaceo ruguloſo, ramis faſciculatis faſtigiatis dichotomis articulatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 127. *n.* 36. *t.* 7. *f.* 5-8. & *t.* 25. *f.* 1.

Habitat in mari Americam *alluente, ſurſum dilatata, tubulorum ope adhærens.*

terreſtris. 8. C. brachiata, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis tranſverſim rugoſis.

Pallas el. zooph. p. 427. *n.* 8. Corallina oppoſita ramoſa, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis tranſverſim oblongis.

Meeſe flor. friſ. p. 75. *n.* 503. *t.* 1. Lichen fruticuloſus ramoſus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis pedunculatis.

Habitat in Friſiæ *ericetis, vix aliquot lineas alta, vix vera, diſtincta, perfecta, hujus generis & regni ſpecies.*

347. SERTULARIA. *Animal* creſcens plantæ habitu.
Stirps emittens e cellulis vel denticulis calyciformibus hydras.

* *ſtirpe tubuloſa cornea, denticulis calyciformibus obſita, baſi affixa, veſiculis hydras, ova vel prolem vivam continentibus inſtructa.*

roſacea. 1. S. paniculata, denticulis oppoſitis, tubuloſis truncatis, ramis alternis, veſiculis coronato-ſpinoſis. *Soland. & Ellis corall. p. 39. n. 7.*
Pallas el. zooph. p. 129. *n.* 78. Sertularia (Nigellaſtrum) alterne-ramoſa, calyculis oppoſitis tubuloſis, ovariis ovatis truncato-ſexſpinoſis.
Ellis act. angl. 48. *t.* 23. *f.* 5. *& corall. p.* 8. *t.* 4. Lily or Pomgranate flowering Coralline.
Seb. muſ. 3. *t.* 69. *f.* 6.
Habitat in Oceano, *&* mari mediterraneo, *alba, tenera, teſtaceis aliiſque zoophytis affixa.*

pumila. 2. S. denticulis oppoſitis mucronatis recurvatis, ovariis obovatis, ramis vagis.
Pallas el. zooph. p. 130. *n.* 79. Sertularia ſubſimplex articulata, calyculis oppoſitis recurvis ſubmucronatis, ovariis ovatis, ore marginato.
Soland. & Ellis corall. p. 40. *n.* 8. Sertularia denticulis oppoſitis mucronatis recurvatis, ovariis ſubrotundis.
Ellis corall. p. 9. *t.* 5. *n.* 8. *f.* a. A. *act. angl.* 48. *t.* 23. *f.* 6. FF. *&* 57. *t.* 19. *f.* 11. Sea-Oak Coralline.
Raj. ſyn. p. 37. *n.* 19. Corallina pumila, repens minus ramoſa, denticulis bijugis.
Reaum. act. Pariſ. 1711. *p.* 279. *t.* 11. *f.* 4. MM.
Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 1.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 216. *t.* 8. *f.* 8-10.
Habitat in Oceano, *fucis, præſertim ſerrato adhærens.*

operculata. 3. S. denticulis oppoſitis mucronatis erectiuſculis, veſiculis obovatis operculatis, ramis alternis. *Soland. & Ellis corall. p.* 39. *n.* 6.
Pallas el. zooph. p. 132. *n.* 80. Sertularia (uſneoides) dichotoma, calyculis oppoſitis bidentatis erectiuſculis, ovariis ovatis operculatiſque.

Ellis corall. p. 8. *t.* 3. *n.* 6. *f.* b. B. Sea-Hair.
Pluckn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 47. *f.* 11. *Tourneſ. inſt. p.* 570. *Raj. ſyn. p.* 36. *n.* 13. Corallina muſcoſa denticulata procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis bijugis.
Raj. hiſt. pl. 3. *p.* 79. Muſcus marinus denticulatus procumbens denticulis bijugis.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 650. *ſ.* 15. *t.* 9. *n.* 2. 3. Muſcus marinus lendiginoſus minimus, arenacei coloris & Muſcus marinus procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis bijugis.
Bocc. muſ. t. 6. *f.* 8.
Seb. muſ. 3. *t.* 102. *f.* 3.
Habitat in mari europæo, americano, mediterraneo, *radicibus ſuis in teſtaceis, rarius in ſucis defixa, ſurculis ad* 5 *pollices longis, denticulis bicuſpidatis, utrinque ſeta brevi minutis.*

tamariſca. 4. S. denticulis ſuboppoſitis truncato ſubtridenticulatis veſiculis obovatis bidentatis, ramis alternis. *Fn. ſuec.* 2240.
Pallas el. zooph. p. 129. *n.* 77. Sertularia ſparſe ramoſa, calyculis oppoſitis tubuloſis ſubdenticulatis, ovariis ovato-biſpinoſis, ore tubuloſo.
Soland. & Ellis corall. p. 36. *n.* 1. Sertularia alternatim ramoſa, denticulis oppoſitis tubuloſis crenatis, ovariis ovato truncatis, bidenticulatis, ore tubuloſo.
Ellis corall. p. 4. *t.* 1. *n.* 1. *f.* a. A. Sea-Tamarisk.
Habitat in mari ſeptentrionali, *in teſtaceis reptans, congenerum maxima, abietinæ affinis, ad* 4 *fere pollices longa.*

abietina. 5. S. denticulis ſuboppoſitis tubuloſis, veſiculis ovalibus, ramis pinnato alternis. *Fn. ſuec.* 2241. *Müll. zool. dan. prodr.* 3072. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 442. *n.* 453.
Pallas el. zooph. p. 133. *n.* 81. Sertularia pinnata, pinnis alternis, calyculis ſuboppoſitis ovato-tubuloſis, ovariis oblongis.
Soland. & Ellis corall. p. 36. *n.* 2. Sertularia alternatim pinnata, denticulis ſuboppoſitis ovato-tubuloſis, ovariis ovalibus.
Ellis corall. p. 4. *t.* 1. *n.* 2. *f.* 6. B. Sea-Fir.
Royen prodr. h. Lugdb. p. 524. *n.* 7. Sertularia ramoſiſſima, articulis membranaceis ovatis alternatim ex ſinu alrerius enaſcentibus.
Tourneſ. inſt. p. 571. *Raj. ſyn. p.* 35. Corallina marina abietis forma.
Imper. hiſt. nat. p. 652. Pennaria marina.
Lobel. ic. 2. *p.* 250. Muſcus coralloides albus alter.

C. Bauh. pin. p. 365. Abieti ſimilis maritima.
Parkinſ. theatr. p. 1301. Abies marina.
Cluſ. hiſt. 35. *Ger. amac.* 1574. Abies marina belgica.
F. Bauh. hiſt. pl. 3. *p.* 799. Muſci marini genus foliis pinnatis.

Raj. hiſt. pl. 1. *p.* 78. *Pluckn. almag. p.* 119. *phytogr. t.* 48. *f.* 5. Corallinæ affinis abies marina dicta ſ. Muſcus marinus major argute denticulatus.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *ſ.* 15. *t.* 9. *p.* 953. Muſcus marinus filicis folio C. B.

Marſ. hiſt. mar. p. 76. *t.* 17. *f.* 59. Muſcus phyllitidi ſimilis.

Baſter op. 2. *t.* 7. *f.* 2. 3.

Habitat in mari europæo, mediterraneo & indico, *teſtaceis utplurimum adhærens, crebro ſerpulis obſeſſa, ad 5 pollices longa.*

nigra. 43. S. pinnata nigricans, calyculis ſuboppoſitis minutis, veſiculis magnis ſecundis ovato-quadrangulis. *Pallas el. zooph. p.* 135. *n.* 82.

Habitat in Oceano indico? americano? *ad* Cornubiæ *littora, mytilo margaritifero ſæpe affixa, ad 4 pollices longa.*

fuceſcens. 44. S. pinnata fuſceſcens, calyculis ſuboppoſitis tubuloſis, veſiculis crebris ſecundis minutis trituberculatis. *Pallas el. zooph. p.* 136. *n.* 83. Sertularia pinnata.
Baſt. op. ſubſ. 1. *l.* 1. *t.* 1. *f.* 6.

Habitat in mari Cornubiam *alluente, nigræ affinis & ex griſeo fuſca.*

obſoleta. 45. S. pinnata, pinnis alternis calyculis utplurimum octofariam per quincunces diſpoſitis ovato-ſubcordatis. *Lepechin. act. Petrop.* 1778. 2. *p.* 137. *t.* 7. *f.* B.

Habitat in mari glaciali, *potiſſimum ad littora ſabuloſa promontorii* Canin Nos, *ad 5 pollices alta, cornei coloris, articulis ſuperiora verſus obſoletioribus, tandem obſoletiſſimis.*

Pinus. 46. S. pinnata, pinnis ſubalternis cylindricis ob caliculos utplurimum ſexfariam diſpoſitos echinatis, veſiculis utriculatibus turgidis ſubdiaphanis: oſculo ſimplici. *Lepechin. act. Petrop.* 1780. 1. *p.* 223. *t.* 9. *f.* 1. 2.

Habitat circa Promontorium Canin Nos maris albi, *fibrillarum ope teſtaceis aut lapillis affixa, cornea.*

cupreſſoides. 47. S. paniculata, ramis dichotomis ſparſis, calyculis vix oſculo prominulo ſimplicibus oblique truncatis, veſiculis

ovatis; oſculo ſubtubuloſo, trunco ramiſque articulatis: commiſſuris biannulatis. *Lepechin. act. Petrop.* 1780. 1. *p.* 224. *t.* 9. *f.* 3. 4.

Habitat in mari albo, *circa* promontorium Canin Nos, *cupreſſinæ affinis, ſubdiaphana flavicans, vix dimidium pedem longa.*

cupreſſina. 6. S. denticulis ſuboppoſitis alternis ſubacutis, veſiculis obovatis, ramis paniculatis longiſſimis.

Pallas el. zooph. p. 141. n. 89. Sertularia caule paniculato, ramulis dichotomis ſparſis, calyculis ſuboppoſitis mucronatis, ovariis biſpinoſis.

Soland. & Ellis corall. p. 38. *n.* 5. Sertularia denticulis ſuboppoſitis oblique truncatis, ramis paniculatis ſparſis longioribus, ovariis obovatis.

Ellis corall. p. 7. *t.* 3. *n.* 5. *f.* a. A. Sea-Cypreſs.

Seb. muſ. 3. *t.* 101. *f.* 2.

Habitat in maris europæi, *præſertim* britannici *profundis.*

argentea. 48. S. denticulis ſuboppoſitis mucronatis, veſiculis ovalibus, ramis alternis paniculatis. *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 809. *n.* 7. *Soland. & Ellis corall. p.* 38. *n.* 4.

Ellis corall. p. 6. *t.* 2. *n.* 4. Squirrel's Tail.

Mercat. pin. p. 29. Corallina comis ad inſtar caudæ vulpinæ ſparſis.

Raj. ſyn. p. 36. *n.* 7. *Pluckn. alm. p.* 119. *phytogr. t.* 84. *f.* 3. Corallina muſcoſa alterna vice denticulata, ramis in creberrima capillamenta ſparſis.

Bocc. muſ. p. 259. *t.* 6. *f.* 9. Muſcus albus denticulatus maritimus fruticans & exilis ramoſus.

Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 650. *ſert.* 15. *t.* 9. *n.* 4. Muſcus marinus minor, denticulis alternis bijugis.

Baſter op. ſubſ. 1. *t.* 1. *f.* 1. 2.

Habitat in Oceano europæo & americano, *a cupreſſina vere diſtincta, conſervam geniculatam ramoſiſſimam pedalem referens.*

rugoſa. 7. S. denticulis alternis obſoletis, veſiculis rugoſiſſimis tridentatis, ramis vagis. *Soland. & Ellis corall. p.* 52. *n.* 24. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 443. *n.* 454.

Pallas el. zooph. p. 126. *n.* 75. Sertularia ſurculis minutis racemoſis, calyculis paucis ovatis rugoſiſſimis, ovariis rugoſis tridentatis.

Ellis corall. p. 26. *t.* 15. *n.* 23. *f.* a. A. Snail-trefoil Coralline.

Habitat in mari europæo, *fluſtræ foliaceæ aliiſque ſertulariis adhærens.*

halecina. 8. S. denticulis alternis obſoletis, calycibus biarticulatis, veſiculis ovalibus, caulibus coadunatis. *Fn. ſuec.* 2242. *Müll. zool. dan. prodr.* 3073. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 443. *n.* 455.

Pallas el. zooph. p. 113. *n.* 64. Sertularia ſcrupoſa ramoſo-pinnata, ramulis alternis calyculis tubuliformibus, ovariis ſparſis oblongis.

Soland. & Ellis corall. p. 46. *n.* 15. Sertularia ramoſa pinnata, ramulis alternis denticulis tubiformibus biarticulatis, ovariis ovalibus, pedunculis lateraliter coadunatis.

Ellis corall. p. 17. *t.* 10. *act. angl.* 48. *t.* 17. *f.* E. F. G. Herring-bone Coralline.

Raj. ſyn. p. 36. *n.* 15. Corallina ſcrupoſa pennata, cauliculis craſſiuſculis rigidis.

Seb. muſ. 3. *t.* 100. *n.* 16.

Edw. glean. t. 286.

Habitat in mari europæo, atlantico, mediterraneo, indico, *in teſtaceis reptans, cornea, ex griſeo luteſcens.*

Thuja. 9. S. denticulis diſtichis appreſſis, veſiculis obovatis marginatis, ſtirpe dichotoma diſticha. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 444. *n.* 456.

Pallas el. zooph. p. 140. *n.* 88. Sertularia caule ſimplici paniculato, ramis creberrimis dichotomis acutis, calyculis diſtichis adpreſſis, ovariis ovatis.

Soland. & Ellis corall. p. 41. *n.* 9. Sertularia denticulis diſtichis alternis appreſſis, ovariis ovatis marginatis, caule angulato rigido paniculato, ramulis creberrimis dichotomis attenuatis.

Ellis corall. p. 10. *t.* 5. *n.* 9. *f.* b. B. *& in front.* Bottle brush Coralline.

Raj. ſyn. p. 50. *n.* 47. *Sibb. Scot. ill.* 2. *p.* 56. *t.* 1. Fucus equiſeti facie, oſtreæ teſtæ adnatus.

Seb. muſ. 3. *t.* 100. *f.* 17-19. *& t.* 106. *f.* 2. a. *Corallina* equiſeti forma.

Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, *antipathi cupreſſo ſimilis, ad ½ pedem longa.*

Myriophyllum. 10. S. denticulis ſecundis acutis, veſiculis ſecundis cylindricis imbricatis, ſurculis ſemipinnatis incurvatis. *Fn. ſuec.* 2243.

Pallas el. zooph. p. 153. *n.* 96. Sertularia ſimplex pinnata, rhachi interrupta, pinnis ſecundis incurvis, calyculis campanulatis ſtipulatis.

Soland. & Ellis corall. p. 44. *n.* 13. Sertularia pinnata, pinnis alternis, rhachi nodoſa, nodulis externe arcuatis diſtantibus, denticulis ſecundis truncatis ſtipulatiſque.
Ellis corall. p. 14. *t.* 8. Pheaſant's tail Coralline.
Barrel. ic. plant. 1292. *f.* 2. *Fetiv. pl. ital. t.* 2. *f.* 11. Corallina fruticoſa pennata.
C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus maritimus, filicis folio.
Moriſ. hiſt. pl. 3. *p.* 650. Muſcus marinus pennatus, ramulis & capillamentis falcatis.
Zanich. monogr. Venet. 1714. *Ginann. adr. t.* 11. *f.* 24. Myriophyllum pelagicum. Aniſocalicum.
Donat. adr. p. 24. Aniſocalicum.
Habitat in Oceano, mari mediterraneo, *pallida, ſubcoriacea; 3 circiter pollices longa, rhachin pennæ referens, a latere anteriore ſulco exarata, pennata radiis e ſulco alternis, ſimplicibus, approximatis, alterno divaricatis, parallelis, æqualibus, articulatis incurvis, veſiculis ſolitariis e ſingulis radii articulis, a latere incurvato, cylindricis, pellucidis, ramo approximatis, bractea ſubulata ſe dimidio brevioribus.*

hypnoides. 49. S. ſurculis pinnato-ramoſis pinnulatis: pinnulis creberrimis, calyculis ſecundis campanulatis dentatis roſtratiſque. *Pallas el. zooph. p.* 155. *n.* 97.
Habitat in Oceano indico, *ſemipedalis, ex fuſco cornea, radiculis luteſcentibus intricatis.*

ſpecioſa. 50. S. pinnata rigida, pinnis ſubſecundis incurvis, calyculis campanulato effuſis dentatis ſtipulatiſque. *Pallas el. zooph. p.* 152. *n.* 95.
Habitat in Oceano indico, *ex fuſco cornea, ſurculis creberrimis 3-4 pollicum, radiculis tubuloſis faſciculatim implexis gorgoniæ adhærens.*

falcata. 11. S. denticulis ſecundis imbricatis truncatis, veſiculis ovatis, ramis pinnatis alternis. *Fn. ſuec.* 2244.
Pallas el. zooph. p. 144. *n.* 90. Sertularia flexuoſa alternatim ramoſa, ramis pinnatis, calyculis ſecundis confertis tubuloſis, veſiculis ovatis ſparſis.
Soland. & Ellis corall. p. 42. *n.* 11. Sertularia denticulis ſecundis imbricatis truncatis, ovariis ovato-oblongis, ramis pinnatis alternis, caule flexuoſo.
Ellis corall. p. 12. *t.* 7. *n.* 11. *f.* a. A. *& in front. centr.* Sickle-Coralline.

Raj. ſyn. 3. *p.* 36. *n.* 16. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 650. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 2. *Pluckn. alm. p.* 119. *phytogr. t.* 47. *f.* 12. *Tournef. inſt.* 1. h. *p.* 570. Muſcus ſ. Corallina muſcoſa pennata, ramulis & capillamentis falcata.
Merr. pin. p. 81. *Johnſ. merc. bot.* 2. *p.* 26. *phyt. brit. p.* 78. Muſcus marinus ſpiralis pennatus.
β) *Syſt. nat.* X. 1. *p.* 813. *n.* 29. Sertularia ſtipulata.
Ellis corall. t. 38. *f.* 5. 6.
Habitat in Oceano, *&* mari indico, 3 *pollices ad* $\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$ *pedem longa, tubulis capillaribus radicularum vices agentibus.*

Pluma. 12. S. denticulis ſecundis imbricatis campanulatis, veſiculis gibbis criſtatis, ſurculis pinnatis alternis lanceolatis. *Fn. ſuec.* 2245. *Soland. & Ellis corall. p.* 43. *n.* 12.
Pallas el. zooph. p. 149. *n.* 93. Sertularia ſurculis pinnatis falcatis, calyculis ſecundis campanulatis, ovariis gibbis annulatim muricatis criſtatiſque.
Ellis corall. p. 13. *t.* 7. *n.* 12. *f.* b. B. Podded Coralline.
Seb. muſ. 3. *t.* 101. *f.* 1. Corallina falciformis.
Bocc. muſ. p. 257. *t.* 6. *f.* 6. Pinnaria marina Imperati.
Mercat. metall. arm. 6. *c.* 19. *p.* 129.
Cavol. ſin. pol. mar. 3. *p.* 210. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat in Oceano *omni, radiculis in circulo diſpoſitis fucis adhærens.*

echinata. 13. S. denticulis oppoſitis ſecundis campanulatis, veſiculis gibbis criſtatis, ſurculis pinnato alternis lanceolatus. *Fn. ſuec.* 2246.*
Pallas el. zooph. p. 152. *n.* 94. Sertularia pinnata, ramulis bifidis, calyculis oppoſitis ſemicampanulatis, ovariis reticulato-muricatis.
Habitat in mari Sueciam *alluente.*

antennina. 14. S. denticulis verticillato-quaternis ſetaceis, veſiculis oblique truncatis verticillatis, ſtirpibus ſubſimplicibus. *Fn. ſuec.* 2245.
Pallas el. zooph. p. 146. *n.* 91. Sertularia ſurculis ſubſimplicibus verticillatis, ſetulis ſecunde calyculatis, ovariiſque axillaribus pedunculatis oblique truncatis.
Soland. & Ellis corall. p. 45. *n.* 14. Sertularia ſurculis ſubſimplicibus verticillatis, ſetulis denticulis ſecundis calyciformibus, ovariis axillaribus pedunculatis oblique truncatis.
Ellis corall. p. 15. *t.* 9. Lobſter's Horn-Coralline or Sea-Board.

Raj.

Raj. ſyn. 3. *p.* 34. *n.* 10. *Petiv. pl. it. t.* 2. *f.* 10. Corallina aſtaci corniculorum æmula.
Dodon. pempt. p. 476. Muſcus marinus ſecundus.
Bocc. muſ. p. 258. *t.* 6. *f.* 2. Fucus vermiculatus aſper alter, ſ. Polytubuli arterioſi maritimi aſperiuſculi.
Plukn. almag. p. 119. *phytogr. t.* 48. *f.* 6. Corallinæ affinis non ramoſa, arenacei coloris, aſtacorum corniculi inſtar geniculata.
Raj. hiſt. pl. p. 79. Muſcus marinus equiſetiformis non ramoſus.
Ginann. opuſc. 16. *t.* 11. *f.* 25. Myriophyllum non ramoſum.
Tourneſ. inſt. 1. h. *p.* 570.
Barrel. pl. ic. 1292. *n.* 3.
β) *Raj. ſyn. p.* 35. *n.* 11. Corallina ramoſa cirris obſita.
Ellis act. angl. 48. *t.* 22.
Habitat in Oceano, *ſæpe fere pedalis, flava, radiculis tubuloſis tenuiſſimis, capillaceis, flaveſcentibus, veſiculis ſolitariis ad ſetarum articulos a latere interiore vel ſuperiore.*

Verticillata. 15. S. denticulis obſoletis, veſiculis campanulatis denticulatis erectis, pedunculis longiſſimis contortis quaternis.
Pallas el. zooph. p. 115. *n.* 66. Sertularia ſcrupoſa ſubramoſa, calyculis campanulatis pedunculatis verticillatiſque.
Soland. & Ellis corall. p. 53. *n.* 21. Sertularia ſubramoſa, denticulis campanulatis pedunculatis margine dentatis ſuberectis verticillatiſque, ovariis ovato-tubuloſis.
Ellis corall. p. 23. *t.* 13. *n.* 20. *f.* a. A. Horſe-tail Coralline with bell-ſhaped Cups.
Habitat in Oceano, *plures pollices longa, tenera & fragilis, denticulis glutinoſis.*

Gelatinoſa. 51. S. ſcrupoſo-gelatinoſa ramoſiſſima, ramis decompoſitis divaricatis ſparſis, calyculis campanulatis. *Pallas el. zooph. p.* 116. *n.* 67.
Raj. ſyn. p. 34. *n.* 7. Corallina confervoides gelatinoſa alba, geniculis craſſiuſculis pellucidis.
Habitat in mari Belgium *alluente; geniculatæ affinis, ½ pedem longa, ex griſeo fuſca, cortice hyalino.*

Volubilis. 16. S. denticulis obſoletis, veſiculis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longiſſimis contortis ſolitariis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 444. *n.* 457.

Pallas el. zooph. p. 121. *n.* 70. Sertularia (uniflora) calyculis ſolitariis campanulatis, pedunculis radicatis longiſſimis contortis.
Soland. & Ellis corall. p. 51. *n.* 22. *t.* 4. *f.* e. f. E. F. Sertularia denticulis campanulatis dentatis alternis, pedunculis longiſſimis contortis, ovariis ovatis interdum tranſverſe rugoſis.
Ellis corall. p. 24. *t.* 14. *n.* 21. *f.* a. A. *act. angl.* 48. *t.* 22. *f.* 2. Small cumbing Coralline with bell-ſhaped cups.
Ellis act. angl. 57. *p.* 437. *t.* 19. *f.* 9. Sertularia uniflora.
Baſt. opuſc. ſubſ. 1. *t.* 2. *f.* 2. a. b. d. & *f.* 3. 4. c. e. & *f.* 7. a. b. c.
Habitat in Oceano, *aliis congeneribus adnata, fluſtris, fuciſve, tenera, albida.*

Syringa. 17. S. denticulis obſoletis, veſiculis cylindricis pedunculo integerrimo.
Pallas el. zooph. p. 122. *n.* 71. Sertularia calyculis ſolitariis cylindricis, pedunculis calyculo brevioribus contortis.
Soland. & Ellis corall. p. 52. *n.* 23. Sertularia (repens) denticulis cylindricis oblique truncatis alternis, pedunculis contortis denticulis brevioribus.
Ellis corall. p. 25. *t.* 14. *f.* b. B.
Habitat in Oceani europæi *ſertulariis, teſtaceis, flaveſcens.*

Cuſcuta. 18. S. denticulis obſoletis, veſiculis ovatis axillaribus ramis oppoſito ſimplicibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 53. *n.* 27.
Pallas el. zooph. p. 125. *n.* 74. Sertularia repens geniculata oppoſita ramoſa, veſiculis axillaribus ovalibus.
Ellis corall. p. 28. *t.* 14. *n.* 26. *f.* c. C. Climbing Dodderlike Coralline.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 62. *t.* 117. *f.* 1-3.
Habitat in mari anglico, *fucis adhærens.*

puſtuloſa. 52. S. articulata ſparſim & alternatim ramoſa, geniculis ſuperne obſolete denticulatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 54. *n.* 28.
Ellis corall. p. 54. *t.* 27. *f.* b. B. Dichotomous tubular Coralline.
Habitat ad littora inſulæ Wight, *tenera, ad* 4 *pollices longa.*

frutescens. 53. S. ramoſa tubuloſa pinnata, pinnulis ſetaceis alternis arrectis, denticulis ſecundis cylindrico-campanulatis. *Soland. & Ellis corall. p.* 55. *n.* 29. *t.* 6. *f.* a. A.

Habitat ad Angliæ *littora, durior congeneribus, nigra, ramis fuſcis.*

Pinaſter. 54. S. ſimplex pinnata, pinnis alternis, denticulis oppoſitis baſi cauli appreſſis, apice tubuloſis incurvis, veſiculis ſecundis majoribus ovato-quadrangulis: angulis mucronatis, ore tubuloſo. *Soland. & Ellis corall. p.* 55. *n.* 30. *t.* 6. *f.* b. B.
Habitat - - -

Pennatula. 55. S. ſimplex pinnata, pinnis incurvis articulatis, denticulis ſecundis campanulatis corniculo truncato ſuffultis: marginibus crenatis, ſpinis duabus oppoſitis inſtructis. *Soland. & Ellis corall. p.* 56. *n.* 31. *t.* 7. *f.* 1. 2.
Habitat in Oceano indico, *ex luteſcente fuſca, 5-6 pollices longa.*

Filicula. 56. S. ramoſiſſima pinnata ſtirpe flexuoſa, ramulis ex angulis alternis, denticulis ovato-tubuloſis ſingulis ad axillas erectis, veſiculis obverſe ovatis apice tubulatis. *Soland, & Ellis corall. p.* 57. *n.* 32. *t.* 6. *f.* c. C.
Habitat ad Angliæ *littora, tenerrima, abietinæ affinis.*

quadridentata. 57. S. ſimplex articulata repens, denticulis quaternis oppoſitis ventricoſis, articulis ſubturbinatis baſi contortis. *Soland. & Ellis corall. p.* 57. *n.* 33. *t.* 5. *f.* g. G.
Habitat ad Africæ *littora, fuco lendigero adhærens.*

ſpicata. 58. S. ſtirpe tubuloſa paniculata annulata, ramulis creberrimis trichotomis ad annulos verticillatim diſpoſitis, denticulis ternis cylindricis cæciſque terminalibus, veſiculis ovatis axillaribus. *Soland. & Ellis corall. p.* 58. *n.* 34.
Habitat - - -

Evanſii. 59. S. ramoſa, ramis oppoſitis, denticulis brevibus oppoſitis, veſiculis ramoſis lobatis oppoſitis ex tubulo reptante enaſcentibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 58. *n.* 35.
Habitat ad Angliæ *littora, gracillima, 2 pollices alta, fucis adhærens, flava, veſiculis fulvis.* Evans.

muricata. 60. S. articulata, denticulis pedunculatis ex ſingulis articulis alternis, veſiculis ſubgloboſis criſtatis muricatis pedunculatis ex tubulis radiciformibus enaſcentibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 59. *n.* 36. *t.* 7. *f.* 3. 4.
Habitat ad Scotiæ *littora.*

ſecundaria. 61. S. minima alba, ſtirpe incurva, denticulis ſecundis campanulatis, veſiculis axillaribus. *Cavol. pol. mar.* 3. *p.* 226. *t.* 8. *f.* 15. 16.

Habitat in mari mediterraneo, *vix* 3 *lineas alta, ſetæ tenerrimæ craſſitie.*

miſenenſis. 62. S. ramoſiſſima dichotoma, denticulis alternis tenuiſſimis divaricatis, veſiculis ovalibus pedunculatis axillaribus. *Cavolin. polip. mar.* 3. *p.* 187. *t.* 7. *f.* 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo, circa promontorium Miſenenſe, *tenella, apicem verſus pellucida, a cancro lineari infeſtata.*

racemoſa. 63. S. ſtirpe recta tereti ramoſa opaca, cornea, denticulis ſparſis pellucidis, veſiculis racemoſis, ramis ſubarcuatis. *Cavolin. pol. mar.* 3. *p.* 160. *t.* 6. *f.* 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo, *potiſſimum ad promontorium* Miſenenſe.

Uva. 19. S. ſubramoſa denticulis obſoletis, veſiculis ovatis racemoſis, ramis vagis. *Soland. & Ellis corall. p.* 53. *n.* 26.

Pallas el. zooph. p. 123. *n.* 72. Sertularia (acinaria) reptans ſubramoſa, calyculis terminalibus oblongis, ovariis veſicularibus.

Ellis corall. p. 27. *n.* 25. *t.* 15. *f.* C. Grape Coralline.

Habitat ad Seelandiæ & magnæ Britanniæ *littora, fucis aliiſque zoophytis adhærens, veſiculis hyalinis, nucleo albo.*

lendigera. 20. S. denticulis obſoletis, calycibus ſecundis cylindricis parallelis paſſim congeſtis, ſtirpibus filiformibus. *Fn. ſuec.* 2248.

Pallas el. zooph. p. 124. *n.* 73. Sertularia geniculata dichotoma implexa, calyculis cylindricis ad genicula congeſtis parallelis.

Soland. & Ellis corall. p. 52. *n.* 25. Sertularia articulata ſubdichotoma implexa, denticulis cylindricis ſecundis parallelis ad genicula minoribus.

Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 229. *t.* 9. *f.* 1. 2. Sertolara lendinoſa.

Ellis corall. p. 27. *t.* 15. *n.* 24. *f.* b. B. Nit-Coralline.

Raj. ſyn. p. 38. *n.* 3. Fucoides lendigerum, capillamentis cuſcutæ iuſtar implexis.

Habitat ad magnæ Britanniæ, Belgii, Italiæ *littora, fucis aliiſque zoophytis adhærens.*

geniculata. 21. S. denticulis alternis contortis, veſiculis obovatis ſubroſtratis, ſtirpe geniculata flexuoſa. *Fn. ſuec.* 2. *n.* 2249.

Fn. ſuec. 1. 2241. Sertularia flexuoſa.
Pallas el. zooph. p. 117. *n.* 68. Sertularia ſubſimplex geniculata mollis, calyculis alternis ſubturbinatis, ovariis axillaribus ovato-truncatis.
Soland. & Ellis corall. p. 49. *n.* 20. Sertularia denticulis alternis calyciformibus, pedunculis contortis, ovariis ovato-truncatis axillaribus.
Ellis corall. p. 22. *t.* 12. *n.* 19. *f.* b. B. *act. angl.* 48. *t.* 22. *f.* 1. Knotted Sea-thread Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 205. *t.* 8. *f.* 1. 2. Sertolara genicolata.
Loeſt. act. Stockh. 1752. *p.* 114. *t.* 3. *f.* 5-10. Madrepora plantæformis mollis, caule flexuoſo, ramis alternis turbinatis.
Müll. zool. dan. 3. *p.* 3. *p.* 61. *t.* 117. *f.* 1-4.
Habitat in mari ſeptentrionali, mediterraneo, *ſtirpibus ſemipollicaribus.*

dichotoma. 22. S. denticulis obſoletis, veſiculis obovatis axillaribus, pedunculis intortis, ſtirpe dichotoma geniculata.
Pallas el. zooph. p. 119. *n.* 69. Sertularia (longiſſima) longa alterne ramoſa, ramis ſubdiviſis, calyculis terminalibus campanulatis, ovariis axillaribus.
Soland. & Ellis corall. p. 48. *n.* 19. Sertularia longiſſima ramoſa dichotoma, denticulis campanulatis, pedunculis annuloſis contortis, ovariis ovatis axillaribus.
Ellis corall. p. 21. *t.* 12. *n.* 18. *f.* a. c. A. C. Sea-thread Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 194. *t.* 7. *f.* 5-7.
Habitat in mari ſeptentrionali & mediterraneo, *pedem ſæpe longa, junior, albida, adultior teſtacea.*

ſpinoſa. 23. S. denticulis obſoletis, calyculis ovato-ſubulatis, ramis dichotomis ſpinoſis.
Pallas el. zooph. p. 114. *n.* 65. Sertularia (ſericea) ſcrupoſa gelatinoſa ramoſa, ramulisque creberrimis teneris dichotomis hirſuta.
Soland. & Ellis corall. p. 48. *n.* 18. Sertularia mollis ramoſa pellucida, ramulis creberrimis teneris dichotomis in ſpinas terminatis, denticulis obſoletis ſecundis diſtantibus, ovariis veſiculæformibus.
Ellis corall. p. 20. *t.* 11. *f.* n. 17. *f.* b. d. B. C. D. Silk-Coralline.
Habitat in mari europæo, mediterraneo, 8 *ſæpe pollices longa.*

pinnata. 24. S. denticulis obſoletis, veſiculis oblongis, ſtirpe ſimplici pinnata lanceolata.
Pallas el. zooph. p. 148. *n.* 92. Sertularia (ſetacea) ſimplex pinnata, pinnis alternis arrectis, calyculis remotiſſimis ſecundis, ovariis oblongis axillaribus.
Soland. & Ellis corall. p. 46. *n.* 16. Sertularia ſimplex pinnata & articulata, pinnis alternis arcuatis, denticulis ſemicampanulatis ſecundis, ovariis ovatis confertis ore coronatis.
Cavolin. pol. mar. 3.
Ellis corall. p. 19. *t.* 11. *n.* 16. *f.* a. A. Sea-Briſtles.
Raj. ſyn. p. 38. *n.* 6. *&. p.* 39. *n.* 7. Fucoides ſetaceum.
Habitat in mari anglico & indico, 3 *pollices alta, veſiculis racemoſis.*

ſetacea. 64. S. ſimplex pinnata, pinnis alternis ſubincurvatis, denticulis obſoletis remotiſſimis ſecundis, veſiculis oblongo tubulatis axillaribus. *Soland. & Ellis corall. p.* 47. *n.* 17.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 813. *n.* 28. Sertularia ſetacea.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 228. Sertolara pennata.
Ellis corall. t. 38. *f.* 4.
Habitat in mari ſeptentrionali & mediterraneo, $1\frac{1}{2}$ *pollicem alta, pinnata duplo anguſtior.*

polyzonias. 25. S. denticulis alternis ſubdenticulatis, veſiculis obovatis polyzoniis, ſtirpe ramoſa. *Fn. ſuec.* 2250.
Pallas el. zooph. p. 127. *n.* 76. Sertularia (ericoides) ſubramoſa, calyculis alternis ovatis ſubdenticulatis, ovariis ovatis rugoſis.
Soland. & Ellis corall. p. 37. *n.* 3. Sertularia ſparſe ramoſa, denticulis ovatis alternis, ovariis obovatis tranſverſe rugoſis.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 224. *t.* 8. *f.* 12-14. Sertolara polyzonia.
Ellis corall. p. 5. *t.* 2. *n.* 3. *f.* a. b. A. B. *Great* Tooth. Coralline.
Raj. ſyn. p. 35. *n.* 13. Corallina minus ramoſa, alterna vice denticulata, denticulis lineis tranſverſis externe ſtriatis.
Seb. muſ. 3. *t.* 102. *n.* 4. *& t.* 103. *n.* 6.
Habitat in mari *ſere omni, marinis variis adhærens.*

Pennaria. 26. S. denticulis ſecundis, ſtirpe contorta bipinnata.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 134. *t.* 5. *f.* 1-6.
Habitat in mari indico? mediterraneo, *ceſpitoſa rupibus, lepadibus &c. adhærens, ſetæ porcinæ craſſitie, ſurſum*

ſenſim, at lente attenuata, recta adſcendens, cornea, flexilis, fuſca, ramis albidis, denticulis albis ſurſum verſis, æque diſtantibus, 10 circiter in ſingulis ramis, ovariis ovalibus in ſingulis denticulis uno vel binis.

Lichenaſtrum. 27. S. denticulis obtuſis bifariam imbricatis, veſiculis obovatis ſecundis parallelis, ſtirpe pinnata, ramis dichotomis.
Soland. & Ellis corall. p. 42. *n.* 10. Sertularia (Lonchitis) articulata pinnata, denticulis alternis diſtichis appreſſis, ovariis ovatis operculatis.
Pallas el. zooph. p. 138. *n.* 85. Sertularia ramoſa pinnataque, calyculis diſtichis appreſſis, ovariis ſecundis ovato-campanularis minoribus.
Ellis corall. p. 11. *t.* 16. Sea-Splean wort or Polypody.
Habitat in Oceano indico, mari hibernico, & *inter* Aſiam *borealem* & Americam *intermedio, ramis bifariam imbricatis.*

cedrina. 28. S. denticulis ſubcylindricis tubuloſis quadrifariam imbricatis, ramis vagis quadrangulis ſurſum incraſſatis.
Pallas el. zooph. p. 139. *n.* 86. Sertularia ſubramoſa, calyculis ſubcylindricis quadrifariam imbricatis.
Habitat in mari Camtſchatcam *circumfluente, ſqualens, ramis dichotomis obtuſis, quadrifariam imbricatis.* Steller.

purpurea. 29. S. denticulis ſubovatis tubuloſis quadrifariam ſubimbricatis, veſiculis erectis campanulatis, ramis dichotomis quadratis.
Pallas el. zooph. p. 140. *n.* 87. Sertularia dichotoma quadrangularis, calyculis ſubovatis tubuloſis quadrifariam ſubimbricatis, ovariis erectis campanulatis.
Habitat in mari Camtſchatcam *alluente, tota ex atro purpurea, faſtigiata.*

articulata. 65. S. articulata pinnata, calyculis appreſſis, veſiculis ſecundis ovatis operculatiſque majuſculis. *Pallas el. zooph. p.* 137. *n.* 84.
Habitat in mari atlantico, *in teſtaceis reptans, bipollicaris, lutea, an diſtincta ſpecies?*

filicina. 66. S. ſcrupoſa ramoſa pinnata pennulataque, pinnulis e rhachis ſulco alternis, calyculis ſecundis imbricatis, veſiculis articulatis. *Pallas el. zooph. p.* 156. *n.* 98.
Habitat in Oceano indico, *pallida, rigida, 3 pollices longa, & longior, an eadem cum* Pennaria?

fruticans. 67. S. ſcrupoſa lignoſa ramoſa pinnataque, pinnulis ſetaceis alternis, calyculis ſecundis ſemicampanulatis. *Pallas el. zooph. p. 157. n. 99.*

Habitat in mari americano? ceſpitoſa teſtaceis inſidens, ex luteſcente griſea ligneo-ſuberoſa, 6 pollices longa.

*** *ſtirpe cruſtacea, lapideſcente, e cellulis ſeriatis compoſita, ovariis diſtinctis nullis, ſed earum loco bullulis,* Cellariæ, *vel* Cellulariæ.

Burſaria. 30. S. denticulis oppoſitis compreſſis faſtigiatis, ramis dichotomis. *Fn. ſuec.* 2252.

Pallas el. zooph. p. 65. n. 23. Cellularia ramoſa articulata, cellulis bijugis pellucidis carinatis, tubuloque adnato ſubclavato auctis.

Soland. & Ellis corall. p. 25. n. 9. Cellaria ramoſa articulata, cellulis oppoſitis pellucidis carinatis, tubulo adnato ſubclavato auctis.

Ellis corall. p. 41. t. 22. n. 8. f. a. A. Shepherd's purſe Coralline.

Habitat in mari anglico, *fucis adhærens, minuta, flexilis, hyalina.*

loriculata. 31. S. denticulis oppoſitis oblique truncatis obſoletis, ramis dichotomis erectis. *Fn. ſuec.* 2253.

Pallas el. zooph. p. 64. n. 22. *Soland. & Ellis corall. p. 24. n.* 8. Cellularia ramoſiſſima articulata gryſea, cellulis bijugis oblique truncatis.

Ellis corall. p. 40. t. 21. n. 7. f. b. B. Coat of Mail Coralline.

Plukn. mant. 56. Corallina geniculata mollis, internodiis rotundis brevioribus.

Raj. ſuppl. 15. Muſcus coralloides mollis elatior ramoſiſſimus.

Habitat in mari anglico, *antiquas ſæpe ſertularias cingens, ſeſquipollicaris.*

faſtigiata. 32. S. denticulis alternis acutis, ramis dichotomis erectis faſtigiatis. *Fn. ſuec.* 2254. *O. Fabr. Fn. groenl. p. 445. n. 458.*

Pallas el. zooph. p. 66. n. 24. Cellularia (plumoſa) mollis fibroſa, ramoſiſſima, ramulis dichotomis faſtigiatis.

Soland. & Ellis corall. p. 21. n. 1. Cellaria (plumoſa) cellulis unilateralibus alternis extrorſum acutis, ramis dichotomis erectis faſtigiatis.

Ellis corall. p. 33. t. 18. Soft-feathered Coralline.

Cavolin. pol. mar. 3. p. 237. t. 9. f. 3. 4. Sertolare faſtigiate.

Raj. ſyn. p. 37. *n.* 20. & *p.* 330. Corallina pumila erecta ramoſior & Fucus minimus hirſutus, fibrillis herbaceis tenuibus.

Habitat in mari anglico.

avicularia. 33. S. denticulis ſecundis ſuboppoſitis mucronato-appendiculatis, calycibus globoſo-mucronatis ſeſſilibus, ramis dichotomis continuis faſtigiatis.

Pallas el. zooph. p. 68. *n.* 26. Cellularia latiuſcula dichotoma faſtigiata, cellulis ore galeato biſetis, nectariis marginalibus.

Soland. & Ellis corall. p. 22. *n.* 3. Cellaria latiuſcula dichotoma erecta, cellulis unilateralibus alternis biſetis, ore galeato, appendiculis inſtar avium capitum marginalibus.

Ellis corall. p. 36. *t.* 20. *n.* 2. *f.* a. A. Bird's-head Coralline.

Habitat in mari *inter* Angliam & Belgium Germaniam*que intermedio, fluſtris affinis, fragilis, ſordida, ex cinereo griſea,* ½—½ *pollicem longa, cellularum ſeriebus longitudinalibus* 3-5.

neritina. 34. S. denticulis alternis ſecundis acutis, ramis dichotomis inæqualibus erectis.

Pallas el. zooph. p. 67. *n.* 25. Cellularia mollis dichotoma gryſea, cellulis alternis extrorſum mucronatis interjectiſque galericulis labiatis albis.

Soland. & Ellis corall. p. 22. *n.* 2. Cellaria dichotoma ferruginea, cellulis alternis unilateralibus extrorſum mucronatis, ovulis ſubteſtaceis nitidis interjectis, oſculis margine ſubfuſco cinctis.

Ellis corall. p. 35. *t.* 19. & *act. angl.* 48. *p.* 115. *t.* 5. *f.* a. A.

Habitat in mari mediterraneo & Americam *mediam alluente, mollis, cellularum ſerie duplici.*

ſcruposa. 35. S. denticulis alternis angulatis ſpinoſis, ramis dichotomis reptantibus. *Fn. ſuec.* 2255.

Pallas el. zooph. p. 72. *n.* 30. *Soland. & Ellis corall. p.* 23. *n.* 5. Cellularia reptans lapidoſa dentata dichotoma, cellulis alternis unilateralibus.

Ellis corall. p. 38. *t.* 20. *n.* 4. *f.* c. C. Creeping ſtony Coralline.

Habitat in mari indico, mediterraneo, americano, europæo, *fragiliſſima, linearis, pallida, cellularum ordine duplici.*

Cellariæ *fluſtris & corallinis affines, per eburneam & cornutam, quibus veſiculæ diſtinctiſſimæ, cum ſertulariis cohærent.*

pilosa. 68. S. dichotoma faſtigiata lapidoſa, cellulis alternis obliquis: ore prælongo ſubſolitario.
Pallas el. zooph. p. 72. *n.* 29. Cellularia piloſa.
Habitat in mari mediterraneo, *ſcrupoſæ affinis, vix 4 linearum.*

criſpa. 69. S. ramoſiſſima dichotoma elongata criſpa, articulis depreſſis ovatis uno latere celliferis.
Pallas el. zooph. p. 71. *n.* 28. Cellularia criſpa.
Seb. muſ. 3. *t.* 101. *n.* 8.
Habitat in Oceano orientali, *grandis, flexiliſſima, pallide griſea.*

floccoſa. 70. S. ramoſiſſima dichotoma faſtigiata, articulis ſubcuneiformibus uno latere celliferis.
Pallas el. zooph. p. 76. *n.* 27. Cellularia floccoſa.
Habitat in Oceano indico, *inſignis, albida, geniculis ſubgriſeis flexilibus.*

reptans. 36. S. denticulis alternis bidentibus, ramis dichotomis reptantibus. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 445. *n.* 459.
Pallas el. zooph. p. 73. *n.* 31. Cellularia repens dichotoma articulata, cellulis unilateralibus bijugis, ore ſubciliato.
Soland. & Ellis corall. p. 23. *n.* 4. Cellaria reptans dichotoma articulata, cellulis alternis unilateralibus, oſculis biſetis.
Ellis corall. p. 37. *t.* 20. *n.* 3. *f.* b. B. Creeping Coralline.
Raj. ſyn. app. p. 330. Muſcus coralloides pumilus ramoſus.
Habitat in mari europæo, *fluſtræ foliaceæ fuſciſque adhærens, ſcrupoſæ affinis, alba, vel pallide griſea,* ½-¾ *pollicis.*

paraſitica. 37. S. denticulis verticillatis turbinatis ciliatis paraſiticis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 447. *n.* 461.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 181. *t.* 6. *f.* 8-13. Sertolara paraſita.
Habitat in mari ſeptentrionali & mediterraneo, *aliis ſertulariis coralliniſque adhærens, obſcure rubra, ramis tranſlucentibus, denticulis terminalibus, adultioribus ovigeris; an hujus tribus?*

ciliata. 38. S. denticulis alternis ciliatis infundibuliformibus, ramis dichotomis erectis. *O. Fabr. Fn. groenl. p.* 446. *n.* 460.
Pallas el. zooph. p. 74. *n.* 32. Cellularia molliuſcula dichotoma, faſtigiata, cellulis binatis alternis turbinatis, ore patulo ciliato.

Soland. & Ellis corall. p. 24. *n.* 6. Cellaria cellulis alternis ciliatis, ore obliquo patulo, ramis dichotomis erectis.
Ellis corall. p. 38. *t.* 20. *n.* 5. *f.* d. D. Ciliated Coralline.
Habitat in mari anglico, norwegico, *aliis ſertulariis, fucis, ſpongiis adnata, albida,* 4-5 *lineas alta.*

eburnea. 39. S. cellulis alternis truncatis prominulis, veſiculis gibbis roſtratis, ramis patulis. *Soland. & Ellis corall. p.* 24. *n.* 7.
Pallas el. zooph. p. 75. *n.* 33. Cellularia veſiculifera erecta dichotoma articulata, articulis linearibus, poris tubuloſis alternis.
Ellis corall. p. 39. *t.* 21. *n.* 6. *f.* a. A. Tufted Ivery Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 240. *t.* 9. *f.* 5-7. Sertolara d'avorio.
Habitat in mari europæo, mediterraneo, *aliis marinis adhærens, ad pollicem uſque alta, alba.*

cornuta. 40. S. denticulis alternis truncatis ſpinis adjectis, veſiculis gibbis roſtratis, ramis alternis.
Pallas el. zooph. p. 76. *n.* 34. Cellularia (falcata) veſiculifera erecta articulata ſubpinnataque, cellulis ſolitariis tubuloſis curvatis, ſeta longiſſima ad os.
Soland. & Ellis corall. p. 25. *n.* 10. Cellaria veſiculifera ramoſa articulata, cellulis ſimplicibus tubuloſis curvatis altera ſuper alteram, ſeta ad oſculum longiſſima.
Ellis corall. p. 42. *t.* 21. *n.* 10. *f.* c. C. Goat's-horn Coralline.
Habitat in maris europæi & mediterranei *fucis, lapidoſa, albiſſima, vix* 4 *lineis longior.*

loricata. 41. S. denticulis ſecundis concatenatis ore ſubtus cornuto, ramis alternis.
Pallas el. zooph. p. 77. *n.* 35. *Soland. & Ellis corall. p.* 25. *n.* 11. Cellularia (chelata) fragiliſſima dichotoma, cellulis corniformibus concatenatis, ore marginato, ſpina infera.
Ellis corall. p. 42. *t.* 22. *n.* 9. *f.* b. B. Bull s-horn Coralline.
Habitat in mari anglico, mediterraneo, *gorgoniis, fucis adhærens, exigua, veluti vitrea.*

anguina. 42. S. denticulis nullis, ſurculis ſimpliciſſimis clavatis obtuſis apertura laterali.
Pallas el. zooph. p. 78. *n.* 36. Cellularia tubulis ſolitariis ſubclavatis, apertura laterali.
Soland. & Ellis corall. p. 26. *n.* 12. Cellaria cellulis ſimpliciſſimis, tubulis obtuſis clavatis, apertura laterali.
Ellis corall. p. 43. *t.* 22. *n.* 11. *f.* c. C. D. Snake Coralline.
Cavolin. pol. mar. 3. *p.* 221. *t.* 8. *f.* 11.

Habitat in mari ſeptentrionali & mediterraneo, *alba, molliſſima, flexiliſſima, fucis aliiſque marinis adhærens, ſcandens, formam varians, ſertulariam hydræ nectens.*

eroides. 71. S. articulata ramoſa, articulis ſubcylindricis, oſculis cellularum undique prominulis. *Soland. & Ellis corall. p.* 26. *n.* 14. *t.* 5. *f.* b. B. C. D. E.

Habitat in mari mediterraneo *ad* Barbariæ *littora*, 3 *pollices alta, exalbida, lapidoſa, aggregata, articulis* ¼ *pollicis longis.*

tulipifera. 72. S. ſtirpe articulata lapidea ſubdiaphana, articulis clavatis, cellulis ternis dentatis connexis ex apicibus articulorum exeuntibus & ſæpe terminantibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 27. *n.* 15. *t.* 5. *f.* a. A.

Habitat ad Jamaicæ, inſularumque vicinarum *littora, fuco adhærens, candidiſſima,* ½ *pollicem alta.*

Flabellum. 73. S. lapidea articulata ramoſa dichotoma, articulis ſubcuneiformibus uno latere celluloſis. *Soland. & Ellis corall. p.* 28. *n.* 16. *t.* 4. *f.* c. C.

Habitat ad inſularum Bahamenſium *littora, ceſpitoſa, alba,* 2 *circiter pollices alta, articulis altero latere convexis ſtriatis, altero complanatis celliferis, cellulis* 3*plici ſerie diſpoſitis.*

cirrata. 74. S. lapidea articulata ramoſa dichotoma incurvata, articulis ſubciliatis ovato-truncatis uno latere planis celliferis. *Soland. & Ellis corall. p.* 29. *n.* 17. *t.* 4. *f.* d. D.

Habitat in Oceano indico, 2 *circiter pollices alta, articulis altera parte convexis ſtriatis, altera complanatis celliferis, cellularum per tubulos flexiles connexarum in ſingulis articulis ſerie duplici, oſculis ovalibus.*

ternata. 75. S. ramoſa dichotoma articulata repens, articulis angulatis ſubturbinatis, cellulis ternis unilateralibus. *Soland. & Ellis corall. p.* 30. *n.* 18.

Habitat in mari ſcotico, *lapidoſa, ſemipellucida.*

filiformis. 76. S. dichotoma filiformis, articulis linearibus quadrilateris, cellulis oblongis.

Pallas el. zooph. p. 63. *n.* 21. *β.* Cellularia filiformis.

Habitat in Oceano indico, *pallide griſea, confertiſſima, digiti longitudine, an forſan varietas tubulariæ fiſtuloſæ?*

opuntioides. 77. S. geniculata, ramis ternatis, articulis cylindraceis; poris undique prominulis.
Pallas el. zooph. p. 61. *n.* 20. Cellularia opuntioides.
Habitat in Oceano orientali, *ſeſquipollicaris, erecta, ramoſiſſima, alba lapidea, poris in quincunces diſpoſitis.*

350. PENNATULA. *Animal* natans liberum multiforme, oſſiculo ſuffultum, baſi nuda, hydras tentaculis radiatis oviparis ſuperne exſerens.

coccinea. 8. P. ſtirpe tereti radicata, lateribus papilloſis hydrigeris, ſummitate clavata. *Lepech. act. Petrop.* 1778. 2. *p.* 136. *t.* 7. *f.* A.
Habitat in maris albi, *potiſſimum ad ſinum* Candalacenſem, *profundiſſimis, inter alcyonia & pennatulas quaſi media, mollis, ſanguinea aut miniata, ſeſquipollicem longa, digiti auricularis craſſitie, rugoſa, papillis ſeriatis.*

griſea. 1. P. ſtirpe carnoſa, rhachi lævi, pinnis imbricatis plicatis ſpinoſis. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 10.
Pallas el. zooph. p. 367. *n.* 214. Pennatula penniformis, ſtipite tereti ad pennam bulboſo, pinnis oviferis acute dentatis, dentibus multifloris.
Soland. & Ellis corall. p. 62. *n.* 3. Pennatula ſpinoſa.
Rondel. aquat. p. 129. *Geſn. nomencl. p.* 273. *Aldrov. zooph. l.* 4. *c.* 8. *t.* 18. *f.* 35. *Jonſt. exang. l.* 4. *c.* 5. *t.* 20. Penna marina.
Seb. muſ. 3. *p.* 39. *t.* 11. *f.* 8. Penna marina phoſphorica.
Barrel. ic. t. 1316. *Petiv. pl. it. t.* 1. *f.* 8. Penna marina ſpinoſa griſea obſoleta.
Albin. annot. acad. 1. *p.* 77. *t.* 6. *f.* 1. 2. Penna marina alba.
Bohadſch mar. p. 109. *t.* 9. *f.* 1-3. Penna marina griſea.
Ellis act. angl. 53. *t.* 21. *f.* 6-10. Grey Sea-Pen.
β) *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 12. Pennatula palmata.
Habitat in mari adriatico, 8 *circiter pollices longa, ſupra dilatato-globoſa, noctu lucens, rhachidis dorſo late lanceolato læviuſculo, radiis imbricatis, margine anteriori undulatis, lobulis a latere ſpina armatis margine obtuſe crenatis, crenulis lateraliter calyculo obſoleto poriformi.*

phoſpho-rea. 2. P. ſtirpe carnoſa, rhachi ſcabra, pinnis imbricatis. *Fn. ſuec.* 2260. *Amœn. acad.* 4. *p.* 256. *Müll. zool. dan. prodr.* 3075. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 18. *Soland. & Ellis corall. p.* 61. *n.* 1. Pennatula (britannica) ſtirpe carnoſa tereti, rhachi ſcabra, polypis tentaculatis ordine ſimplici.

Imperat. hiſt. nat. p. 650. *Seb. muſ.* 3. *t.* 6. *f.* 1. *J. Bauh. hiſt. pl.* 2. *p.* 790. *Ginann. adr. t.* 55. *f.* 114. *Tournef. inſt.* 1. *h.* 1. *p.* 569. Penna marina.

Geſn. nomencl. p. 273. Penna alia.

Aldrov. zooph. l. 4. *c.* 8. *t.* 18. *f.* 36. Penna marina ſanguinei coloris.

Jonſt. exang. l. 4. *c.* 5. *t.* 20. Penna marina alia.

Barrel. icon. 1313. 1314. Penna marina carnea & purpurea.

Planc. Conch. c. 18. *t.* 8. *f.* E. D. Penna marina ſ. Mentula alata minor.

Bohadſch mar. t. 8. *f.* 5. Penna roſea.

Pontopp. Dan. atl. t. 30. *f.* 1-3. & *nat. Norw. p.* 196. *t.* 17. *f.* 1-3. Pinna pennacea.

Albin. annot. ac. 1. *t.* 6. *f.* 3-5? Penna marina rubra.

C. Bauh. pin. p. 363. Muſcus pennæ ſimilis.

Shaw afr. app. p. 5. Fucus pennam referens.

Petiv. pl. ital. t. 1. *f.* 5. 6.

Ellis act. angl. 53. *p.* 426. *t.* 19. *f.* 1-5.

Habitat in Oceano *omni, noctu egregie lucens, ad* 4 *pollices longa, ex flavicante rubra, ſtirpe æquali, villoſa, rhachis dorſo ex lineari lanceolato, confertim paleaceo-denticulato, radiis ſubincumbentibus, calyculis ſetoſo-ſpinoſis ſecundis.*

filoſa. 3. P. ſtirpe ſubcarnoſa, rhachi utrinque pennata, baſi tentaculis duobus filiformibus. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 21.

Salvian. aquat. p. 128. Vermiculus.

Boccon. muſ. 1674. *p.* 286. *t.* 286.

Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 15.

Habitat in maris mediterranei *xiphiis, 4-6 pollices longa, ſtipite ſemitereti, rugoſo-imbricato, bicirrato, radiis ſetarum æmulis confertis.*

rubra. 4. P. ſtirpe carnoſa, rhachi pennata, pinnis imbricatis lævibus. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 13.

Pallas el. zooph. p. 368. *n.* 215. Pennatula penniformis ovalis, ſtipite tereti, rhachi, ovifera, pinnis lacero-dentatis,

Soland. & Ellis corall. p. 61. *n.* 2. Pennatula (italica) ſtirpe carnoſa tereti, rhachi patula verrucoſa, ſpina brevi ad baſin dorſi cujuſque pinnæ.
Ellis act. angl. 53. *t.* 21. *f.* 1. 2. Red Sea-Pen.
Bohadſch mar. p. 101. *t.* 8. *f.* 1-3. Penna rubra.
β) *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 16. Pennatula ſtupata.
Habitat in mari mediterraneo, *ad 6 pollices longa, albida punctis rubris lineiſque croceis varia, ſtirpe elongata obovata, rhachi ſubulata, radiis incumbenti-imbricatis, dorſo ad baſin confertiſſime granulatis, ventre calyculis inermibus ad apicem ſerie duplici.*

mirabilis. 5. P. ſtirpe filiformi, rhachi diſtiche pennata: pinnis lunatis remotis alternis. *Fn. ſuec.* 2261. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 38. *t.* 11. *f.* 1-3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 23. *prodr.* 3074. *Soland. & Ellis corall. p.* 63. *n.* 4.
Pallas el. zooph. p. 370. *n.* 216. Pennatula ſimplex alba, calyculis recurvis alternis octodentatis.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 17.
Muſ. Ad. Fr. 1. *p.* 96. *t.* 19. *f.* 4.*
Amœn. acad. 4. *p.* 256.*
Habitat in mari atlantico, americano, norwegico, *fulva, 3-4 pollices longa, vix calami ſcriptorii craſſitie, ſenſim attenuata, ſtipite lævi utrinque ſerrulato, rhachi lineari, radiis remotis alternis, calyculis teretibus, apice ſetoſo ſpinoſis.*

Sagitta. 6. P. ſtirpe filiformi, rhachi utrinque approximata pennata, apice nudo. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 23. 24.
Soland. & Ellis corall. p. 64. *n.* 6.
Ellis act. angl. 53. *t.* 20. *f.* 16.
Amœn. acad. 4. *p.* 257. *t.* 13. *f.* 13.
Habitat in Pelagi *lophiis hiſtrionibus, utrum diſtincta ſpecies, an junior mirabilis?*

antennina. 7. P. ſtirpe ſubtetragona ſetiformi hinc pinnata, floſculis confertis. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 30.
Pallas el. zooph. p. 372. *n.* 219. Pennatula (quadrangularis) ſimplex rhachi quadrangulari altero latere polypifera.

Pennatulæ motæ, aut poſt mortem contrectatæ lucem phoſphori æmulam ſpargentes noctu, locum mutantes, ceterum alcyoniis perquam affines per Epipetrum & agaricum, & p. phalloidem intermediæ his nectuntur, hinc generi adjudicanda quoque videtur Amphiſbæna marina a Johnſtonio *de piſc. t.* 8. *& de ſerpent. p.* 25. *memorata, & a* Seba *muſ.* 1. *t.* 90. *f.* 3. *adumbrata.*

Soland. & Ellis corall. p. 63. *n.* 5. Pennatula ſtirpe ſimplici, rhachi quadrangulari, lateribus tribus polypifera.
Ellis act. angl. 53. *p.* 431. *t.* 20. *f.* 4. Pen of Peacock Fiſh.
Bohadſch mar. p. 112. *t.* 9. *f.* 4. 5. Penna piſcis pavonis piſcatorum.
Habitat in mari mediterraneo, *ad* 10 *pollices*, *altera* 2 *pedes longa*, *flavicans*, *rubro punctata*, *ſtirpe elongata ſubattenuata*, *radiis e calyculis ſeſſilibus confertis ſecundis.*

ſtellifera. 9. P. ſimplex æqualis, apicem verſus hydris ſolitariis. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 133. *n.* 66. *t.* 35. *f.* 1-3. *rar. deſcr.* 1. *p.* 88. *prodr.* 3076.
Habitat in mari norwegico, *rariſſima*, *carnoſa*, *rubella*, *ad* 4 *pollices longa*, *diametro* 2-3 *linearum*, *inferne incraſſata obtuſa*, *ſuperne hydras* 5 *alternas exſerens.*

phalloides. 10. P. ſimplex rhachi cylindrica obtuſo-punctata undique hydrigera. *Pallas el. zooph. p.* 373. *n.* 220. *miſcell. zool. p.* 179. *t.* 15. *f.* 5-9.
Habitat in Oceano indico, *ad* ½ *pedem longa cineraſcens*, *rhachi craſſitie digiti infantilis*, *oſſiculo quadrangulari.*

arundinacea. 11. P. ſtirpe quadrangula longiſſima. *I. Fabr. it. norw. p.* 349. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 28.
Habitat in mari norwegico, *ad* 4 *pedes longa*, *ſtipite lineari*, *radiis e calyculis ſolitariis cylindricis*, *deciduis*, *confertis*, *erectis*, *tubuloſis utrinque petiolo tenui inſidentibus.*

ſcirpea. 12. P. ſimplex lineari attenuata, rhachi tereti altero latere polypifera. *Pallas el. zooph. p.* 372. *n.* 218. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 29.
Habitat in Oceano, *ſeſquipedalis*, *ſtirpe carnoſa craſſiore terete*, *rhachi longiore*, *oſſiculo ſubflexili.*

juncea. 13. P. ſimplex linearis, rachi truncata, rugis diſtichis tranſverſis polypiferis. *Pallas el. zooph. p.* 371. *n.* 217. *Modeer nov. act. Stockh.* 1786. 4. *n.* 5. §. 25.
Rumpf muſ. p. 43. *n.* 1. Sagitta marina alba.
amb. 6. *p.* 256. Sagitta marina alia.
Seb. muſ. 3. *t.* 114. *f.* 2.
Habitat in Oceano indico, *ad* 2 *pedes longa*, *alba*, *inferne*, *carnea*, *radiis ex fulvo alboque miſtis*, *ſtipite* 5-6 *pollices longo*, *molli*, *verminculari*, *rachi* 4*plo* 5*plo longiori*, *oſſiculo albo*, *fragiliſſimo.*

14. P.

grandis. 14. P. penniformis lineari-lanceolata, ſtirpe tereti læviſſima, pinnis lacero-dentatis. *Pallas el. zooph. p. 366. n. 213. Modeer nov. act. Stockh. 1786. 4. n. 5. §. 15. Rumpf muſ. p. 43. 44. n. 2.* Sagitta marina nigra.
Habitat in Oceano indico, *pedem longa, & longior, ex cinereo vireſcens, oſſe fragili utrinque attenuato, tangentem manum interdum urens, pinnis imbricatis, lucem cineream in tenebris ſpargens.*

argentea. 15. P. lanceolata pennæ facie, ſtirpe lævi tereti, pinnis creberrimis imbricatis dentatis virgatis. *Soland. & Ellis corall. p. 66. n. 9. t. 8. f. 1-3.*
Habitat in Oceano indico, *noctu egregie lucens, pede ſæpe longior, nitens, pinnis albo nigroque ſtriatis.*

Encrinus. 16. P. ſtirpe quadrangulari attenuata longiſſima oſſea, membrana calloſa veſtita, hydris oviparis apice in umbellam congeſtis. *Soland. & Ellis corall. p. 67. n. 10.*
Pallas el. zooph. p. 365. n. 212. Pennatula ſtipite oſſeo quadrangulo contorto, corporibus tereti-attenuatis apice floreſcentibus, in umbellam congeſtis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1317. *n.* 1. Vorticella compoſita, floribus octoradiatis, ſtirpe ſimpliciſſima contorto-oſſea.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 80. Iſis Encrinus.
Ellis act. angl. 48. *p.* 305. *t.* 12. *corall. p.* 96. *t.* 37. Cluſterpolypi.
Mylius monogr. 1753. 4. *c. fig.* Zoophyton groenlandicum.
Act. Petrop. 1766. *p.* 425. *t.* 11. *f.* 7.
Habitat in mari groenlandico, *6 pedes longa, & longior, hydris umbellæ* 20-30, *cylindricis, ſingulis apice 8 tentaculatis, radiis ſerrato-pinnatis; an protypus encrinitæ?*

349. HYDRA. *Animal* baſi ſe affigens contractile. *Os* terminale tentaculis cinctum.

* *marinæ, animali carnoſo oblongo tereti viviparo, ore dilatabili*, Actiniæ Elliſii.

Cereus. 5. H. tentaculis denudatis numeroſiſſimis, corpore longitudinaliter ſulcato. *Gaertn. act. angl.* 52. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 1.
Soland. & Ellis corall. p. 2. *n.* 1. Actinia Cereus.
Habitat ad Cornubiæ *littora, fuſca, tentaculis thalaſſinis, apice roſeis.*

Bellis. 6. H. calyciflora verrucoſa, tentaculis retractilibus variegatis. *Gaertn. act. angl.* 52. *p.* 79. *t.* 1. *f.* 2.
Soland. & Ellis corrall. p. 2. *n.* 2. Antinia Bellis.
Habitat ad Cornubiæ *littora, mollis, incarnata, verrucis albis, in purpureum violaceum fuſcum extrinſecus colorem vergens, tentaculis pellucidis inæqualibus, aliis pallide cinereis fuſco maculatis, aliis badiis albo maculatis, diſco ſtellato, fuſco, flavo, cinereo alboque radiato.*

gemmacea. 7. H. diſciflora, tentaculis retractilibus ſubdiaphanis, corpore cylindrico glandulis miliaribus longitudinaliter ſtriato. *Gaertner act. angl.* 52. *p.* 82. *t.* 1. *f.* 4.
Soland. & Ellis corall. p. 3. *n.* 3. Actinia gemmacea.
Habitat ad Cornubiæ *littora, in rupium fiſſuris, ad baſin rubella, ceterum ex albo flavo & cinereo miſta, glandulis medii ordinis albis, tentaculis albidis.*

Meſembryanthenum. 8. H. diſciflora, tentaculis retractilibus, extimo diſci margine tuberculato. *Gaertner act. angl.* 52. *p.* 83. *t.* 1. *f.* 5.
Soland. & Ellis corall. p. 4. *n.* 4. Actinia Meſembryanthemum.
Habitat ad Angliæ *littora, æſtate rubra, colore auctummo in obſcure viridem vel fuſcum tranſeunte, tentaculis & tuberculis diſci rubris, cæruleis, albis, aut variegatis.*

ſociata. 9. H. tenuis tubæformis, capitulo ſubgloboſo tentaculato, ex tubulo carnoſo adhærente prolifera.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 1. 2. *Soland. & Ellis corall. p.* 5. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 1. 2. Actinia ſociata.
Hugh. nat. hiſt. Barbad. p. 296. Cleſter's of Waterbottles?
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Aſter. 10. H. ſtirpe craſſa carnoſa ſubcylindrica lævi truncata tentaculis radiata.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 3. *Soland. & Ellis corall. p.* 6. *n.* 6. Actinia aſter.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Hinc tribus actiniis jungit hydras, molluſcis zoophyta; huc ſpectare quoque videntur Veretillum Apuleii, *ſive Priapus marinus* Valiſneri *op.* 3. *p.* 442. *ſ. Cucumis marinus* Barrelier *pl. ic.* 1293. *n.* 2. *ſ. Hydra Bohadſch mar. c.* 4. *t.* 6. *ſ. & mentula marina.* Planc. *Conch. min. not. ed.* 2. *app. p.* 108. *c.* 17. *t.* 8. *ejuſdem p.* 99. *c.* 6. *t.* 6. *f.* D. E. F. *Echinus coriaceus.*

Anemo-ne. 11. H. carnoſa complanata, diſco ſubhexagono tentaculis plurimis cincto.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 4. 5. *Soland. & Ellis corall. p.* 6. *n.* 7. Actinia Anemone.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Helian-thus. 12. H. carnoſa complanata hypocrateriformis, diſco rotundo tentaculis plurimis prædito.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 6. 7. *Soland. & Ellis corall. p.* 6. *n.* 8. Actinia Helianthus.
Habitat in mari, Americam *mediam alluente.*

Dianthus. 13. H. lævis ſubcylindrica, diſco quinquepartito foliaceo tentaculis exiguis albis ornato, oſculo elevato ſtriato.
Ellis act. angl. 57. *p.* 436. *t.* 19. *f.* 8. *Soland. & Ellis corall. p.* 7. *n.* 9. Actinia Dianthus.
Habitat ad Angliæ *littora, flava; an eadem cum actinia plumoſa?*

Calendu-la. 14. H ſtirpe ſubturbinata, diſco tentaculis petaliformibus cincto.
Soland. & Ellis corall. p. 7. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 3. Actinia Calendula.
Hugh. nat. hiſt. Barb. p. 293. *t.* 24. *f.* 1. Animal Flower.
Habitat ad inſulas Barbados; *an hujus generis?*

Dolio-lum. 15. H. quinquelatera cineraſcens, angulis obſoletioribus papillis bifariam aſperis, diſco convexiuſculo tentaculis viginti.
Pallas miſc. zool. p. 152. *t.* 9. *f.* 10-12. & *t.* 10. Actinia Doliolum.
Habitat ad Caput Bonæ Spei, *ſubdecaëdra, utroque fine truncata, poſteriori magis attenuata, tentaculis bipartitis fuſcis villoſo-granulatis.*

** *vagæ, lineares, gelatinoſæ, nudæ, tentaculis ſetaceis, prolibus lateralibus (auctumno ovis) deciduis, in aquis dulcibus habitantes.*

gelatino-ſa. 16. H. minuta gelatinoſa lactea cylindrica, tentaculis duodecim corpore elongato brevioribus. *Müll. zool. dan.* 3. *p.* 25. *t.* 95. *f.* 1. 2.
Habitat gregaria in fucorum facie inverſa.

viridis. 1. H. tentaculis ſubdenis brevioribus.
Pallas el. zooph. p. 31. *n.* 3. Hydra (viridiſſima) corpore viridiſſimo, cirris viridibus corpore brevioribus.

Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 13. *n.* 147. *zool. dan. prodr.* 2783. Hydra viridiſſima, cirris corpore brevioribus.
Leeuwenh. act. angl. 23. *n.* 283. *p.* 1494. *n.* 4.
Ledermüll. microſc. t. 67. *f.* e. f.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* I.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 531. *t.* 88. 89.
Schaeff. grün. Armpolyp. Regensb. 1755. *t.* I. *f.* 10-15. *t.* 2. *f.* 10-12. & *t.* 3. *f.* 4-8.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, & rivulis, *ſub plantis aquaticis primo vere & auctumno potiſſimum conſpicua, tentaculis* 8-10.

fuſca. 2. H. tentaculis ſuboctonis longiſſimis. *Soland. & Ellis corall. p.* 9. *n.* I.
Pallas el. zooph. p. 29. *n.* I. Hydra (oligactis) corpore caudato gryſeo, cirris multoties longioribus.
Ellis corall. t. 28. *f.* C.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* 3. 4.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 505. *t.* 84. (α). 85-87. (β).
Schaeff. polyp. 1754. *t.* 3. *f.* I.
Habitat in Europæ aquis dulcibus, *ex fuſco griſea, antrorſum ſubattenuata. tentaculis ad ſummum* 8, *tenuiſſimis contractis ſetaceis albidis.*

griſea. 3. H. tentaculis ſubſeptenis longioribus.
Pallas el. zooph. p. 30. *n.* 2. Hydra (vulgaris) corpore poſtice attenuato gryſeo, cirris vix duplo longioribus.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 14. *n.* 148. *zool. dan. prod.* 2784. Hydra aurantia, cirris corpore vix duplo longioribus.
Soland. & Ellis corall. p. 9. *n.* 2. Hydra (vulgaris) tentaculis longioribus ſubſeptenis, corpore luteſcente poſtice attenuato.
Ellis act. angl. 57. *p.* 430. *t.* 19. Freſh-water Polype.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 473. *t.* 78-83. Polypus aurantius.
Trembl. polyp. I. *p.* 22. *t.* I. *f.* 2.
Lederm. microſc. t. 67. *f.* m.
Baker microſc. t. 7. *f.* 3-7.
Habitat in Europæ rivulis aquiſque ſtagnantibus *purioribus, tentaculis interdum* 12, *plantis aquaticis*, e. g. *ſio adhærens.*

Hydræ *poſterioris hujus tribus gregariæ, ſemipellucidæ, teſt bus* Roeſelii, Trembleyi, Bonneti, Blumenbachii, Lichtnebergii *experimentis, vi proliſica inſigni ſpectabiles.*

pallens. 4. H. tentaculis ſubſenis mediocribus.
Pallas el. zooph. p. 32. *n.* 4. Hydra (attenuata) corpore flaveſcente ſurſum attenuato.
Müll. hiſt. verm. I. 2. *p.* 14. *n.* 149. *zool. dan. prodr.* 2785. Hydra pallida, cirris corporis longitudine.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 465. *t.* 76. 77. Polypus ſtramineus.
Habitat rarior in Europæ ſtagnis *purioribus, tenerrima, griſea paulo major, tentaculis albidis.*

V. INFUSORIA.

Vermes minimi ſimpliciores.

BRACHIONUS. *Corpus* contractile, teſta tectum, ciliis rotatoriis.

urceolaris. 1. Br. teſta apice multidentata, baſi mutica, cauda ſimplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 131. *n.* 142. *zool. dan. prodr.* 2571.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 12. Vorticella ſimplex pedunculata, ore dentato.
Pallas el zooph. p. 91. *n.* 47. Brachionus (capſuliflorus) ſimplex calyculatus, capſula depreſſa poſtice crenata, oris labio ſuperiore ſexdentato.
Hill anim. p. 11. Brachionus corpore breviori campaniformi, cauda brevi.
Fn. ſuec. p. 537. *Müll. fl. Fridrichsd. p.* 238. Tubipora Urceus.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 68. *t.* 9?
Baker microſc. p. 338. *t.* 12. *f.* 7-10.
Schaeff. grün: Armpol. t. 1. *f.* 8. k. *t.* 2. *f.* 7-9.
Habitat frequens in Europæ aquis ſtagnantibus, *Auguſto potiſſimum, & oculo quidem nudo tanquam punctum mobile albicans conſpicuus, oviparus & viviparus, ciliis uncinatis.*

Patella. 2. Br. univalvis, teſta apice bidentata baſi emarginata, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 130. *n.* 142. *zool. dan. prodr.* 2570.
Joblot miaroſc. I. 2. *t.* 4. *f.* F. G?
Habitat in Europæ aquis paluſtribus, *per totam hiemem conſpicua, teſta plana, cryſtallina, ovato-orbiculari, capite, trunco caudaque diſtinctis.*

cirratus. 3. Br. bivalvis, teſta apice mutica abbreviata baſi bicorni, cauda longa biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 232. *n.* 143. *zool. dan. prodr.* 2172.
Joblot microſc. 2. *p.* 54. *t.* 6. *f.* 10. A. B. C. D.
Habitat in Europæ aquis, *teſta corpore breviore, urceolari major, ventricoſus ſubpellucidus, capite conico utrinque barbato, trunco ovato.*

tripus. 4. Br. bivalvis, teſta apice mutica baſi tricorni, cauda duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 133. *n.* 144. *zool. dan. prodr.* 2573.

Habitat paulo rarior in aquis aſſervatis, *urceolari minor, pellucidiſſimus fere triqueter, organo rotatorio duplici.*

uncinatus. 5. Br. bivalvis, teſta apice mutica rotundata baſi unidentata, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 134. *n.* 145. *zool. dan. prodr.* 2574.

Habitat in Europæ foſſis aquoſis, *congeneribus minor, antrorſum unco armatus, cauda 4-5 articulis compoſita, teſta utrinque rotundata & aperiunda.*

mucronatus. 6. Br. bivalvis, teſta apice baſique bidentata, cauda ſpina duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 134. *n.* 146. *zool. dan. prodr.* 2575.

Habitat ſat frequens in aquis Europæ, *lemna coopertis, organi rotatorii medio mucronato, caudæ ſpinis pellucidis mobilibus, teſta cryſtallina, oblongiuſcula, utrinque truncata.*

cernuus. 7. Br. pedunculo piloſo, capitulis cernuis. *Pallas ſpic. zool.* 10. *p.* 37. *t.* 4. *f.* 10.

Habitat gregarius in tubularia fiſtuloſa.

calyciflorus. 8. Br. ſimplex calyculatus, teſta poſterius crenata, oris labio ſuperiore quadridentato *Pallas el. zooph. p.* 93. *n.* 48.

Baker. microgr. p. 304. *t.* 12. *f.* 4-6. Animalculum teſta notuliſque inſtructum tertium.

Habitat - - - vagus.

tubifex. 9. Br. teſta tubuloſa punctata, corpore oppoſite prolifero, limbo lobato ciliatoque. *Pallas el. zooph. p.* 91. *n.* 46.

Schaeff. monogr. 1755. *cum tab.* Blumenpolypen der ſüſsen Waſſer.

Habitat in Europæ ſtagnis, *an hujus generis ?*

quadridentatus. 10. Br. teſta ventricoſa apice quadridentata, organo rotatorio duplici, baſi bicorni, cauda longa ſimplici. *Hermann. Naturf.* 19. *p.* 47. *t.* 2. *f.* 9.

Baker microgr. t. 11-13.

Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, *lemne ſæpe adhærens caudæ ope, celerrime natans, teſta pellucidiſſima.*

Patina. 11. Br. teſta orbiculari mutica integra, organo rotatorio duplici, cauda brevi ſimplici. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 48. *t.* 2. *f.* 10.

Eichhorn. Naturg. Waſſerm. t. 1. *f.* 2. 4.

Habitat in Europæ ſtagnis, *in quibus* lemna, hydrocharis *vegetat.*

348. VORTICELLA. *Corpus* contractile nudum, ciliis rotatoriis.

* *pedunculatæ.*

racemoſa. 1. V. compoſita, pedunculo rigido: pedicellis ramoſiſſimis longis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 128. *n.* 140. *zool. dan. prodr.* 2568.
Habitat in aquis e ſtagno Embderupenſi Hafniam *deductis, hieme conſpicua, ſtipite elongato ſubtiliſſimo, rariſſime tota ſimul in motum agitata.*

polypina. 2. V. compoſita ovato-truncata, pedunculo reflexili ramoſiſſimo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 123. *n.* 137. *zool. dan. prodr.* 2569.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1317. *n.* 2. Vorticella compoſita, floribus concatenatis, ſtirpe paniculata ſubdigitata.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 816. Sertularia corpuſculis concatenatis pellucidis hyalinis, panicula ſubdigitata.
Pallas el. zooph. p. 98. *n.* 55. Brachionus (ramoſiſſimus) vegetans, ſtirpe retortili ramoſiſſima, corpuſculis campanulatis.
Ellis coral. t. 13. *f.* b. B. c. C. Corallina omnium minima.
Baſter opuſc. ſubſ. 1. *l.* 1. *t.* 3. *f.* 1. a. b. c. Minima polyporum ſpecies.
Trembl. act. angl. 44. *p.* 639. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat frequens in mari balthico, mediterraneo, *aliis, fucis adhærens, oculo nudo tanquam punctum album apparens, motu duplici ſpontaneo agitata.*

Anaſtatica. 3. V. compoſita oblonga oblique truncata, pedunculo ſquamoſo rigido. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 127. *n.* 139. *zool. dan. prodr.* 2567.
Syſt. nat. XII. 1. *p.* 1317. *n.* 3. Vorticella compoſita, floribus campanulatis, ſtirpe multiflora rigeſcente.
Fn. ſuec. 2221. Iſis Anaſtatica.
Pallas el. zooph. p. 99. *n.* 56. Brachionus vegetans, ſtirpe retortili umbellata, radiis racemoſis, corpuſculis campanulatis.
Amœn. acad. 2. *p.* 64. *n.* 4. 5.
Trembl. act. angl. 44. *p.* 637 *t.* 1. *f.* 7-9.
Brady act. angl. 49. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1-6.
Degeer act. Stockh. 1746. *t.* 6. *f.* 4. 5.
Needh. microſc. t. 7. *f.* 2-5.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Habitat in Europæ aquis dulcibus, *teſtaceis plantiſque inſidens, quarum ſuperficiem exaſperat, ramulis in umbellam ex umbellulis conſlatum expanſis, capitulis in ſingulis pedicellis 5-10, pellucidiſſimis, ovato oblongis, corpuſculis 5-6 ſubſphæricis repletis.*

conglomerata. 4. V. compoſita, capitulis eroſo-dentatis, ſtirpe multiflora, craſſitie pennæ columbinæ.
Amœn. acad. 4. *p.* 257. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Oceano indico.

pyraria. 5. V. compoſita inverſe conica., pedunculo ramoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 126. *n.* 138. *zool. dan. prodr.* 2566.
*Syſt. nat.*XII. 2. *p.* 1318. *n.* 5. Vorticella compoſita, floribus muticis obovatis, tentaculis bigeminis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 102. *n.* 59. Brachionus (pyriformis) vegetans, ſtirpe ſetacea extremitate dichotoma faſtigiata, corpuſculis ovatis utrinque bitentaculatis.
Hill. hiſt. an. t. 1. 2. Macrocercus corpore utrinque anguſtato & truncato, cauda longiſſima.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 606. *t.* 98. *f.* 1. & 2. d. e.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, *ceratophyllo potiſſimum adhærens, rigida, ſetacea, elongata.*

operculata. 71. V. compoſita, capitulis muticis ovalibus ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 104. *n.* 62. Brachionus vegetans, ſtirpe articulata ramoſiſſima, corpuſculis ovalibus piſtillo ciliato operculatis.
Roeſ. inſ. 3. *polyp.* 609. *t.* 98. *f.* 5. 6. Pſeudopolypus operculatus.
Baker microgr. p. 351. *t.* 13. *f.* 13. 14.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* W.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, *ramoſiſſima.*

tuberoſa. 12. V. ſtirpe dichotoma, capitulis turbinatis bi-vel trituberculatis.
Pall. el. zooph. p. 105. *n.* 63. Brachionus tuberoſus
Baker microgr. p. 350. *t.* 13. *f.* 10-12.
Habitat in Angliæ ſtagnis, *rigida, capitulorum tuberculis convexis radiatis.*

hians. 14. V. ſimplex citriformis, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 135. *n.* 137. *zool. dan. prodr.* 2565.
Wrisb. anim. infuſ. p. 417. *f.* 1. B. C. K. I. & G. F. E. *f.* 2. *f.* 13. B. F. C. H.

Habitat in vetuſtis infuſionibus & fimetis, *ex minimis hujus generis, pedunculo relicto ſæpe in aquis vagans, capitulo pomi interni forma, in apice interdum hiante, pedunculo capitulo triplo longiore, cauda corpore ſextuplo breviore.*

Bellis. 15. V. ſimplex hemiſphærica, margine contractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 2. *p.* 123. *n.* 136. *zool. dan. prodr.* 2564. *Habitat rarior in* aqua foſſarum Europæ, *convallariæ facie, at minor, capitulo flavicante diſco lato ciliiſque marginis bellidis florem referente, pedunculo longo, pellucido, tenuiſſimo, ad apicem bifido.*

umbellaria. 8. V. ſimplex globoſa, granis nigricantibus, pedunculo rigido.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1318. *n.* 8. Vorticella compoſita, floribus ciliatis globoſis muticis, ſtirpe umbellata.
Müll. hiſt. verm. I. 1. *p.* 122. *n.* 135. *zool. dan. prodr.* 2563. Vorticella acinoſa.
Pallas el. zooph. p. 100. *n.* 37. Brachionus (acinoſus) vegetans, ſtirpe rigida dichotoma, corpuſculis truncatis fimbriato-ciliatis, acinis opacis.
Trembl. act. angl. 43. *p.* 171. *t.* 11. *f.* 5-7.
Baker microgr. p. 348. *t.* 13. *f.* 6. 7.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 614. *t.* 100.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* t. n.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, *capitulis flaveſcentibus punctis opacis diſtinctis, coarctatorum baſi hyalina, pedunculo octuplo longiore, interdum apice bifido.*

berberina. 9. V. ſimplex ovalis, ſtirpe ramoſa rigida, granis albida.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 9. Vorticella compoſita, floribus ovalibus muticis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 103. *n.* 60. Brachionus (berberiformis) vegetans, ſtirpe deorſum attenuata, ſubramoſa, corpuſculis terminalibus oblongis muticis.
Trembl. act. angl. 43. *p.* 179. Polypi bipertientis altera ſpecies paulo minor.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 613. *t.* 99. Pſeudopolypus beriformis.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* q. ſ.
Habitat in Europæ *aquis.*

digitalis. 10. V. ſimplex cylindrica uniſulcata ſemiclauſa, ſtirpe ramoſa.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n* 10. Vorticella compoſita, floribus cylindricis uniſulcatis ſemiclauſis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 104. *n.* 61. Brachionus vegetans ſtirpe

umbellata, corpuſculis oblongo-truncatis, longitudinaliter uniſulcatis.

Roeſel inſ. 3. polyp. p. 607. *t.* 98. *f.* 4. Pſeudopolypus corniculum chartaceum referens.

Habitat in Europæ ſtagnis, *ſtirpe brevi.*

faſciculata. 16. V. ſimplex viridis campanulata: margine reflexo, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 121. *n.* 134. *zool. dan. prodr.* 2562.

Habitat in Daniæ confervis fluviatilibus, *primo vere conſpicua, numeroſiſſima, gelatinoſa, capitulo opaco, baſi pedunculoque longiſſimo, tenuiſſimo hyalinis.*

annularis. 17. V. ſimplex truncata, pedunculo apice retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 121. *n.* 133. *zool. dan. prodr.* 2561.

Habitat in ſtagnorum Daniæ *teſtaceis, nudo oculo viſibilis, capitulo inverſe conico, pedunculo longiſſimo, rigido inſidente.*

nutans. 18. V. ſimplex turbinata, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 120. *n.* 132. *zool. dan. prodr.* 2560.

Habitat in Daniæ ſtagnis, *ſtratiotæ & teſtaceis adhærens, oculo nudo non uſurpanda, capitulo apice albo, quaſi annulo lucido cincto, baſi hyalino, pedunculo longo tenui.*

gemella. 19. V. ſimplex ſphærica, capitulo gemino. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 120. *n.* 131. *zool. dan. prodr.* 2559.

Habitat in teſtis monoculorum *inter* confervas marinas degentium, *oculo nudo inviſibilis, capitulis hyalinis punctis obſcuris repletis.*

nebulifera. 20. V. ſimplex ovata, pedunculo reflexili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 119. *n.* 130. *zool. dan. prodr.* 2558.

Habitat in maris balthici conferva polymorpha, *oculo nudo inconſpicua, pedunculo baſi dilatato, in medio bipartito.*

Convallaria. 21. V. ſimplex campanulata pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 118. *n.* 129. *zool. dan. prodr.* 2557.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1319. *n.* 11. Vorticella ſimplex gregaria, flore campanulato mutico: tentaculis bigeminis, ſtirpe fixa.

Pallas el. zooph. p. 97. *n.* 54. Brachionus (campanulatus) gregarius, pedunculo ſetaceo retortili unifloro, corpuſculo campaniformi.

Trembl. act. angl. 43. *p.* 474. Polypi bipartientis tertia ſpecies.

Baker microgr. p. 339. *t.* 13. *f.* 1. d. e. Animalcula campanacea.

Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 597. *t.* 97. Pſeudopolypus parvus ſocialis crateriformis.

Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* l.

Cavol. pol. mar. 3. *p.* 253. *t.* 9. *f.* 13.

Habitat in Europæ aquarum dulcium *teſtaceis, cerathophyllo, lemna, capitulis oculo inermi puncta minima albida referentibus, pedunculo ſimplici, ſetaceo, longiſſimo, an eadem, quam* Cavolini *in mari mediterraneo veneris teſtæ adhærentem,* Schranck *in infuſo granorum avenæ conſpexit?*

lunaris. 21. V. ſimplex hemiſphærica, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 117. *n.* 128. *zool. dan. prodr.* 2556.

Habitat in Daniæ ſtagnorum *lemna minori, capitulo pedunculo* 8-10*plo breviori, apertura dimidium lunæ æquante: margine protuberante flexuoſo, ciliorum faſciculo in horizontalem & perpendicularem partito.*

Globularia. 22. V. ſimplex ſphærica, pedunculo retortili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 117. *n.* 127. *zool. dan. prodr.* 2555.

Hill hiſt. an. t. 1. *f.* 1. Macrocercus corpore rotundo, cauda tenuiſſima.

Habitat frequens in Daniæ ſtagnorum *monoculo quadricorni, capituli apertura diametrum non ſuperante, ciliis quaſi pectinatis coronata, pedunculo vix quadruplo longiori.*

inclinans. 23. V. ſimplex deflexa, pedunculo brevi, capitulo retractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 116. *n.* 126. *zool. dan. prodr.* 2554.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in aquis Daniæ dulcibus, *naidibus adhærens, oculo nudo inconſpicua, hyalina, ſyringam, ex qua fumus nicotianæ hauritur, referens, capitulo pendulo anterius truncato; pedunculo duplo longiore.*

ringens. 24. V. ſimplex obovata, pedunculo minimo, orificio contractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 116. *n.* 125. *zool. dan. prodr.* 2553.

Müll. von Würm. p. 70. 71.

Habitat in Daniæ ſtagnis, *naidibus adhærens, oculo nudo non uſurpanda, hyalina, erecta, pyrum, contractu pomum citreum potius referens; capitulo in aperturæ con-*

tractilis medio quaſi operculato, pedunculum non contractilem quadruplo ſuperante.

ſtellata. 13. V. ſimplex repens, orificio decemfido, pedunculo capillari. *Habitat in* Oceano africano, *plantis ſubmarinis inſidens, alba, perennans, capilli craſſitie, rarius unum alterumve ramum protrudens, pedunculo erecto, molli, 3 lineas longo, capite ſubcampanulato, ſeminis thymi magnitudine, an hujus generis?*

pirifor-mis. 25. V. ſimplex obovata, pedicello minimo retractili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 115. *n.* 124. *zool. dan. prodr.* 2552. *Hill hiſt. an. t.* 1. *f.* 2. Brachiurus corpore ovato.
β) *Schaeff. grün. Armpol. t.* 1. *f.* 8. h.
Habitat in Europæ ſtagnorum *monoculis, oculo nudo inconſpicua, hyalina, capitulo pedicellum quadruplo ſuperante.*

citrina. 26. V. ſimplex multiformis, orificio contractili, pedunculo æquali. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 114. *n.* 123. *zool. dan. prodr.* 2551.
Habitat in Daniæ aquis ſtagnantibus, *trichodæ bombardæ affinis, capitulo majori moleculis flavo virentibus farto, baſi pellucidiſſimo, pedunculo curvato.*

cyathina. 27. V. ſimplex crateriformis, pedunculo retortili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 131. *n.* 63. *t.* 35. *ſer.* 1. *rar. deſcr.* 1. *p.* 85. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata, *hyalina, vaga, pedunculo tenuiſſimo, longo, corpus ſubſphæricum ventricoſum 2-4plo ſuperante.*

putrida. 28. V. ſimplex, apice retractili, pedunculo rigido. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 132. *n.* 64. *t.* 35. *f.* 2. *rar. deſcr.* 1. *p.* 86. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata putrida, *ſegnis, gelatinoſa, hyalina, oblonga, ventricoſa, orificio clauſo in papillam prolongata, pedunculo corpore vix duplo longiori.*

patellina. 29. V. ſimplex patinæformis, pedunculo retortili. *Müll. zool. dan.* 1. *p.* 133. *n.* 65. *t.* 35. *f. rar. deſcr.* 1. *p.* 87. *prodr. p.* 281.
Habitat in aqua marina *aliquantiſper aſſervata, hyalina, vivida, oculo nudo non uſitpanda, celerrime natans, intus moleculas 2 craſſiores, globuloſque 3-4 oſtendens, pedunculo tenui corpore quadruplo longiori.*

** *caudatæ.*

floſculo-ſa. 30. V aggregata oblongo-ovata, diſco dilatato pellucido. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 113. *n.* 112. *zool. dan. prodr.* 2550.
Habitat in Daniæ paludoſis, *ceratophyllo adhærens, Septembre, & primo vere potiſſimum conſpicua, oculo nudo globulum flaveſcentem offerens, diſco capitis in abdomen hyalinum retractilis reniformi hyalino, cauda acuminatiſſima abdomine duplo longiori, nunc lævi, nunc annulis rugoſa:*

ſocialis. 31. V. aggregata clavata, diſco obliquo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 112. *n.* 121. *zool. dan. prodr.* 2549.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1321. *n.* 7. *Müll. fl. Fridrichsd. p.* 238. Hydra mutica toroſa rugoſa.
Pallas el. zooph. p. 96. *n.* 53. Brachionus aggregatus, corpore toroſo mutabili caudato oblique truncato, diſco reniformi.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 585. *t.* 94. *f.* 1-6. & *t.* 95. 96. Pſeudopolypus ſocialis clavæformis.
Brady act. angl. 49. 1. *p.* 249. *t.* 7. *f.* 1.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* f. g.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, *ceratophyllo ſæpius adhærens.*

ſtentorea. 32. V. tubæformis, limbo ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 111. *n.* 120. *zool. dan. prodr.* 2548.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1321. *n.* 6. Hydra tentaculis ciliaribus, corpore infundibuliformi.
Pallas el. zooph. p. 95. *n.* 52. Brachionus ſimplex nudus infundibuliformis, limbo ciliato.
Trembl. act. angl. 43. *p.* 180. Polypi infundibuliformes virides, cærulei & albidi.
Baker microgr. p. 340. *t.* 13. *f.* 1. f. g. Animalculum infundibuliforme.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 594. *t.* 94. *f.* 7. 8. Pſeudopolypus tubiformis.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* d. e. i.
Habitat in Europæ aquis dulcibus, *hyalina, in tubam quaſi ſtentoream elongata.*

hyacin-thina. 33. V. ſimplex involucrata, aperturæ limbo multidentato.
Pallas el. zooph. p. 93. *n.* 49. Brachionus hyacinthinus.
Baker microgr. p. 302. *t.* 12. *f.* 2.
Habitat - - - vaga, oblonga, cauda attenuata, an hujus generis & tribus?

auricula-ta. 34. V. nuda, cauda biſeta parvula. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* III. *n.* 119. *zool. dan. prodr.* 2547.
Habitat in Daniæ aquis dulcibus *purioribus*, *pellucida*, *cylindrica*, *retrorſum anguſtior*, *apertura utrinque in auriculam dilatata*, *lacinula media ſubtriangulari*, *motu per diagonalem celeri.*

furcata. 35. V. apertura mutica, cauda ſimplici bifida. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 110. *n.* 118. *zool. dan. prodr.* 2546.
Ledermüll. microſc. p. 88. *t.* 48.
Habitat vulgaris in Europæ aquis dulcibus, *cylindrica*, *interaneis pellucidiſſimis*, *caudæ cruribus quieſcenti junctis.*

Scuta. 36. V. apertura ſpinoſa, cauda apice fiſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 109. *n.* 117. *zool. dan. prodr.* 2545.
Habitat in Europæ aquis lemna *coopertis*, *pellucida*, *varie plicata*, *antrorſum truncata*, *organo rotatorio ſimplici*, *inteſtino luteſcente.*

Catulus. 37. V. cylindrica, apertura mutica, cauda reflexa. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 148. *n.* 116. *zool. dan. prodr.* 2544.
Joblot. microſc. I. 2. *t.* 13. *f.* X.
Habitat in Daniæ aqua paluſtri, *in varias directiones natans*, *craſſiuſcula*, *ſulcis longitudinalibus exarata*, *organo rotatorio minutiſſimo*, *cauda breviſſima exſertili biſeta.*

Felis. 38. V. cylindrica mutica, cauda ſpinis duabus longis terminata. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 108. *n.* 115. *zool. dan. prodr.* 2543.
Habitat in Daniæ aquis, *lemna tectis*, *toroſa*, *anteriore ſui parte ſe contrahens*, *ſpinis caudæ pellucidis tertiæ corporis ipſius longitudinis.*

vermicularis. 39. V. cylindrica annulata, proboſcide exſertili. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 107. *n.* 114. *zool. dan. prodr.* 2542.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 80. *t.* 11. *f.* A-Z.
Habitat rarior in Daniæ aquis *lemna coopertis*, *elongata*, *carnoſa*, *mutabilis*, *annulis* 8-9 *rugoſa*, *apice nunc obtuſa*, *nunc* 2 *mucronibus terminata*, *proboſcide articulata bifida*, *cauda ſpinis* 2 *pellucidis terminata.*

macroura. 40. V. organo rotatorio duplici, cauda gracili triplici ſpina terminata. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 57. *t.* 2. *f.* 23.
Baker microgr. p. 380. *t.* 12. *f.* I.
Habitat in Europæ aqua paluſtri, *rotatoriæ affinis*, *at tota hyalina.*

rotatoria. 41. V. cylindrica, organo rotatorio duplici. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 106. *n.* 113. *zool. dan. prodr.* 2541.
Pallas el. zooph. p. 94. *n.* 50. Brachionus ſimplex nudus oblongus, capite diſcreto bilobo, lobis ciliatis.
Hill hiſt. an. t. 1. 2. Brachionus corpore conico toruloſo, cauda tricuſpidi.
Goeze Hannöv. Magaz. 1772. & *Beſch. berl. Naturf.* 2. *p.* 287.
Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 386. *f.* 1. 2.
Joblot microſc. 2. *p.* 96. *t.* 5. *f.* A–E. K.
Baker microſc. p. 348–379. *t.* 11. *f.* 1–14.
expl. p. 95. *t.* 6–8.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, *vere & auctumno in vegetabilium infuſo frequens, cordis & interaneorum motu diverſo, viſibili, flavicans.*

*** *cauda pedunculoque orbæ.*

crataegaria. 6. V. ſubgloboſa conferta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 105. *n.* 112. *zool. dan. prodr.* 2540.
Syſt. nat. XII. *p.* 1318. *n.* 6. Vorticella compoſita, floribus muticis globoſis: tentaculis binis, ſtirpe ramoſa.
Pallas el. zooph. p. 101. *n.* 58. Brachionus vegetans, ſtirpe rigida brevi dichotoma, corpuſculis confertis ovalibus ore bitentaculatis.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 604. *t.* 98. *f.* 2. aa. & *f.* 3. Pſeudopolypus fructus cratægi forma, tentaculis binis.
Baker microgr. p. 357. *t.* 13. *f.* 15. 1. 2. 3. Animalculum moriforme.
Ledermüll. microſc. t. 88. *f.* o. p.
Habitat in Europæ ſtagnis, *Aprili ſæpe caudæ monoculi quadricornis adhærens, corpuſculis plerumque acaulibus, ſeſſilibus, coacervatione morum referentibus.*

canaliculata. 42. V. dilatata pellucida, latere inciſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 104. *n.* 111. *zool. dan. prodr.* 2539.
Habitat in aqua confervæ fluviatili infuſa, *poſtquam hæc virorem exuerat, gregaria, alba, pellucida, interaneis obſcuris.*

naſuta. 43. V. cylindrica, crateris medio mucrone prominente. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 102. *n.* 110. *zool. dan. prodr.* 2538.
Habitat parcior in Daniæ aquis *inter lemnam, nudo oculo inconſpicua, pellucida, formam pro lubitu mutans, motu multiplici, organo rotatorio medium corpus cingente.*

44. V.

crateriformis. 44. V. ſubquadrata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 101. *n.* 109. *zool. dan. prodr.* 2537.
Hill hiſt. an. p. 6. *t.* 1. *f.* 2. Craſpedarium corpore ſubovato.
Habitat in foſſis Daniæ aquoſis lemna obductis, & *frequens in* aqua graminibus infuſa, *oculo nudo inconſpicua, vivaciſſima, pellucidiſſima, ut veſiculas tamen* 8-10 *in medio diſtinguere liceat, organo rotatorio utrinque in faſciculum ciliorum unito.*

truncatella. 45. V. cylindrica truncata, ciliis confertis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 100. *n.* 108. *zool. dan. prodr.* 1536.
Hill. hiſt. an. p. 6. *t.* 1. Craſpedarium corpore cylindrico.
Habitat haud frequens in aquis Daniæ *lemnam ferentibus, limacina craſſior, hyalina, moleculis nigricantibus farta, poſterius obtuſa, antrorſum truncata, aperturæ margine toto ciliis ornato.*

limacina. 46. V. cylindrica truncata, ciliis bigeminis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 100. *n.* 107. *zool. dan. prodr.* 2535.
Habitat in Daniæ aquis ſtagnantibus, *teſtaceorum tentaculis orique inſidens, oculo nudo inconſpicua, hyalina.*

cornuta. 47. V. inverſe conica viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 99. *n.* 100. *zool. dan. prodr.* 2534.
Habitat in Daniæ paludibus, *Decembri potiſſimum obvia, craſſa, formæ mutabilis, ſitu obliquo vacillando incedens.*

cincta. 48. V. trapeziformis nigro viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 98. *n.* 105. *zool. dan. prodr.* 2533.
Habitat in Daniæ paludibus, *oculo nudo inviſibilis, circa centrum lente rotata, formæ irregularis.*

polymorpha. 49. V. multiformis viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 98. *n.* 104. *zool. dan. prodr.* 2532. *Beſch. berl. Naturf.* 2. *p.* 20. *t.* 1.
Habitat - - - oculo nudo punctum agiliſſimum viride oſtendens.

viridis. 50. V. cylindrica uniformis viridis opaca. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 97. *n.* 103. *zool. dan. prodr.* 2531.
Habitat in Daniæ aquis purioribus, *Septembri præſertim obvia, lente ſæpe in linea recta, ſæpiſſime per circulum in aqua mota, oculo nudo punctum parvum viride repræſentans.*

nigra. 51. V. trochiformis nigra. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 96. *n.* 102. *zool. dan. prodr.* 2530.
Habitat in Daniæ pratis inundatis. *Auguſto occurrens vacillando fere continue in ſummo aquæ mota, oculo nudo puncta minima nigra ſiſtens.*

TRICHODA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, pellucidus, altera parte crinitus.

* *acaudatæ.*

Patella. 1. Tr. univalvis, anterius & poſterius ſetis inæqualibus porrectis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 95. *n.* 101. *zool. dan. prodr.* 2529.
Habitat rara in Daniæ aqua paluſtri, *vacillando natans, pulpoſa, ſuperius & inferius ſetis, pedum quaſi vices agentibus hirta, valvula orbiculari cryſtallina, anterius ſubemarginata.*

Inquilinus. 2. Tr. vaginata folliculo cylindrico hyalino, pedicello retortili. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 31. *n.* 8. *t.* 9. *n.* 2. *rar. deſcr.* 1. *p.* 17. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina puriſſima, *crateriformis, moleculis obſcuris farta, pedicello filiformi, vagina corpore triplo vel quadruplo longiori, rarius pedunculata; an forſan cum Patella diſtincti generis?*

Anas. 3. Tr. elongata, apice colli ſubtus elongato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 95. *n.* 100. *zool. dan. prodr.* 2528. *Joblot microſc. t.* 4. *f.* l. n. m?
Habitat in aquis purioribus, *moleculis obſcuris impleta, complanata, latitudine quintuplo longior, lente vagans.*

Larus. 4. Tr. antrorſum dilatata, dorſo gibbo. *Hermann Naturf.* 20. *t.* 3. *f.* 61.
Müll. zool. dan. prodr. add. p. 281. *n.* 4. Trichoda Anas.
Habitat in palude populi foliis putreſcentibus *plena, lente & corpore ad latus curvato natans.*

Urſula. 5. Tr. planiuſcula elongata æqualis anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 94. *n.* 99. *zool. dan. prodr.* 2527.
Habitat in fœni *aliorumque* vegetabilium infuſis putridis, *ſæpe* muceſcentibus, *per aquam vagans, latitudine ſua ſextuplo longior flexuoſa, æqualis teretiuſcula.*

Sannio. 6. Tr. incurvata, ſupra ciliata infra truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 94. *n.* 98. *zool. dan. prodr.* 2526.
Habitat rara in aquis, *in quibus* lemna *naſcitur*, *ludionem referens*, *at cirris ventris nullis*, *capitis lateralibus utrinque duobus*, *mobilibus*, *pendulis, pilis in margine truncato* 3-4 *breviſſimis.*

Linter. 7. Tr. ovato-oblonga, utroque fine prominula. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 93. *n.* 97. *zool. dan. prodr.* 2525.
Habitat in aqua licheni coriario Groenlandorum infuſa, *centro vacillando feſtino motu agitata*, *interdum ſurſum deorſumque gyrata*, *utroque fine æqualis*, *globulorum ſerie utrinque duplici vel triplici.*

Pubes. 8. Tr. ovato-oblonga gibba, antrorſum depreſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 92. *n.* 96. *zool. dan. prodr.* 2524.
Habitat in aquis lemnam *ferentibus*, *Decembri per eas vagans*, *ſupra poſterius macula nigra ab interaneis notata*, *apice obtuſo pilis minimis*, *ſetis nullis obſeſſo.*

Cypris. 9. Tr. obovata, poſteriora verſus ſuperne ſinuata, anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 91. *n.* 95. *zool. dan. prodr.* 2523.
Habitat in aquis lemna tectis, *quovis momento retrogrado motu agitata*, *monoculum cypridem referens*, *compreſſa*, *frontis capillis baſi latiuſculis.*

Cyclidium. 10. Tr. ovata, apice hiante, baſique crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 90. *n.* 94. *zool. dan. prodr.* 2522.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 2. *f.* 3. *t.* 8. *f.* 9. & *t.* 10. *f.* 19.
Habitat vulgaris in aqua vegetabilibus *infuſa*, *margine vacillando incedens*, *latere plano promota*, *antrorſum anguſtior*, *globulis diverſi voluminis*, *retrorſum obſcurioribus*, *repleta.*

Urinarium. 11. Tr. ovata, roſtro breviſſimo crinito. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 90. *n.* 93. *zool. dan. prodr.* 2521.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 65. *t.* 8. *f.* 2-4?
Habitat rarior in aqua fœno *infuſa*, *vacillando mota*, *depreſſa*, *veſiculis molecularibus impleta*, *roſtri ciliis breviſſimis.*

Lepus. 12. Tr. ovata, apice crinito, baſi ſetoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 89. *n.* 92. *zool. dan. prodr.* 2520.
Habitat in fimetis, infuſionibuſque tum animalibus tum vegetabilibus, *abundante*, *latice fluctuans*, *margine*

utrinque ſurſum flexo, parciore lente procedens, & omni momento conitatim a via deflectens, compreſſa, antrorſum punctis 2-3 lucidis mobilibus.

Caloſtium. 13. Tr. latiuſcula oblonga, anterius corniculis micantibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 89. *n.* 91. *zool. dan. prodr.* 2519.
Habitat in aqua vegatabilibus infuſa, *æqualis, planiuſcula, utrinque obtuſa, moleculis nigricantibus impleta, anterius corniculis 2-3 punctiſque lucidis mobilibus 3-5, poſterius ſetis breviſſimis inſtructa.*

Silurus. 14. Tr. oblonga, anterius & poſterius crinita, dorſo ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 88. *n.* 90. *zool. dan. prodr.* 2518.
Habitat copioſa in aqua conferva plena, *& aliquandiu in vaſculo ſervata, opaca, ſubincurvata, complanata, ſæpe ovata, punctis inæqualibus lucidis & opacis plena, pilis ciliiſque undique mobilibus.*

Mytilus. 15. Tr. ſubclavata, utroque fine latiori hyalino ciliato. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 87. *n.* 89. *zool. dan. prodr.* 2517. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 51. *t.* 3. *f.* 12.
Habitat in aqua, *potiſſimum* paluſtri, *paulo diutius aſſervata, celerrime natans multumque aquam continue hauriens, vorticellæ affinis, immuculata, utroque fine quaſi ex 2 laminis conflato, rotundata, medio interaneis nigricantibus, quibus veſiculæ pellucidæ interjacent, obſcura.*

Urnula. 16. Tr. urceolaris anterius crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 87. *n.* 88. *zool. dan. prodr.* 2516.
Habitat rariſſima in aqua *lemna obtecta, lente incedens, vorticellæ facie, membranacea, poſterius obtuſa, medio latiuſcula, anterius truncata, moleculis veſicularibus & nigricantibus repleta, pilis æqualibus brevibus.*

Lynceus. 17. Tr. ſubquadrata, roſtro adunco: ore crinito. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 86. *n.* 87. *zool. dan. prodr.* 2515.
Habitat in aqua *ante* 3 ſeptimanas regelata, *a* Mullero *in copula deprehenſa, in lineum rectam vix 2-3 corporis diametros progreſſa, confeſtim ſe pauliſper recipiens, retroque in circulum mota, monoculum lynceum referens, membranacea, compreſſa, roſtro porrecto infra truncato, pilorum faſciculo pendulo, interaneis tubuloſis eximie conſpicuis.*

Seminula. 18. Tr. ſemiorbicularis, anterius ſubtus crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 85. *n.* 86. *zool. dan. prodr.* 2514.

Habitat in aqua lemnæ infuſa, *lento, convulſivo quaſi motu agitata, complanata, figuram lunæ in primo quadrante conſtitutæ, præ ſe ferens, pilis raris breviſſimis.*

Orbis. 19. Tr. orbicularis anterius emarginata crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 85. *n.* 86. *zool. dan. prodr.* 2513.
Habitat rara in aquis, *cimicem referens, at major & planior, tota e meris moleculis veſicularibus conflata.*

Cimex. 20. Tr. ſupra convexa ſubtus plana crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 84. *n.* 85. *zool. dan. prodr.* 2512. *Goeze Beſch. berl. Naturf.* 3. *p.* 377. *t.* 8. *f.* 7-12.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 78. *t.* 2. *f.* 3. *t.* 8. *f.* 99.
Habitat frequens in aqua ſimetorum & vegetabilibus infuſa, *colpodas devorans, rapaciſſima, natans & ambulans, lynceo affinis, at ovalis interaneis pellucidiſſimis indiſtinctis, interdum gibba & poſterius opaca.*

Charon. 21. Tr. cymbiformis, fronte crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 83. *zool. dan. prodr.* 2511.
Habitat in aqua maris, *lynceo duplo major, undulatim mota, anterius ſetis* 2-3 *porrectis, in medio ſolitariis mobilibus inſtructa.*

Tinea. 22. Tr. clavata anterius crinita, poſterius groſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 83. *n.* 84. *zool. dan. prodr.* 2510.
Habitat in aqua fœno infuſa, *poſt* 3 *demum ſeptimanas conſpicua, lepore triplo minor, lente pilis continue micantibus incedens, teres, ſubpellucida, anterius anguſta, tineam referens.*

Trigona. 23. Tr. convexa anterius ciliata poſterius eroſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 82. *n.* 83. *zool. dan. prodr.* 2509.
Habitat rarior in aquis, *ſub lemna vacillando incedens, pilis breviſſimis.*

Angulus. 24. Tr. angulata apice crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 81. *n.* 82. *zool. dan. prodr.* 2508.
Habitat rara in aqua fœno infuſa, *interrupte per circulum mota, elongata, teretiuſcula, quaſi infracta, pilis brevibus, interaneis non diſcernendis.*

Pullaſter. 25. Tr. ovata, anterius ſinuata, fronte criſtata baſi crinita *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 81. *n.* 81. *zool. dan. prodr.* 2507.
Habitat in aquis ſub lemna, *pulici affinis, ſed minor, ſupra pellucida punctis nigricantibus vacua, anterius*

ſinuata fronte truncata, totaque capitis ſuperficie pilis aſpera, diſtincta.

Pulex. 26. Tr. ovata anterius inciſa, fronte baſique crinitis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 80. *zool. dan. prodr.* 2506. *Habitat rarior in* aqua ſub lemna, *quoties* 3-4 *greſſus proceſſit, unum mox retrogradiens, Colpodam cucullum referens, erecta, convexiuſcula, pellucida, moleculis nigricantibus undique referta, fronte obtuſa pilis rarioribus inſtructa, quibus alternatim vibrat.*

Pellionella. 27. Tr. cylindrica anterius crinita poſterius ſetoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 79. *zool. dan. prodr.* 2505. *Habitat in* aqua vegetabilibus *infuſa, lente incedens, medio paulo craſſior, utrinque obtuſa.*

Camelus. 28. Tr. anterius crinita craſſiuſcula medio utrinque emarginata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 80. *n.* 78. *zool. dan. prodr.* 2504.
Habitat rara in aqua, *vegetabilibus infuſa, in qua lente movetur pilis quaſi oſcillantibus, anterius ventricoſa, dorſo medio in* 2 *quaſi tubercula diviſo.*

Acarus. 29. Tr. piriformis, anterius ſubtus crinita, poſterius pedata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 79. *n.* 77. *zool. dan. prodr.* 2503. *Habitat rara in* aqua lemna, *tecta utplurimum per circulum mota, vivida, conica, moleculis nigricantibus impleta, anterius hyalina, apice attenuato, ſubtus ciliis longis radiato, ſubtus cirris* 4 *mobilibus, longis, curvatis inſtructa.*

Bomba. 30. Tr. mutabilis anterius pilis ſparſis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 78. *n.* 76. *zool. dan. prodr.* 2502. *Schranck oberdeutſch. Beytr.* 1787. *p.* 146. *t.* 1. *f.* L.
Habitat frequens in aquis, ubi lemna *vegetat, granatæ affinis, at major & flaveſcens, vivaciſſima, craſſa, moleculis lateſcentibus repleta.*

Granata. 31. Tr. ſphærica, centro opaco, peripheria crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 78. *n.* 75. *zool. dan. prodr.* 2501. *Habitat in* aquis lemna coopertis, *grandinellæ & cometæ affinis, at vita ſedentaria, nucleo obſcuro, interaneis non diſcernendis, ciliis totum marginem occupantibus diametro brevioribus diſtincta.*

Cometa. 32. Tr. ſphærica, anterius crinita, globulo appendente. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 77. *n.* 74. *zool. dan. prodr.* 2500.

Habitat in aqua puriſſima, auctumno conſpicua, vorticellarum pedunculatarum more circumnatans, tota pellucida.

Grandinella. 33. Tr. ſphærica pellucida ſuperne crinita. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 77. *n.* 73. *zool. dan. prodr.* 2499.
Habitat in aqua puriſſima, & vegetabilibus infuſa, interaneis vix diſcernendis, ſetis 2, 3 pluribuſve in puncto ſuperficiei.

Sol. 34. Tr. globularis undique radiata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 76. *n.* 72. *zool. dan. prodr.* 2498.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 64. *t.* 7. *f.* 15.
Habitat in aqua per 3 ſeptimanas aſſervata, radiis ex tota ſuperficie prodeuntibus innumeris ſubtiliſſimis, diametro longioribus interaneis molecularibus ſimilaribus.

Syncaſter. 35. Tr. ſubquadrata roſtro obtuſo, diſco pedicellis micantibus. *Müll. zool. dan.* I. 1. *p.* 33. *ic.* 1. *t.* 9. *n.* 3. *rar. deſcr.* 1. 3. 19. *prodr. app. p.* 281.
Habitat in aqua marina aſſervata, *minima.*

Rattus. 36. Tr. oblonga carinata, anterius pilis breviſſimis, poſterius ſeta longa ſimplici. *Müll. zool. dan. prodr. app. p.* 281.
Hermann Naturf. 20. *p.* 163. *n.* 47. *t.* 3. *f.* 47.
Habitat in aqua ſtagnante, inter lemnas, æquabiliter mota, interaneis in gibbo dorſi conſpicuis.

ciliata. 37. Tr. ventricoſa, poſterius crinibus pectinata. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 13-15. *rar. deſcr.* 2. *p.* 100.
Habitat in aqua mytilli edulis, *leucophram fluidam referens, flavicans, craſſa, reniformis, vel triangularis, ciliis undique cincta, crinibus totum marginem poſteriorem occupantibus, intermediis longioribus.*

ſulcata. 38. Tr. ovato-ventricoſa apice acuminata, ſulco ventrali utrinque crinito. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 16-20. *rar. deſcr.* 2. *p.* 100.
Habitat in aqua inter valvulas mytilli edulis *retenta, ignitam referens, at major, flavicans, anterius pallida abſque ciliis.*

** *caudatæ.*

tranſfuga. 39. Tr. latiuſcula anterius crinita poſterius ſetoſa, altero latere ſinuata, altero mucronata. *Müll. zool. dan.* I. *p.* 29. *ic. t.* 9. *n.* 1. *rar. deſcr.* 1. *p.* 16. *prodr. app. p.* 281.

Habitat in aqua marina, *aliquandiu aſſervata, in dorſo ut plurimum natans, primo antrorſum procedens, mox convulſivo quaſi motu retrogradiens, inter congeneres magna, duplo longior, quam lata, ad latus & retrorſum conſpicuis interaneis, anterius rotundata, pilis interdum in 2 faſciculos junctis, dorſo ultra medium convexo, in caudam latam depreſſam ſubtetragonam oblique truncatam terminata, ſub qua ſetæ* 4 *pluresve flexuoſæ.*

Delphinus. 40. Tr. oblonga, anterius crinita, poſterius cauda reflexa truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 75. *n.* 71. *zool. dan. prodr.* 2497.

Habitat in aqua fœno infuſa, *poſt* 2 *ſeptimanas conſpicua, lateribus planis potiſſimum mota, complanata, cauda dimidia corporis longitudine apice dilatata: angulo ſuperiore prominulo.*

Ludio. 41. Tr. cirrata, ſupra crinita, cauda ſurſum extenſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 75. *n.* 70. *zool. dan. prodr.* 2496.

Habitat rariſſima in aquis Daniæ *nemoralibus, lepida, vivida, nunc in gyrum circumacta, nunc per lineam angulatam vacillans, punctulata, anterius clavata, poſterius anguſtior, baſi verſus anteriora oblique truncata, ciliis cirriſque mobiliſſimis.*

Muſculus. 42. Tr. ovalis anterius crinita, poſterius ſubtus caudata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 71. *n.* 69. *zool. dan. prodr.* 2495.

Habitat in aqua fœno infuſa, *poſt plures demum ſeptimanas conſpicua, lentius mota, complanata, pilis raris breviſſimis, cauda ſpinam referente, interdum triplo minor & vivacior.*

Piſcis. 43. Tr. oblonga anterius crinita, poſterius in caudam exquiſitam extenuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 73. *n.* 68. *zool. dan. prodr.* 2494.

Habitat in aquis lemna plenis, *per ſeptimanam aſſervatis, lente mota, complanata, æqualis ubique latitudinis, moleculis flaveſcentibus plana, anterius obtuſa: pilis rarioribus & breviſſimis, poſterius hyalina.*

Cuniculus. 44. Tr. oblonga anterius crinita, poſterius ſubacuminata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 73. *n.* 67. *zool. dan. prodr.* 2493.

Habitat rarior paulo in aquis purioribus, *motu vagatorio, complanata, moleculis & veſiculis nigricantibus repleta, anterius obtuſo: ciliis breviſſimis, poſteriori apice hyalino.*

Clavus. 45. Tr. anterius rotundata crinita, poſterius acuminato-caudata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 72. *n.* 66. *zool. dan. prodr.* 2492.
Habitat in paludoſis, *lente mota, clavum referens, pilis anterius raris, paſſim mobilibus.*

Pupa. 46. Tr. aculeata fronte crinita, cauda inflexa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 72. *n.* 65. *zool. dan. prodr.* 2491.
Habitat rara in aquis *cum* lemna, *culicis pupam referens, lente in circulum mota, teretiuſcula, capitis pilis breviſſimis, in inferiore ejus regione veſicula hyalina, cauda obliqua.*

Clava. 47. Tr. clavata, fronte crinita, cauda reflexili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 71. *n.* 64. *zool. dan. prodr.* 2490.
Habitat rarior in paludoſis Daniæ, *Novembri conſpicua, cypridi affinis, at triplo major, pilis anticis longis, poſteriori parte anguſtiore nuda.*

CERCARIA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, pellucidus, caudatus.

* *depreſſæ.*

Pleuronectes. 1. C. orbicularis, cauda uniſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 70. *n.* 63. *zool. dan. prodr.* 2488.
Habitat in aqua *per 6 ſeptimanas aſſervata, vacillando mota, membranacea, albida (a morte virens), anterius punctis 2 ſubapproximatis nigris, cauda ſubtili acuta: interaneis in medio orbicularibus, majori unico pellucidiſſimo.*

tenax. 2. C. membranacea anterius craſſiuſcula truncata, cauda triplo breviore. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 69. *n.* 62. *zool. dan. prodr.* 2487.
Habitat in aqua ſordibus dentium infuſa, *poſt 4 dies apparens, celeri gyro in varias directiones vagans, lente paulo major, obovata.*

Cyclidium. 3. C. ovalis poſterius ſubemarginata, cauda exſertili. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 68. *n.* 61. *zool. dan. prodr.* 2486.
Habitat frequens in aquis purioribus, *ad angulum acutum vacillando, per diagonalem guttulæ currendo mota, pellucidiſſima, margine nigricante, cauda latente, interaneis veſicularibus pellucidis.*

** *ſubtrigonæ.*

tripus. 4. C. brachiis deflexis. *Müll. zool. dan. prodr.* 2489.
Habitat in aqua marina.

*** *teretes.*

Lemna. 5. C. mutabilis, cauda annulata. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 67. *n.* 60. *zool. dan. prodr.* 2485.
Habitat in aqua palludoſa, *lente incedens, & incedendo mirifice ſe contrahens formamque mutans, pyriformis, oblonga, elongata, reniformis vel triangularis, cauda brevi craſſa annulata, aut flexuoſa tereti, abſque annulis.*

Lupus. 6. C. cylindrica elongata toroſa, cauda ſpinis duabus. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 67. *n.* 59. *zool. dan. prodr.* 2484.
Habitat rara in aquoſis lemnam ferentibus, *congeneribus duplo vel triplo major, Vorticellæ feli affinis, & organo rotario nullo, & apice ſubtus in mucronem terminato diſcernenda, muſculoſa contractilis, capite trunco dimidio majore, apice deorſum in uncum parvum producto.*

Podura. 7. C. cylindrica, poſterius acuminata ſubfiſſa. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 66. *n.* 58. *zool. dan. prodr.* 2483.
Habitat in Daniæ paludoſis lemna coopertis, *Novembri & Decembri obvia, poduras pullas referens, corpus circa axin volvendo in quamvis plagam incedens, capite halecem referens, trunco formæ pro lubitu mutabilis, inteſtinis nigris ſpiralibus repleto.*

Catellus. 8. C. tripartita, cauda biſeta. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 65. *n.* 57. *zool. dan. prodr.* 2482.
Habitat in aqua *per annum ſervata, & in aqua per ſeptimanam flores nutriente, abdomine capite duplo longiori cauda latiori.*

Gyrinus. 9. C. rotundata, cauda acuminata. *Müll. hiſt. verm.* I. I. *p.* 64. *n.* 56. *zool. dan. prodr.* 2481.
Hill hiſt. an. t. I. 3. Macrocercus corpore globoſo, cauda craſſiore.
Leeuwenh. ep. phyſ. 41. *f.* 5.
Fraenk. Samml. 4. *p.* 227. *n.* I. *f.* a. *p.* 372. *t.* 3. *f.* a. b.
Ledermüll. an. ſperm. f. I. 2?
Baker microſc. expl. t. 10. *f.* I?
β) *Hill anim. hiſt. t.* I. 4?
Habitat rara in aqua partibus animalibus infuſa, *candida, gelatinoſa, abſque omni interaneorum veſtigio, anterius*

ſubgloboſa, poſterius teres elongata, interdum utrinque compreſſa, natando caudam inſtar gyrini vibrans.

BURSARIA. *Vermis* ſimpliciſſimus membranaceus cavus.

Hirundinella. 1. B. excavata mucronata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 63. *n.* 55. *zool. dan. prodr.* 2480.

Habitat in aquis nemoralibus, *Julio & Auguſto circa lemnam copioſiſſima, lente volutata, brachiiſque extenſis hirundines in aere circumvolitantes mentiens, linea duplici ſubelevata tranſverſa inæqualis, margine in quatuor mucrones plagas oppoſitas ſpectantes, 2 laterales æquales breviores expanſo.*

Truncutella. 2. B. ventricoſa apice truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 62. *n.* 54. *Müll. zool. dan. prodr.* 2479.

Habitat in Daniæ foſſis aquoſis paludibuſque nemoralibus, *foliis fagi putreſcentibus repletis, vere copioſa, nudo oculo uſurpanda, albida, lente ſe ab uno latere ad alterum volvendo per lineam ſpiralem in aquæ ſuperficiem adſcendens, ovata,* ½ *lineæ magnitudine, apice hiante, ovis ſæpius in fundo* 3–5 *ſphæricis, rufis.*

GONIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus, complanatus angulatus.

polyſphærium. 1. G. orbiculare pellucidum molecculis ſphæricis innumeris. *Schranck. oberd. Beytr.* I. *p.* 145. §. 5. *t.* 2. *f.* 1. K.

Habitat in aqua ſtagnante puriore, *Julio conſpicua, innumeris globulis conſtans, tunicæ communi incluſis, pellucidiſſimis, ex vireſcente flava, pectorali multo minus.*

truncatum. 2. G. obtuſangulum poſterius arcuatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 61. *n.* 52. *zool. dan. prodr.* 2477.

Habitat haud frequens in aquis puris, *pulvinato multo majus, lente procedens, antrorſum linea recta terminatum, ſubtus linea breviori in angulum obtuſum: truncatum, cruribus arcu unitis, interaneis obſcure vireſcentibus, in medio veſiculis 2 majoribus hyalinis.*

lunatum. 3. G. rectangulum poſterius acuatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 62. *n.* 53. *zool. dan. prodr.* 2478.

Habitat frequentius, truncato minus, interaneis vireſcentibus, intermedia veſicula majore hyalina.

pulvinatum. 4. G. quadrangulare opacum, pulvillis quatuor. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 61. *n.* 51. *zool. dan. prodr.* 2476.
Habitat in ſimetis, *ad angulum acutum lente vibrando motum, in* 4 *quaſi areolas diviſum.*

pectorale. 5. G. quadrangulare pellucidum, moleculis ſedecim ſphæricis. *Müll. hiſt verm.* I. 1. *p.* 60. *n.* 50. *zool. dan. prodr.* 2475. *act. Stockh.* 1781. *p.* 21. *kl. Schr.* 1. *p.* 15. *f.* 1-3.
Goeze apud Bonnet. inſectol. p. 376. *t.* 4. *f.* 8.
Pelliſſon Beſch. berl. Naturf. 1. *p.* 339.
Beſcke leipz. Magaz. 1784. 3. *p.* 319.
Schranck Beytr. z. Naturg. p. 107. *t.* 4. *f.* 23-27.
Habitat in Europæ aquis puris, *alternatim dextram ſiniſtramque verſus ultra circuli quadrantem ſe volvendo progrediens, moleculis motu ovalibus, ſubvirentibus, unionum inſtar pectoralis ſummi pontificis membranæ quadrangulæ incluſis.*

COLPODA. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, pellucidus, complanatus, ſinuatus.

Hippocrepis. 1. C. toroſa medio anguſtata ſemilunaris vireſcens. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 169. *n.* 59. *t.* 3. *f.* 60.
Habitat in aqua inundante, aſſervata, *formæ conſtantis agilis, continue mota.*

Meleagris. 2. C. mutabilis, anterius uncinata poſterius complicata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 59. *n.* 49. *zool. dan. prodr.* 2474.
Habitat rara in aquis cum lemna, *varie ſe plicando lente mota, apice in uncum flexo, anterius hyalina, poſterius moleculis repleta.*

Cucullus. 3. C. ovata anterius inciſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 58. *n.* 48. *zool. dan. prodr.* 2473.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 2. *f.* 2-7. *t.* 3. *f.* F. G. P. *t.* 4. *f.* 2. c. *f.* p. g. A. B. *t.* 5. *f.* 5. S. *f.* 6. V. *f.* 7. & *t.* 6. *f.* 2. 4. 5. 6.
Ledermüll. microſc. p. 88. *t.* 48. *f.* 1.
Wrisberg an. infuſ. p. 59. *f.* 4. D. E. F. G. O. *f.* 10. C. D. E. F. G. H. & *f.* 12.
Spallanz. anim. infuſ. p. 128. 129. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Schranck Beytr. z. Naturg. p. 17. *t.* 1. *f.* 21.
Goeze Beſch. berl. Naturf. 3. *p.* 376. *t.* 8. *f.* 1-6.
Habitat vulgaris in aqua fœno *aliiſque* vegetabilibus infuſa, *in varias directiones vivide mota, ventricoſa, pellucidiſſima, antrorſum infra apicem in roſtrum utplurimum obtuſum ſinuatum, veſiculas pellucidas, junior nullas, adultior* 8-24 *continens, ſobolem.*

Ren. 4. C. craſſa medio ſinuata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 57. *n.* 47. *zool. dan. prodr.* 2472.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 65. *c.* 8. *f.* 3. A. B. C.
Habitat in aqua fœno infuſa, *decem horis elapſis comparens, celeriter vacillando mota, flaveſcens, aut cryſtallina ſubobſcura, teres, interaneis molecularibus farta.*

Roſtrum. 5. C. oblonga anterius uncinata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 57. *n.* 46. *zool. dan. prodr.* 2471.
Habitat haud frequens in aquis lemnam ferentibus, *lente & horizontaliter mota, ſæpe in alteram paginam præceps projecta, moleculis nigricantibus repleta, poſterius obtuſa.*

Lamella. 6. C. elongata membranacea, anterius curvata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 56. *n.* 45. *zool. dan. prodr.* 2470.
Habitat rariſſima in aquis, *margine acuto vagando vacillans, cryſtallina, pellucidiſſima anguſta, poſterius obtuſa.*

PARAMECIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimplex, pellucidus, complanatus, oblongus.

Hiſtrio. 1. P. ovato-oblongum, anterius punctis mobilibus nigris. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 55. *n.* 44. *zool. dan. prod.* 2469.
Habitat inter conſervas aquarum dulcium, *motu convulſivo retractili agitatum, punctis anterius* 4-5 *omni momento locum mutantibus notatum.*

Aurelia. 2. P. oblongum anterius in longitudinem plicatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 54. *n.* 43. *zool. dan. prodr.* 2468. *Hermann Naturf.* 20. *t.* 3. *f.* 41. a.
Hill hiſt. anim. t. 1. 3. Paramecium corpore ſublongo medium verſus anguſtato.
Wrisberg an. infuſ. f. 7. a. E.
Habitat in foſſis lemna plenis, *Junio obvia, & copioſa aquæ vegetabilibus infuſa, ſecundum lineas rectas vacillans,*

juſcula, membranacea, latitudine quadruplo longior, anterius obtuſa, hyalina, poſterius moleculis variæ magnitudinis repleta, plica a medio ad apicem anteriorem producta.

caudatum. 3. P. utroque fine acuminatum, medio latiore moleculis referto. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 157. *n.* 38. *t.* 3. *f.* 38.
Habitat in aquis ſub lemna, *motu lento æquabili agitatum.*

anceps. 4. P. cauda ancipite, capite obtuſo. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 157. *n.* 39. *t.* 3. *f.* 39.
Habitat in aqua, hydrocharide *referta, motu lento æquabili laterali directionem ſpiralem ſequens.*

acutum. 5. P. cauda ancipiti, capite acuto. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 158. *n.* 40. *t.* 3. *f.* 40.
Habitat in lemna aquarum ſtagnantium, *minus agile, caudam continue motitans.*

CYCLIDIUM. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus, pellucidus, complanatus, orbicularis vel ovatus.

Pediculus. 1. C. ovale convexum ſubtus planum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 54. *n.* 42. *zool. dan. prodr.* 2467.
Trembl. polyp. 1. *p.* 282. *t.* 7. *f.* 10. 11.
Goeze Beſch. berl. Naturf. 2. *p.* 281. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat in hydra fuſca & pallente, *corpori tentaculiſque adhærens, Julio potiſſimum & Augusto occurrens, motu formaque multiplici varians, gelatinoſum, albidum, utroque fine depreſſum truncatum.*

Nucleus. 2. C. ovale, poſterius acuminatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 53. *n.* 41. *zool. dan. prodr.* 2466.
Hill hiſt. anim. t. 1. 4? Cyclidium corpore ovato.
Habitat rara in aqua vegetabilibus infuſa, *figura nucleum uvarum referens, compreſſum, diſtincte marginatum, anterius convexo-obtuſum interaneis veſicularibus, anterius & poſterius ab altero latere obſcurioribus.*

roſtratum. 3. C. ovale anterius mucronatum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 53. *n.* 40. *zool. dan. prodr.* 2465.

Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *complanatum, pellucidiſſimum, intus canali cæruleo ab apertura in 2 crura diviſo, ad medium corporis, infra medium lineolis 2 tranſverſis.*

radians. 4. C. ovatum, interaneis manifeſtis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 52. *n.* 39. *zool. dan. prodr.* 2464. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 151. *t.* 3. *f.* 27. i.

Hill hiſt. an. t. 1. *f.* 3. Cyclidium corpore elliptico.
Spallanz. an infuſ. t. 1. *f.* 2-6.

Habitat haud frequens in aqua vegetabilibus infuſa, *inter ovatum & orbicularem medium, pellucidiſſimum, planum, margine nigricante, interaneis veſicularibus hyalinis, materiæ cæruleæ incluſis.*

Glaucoma. 5. C. ovatum, interaneis ægre conſpicuis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 51. *n.* 38. *zool. dan. prodr.* 2463. *Hermann Naturf.* 20. *p.* 148. *t.* 3. *f.* 27. b?

Habitat in aqua ultra 6 menſes hiemales *in* vaſe aperto ſervata, *in abundante aqua motu celere circulari & diagonali, quemadmodum gyrini, agitatum, utrinque planiuſculum, inteſtinis cæruleſcentibus.*

Milium. 6. C. ellipticum cryſtallinum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 50. *n.* 37. *zool. dan. prodr.* 2462.

Habitat in aqua variis ſtirpibus infuſa, *poſt plures ſeptimanas copioſiſſimum, ſparſum, milii ſemina referens, motu celeri micatorio interrupto agitatum, pellucidiſſimum, puncto anteriori & poſteriori nigricante.*

Bulla. 7. C. orbiculare hyalinum. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 49. *n.* 36. *zool. dan. prodr.* 2461.

Hill hiſt. anim. t. 1. 2. Cyclidium corpore orbiculari ſubfuſco.
Wrisberg anim. infuſ. f. 1. b. & *f.* 2. i?

Habitat paſſim in aqua fœno infuſa, *motu lento ſemicirculari agitatum, interaneis globularibus, margine ſolo obſcuriore.*

VIBRIO. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, teres, elongatus.

* *pellucentes.*

Columbus. 1. V. craſſus poſterius acuminatus, collo ſubfalcato. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 49. n. 35. zool. dan. prodr.* 2460.
Habitat rarus in aquis, *lente motus, congeneribus major, avem aquaticam referens, trunco ſubtriquetro, moleculis flaveſcentibus repleto, antrorſum lato, collo breviori æquali, hyalino, apice obtuſo.*

Faſciola. 2. V. anterius attenuatus, medio latiuſculus, poſterius acutus. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 48. n. 34. zool. dan. prodr.* 2459.
Habitat rarior in aqua gelu ſoluta, *lente faſciolæ inſtar incedens, feſtine autem utrumque finem alternatim ſurſum deorſumque movendo, totumque ſimul corpus cylindri in modum circumagendo, interaneis punctorum æmulis mediis.*

Utriculus. 3. V. teres anterius anguſtatus truncatus, poſterius ventricoſus. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 48. n. 33. zool. dan. prodr.* 2458.
Habitat in aqua marina putrida, *etiam* fluviatili *per menſes in* vaſculo ſtagnante, *utrem figura referens concitatim vacillans, vagandoque collum hyalinum, apice truncatum quovis momento citiſſime in utrumque latus motitans, ventre interaneis repleto: puncto interdum ad baſin pellucido.*

Malleus. 4. V. linearis, baſi globoſo, apice linea tranſverſa. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 47. n. 32. zool. dan. prodr.* 2457.
Habitat copioſus in putei aquis, *albus, T latinum referens, alternatim motus & quieſcens.*

Cygnus. 5. V. ventricoſus, collo adunco. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 47. n. 31. zool. dan. prodr.* 2456.
Habitat in aqua ſtagnante, *congenerum inertiſſimus, collum modo exſerens & retrahens, exilis, pellucidiſſimus, poſterius acutus trunco anteriori parti æquali, moleculis obſcuris & inteſtinis pellucidis repleto, cauda triplo breviore.*

Anſer. 6. V. ellipticus, collo longo, tuberculo dorſali. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 46. n. 30. zool. dan. prodr.* 2455.
Habitat in aquis, quæ lemnam ferunt, *lento motu, colli flexuoſo vivaciori, ſæpe ſpirali agitatus, inter falcem & Proteum medius, ab illa collo longiori tuberculo dorſi*

huic

vicino, ab hoc colli apice æquali diſcernendus, teres moleculis refertus, poſterius hyalinus, canalibus intra margines colli cæruleſcentibus.

Falx. 7. V. gibboſus, poſterius obtuſus, collo falcato. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 46. n. 29. zool. dan. prodr. 2454.*
Habitat in paludoſis lemna refertis, *latere plano ſurſum vergente progrediens, colloque immobili falcis formam mentiens, pellucidus ſupra planus, ſubtus gibbus, moleculis minimis globuliſque 2 hyalinis impletus, collo teretiuſculo, hyalino, trunci fere longitudine, attenuato.*

Proteus. 8. V. ellipticus, collo longiſſimo: apice nodoſo. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 45. n. 28. zool. dan. prodr 2453.*
Pallas el. zooph. p. 94. n. 51. & p. 417. n. 2. Brachionus ſimplex mutabilis, tentaculo longiſſimo retractili, ore ciliato, & Volvox polymorpho-mutabilis, totus e moleculis homogeneis compoſitus.
Baker microgr. p. 270. t. 10. f. 110. a-f.
microſc. t. 10. n. XI. f. 1-6.
Roeſ. inſ. 3. polyp. t. 101. f. A-T?
Habitat rarus in aqua diutius *in* vaſculo ſervata viroreque vegetabili plena, *vividus, colli motu continuo, corporis lento, formæ mutabilis, poſterius moleculis obſcuris repletus, collo corpore duplo & triplo longiore, pellucidiſſimo.*

** *gelatinoſi.*

Inteſtinum. 9. V. teres anterius anguſtatus. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 44. n. 27. zool. dan. prodr. 2452.*
Habitat in Daniæ paludoſis, *lente progrediens, lacteus, utroque fine obtuſus, anteriorem ſæpius in ſe retrahens, verſus poſteriorem ova 4-5 ſphærica oſtendens.*

Undula. 10. V. filiformis flexuoſus. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 43. n. 26. zool. dan. prodr. 2451. Hermann Naturf. 20. p. 150. t. 3. f. 27. g.*
Leeuwenh. epiſt. phyſ. 41. f. 5.
arcan. nat. 96? Anguilla.
Habitat in aqua lemna cooperta aſſervata, *vivaciſſimus adſcendendo, deſcendendo, recta pergendo progrediens, teres, Lineola longior, Vermiculo multoties minor, interaneis nullis conſpicuis, nunquam recta extenſus.*

Vermiculus. 11. V. tortuoſus. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 42. n. 25. zool. dan. prodr.* 2450.
Leuwenh. op. omn. p. 56. (*in ranarum ſtercore*) *arcan. nat. p.* 18. *f.* 5.
Habitat rarus in aqua paluſtri, *Novembri obvius, undulatim at lentiſſime motus, interdum at laborioſe recta extenſus progrediens, quieſcendo nonnunquam complanatus, lacteus, teres, elongatus, apice obtuſus, retrorſum acuminatus.*

Serpentulus. 12. V. æqualis utrinque ſubacuminatus. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 42. n. 24. zool. dan. prodr.* 2449.
Hill hiſt. anim. t. 1. Enchelis corpore utrinque attenuato graciliori.
Frank. Samml. 4. *p.* 227. *n.* 1. *f.* b.-f.
Spallanz. microſc. p. 189. *f.* 2. 12.
Habitat in aqua vegetabilibus infuſa per ſeptimanas aſſervata, *ſerpentis more motus, at ſæpe recta extenſus, & tranquillus, brevior anguillula, & ſerie punctorum minimorum longitudinali notatus.*

Anguillula. 13. V. æqualis ſubrigidus. *Müll. hiſt. verm. I. 1. p. 41. n. 23. zool. dan. prodr.* 2448. *Naturf.* 16. *p.* 161.
Mundus inviſib. in amœnit. acad. Coruſcum vermiculo ſimile.
Roffredi Journ. de phyſique 1775. *Jan. t.* 1. *f.* 7. 1778. *Nov. p.* 401. Anguille vulgaire.
Needham microſc. t. 5. *f.* 7. & *Hamb. Mag.* 1. *p.* 399.
Spallanz an. infuſ. p. 189. *f.* 12.
v. Gleichen microſc. p. 61. *t.* 28. *f.* 6.
Eichhorn kl. Waſſerth. p. 72. *t.* 8. *f.* A.
β) *Roffredi Journ. de phyſ. Jan.* 1775. *t.* 1. Anguille de blad rachitique.
γ) *Roffredi journ. de phyſ.* 1776. *Jan. p.* 72. *Mart. p.* 372. 436. Anguille du faux ergot.
T. Fontana ſaggio d'oſſerv. ſopra il falſo ergoſt e la tremella. Flor. 1775.
Habitat in ſedimento vegetabili, parietes vaſorum, *in quibus* aqua ſtagnat, obveſtiente, *aut* frumenti granis rhachiticis vel cornutis infuſa, *pellucidiſſimus, abſque conſpicuis interaneis, ut tamen interdum linea media tranſverſa, rarius corpuſcula bina ovata, rariſſime longitudinalis globulorum ſeries oculo armato occurrit, oviparus.*

aceti. 14. A. ſubrigidus, cauda longiore tenuiore acuminata: mucrone retractili ad baſin prominente. *Goeze Naturf.* 1. *p.* 1. 9. *p.* 179. 18. *p.* 38. *t.* 3. *f.* 12–19. & *apud Bonnet org. Koerp. p.* 59.
Müll. Naturf. 19. *p.* 162.
Roſſredi journ. de phyſ. 1775. *t.* 1. *f.* 5. 1776. *Jan. p.* 71. *Mart: p.* 382. Anguille du vinaigre.
Borell. obſerv. microſc. 1. *p.* 7.
Leeuwenh. op. omn. p. 3. *f.* 1–0.
Baker. microſc. t. 10. *f.* 8. 9.
Joblot microſc: I. 2. *t.* 1.
Power microſc. p. 30.
Hoon microſc. t. 25 *f.* 2.
Unzer phyſ. Schr. p. 260.
Biſchoff n. opt. Beytr. p. 24–26 & *Beytr.* 3. *Opt. p.* 40.
Fraenk. Samml. 4. *p.* 277. *n.* 2. *f.* g. o.
Habitat in aceto aliiſque acidis mitioribus, *aëri opportunis, quibus congelatis obrigeſcit, relegati ad motum redit, evaporatione diſſipatis, quemadmodum alia infuſoria, dilabitur & perit, nunquam reviviſcens, niſi pulviſculis a vi aëris defendentibus involutus fuerit, exuvias deponens, Julio auctumnum verſus viviparus, in ſerum uſque auctumnum oviparus, fertiliſſimus, ſexibus diſtinctis, filiformis, vivax, pellucidus, utroque fine quam maxime, & vacuo, medio granulis repleto.*

glutinis. 15. V. filiformis, dorſi clypeo obſcuro annulo albido cincto, capite clavato. *Goeze Naturf.* 9. *p.* 181. *Müll. Naturf.* 19. *p.* 162.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1326. *n.* 1. Chaos (redivivum) filiforme utrinque attenuatum.
Roſſredi journ. de phyſ. 1775. *Mart. f.* 4. 1776. *p.* 383.
Ledermüll. microſc. p. 33. *t.* 17. *f.* 1.
Habitat in glutine bibliopegorum, *aliiſque viſcidis frumentaceis, atmoſphæræ contactui obviis, fertilitate, motu, vita, propagatione v. aceti ſimilis, at multo tardior, brevior, cauda minus acuta.*

marinus. 16. V. filiformis æqualis. *Müll. Naturf.* 19. *p.* 163.
Habitat in aqua marina, *an vere diſtinctus ab anguillula?*

Bacillus 17. V. linearis æqualis utrinque truncatus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 40. *n.* 22. *zool. dan. prodr.* 2447.
Leeuwenh. arc. nat. p. 40. *f.* F. & *p.* 315. *f.* C. D.

Joblot microſc. I. 2. *p.* 67. *t.* 8. *f.* 12. 14.
Habitat in aqua fœno infuſa diu ſervata, paluſtri, lemnam ferente, fœtente *languidus, ſerpens, recta ſemper linea progrediens, gordio lacteo ſimilis, ſed ſubtiliſſimus, ut monade lente dimidio ſit anguſtior, quamvis ſextuplo & decuplo longior.*

Lincola. 18. V. linearis obſcurus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 39. *n.* 21. *zool. dan. prodr.* 2446.
Habitat in aqua vegetabilibus infuſa, *poſt aliquot dies copioſiſſima, bacillo tricies minor, ipſa monade ter mone fere minor, motu tremulo continuo agitatus.*

LEUCOPHRA. *Corpus* undique ciliis albicantibus, motu argenti inſtar ſplendentibus cinctum: oculo nudo non conſpicuum.

Nuida. 1. L. ſubreniformis ventricoſa. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 1-6. *rar. deſcr.* 2. *p.* 97.
Habitat in aqua mytili edulis, *flavicans, craſſa, moleculis farta, in quas ſenſim ſatiſcunt, formæ mutabilis, ovatæ, oblongæ, vel ſubtriangularis.*

acuta. 2. L. nigra acuminata. *Müll. zool. dan. rar. deſcr.* 2. *p.* 97.
Habitat - - -.

fluxa. 3. L. ſinuata reniformis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 7. 10. *rar. deſcr.* 2. *p.* 99.
Habitat in aqua mytili edulis, *oblonga flavicans, altera parte obtuſa, ciliis undique cincta, altera in conum producta, in plurimis in moleculas diffluentem.*

Armilla. 4. L. teres annularis. *Müll. zool. dan.* 2. *t.* 73. *f.* 11. 12. *rar. deſcr.* 2. *p.* 99.
Habitat rarior in aqua mytili edulis, *altero fine pauliſper incraſſato & in annuli formam curvato farcimen referens.*

Plures adhuc Leucophræ *ſpecies in aqua fluviatili & marina, in naidis lumbrici, ranæ inteſtinis occurrunt, hactenus nondum cura ſatis definitæ.*

nodulata. 5. L. ovato-oblonga depreſſa, ſerie nodulorum duplici. *Müll. zool. dan. 2. t. 80. f.* a-e. *rar. deſcr. 2. p. 124.*
v. Gleichen microſc. p. 59. t. 27. f. 1. & t. 28. f. 11.
Knopthierchen, Perlenthierchen.
Habitat in lumbrici terreſtris & naidis littoralis inteſtinis, *pellucidiſſima, argentei ſplendoris, partitione tranſverſali propaganda, junior ovalis, adultior oblonga, apice truncata, ac rimula orificium ſimulante notata, ciliis motu tremulo agitatis.*

BACILLARIA. *Corpus* ex bacillis cylindricis ſitu parallelo, ceterum varia directione digeſtis compoſitum.

paradoxa. 1. B. *Müll. kl. Schrift. 1. p. 1. f. 1-8.*
Habitat in littoris Havnienſis ulva latiſſima, *conſtans* 5-40 *& ultra bacillis brevibus, cylindricis; longitudine diametrum* 12es *ſuperante, intus membranula flavicante punctis lucidis ſparſis* 2-3 *notata refertis, quieto animali in parallelepipedum junctis, facile in lineam rectam, angulatumque pro lubitu animalis diſponendis, in qua ſinguli bacilli eundem ſemper obtinent locum.*

ENCHELIS. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus; ſimpliciſſimus, cylindricus.

* *pellucidæ.*

Pyrum. 1. E. inverſe conica, poſterius hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 38. *n.* 20. *zool. dan. prodr.* 2745.
Habitat haud frequens in aqua lemnam ſerente, *diu ſervata, feſtine currendo & recurrendo per guttulæ diametrum ſe volutans, vivida, pellucida, anterius ventricoſa, obtuſa, moleculis mobilibus farta.*

Spathula. 2. E. cylindrica ſtriata, apice hyalino ſpatulata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 38. *n.* 19. *zool. dan. prod.* 2444.
Habitat rara in aquis, *in* quibus lemna *vegetat, vacillando mota, pellucidiſſima, ſtriis ſecundum longitudinem exarata, globulos 2 hyalinos utplurimum includens.*

Papula. 3. E. cylindrica, apice papillari. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 37. *n.* 18. *zool. dan. prodr.* 2443.
Habitat in fimetis, *ultimis anni menſibus obvia, circa axin longitudinalem rotando mota, moleculis ſubſphæricis mobilibus antrorſum confertis impleta, utroque fine obtuſa, antrorſum ventricoſa, obſcura, poſterius pellucida: apertura circulari.*

Fritillus. 4. E. cylindrica anterius truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 37. *n.* 17. *zool. dan. prodr.* 2442. *Hermann Naturf.* 19. *p.* 55. *t.* 8. *f.* 21.
Habitat in aqua gramini fœnove infuſa, *rarior poſt multas demum ſeptimanas conſpicua, motu vacillatorio guttulæ diametrum confeſtim percurrens, interdum per temporis momentum in gyrum acta, pellucidiſſima, poſterius convexo-obtuſa.*

Ovulum. 5. E. cylindrico-ovata hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 36. *n.* 16. *zool. dan. prodr.* 2441.
Habitat in fimetis, *ſolitaria inter monadum myriades, pellucidiſſima.*

Fuſus. 6. E. cylindrica, utroque fine anguſtiori truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 36. *n.* 15. *zool. dan. prodr.* 2440.

Habitat in aquis purioribus, *lente mota, inteſtino longitudinali ſubflexuoſo, liquore cæruleſcente & moleculis nigricantibus repleto.*

Epiſtomium. 7. E. cylindrico-elongata, apice gracili globoſo. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 35. *n.* 14. *zool. dan. prodr.* 2439.
Habitat in aqua fœtente, *utplurimum per diametrum guttæ vacillans, congenerum fere minima, teres, poſterius obtuſa, anterius ſubacuminata.*

Seminulum. 8. E. cylindrica æqualis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 35. *n.* 13. *zool. dan. prodr.* 2438.
Habitat in aqua dies aliquot ſervata, *alternatim deſcendendo & adſcendendo mota, latitudine duplo longior, interaneis anterius pellucidis, poſterius obſcuris.*

** *opacæ.*

nebuloſa. 9. E. ovato-cylindrica, interaneis manifeſtis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 12. *zool. dan. prodr.* 2437.
Habitat cum Cyclidio Glaucomate *in eadem* aqua, *at triplo major, multoque rarior, anteriorem corporis partem elevando mota, anterius anguſtior, interaneis opacis.*

Farcimen. 10. E. cylindrica curvata utrinque truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 11. *zool. dan. prodr.* 2436.
Joblot microſc. I. 2. *p.* 33. *t.* 5. *f.* 2. M.
Habitat rara in aqua diu ſervata, *incedendo litteram S referens, latitudine quadruplo longior, æqualis, interaneis opacis.*

viridis. 11. E. ſubcylindrica anterius oblique truncata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 34. *n.* 10. *zool. dan. prodr.* 2435.
Habitat copioſa in aqua plures ſeptimanas ſervata, *omni momento dextrorſum & ſiniſtrorſum mota, poſterius obtuſa interaneis obſcuris non diſtinctis.*

352. VOLVOX. *Vermis* nudo oculo inconſpicuus, ſimpliciſſimus, pellucidus, ſphæricus.

Bulla. 1. V. ſubovalis. *Martiniere journ. de phyſ.* 1787. *Oct. p.* 265. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in aqua, *in* vitro aſſervata, *bullam ſaponis referens, in gyrum continuo acta, nunc ſolitaria, nunc gregaria.*

Pileus. 2. V. hemiſphæricus ſubtus excavatus membranaceus. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 144. §. IV. *t.* 2. *f.* G. H.
Habitat in aqua, *inter congeneres major, dilute vireſcens, in gyrum ſæpius acta.*

Globator. 3. V. ſphæricus membranaceus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 32. *n.* 9. *zool. dan. prodr.* 2434.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1325. *n.* 3. *Fn. ſuec.* 2266. Volvox globoſus.
Pallas el. zooph. p. 417. *n.* 1. Volvox globoſus immutabilis, fœtubus ſparſis.
De Geer. act. Stockh. 1761. *p.* 111. *t.* 3. *f.* 1-5.
Roeſel inſ. 3. *polyp. p.* 67. *t.* 101. *f.* 1-3.
Leeuwenh. cont. arc. nat. p. 149-152. *f.* 2.
Baker act. microſc. p. 418. *c.* 13. *t.* 12. *f.* 27.
Habitat in Europæ aquis ſtagnantibus, *primo vere & æſtate copioſiſſimus*, in aqua fœno infuſa *hieme quoque obvius, viridis, ætate albidus & aurantius*, globulis *minoribus ſaturate viridibus fœtus, circa axin lente motus, nudo oculo conſpicuus, membrana conſtans pellucida, moleculis rotundis centro pellucidis immobilibus in ſuperficie obſita*, globulos 8-30-40 *magnitudine diverſos includens, qui membrana dehiſcente prodeunt, propriam agentes vitam, alioſque iterum includentes & pari ratione enitentes, ut liberis, nepotibus, & pronepotibus ſæpe gravidum dixeris animalculum.*

dimidiatus. 4. V. inceſſu hemiſphæricus.
Wilk. act. Stockh. 1762.
Habitat ſæpius in caudis larvarum ranæ temporariæ, *dum in aqua ſe volutat, hemiſphæricus, dum quieſcit, globoſus; an vere diſtincta a reliquis hujus generis ſpecies?*

Sphærula. 5. V. ſphæricus, moleculis ſimilaribus rotundis. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 31. *n.* 8. *zool. dan. prodr.* 2433. *Schranck oberd. Beytr.* 1. *p.* 141. §. III. *t.* 2. F. *Hermann Naturſ.* 20. *p.* 154. *n.* 33. *t.* 3. *f.* 33.

Habitat haud frequens in Europæ aquis ſtagnantibus, *lente a dextra ad ſiniſtram vix ultra quadrantem circuli, & mox rurſus dextrorſum motus, e punctis circiter 60 pellucidis homogeneis conflatus, nunc hyalinus, nunc ex vireſcente flavicans.*

Uva. 6. V. orbicularis, moleculis ovatis pellucidis ſuccineis puncto connexis. *Hermann Naturſ.* 20. *p.* 148. *t.* 3. *f.* 27. f.

Habitat in aqua paluſtri, *motu vivaci, æquabili, circa axin rotando agitatus, moleculis* 8-10 *conſtans.*

Lunula. 7. V. hemiſphæricus, moleculis ſimilaribus lunatis *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 30. *n.* 7. *zool. dan. prodr.* 2432.

Habitat rarus in Daniæ aqua paluſtri, *primo vere obvius, continue motus, tum lente totum corpus rotando, tum moleculis ſingulis concitate agitatis, hyalinus, moleculis innumeris.*

Conflictor. 8. V. ſphæricus ſubopacus, interaneis mobilibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 29. *n.* 6. *zool. dan. prodr.* 2431.

Habitat in fimetis, *rarius vere quidem* obvius, *in* aqua vegetabilibus infuſa, *hieme, vorticellis pleriſque major, flaveſcens, margine nigricans dextrorſum & ſiniſtrorſum lente per intervalla rotatus, moleculis innumeris minutiſſimis in circulo contentis continue motis, & abſque omni conſpicuo ordine vehementer quaſi confligentibus, aqua deſicere incipiente, in figuram ovato oblongam vel cylindricam, poſteriore parte ſæpe trigonam tranſiens, nunc pellucidus interaneis vacuus, nunc vacillando aut gyrando corpus per aquas latas, molecularum rotatione decuplo celeriore, aqua penitus deficiente totus quieſcens, & humore omni tandem diſſipato, in moleculas informes effuſus, ſenſim evanidas,*

Pilula. 9. V. ſphæricus, interaneis immobilibus vireſcentibus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 28. *n.* 5. *zool. dan. prodr.* 2430.

Habitat in aquis purioribus, lemnam minorem *ferentibus, Decembris medio frequens, lente & feſtine circa axin rotatus, conflictore minor.*

Globulus. 10. V. globoſus, poſterius ſubobſcurus. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 28. *n.* 4. *zool. dan. prodr.* 2429.

Habitat in aqua-vegetabilibus infuſa, *ſubovalis, monade lente decuplo major, volutando, vel eodem loco lente motus, vel celeriter currens, interaneis veſicularibus poſterius obſcurioribus.*

MONAS *Vermis* nudo oculo inconſpicuus ſimpliciſſimus pellucidus puncti æmulus.

Mica. 1. M. circulo notata. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 27. *n.* 3. *zool. dan. prodr.* 2428.

Habitat paſſim in aquis purioribus, *vacillando mota, hyalina, circulo ovali, medio, mobili.*

Lens. 2. M. hyalina. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 26. *n.* 2. *zool. dan. prodr.* 2427.

Hill hiſt. anim. t. I. 1. Cyclidium corpore orbiculari pellucidiſſimo.
Leeuwenh. arc. nat. p. 40. *f.* E.
Joblot microſc. I. 2. *t.* 5. *f.* 8. Z.
Baker microſc. expl. t. 10. *f.* 1-3.
Ledermüll. microſc. p. 115. *t.* 60.
Wrisberg anim. infuſ. f. 1-4.
Spallanz. an. inf. f. 11.

Habitat per myriades in omni aqua, *rarior in* puriſſima, *etiam in* dentium ſordidus, *eodem in loco per intervalla tremulo motu agitata, dein lente incedens, demum vivacior totum guttulæ oceanum percurrens, figura inter ovatum & ſphæricum media, interancorum veſtigio nullo, aggregata, maſſas veſiculares membranaceas fingens.*

Termo. 3. M. gelatinoſa. *Müll. hiſt. verm.* I. 1. *p.* 25. *n.* 1. *zool. dan. prodr.* 2424.

Habitat in aqua animalibus aut vegetabilibus infuſa, *brevi, antequam fœtet, comparens, omnium animalium ſimpliciſſimum, minimum.*

Sed

Animadverti immenſum Opus DEI
non poſſe hominem *aſſequi,*
quamvis laborioſe quærat.

Eccl. XVIII. 2-5.

Pauca hæc vidimus operum DEI,
Multa abſcondita ſunt minora his majora.

o JEHOVA!

Omnia iſta ANIMANTIA in TE ſperant,
ut des illis Eſcam tempore ſuo;
TE ipſis dante illam colligunt,
aperiente manum. Tuam ſatiantur bono;
TE recipiente Spiritum eorum pereunt,
& in Pulverem revertuntur;
TE emittente ſpiritum Tuum creantur,
& renovas faciem Terræ.
Gloria Domini erit in Secula,
& lætatur Jehova operibus ſuis.
Canam JEHOVÆ in diebus vitæ meæ,
reflectam Sapientiæ EJUS radios, quamdiu ſuperero.

David Pſalm. CIV. 27.

RUDOLPHIPOLI,
LITTERIS BERGMANNIANIS.